

LÍNGUA PORTUGUESA

Valor por questão:

Questão	V. Questão	Peso	V. Ponderado
Da questão 01 à questão 04	0,5	2,5	1,25
Da questão 05 à questão 08	1,0	2,5	2,5
Da questão 09 à questão 10	2,0	2,5	5,0

Texto I

A educação é uma arma

O brasileiro, principalmente o das grandes cidades, parece viver em pânico. O medo tornou banal desconfiar de crianças em semáforos ou de adultos maltrapilhos que andam pelas ruas.

A cada dia aumenta o número de crimes e criminosos. Aqueles que já estão cegos pelo pavor não têm dúvida ao enxergar quem os ameaça como inimigos a serem eliminados. Muitos defendem a pena de morte. Outros gostam de saber que os marginais estão em condições repugnantes nas prisões em que são lançados. Mas, os piores são os que acham impossível regenerar um homem.

Victor Hugo advertiu: "Quem abre uma escola fecha uma prisão". Muito antes, Pitágoras conclamou: "Educar crianças, para que não seja necessário castigar os adultos". Não é, portanto, nenhuma novidade, nem tampouco absurdo, exigir que se invista cada vez mais em educação. É ela que arrebenta grades, abre portas e liberta todos nós.

(Revista Educação, out. 1999. Adaptado)

01. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Com base no texto acima, o título do texto I "A educação é uma arma" apresenta-se em qual figura de linguagem?

- Metáfora.
- Catacrese.
- Metonímia.
- Onomatopeia.

02. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Assinale a alternativa em que todas as palavras ou expressões recuperam, por coesão textual, o fato da advertência do escritor Vitor Hugo no texto I.

- liberdade, impaciência.
- impossibilidade, interesse.
- vontade, liberdade.
- solidariedade, condenação

03. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Segundo o Texto I, a pior forma de se observar os criminosos é:

- não tem como mudar a forma como eles levam a vida.
- são pessoas a serem dizimadas da sociedade.
- é muito melhor vê-los nas prisões.
- o pânico que acontece na sociedade é culpa deles.

04. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

A expressão "parece viver em pânico", na primeira e na segunda linha do texto significa que:

- As pessoas estão cada vez mais preocupadas com a criminalidade.
- Os grandes filósofos já alertavam para a teoria do pânico na vida das pessoas.
- Viver em grandes cidades transforma o cotidiano em um transtorno geral.
- Cada dia, mais e mais pessoas estão enfrentando problemas no cotidiano.

05. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Na oração "Aqueles que já estão cegos pelo pavor não têm dúvida ao enxergar" A partir dos estudos gramaticais podemos dizer que o termo destacado se refere a:

- Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta.
- Oração Subordinada Substantiva Subjetiva.
- Oração Coordenada Sindética Explicativa.
- Oração Subordinada Adjetiva Restritiva.

06. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Na oração: Dentre eles, 86% fazem isso, mesmo durante o período de pânico. Substituindo 86% por 1% flexionando o verbo FAZER no pretérito imperfeito do indicativo, obter-se-á:

- 1% fará.
- 1% farão.
- 1% fazia.
- 1% faziam.

07. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Assinale a alternativa que apresenta palavra em sentido conotativo.

- Não será preciso castigar os adultos.
- Vários pensadores falaram sobre a criminalidade.
- É o ensino que arrebenta as grades.
- Muitos querem a pena de morte.

08. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Atribuir-se-á o emprego de dois-pontos, em "Um poeta é sempre irmão do vento e da água: deixa seu ritmo por onde passa." (Cecília Meireles). A intenção é de anunciar:

- uma explicação;
- um esclarecimento;
- um vocativo;
- uma citação.

09. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)

No fragmento de texto "Temos de cobrar dos deputados e senadores as leis necessárias para punir esses assassinos. Das autoridades do trânsito, fiscalização e multas vigorosas para quem desobedece às leis e à sinalização. E da justiça, rapidez e dureza com os infratores." (Nicole Puzzi, Veja 1280, ano 26, n° 12) Empregam-se as vírgulas para:

- a) separar termos coordenados;
- b) separar as orações adjetivas;
- c) isolar orações intercaladas;
- d) **indicar a supressão do verbo.**

10. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)

O segmento sublinhado pode-se substituir, sem prejuízo para a correção e o sentido do texto em:

- a) O grupo que abrange os seis países mais ricos por onde se abarcam.
- b) São carentes de propostas políticas por imunes a.
- c) Sob a direção de Capangas o movimento foi declaradamente ilegal por em cuja direção.
- d) **E sobra-me uma raiva que deve valer a dos mais radicais interesses por talvez equiválha à.**

CONHECIMENTO ESPECÍFICO DE ENFERMEIRO

Valor por questão:

Questão	V. Questão	Peso	V. Ponderado
Da questão 11 à questão 22	0,5	2,5	1,25
Da questão 23 à questão 34	1,0	2,5	2,5
Da questão 35 à questão 40	2,0	2,5	5,0

11. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Sobre a lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, é correto afirmar, EXCETO:

- a) A Conferência de Saúde reunir-se a cada quatro anos com a representação dos vários seguimentos sociais, para avaliar a situação da saúde e propor as futuras diretrizes.
- b) **O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASENS) não terão representações no conselho nacional de saúde.**
- c) É responsabilidade do Conselho de Saúde, a formulação de estratégias e controle da execução da política de saúde na instância correspondente.
- d) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências serão paritárias em relação ao conjunto dos demais seguimentos.

12. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Assinale a alternativa que apresenta o evento no qual foram aprovadas as teses que podem ser consideradas como marco do processo de reforma sanitária brasileira.

- a) **VIII Conferência Nacional de Saúde.**
- b) II Conferência Nacional de Saúde.
- c) IX Conferência Nacional de Saúde.
- d) I Conferência Nacional de Saúde.

13. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

De acordo com a norma operacional de assistência a saúde 01/2002, constitui-se responsabilidade dos municípios em gestão plena da atenção básica ampliada:

- a) gerenciar todas as unidades ambulatoriais públicas existentes em seu território.
- b) **elaborar o plano municipal de saúde e o relatório de gestão.**
- c) organizar toda a rede de atenção básica com exceção dos prestadores privados.
- d) manter o controle das doenças desde que enquadradas como transmissíveis.

14. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

No manejo do paciente com diarreia, o plano de tratamento para prevenir a desidratação da criança que apresenta o estado geral irritado e intranquilo, sedento, bebendo avidamente e com enchimento capilar prejudicado deverá ser:

- a) Plano A.
- b) **Plano B.**
- c) Plano C.
- d) Plano D.

15. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

O Pacto pela Vida, portaria GM/MS 399, que integra o Pacto pela Saúde 2006, prevê como um dos seus objetivos a execução de programas voltados para a assistência ao(s):

- a) câncer de pele.
- b) **câncer de colo do útero.**
- c) transplantes de órgãos.
- d) câncer de pulmão.

16. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

De acordo com a classificação das doenças, elas podem ser divididas em emergentes, reemergentes e permanentes. Indique a alternativa em que as doenças aparecem nessa sequência de classificação:

- a) Tuberculose, AIDS, febre amarela.
- b) AIDS, hanseníase e dengue.
- c) **Febre amarela, tuberculose, hantavirose.**
- d) AIDS, tuberculose, hanseníase.

17. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

O indicador que expressa " O maior ou menor poder que uma determinada doença tem de provocar a morte daqueles que adquirem esta enfermidade, em um determinado intervalo de tempo:

- a) Patogenicidade.
- b) Doença vetorial.
- c) Mortalidade geral.
- d) **Letalidade.**

18. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

A classificação das feridas por cores foi adaptada para uso em que cicatrizem por segunda intenção. As cores apresentavam-se da seguinte maneira: preta, amarela, vermelha, correspondendo, respectivamente a :

- a) necrose, granulação, epitelização.
- b) exsudato, necrose e granulação.
- c) **necrose, exsudato e granulação.**
- d) esfacelo, exsudato e epitelização.

19. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Ao realizar o exame físico geral de enfermagem de um paciente, é necessário a utilização dos métodos conhecidos como propedêutico. São eles:

- a) Pesar e mensurar, auscultar, tapotagem e inspeção dinâmica.
- b) **Inspeção, palpação, percussão e ausculta.**
- c) Percussão, inspeção dinâmica, ausculta e transluminação.
- d) Pesar e mensurar, inspeção, manobras de Ruact e transluminação.

20. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Ao executar um procedimento sem conhecimento técnico científico está expondo o paciente a danos decorrentes de :

- a) omissão.
- b) dolo.
- c) **imperícia.**
- d) imprudência.

21. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Relacione as colunas

- I- direitos
 - II- responsabilidades
 - III- deveres
 - IV- proibições
- () negar assistência de enfermagem em caso de urgência e emergência.
 - () respeitar o ser humano em situação de morte e pós-morte.
 - () recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência legal.
 - () assegurar ao cliente uma assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência.
 - () ser informado sobre o diagnóstico provisório ou definitivo de todos os clientes que estejam sob sua responsabilidade.
- a) **IV, III,I, II, I.**
 - b) III, II, I,IV,I.
 - c) I, III, II, IV,II.
 - d) IV. III,I, IV, II.

22. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Criança de 10 anos deu entrada no setor de emergência vítima de queimadura por leite quente. No exame físico, apresenta eritema, edema e flictemas na região do braço e essas características classificam a queimadura dessa criança como sendo de:

- a) 1º grau.
- b) **2º grau.**
- c) 3º grau.
- d) 4º grau.

23. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

De acordo com o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento, é critério fundamental para o acompanhamento pré-natal a solicitação dos seguintes exames, EXCETO:

- a) grupo sanguíneo e fator Rh.
- b) glicemia de jejum, sorologia para hepatite B (HBsAg).
- c) **paracitológico de fezes, cultura de urina.**
- d) sorologia para toxoplasmose e teste anti-HIV.

24. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Recém nascido, filho de mãe diabética, encontra-se letárgico, hipotônico, episódios de tremores e abalos, requer pronta intervenção do enfermeiro, pois trata-se de:

- a) Cetoacidose diabética.
- b) Hiperglicemia.
- c) Anemia aguda.
- d) **Hipoglicemia.**

25. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

A heparina, adicionada ao líquido dialisador, tem como objetivo:

- a) diminuir o fluxo venoso.
- b) acelerar a absorção da albumina.
- c) evitar a oclusão do cateter.
- d) aumentar a permeabilidade capilar.

26. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

O gotejamento necessário para correr uma solução de 450 ml em 12 horas em equipo de macrogotas:

- a) 36 gotas por minutos.
- b) 10,4 gotas por minutos.
- c) 9,7 gotas por minutos.
- d) 12,5 gotas por minutos.

27. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Pode ser caracterizado como aspecto clínico da dengue, EXCETO:

- a) Febre alta (39C a 40C), cefaléia e adinamia.
- b) Mialgia e artralgia.
- c) Dor retroorbitária e presença ou não de exantema.
- d) Niastigmo e presença ou não de prurido.

28. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

M. S. S., gestante de 37 anos multipara chegou ao hospital com hemorragia vaginal indolor e sangue com aspecto vermelho rutilante, quadro clínico característico de:

- a) Placenta prévia.
- b) Descolamento prematuro da placenta.
- c) Distúrbio de hemocoagulação.
- d) Aminiorrexe prematura.

29. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

A indicação da adrenalina como medicamento utilizado em Parada Cardio-Respiratória (PCR) é de ser:

- a) Administrada a pacientes em parada cardíaca causada por taquicardia ventricular, fibrilação ventricular e assistolia ou atividade elétrica sem pulso.
- b) Administrada a todos os pacientes com isquemia aguda ou suspeita de hipoxemia, incluindo aqueles com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)
- c) Administrada a pacientes com bradicardia sintomática, contração ventricular prematura e sintomas de isquemia.
- d) Administrada para corrigir acidose metabólica.

30. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Considerada mundialmente como medida primária, a higienização das mãos desempenha importante papel no controle de infecções relacionadas à assistência a saúde. Sobre higienização das mãos é correto afirmar, EXCETO:

- a) Na assistência a pacientes colonizados e/ou infectados com bactérias multirresistentes, a higienização das mãos pode ser feita com vários anti-sépticos e sabonetes associados a anti-sépticos, como clorexidina, polivinilpirrolidona-iodo (PVPI), triclosan e álcool.
- b) A higienização das mãos com sabonete líquido favorece a remoção da microbiota transitória, tornando as mãos limpas.
- c) O álcool a 70% apresenta rápida velocidade de ação e baixo efeito residual. A clorexidina a 4% apresenta efeito residual e raras reações alérgicas.
- d) O termo Lavagem das Mãos foi substituído por Higienização das Mãos, por ser mais abrangente, dependendo do objetivo a técnica pode ser: Higienização simples, Higienização séptica, Fricção de anti-séptico e Anti-sepsia cirúrgica.

31. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

A Doença de Chagas apresenta vários modos de transmissão, EXCETO:

- a) Oral.
- b) Vertical.
- c) Transfusional.
- d) Sexual.

32. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Após a utilização de artigos de assistência respiratória, considerados semicríticos, o enfermeiro deverá submetê-los a desinfecção de alto nível ou esterilização. É correto afirmar, EXCETO:

- a) O tempo de exposição ao hipoclorito de sódio varia de acordo com a carga microbiana, quanto mais contaminada maior o tempo de exposição.
- b) O hipoclorito de sódio é o desinfetante recomendado para artigos que não contenham componentes metálicos.
- c) Alto poder germicida, baixo custo e baixa toxicidade são características do hipoclorito de sódio.
- d) Permanência do artigo por 30 minutos no hipoclorito de sódio a 10.000 ppm e de 60 minutos no hipoclorito de sódio a 200 ppm.

33. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Nos Sinais Vitais, a temperatura corporal equivale ao grau de calor que o corpo humano apresenta. Na hipertermia em que a temperatura corpórea aumenta em algum momento durante o dia, mas em 24 horas retorna ao normal é chamada de :

- a) **Hipertermia Intermitente.**
- b) Hipertermia Persistente.
- c) Hipertermia Maligna.
- d) Hipertermia Recorrente.

34. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

São complicações transfusionais mais comuns e potencialmente graves, EXCETO:

- a) Febre, reação não hemolítica.
- b) Reação hemolítica aguda.
- c) Contaminação bacteriana.
- d) **Sobrecarga pulmonar.**

35. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)

No controle das infecções hospitalares, classifica-se a limpeza hospitalar como, EXCETO:

- a) Limpeza concorrente.
- b) Limpeza terminal.
- c) Limpeza de manutenção.
- d) **Limpeza transitória.**

36. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)

Durante o período de internação J.J. apresentou crise convulsiva. O enfermeiro da unidade prestou assistência correta após a convulsão realizando cuidados, EXCETO:

- a) **Manteve o paciente em decúbito dorsal.**
- b) Orientou o paciente em relação ao ambiente.
- c) Manteve oxigênio disponível.
- d) Manteve aspirador disponível

37. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)

Nos distúrbios hidroeletrólíticos que acontecem na prática clínica, e que precisam ser corrigidos, a hipernatremia caracteriza-se pelo aumento sérico de:

- a) Cálcio.
- b) Ferro.
- c) **Sódio.**
- d) Potássio.

38. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)

Sobre a vacina pneumocócica 10 conjugada, assinale a alternativa errada:

- a) Essa vacina protege a criança de bactérias tipo pneumococo, que causam doenças graves como meningite, pneumonias, otite média aguda, sinusite e bacteremia.
- b) **A vacina é administrada em duas doses e mais um reforço. A primeira dose é oferecida no segundo mês de vida e a próxima aos quatro meses de vida, sendo o reforço aos 12 meses.**
- c) Em caso de doença febril aguda, a vacina deve ser adiada.
- d) O intervalo entre as doses é de 60 dias e mínimo de 30 dias.

39. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)

A NR-32 no quesito de riscos biológicos, determina que o empregador deve vedar, EXCETO:

- a) A utilização de pias de trabalho para fins diferentes dos previstos.
- b) O ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato no trabalho.
- c) **A guarda de alimentos em locais destinados para este fim.**
- d) O uso de calçados abertos.

40. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)

A embalagem deve ser sempre compatível com o método de esterilização. O algodão cru é compatível com:

- a) **Calor úmido.**
- b) Calor seco.
- c) Oxido de etileno.
- d) Vapor de formaldeído.