

## MÉDICO PSF

### PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

#### Perguntas de um operário que lê

#### Bertold Brecht

Quem construiu Tebas, a das sete portas?  
Nos livros vem o nome dos reis,  
Mas foram os reis que transportaram as pedras?  
Babilônia, tantas vezes destruída,  
Quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas  
Da Lima Dourada moravam seus obreiros?  
No dia em que ficou pronta a Muralha da China para onde  
Foram os seus pedreiros? A grande Roma  
Está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem  
Triunfaram os Césares? A tão cantada Bizâncio  
Só tinha palácios  
Para os seus habitantes? Até a legendária Atlântida  
Na noite em que o mar a engoliu  
Viu afogados gritar por seus escravos.

O jovem Alexandre conquistou as Índias  
Sozinho?  
César venceu os gauleses.  
Nem sequer tinha um cozinheiro ao seu serviço?  
Quando a sua armada se afundou Filipe de Espanha  
Chorou. E ninguém mais?  
Frederico II ganhou a guerra dos sete anos  
Quem mais a ganhou?

Em cada página uma vitória.  
Quem cozinhava os festins?  
Em cada década um grande homem.  
Quem pagava as despesas?

Tantas histórias  
Quantas perguntas

1. O texto apresentado é de autoria do teatrólogo alemão Bertold Brecht. A partir de sua leitura, podemos AFIRMAR que:

- a) A produção do conhecimento histórico só deve levar em consideração os grandes feitos e grandes homens.
- b) No texto o autor apresenta uma crítica à produção do conhecimento histórico por fazer lembrar apenas dos “grandes homens”.**
- c) O autor reforça a ideia de que nós não fazemos história.
- d) Os homens só passam a fazer sua história a partir da construção da “Tebas, a das sete portas”.



6. A figura de linguagem encontrada no trecho da obra de Graciliano Ramos é:  
a) **Personificação**      b) Hipérbole      c) Metonímia      d) Eufemismo

7. As formas verbais empregadas no trecho de Graciliano Ramos: aproximaram-se, recuaram, sumiram-se estão em que tempo verbal?

- a) Futuro do presente      b) Futuro do pretérito  
c) Pretérito imperfeito      **d) Pretérito perfeito**

8. Em “Era-se mais feliz no passado.” A partícula SE é:

- a) Pronome apassivador.      **b) Índice de indeterminação do sujeito.**  
c) Parte integrante do verbo.      d) Partícula expletiva.

9. Compreendo o \_\_\_\_\_ de ela ter chorado. É uma menina cheia de mágoas e de \_\_\_\_\_. Completa CORRETAMENTE às lacunas:

- a) Porquê, porque.      b) Por quê, porquê.      c) Porque, porquê      **d) Porquê, Porquê**

10. **NULA**

### PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. Julgue os itens.

- I- O SUS é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde prestados pelos órgãos e instituições públicas.  
II- O SUS é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde prestados pela administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público.  
III- À iniciativa privada é permitido participar do SUS de maneira complementar.

Estão CORRETAS:

- a) I e III.      b) I      c) II e III      **d) Todas estão corretas.**

12. Após a implantação do SUS, a saúde passa a ser compreendida como:

- a) Estado de não doença.  
b) A concentração de esforços para amenizar os efeitos das doenças.  
c) Estado de cura da doença.  
**d) Qualidade de vida da população.**

13. Para que os municípios recebam quaisquer recursos do Ministério da Saúde ou se habilitem a seus programas é necessário:

**a) Que o Conselho Municipal da Saúde exista e esteja em funcionamento.**

b) Que o SUS esteja organizado em forma de consórcios.

c) Que o COSEMS exista e esteja em funcionamento.

d) Que as CIBs sejam compostas de forma paritária entre os três governos.

14. A representação total dos Conselhos de Saúde deve ser:

a) 50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de serviços público.

**b) 50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de serviços (público e privado).**

c) 50% de usuários; 25% de trabalhadores da saúde, 25% de prestadores de serviços (público ou privado).

d) 50% de trabalhadores da saúde; 25% de usuários; 25% de prestadores de serviços (público e privado).

15. O Princípio da \_\_\_\_\_ leva em consideração as necessidades específicas de pessoas ou grupos de pessoas, ainda que minoritários em relação ao total da população.

a) Equidade

b) Universalidade

**c) Integralidade**

d) Igualdade

16. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como:

I - despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.

II - investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.

III - investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.

IV - cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.

Está CORRETO:

a) I, II e IV

b) I, II e III

c) I, III, IV

**d) Todos estão corretos**

17. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:

**a) universalidade da cobertura e do atendimento.**

b) uniformidade e universalidade dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.

c) equidade e integralidade na prestação dos benefícios e serviços

d) caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão bipartite, com participação dos trabalhadores e dos empregadores.

18. Assinale a alternativa INCORRETA:

- a) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- b) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- c) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.
- d) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, não sendo vedado todo tipo de comercialização.**

19. É objetivo do Sistema Único de Saúde - SUS:

- a) O estudo dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- b) A formulação de política de saúde destinada a promover a integralidade.
- c) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.**
- d) o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.

20. As Comissões Intergestores pactuarão, EXCETO:

- a) aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, de acordo com a definição da política de saúde dos entes federativos, consubstanciada nos seus planos de saúde, aprovados pelos respectivos conselhos de saúde.
- b) diretrizes gerais sobre Regiões de Saúde, integração de limites geográficos, referência e contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre os entes federativos.
- c) diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e interestadual, a respeito da organização das redes de atenção à saúde, principalmente no tocante à gestão institucional e à integração das ações e serviços dos entes federativos.
- d) responsabilidades dos entes federativos na Rede de Atenção à Saúde, de acordo com o seu porte demográfico e seu desenvolvimento econômico-financeiro, estabelecendo as responsabilidades coletivas.**

21. Criança de 7 anos de idade com quadro de evolução de 3 semanas, apresentando história de episódios de dor abdominal e com cerca 3 episódios diários de evacuação líquida. Relata a mãe que outras crianças da escola tinha tido um quadro semelhante. Apresentando de alterado, ao exame, apenas um abdome doloroso difusamente à palpação. Marque a opção ERRADA.

- a) Pelo diagnóstico presuntivo está recomendado a alimentação e aumentar a ingestão de líquidos.
- b) Pelo diagnóstico presuntivo está recomendado solicitar o parasitológico de fezes.
- c) Pelo diagnóstico presuntivo está recomendado iniciar mebendazol.**
- d) Pelo diagnóstico presuntivo deve buscar investigar a possibilidade de algum surto.

22. Gestante com história de ter realizado apenas 1 dose de antitetânica há 4 anos atrás. Marque a opção ERRADA.

- a) Na dúvida da veracidade, deve fazer as três doses da vacina.
- b) Estando muito perto do parto poderá fazer as doses da vacina com intervalo menor.
- c) Deve completar o esquema vacinal com mais 2 doses.

**d) Tem que completar todo o esquema antes do parto.**

23. Mulher, 30 anos de idade com VDRL 1:32, relatando que fez tratamento com penicilina benzatina há 5 meses, mas que o parceiro não se tratou. Marque a conduta CORRETA.

- a) Tratar o parceiro.
- b) Deve ser memória imunológica.
- c) Deve repetir o tratamento da paciente e tratar também o parceiro.**
- d) Repetir o exame após 3 meses para verificar a queda dos títulos.

24. Gestante com sorologia positiva para o vírus da AIDS. Marque a opção CORRETA.

**a) O risco do neonato adquirir o vírus diminuí com a administração de terapia antiretroviral a partir da 14ª semana de gestação.**

- b) A transmissão do vírus (vertical) acontece apenas com o aleitamento materno.
- c) O início da medicação antiretroviral na gestação restringe-se à prevenção de complicações maternas.
- d) A cesárea previne a transmissão vertical não necessitando do uso de medicação antiretroviral.

25. Senhor, 26 anos, residente de Reriutaba-Ce, chega à unidade de saúde, com história de febre, cefaleia, mal estar e dor abdominal. Há cerca de 4 (quatro) dias vem doente. Fez uso de analgésico no dia e refere melhora. Temperatura de 37,5°C e exantema maculopapular. PA deitada: 120 x 60mmHg. Marque a opção ERRADA.

- a) Está recomendada a abordagem clínica como se fosse um caso de dengue.
- b) Está recomendado repouso no próprio domicílio e medicação sintomática para dor.**
- c) Está recomendada a solicitação de hemograma com contagem de plaquetas.
- d) Está recomendada a verificação da Prova do laço.

26. Criança menor de 1 ano de idade chega com quadro de diarreia aguda e desidratação. Relata a mãe que vinha dando soro cada evacuação, mas que a criança não melhorou. Marque a opção INCORRETA.

- a) Está recomendado, no caso de criança com vômito, reduzir o volume administrado de soro oral e aumentar a frequência da administração.
- b) Está recomendado, no caso de administração insuficiente, reiniciar na própria unidade de saúde uma fase rápida de tratamento com soro oral (em 3 a 4 horas).
- c) Está recomendado, nesse caso iniciar precocemente a reidratação parenteral iniciando com a fase rápida.**
- d) Está recomendada, após o desaparecimento de sinais de desidratação, reiniciar a alimentação sendo que em lactantes em uso de fórmula artificial não deve diluir o leite.

27. Senhora de 35 anos, alcoólatra, com quadro de tosse e emagrecimento. Relata a paciente que mora com 2 filhos menores de 4 anos e com desnutrição leve. Marque a opção INCORRETA.

- a) Está recomendado pesquisar de tuberculose na dona Joana, solicitando o exame microbiológico do escarro.
- b) O exame de BAAR negativo não exclui tuberculose e há necessidade de realizar Raio X de tórax.
- c) No caso da mãe com tuberculose, está recomendada a investigação nas crianças com a realização de exame físico, ppd e raio X de tórax.
- d) No caso da mãe com tuberculose com filhos assintomáticos, basta consultas periódicas de acompanhamento.**

28. Sobre as doenças respiratórias. Marque a opção INCORRETA.

- a) As infecções respiratórias nas crianças nos primeiros anos de vida são mais bacterianas e exigem maior uso de antibióticos.**
- b) Criança com quadro de infecção respiratória aguda, com taquipneia e tiragem subcostal deve pensar em pneumonia.
- c) Criança com menos de dois meses de idade com pneumonia é mais recomendado a hospitalização.
- d) A ausculta pulmonar é de suma importância na propedêutica de criança com infecção respiratória aguda.

29. Paciente, agricultor, de 68 anos de idade com quadro de tosse e discreta falta de ar, relata que iniciou o quadro com um resfriado, tudo começou há cerca de 1 semana. Orientado, temperatura axilar- 38,5°C, frequência respiratória de 32irpm. Marque a opção ERRADA.

- a) Esse quadro poderá ser de pneumonia e é recomendado iniciar precocemente o tratamento antibiótico.
- b) A escolha do antibiótico no tratamento empírico das pneumonias deve basear-se na idade do paciente e na gravidade do quadro clínico.
- c) Está indicada a solicitação de raio X de tórax em PA e perfil, eritrograma e leucograma.
- d) A escolha do antibiótico e do tratamento em regime ambulatorial baseia-se apenas na idade e no estado geral do paciente.**

30. Criança de 12 anos de idade apresenta-se à consulta médica com história de tosse e falta de ar, que tem a levado algumas vezes à emergência para uso de medicação endovenosa. Relata ainda que há anos apresenta essas crises com frequência, que apresenta também quando pega poeira; atualmente vem com cerca de 3 vezes por semana, melhorando quando usa aerossol com broncodilatador. Marque a opção correta.

- a) Esse quadro é compatível com asma persistente e deveria usar corticóide fora das crises.**
- b) Esse quadro é compatível com asma intermitente e a conduta está correta e deveria usar corticoide apenas nas crises agudas.
- c) Esse quadro é compatível com asma persistente e deveria usar corticóide apenas nas crises agudas.
- d) Esse quadro é compatível com bronquite crônica e deve apenas introduzir antibiótico nas crises.

31. Paciente de 65 anos, hipertenso em tratamento com diurético, passa a relatar que vem com quadro de dispneia aos grandes esforços. Marque a opção CORRETA.

a) Deve ser um quadro de insuficiência cardíaca e está recomendado para o diagnóstico o teste ergométrico.

b) Deve ser um quadro de hipotensão medicamentosa e está recomendado diminuir a dose do anti-hipertensivo.

c) Deve ser um quadro de mau controle da pressão arterial e está recomendado o aumento da dose da medicação.

**d) Deve ser um quadro de insuficiência cardíaca e está recomendado para o diagnóstico o ECG e o raio X de tórax.**

32. Paciente de 58 anos de idade com história de dor torácica episódica que aparece durante o jogo de futebol e/ou quando fica irritado, dura em torno de 10 minutos, melhorando com o repouso. Ao exame físico não foi encontrado nenhuma alteração. Marque a opção CORRETA.

a) Nesse caso, o ECG normal exclui a hipótese de angina pectoris estável.

b) Nesse caso, o ECG não está recomendado, pois a primeira hipótese é de ansiedade generalizada.

c) Nesse caso, o ECG está recomendado, pois a primeira hipótese é de angina pectoris instável.

**d) A primeira hipótese é angina pectoris estável e o teste ergométrico está recomendado, mesmo com ECG normal.**

33. Paciente de 50 anos de idade com diagnóstico de hipertensão arterial primária. Sem sintomatologia. PA de 180 x 100mmHg. Sem outra alteração significativa ao exame físico. Marque a opção CORRETA.

a) Está indicado fazer nifedipina de ação rápida para diminuição da PA e depois iniciar tratamento medicamentoso.

b) Está indicado o aumento da dosagem do medicamento ou sua troca se já faz duas semanas que vem em uso.

c) Está indicado a mudança de estilo de vida e avaliar após 2 meses se há necessidade de tratamento medicamentoso.

**d) Está indicado orientar mudança de estilo de vida e iniciar a terapêutica medicamentosa de uso crônico.**

34. Paciente, 50 anos de idade com história de dor torácica tipo angina e náuseas há 20 minutos. Sem história pregressa de coronariopatia, de episódio semelhante ou de qualquer outra patologia. Ao exame: pressão arterial de 120 X 70mmHg; ausculta cardiopulmonar e pulso normais. Marque a opção errada (incorreta).

a) Está recomendado a administração de 200mg de aspirina VO amassados ou mastigado.

b) Está recomendado o encaminhamento imediato para unidade hospitalar de referência.

c) Está recomendado a administração de 5mg de dinitrato de isossorbida sublingual.

**d) Está recomendado deixar o paciente em observação, sendo encaminhado se apresentar sinais de alteração cardiovascular.**

35. Gestante, 40 anos de idade, vinha com pré-natal sem alteração. Chega à unidade de saúde com queixa de dor abdominal e discreto sangramento, apresentando 33 semanas de idade gestacional. Marque a opção ERRADA.

- a) **Está recomendado o uso de tocolítico oral e orientar repouso em domicílio.**
- b) Está recomendado avaliar o volume do sangramento para realizar o diagnóstico diferencial.
- c) Está recomendado o exame especular para avaliar a origem do sangramento.
- d) Está recomendado avaliar o tônus uterino para realizar o diagnóstico diferencial.

36. Entende-se como câncer gástrico precoce:

- a) tumor sempre curável por ressecção endoscópica.
- b) tumor que se estende até a muscularis própria sem acometer serosa.
- c) **tumor que se estende até a submucosa com ou sem acometimento linfonodal.**
- d) tumor que do ponto de vista clínico é assintomático.

37. Paulo, 27 anos, técnico de eletricidade, apresenta queimadura de membro superior direito e tórax, após acidente de cabo de alta tensão. A respeito da queimadura elétrica pode-se afirmar, EXCETO:

- a) O tecido de maior resistência à propagação da corrente elétrica é o osso.
- b) **A lesão por corrente alternada apresenta melhor prognóstico.**
- c) O risco de fibrilação ventricular persiste durante as primeiras 48 horas.
- d) Amioglobinúria é causa frequente de insuficiência renal aguda.

38. Mário um pré-escolar de 2 anos que recentemente apresentou episódio de sangramento retal abundante. Seu pediatra solicitou uma cintilografia com pertecnetato de tecnécio, pois tinha como principal hipótese diagnóstica:

- a) invaginação intestinal.
- b) **divertículo de Meckel.**
- c) má-rotação com volvo.
- d) pólipos colônicos.

39. Paciente de 50 anos é submetido à colecistectomiavideolaparoscópica há 6 meses. Apresentou nesse período episódios de icterícia com regressão espontânea associada a discreta dor epigástrica. A principal hipótese etiológica é:

- a) estenose cicatricial.
- b) colangite esclerosante.
- c) coledocolitíase primária.
- d) **cálculo residual.**

40. Paciente com sintomas atípicos de refluxo gastroesofageano (rouquidão, tosse, estomatite) realiza endoscopia que não revela esofagite. Antes de planejarmos o tratamento, qual exame você indicaria?

- a) **pHmetria com manometria esofágica.**
- b) manometria esofágica.
- c) cintilografia do esôfago.
- d) seriografia esôfago-estômago-duodeno (SEED).

41. O padrão-ouro para o diagnóstico de litíase urinária é:

- a) ultra-sonografia.
- b) pielografia intravenosa.
- c) tomografia computadorizada helicoidal sem contraste.**
- d) tomografia computadorizada helicoidal com contraste.

42. Uma gestante hipertensa crônica com 28 semanas de gestação, em acompanhamento pré-natal de alto risco apresenta ganho ponderal superior a 1000g na última semana e aumento dos níveis pressóricos, apesar do uso correto de medicações. Visando fazer o diagnóstico diferencial com pré-eclâmpsia sobreposta, são exames complementares auxiliares, EXCETO:

- a) perfil biofísico fetal.**
- b) proteinúria de 24 horas.
- c) atividade antitrombina III.
- d) calciúria de 24 horas

43. Sobre a esterilização cirúrgica como método de planejamento familiar, marque a alternativa CORRETA.

- a) A esterilização de pessoa absolutamente incapaz somente poderá ocorrer mediante autorização judicial.
- b) Até 42 dias pós-parto ou aborto é vedada, exceto em caso de necessidade comprovada.
- c) É vedado durante o período da gestação, exceto em caso de necessidade comprovada.
- d) Todas as alternativas estão corretas.**

44. Em relação à DHEG, estão CORRETAS:

- I- As drogas de primeira linha no controle da emergência hipertensiva são a hidralazina, labetalol e nifedipina.
- II- Os anti-hipertensivos devem ser iniciados sempre que a pressão sistólica for superior a 140 mmHg.
- III- O uso de hipotensores previne o aparecimento das formas graves.
- IV- Os diuréticos são as drogas de escolha na presença de edema.

- a) I**
- b) I e III
- c) II
- d) II e IV

45. Em relação ao sulfato de magnésio na DHEG, estão CORRETAS:

- I- Sua indicação deve se limitar aos casos de eclâmpsia, devido às elevadas taxas de intoxicação.
- II- O tratamento da intoxicação deve ser realizado com carbonato de cálcio.
- III- Presença de reflexos tendinosos exaltados sinaliza intoxicação.
- IV- O esquema de Sibai consiste na administração de 6 g EV em bolus, seguido de 3 g/hora EV em dose de manutenção.

- a) Nenhum item correto.**
- b) Apenas uma opção.
- c) Apenas duas opções.
- d) Três opções.

