

LEGISLAÇÃO DO SUS

- 01.** O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde, publicou em 2006 a Política Nacional de Promoção da Saúde. São ações prioritárias dessa Política:
- A) incentivo à amamentação, campanha de prevenção as DST/aids, prevenção e controle do tabagismo
 - B) alimentação saudável, redução da morbimortalidade por acidentes de trânsito
 - C) redução da morbimortalidade em decorrência do uso abusivo de álcool e outras drogas, estímulo a atividade física e redução de gravidez na adolescência
 - D) promoção do desenvolvimento sustentável, controle da obesidade infanto-juvenil, redução da mortalidade infantil
- 02.** O financiamento das ações básicas de saúde se dá pelo Piso de Atenção Básica (PAB), composto por uma parte fixa e outra variável. Os investimentos aplicados por meio do PAB variável têm por objetivo:
- A) estimular a implantação de estratégias nacionais de reorganização do modelo de atenção à saúde
 - B) ampliar o montante de recursos destinados à qualificação da média e da alta complexidade
 - C) financiar ações de saúde em municípios de pequeno porte
 - D) assegurar a autonomia dos municípios na sua utilização
- 03.** A estratégia de Saúde da Família tem como objetivo central a reorientação da atenção básica no âmbito do Sistema Único de Saúde. São princípios dessa estratégia:
- A) ter caráter complementar em relação à atenção básica, realizar cadastramento das famílias e atuar de forma intersetorial
 - B) desenvolver atividades com base no diagnóstico situacional, ter como foco o indivíduo e buscar parcerias para as ações de saúde
 - C) dirigir as ações aos problemas de saúde de maneira pactuada com a comunidade, priorizar as ações recuperadoras e manter postura pró-ativa frente aos problemas de saúde-doença da população
 - D) atuar no território, ofertar cuidado longitudinal e ser um espaço de construção da cidadania

Sobre as Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saúde, publicadas pelo Ministério da Saúde no ano de 2006, responda às questões de números 4 a 7

- 04.** É uma diretriz e uma ação do Pacto em Defesa do SUS, respectivamente:
- A) expressar os compromissos entre gestores do SUS com a consolidação da Reforma Sanitária Brasileira; implantar serviços de atenção domiciliar
 - B) desenvolver e articular ações que visem assegurar o SUS como política pública; publicação da Carta dos Direitos dos Usuários do SUS
 - C) garantir financiamento de acordo com as necessidades do SUS; apoiar o desenvolvimento de estudos e pesquisas
 - D) articular e apoiar a mobilização social pela promoção da cidadania; reorganizar o processo de acolhimento nas unidades de saúde
- 05.** “O Pacto pela Vida é o compromisso entre gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira.” São prioridades pactuadas:
- A) saúde bucal; controle do câncer do colo de útero e da mama; fortalecimento da atenção básica
 - B) redução da mortalidade infantil e materna; controle da dengue, tuberculose e malária; controle de hipertensão e diabetes
 - C) promoção da saúde; fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias; saúde do idoso
 - D) aumento da produção de imunobiológicos; redução da transmissão vertical do HIV; atenção às doenças negligenciáveis
- 06.** É diretriz para o trabalho da Educação na Saúde:
- A) ampliar a compreensão dos conceitos de formação e educação permanente para adequá-los às distintas lógicas e especificidades
 - B) capacitar recursos humanos do SUS para a difusão de informações sobre prevenção de doenças e auto-cuidado
 - C) considerar a Educação Continuada como a estratégia de formação e de desenvolvimento de trabalhadores para o setor
 - D) centrar o planejamento e o acompanhamento das atividades educativas em saúde com vistas à aquisição de conhecimentos e mudança de hábitos

- 07.** Racionalizar os gastos e otimizar os recursos, possibilitando ganho em escala nas ações e serviços de saúde oferecidos para um determinado território, é objetivo da:
- A) descentralização
 - B) universalização
 - C) regionalização
 - D) hierarquização
- 08.** De acordo com a Lei 8.142/90, o segmento que tem representação paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos participantes dos Conselhos e das Conferências de Saúde é o dos:
- A) profissionais de saúde
 - B) usuários
 - C) representantes do governo
 - D) prestadores de serviço
- 09.** O significado da expressão “concepção ampliada de saúde”, que marca conceitualmente a Política Nacional de Promoção de Saúde, é o de que:
- A) a saúde e o adoecimento refletem as escolhas individuais, mais que o acesso aos cuidados e as tecnologias médicas
 - B) a saúde e a doença são um binômio inseparável, determinando necessidades curativas
 - C) a saúde envolve tanto aspectos físicos como os processos mentais, singulares em cada sujeito
 - D) o processo saúde-doença não é somente resultante da vontade dos sujeitos e/ou comunidades, mas expressa o contexto da própria vida
- 10.** De acordo com a Lei 8.080/90, pode-se afirmar que é competência da direção nacional do SUS:
- A) executar serviços de vigilância epidemiológica e sanitária
 - B) planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde
 - C) participar na formulação e na implementação de políticas relativas às condições e aos ambientes de trabalho
 - D) acompanhar, avaliar e divulgar os indicadores de morbidade e mortalidade no âmbito da unidade federada

ESPECÍFICO DO CARGO

- 11.** O protocolo para prevenção da endocardite bacteriana preconiza a seguinte utilização de antibiótico por via oral:
- A) clindamicina 2,0 gr, meia hora antes do procedimento
 - B) amoxicilina 1,0 gr, 1 hora antes do procedimento
 - C) amoxicilina 1,0 gr, meia hora antes do procedimento
 - D) amoxicilina 2,0 gr, 1 hora antes do procedimento
- 12.** Na doença de Christmas ou hemofilia B, o fator de coagulação alterado é o:
- A) VII
 - B) VIII
 - C) IX
 - D) XI
- 13.** Um paciente com neoplasia maligna na região de cabeça e pescoço necessita de tratamento radioterápico. A realização de exodontia, em relação ao início da radioterapia, deve ser feita com antecedência mínima de:
- A) 1 semana
 - B) 2 semanas
 - C) 1 mês
 - D) 6 meses
- 14.** Na classificação da mucosite oral, o grau II corresponde a:
- A) presença de lesão esbranquiçada
 - B) presença de ulcerações
 - C) alterações clínicas visíveis
 - D) área eritematosa
- 15.** O sinal de Burton corresponde a:
- A) manchas azuladas nas gengivas, decorrentes de intoxicação pela prata
 - B) manchas enegrecidas na mucosa oral, decorrentes do acúmulo de melanina na doença de Addison
 - C) manifestação oral da intoxicação pelo chumbo
 - D) impregnação de pigmentos endógenos no dorso da língua
- 16.** O acúmulo de gordura na região da coluna cervicodorsal, conhecido como corcova de búfalo, é um achado comumente encontrado na seguinte patologia:
- A) doença de Crohn
 - B) tireoidite de Hashimoto
 - C) síndrome de Cushing
 - D) síndrome de Gardner

17. O aumento sérico de Ca^{++} , fosfatase alcalina e paratormônio são dados laboratoriais encontrados na seguinte patologia:
- hipervitaminose D
 - doença de Paget
 - displasia fibrosa polioestótica
 - hiperparatireoidismo primário
18. A osteíte deformante caracteriza-se por densificações e deformações em todo o esqueleto. A manifestação em cabeça e pescoço pode levar aos seguintes achados radiográficos:
- hipercementose e aumento da maxila
 - micrognatia mandibular e maxilar, além de radiolucências maldefinidas
 - presença de áreas osteolíticas com aspecto de favo de mel
 - presença de lesão radiolúcida com halo radiopaco, que envolve as raízes dos dentes posteriores da mandíbula
19. A síndrome de Sjögren é caracterizada como uma doença auto-imune que afeta principalmente as glândulas salivares e lacrimais. Além disso, está comumente associada à seguinte patologia:
- Diabetes mellitus*
 - diabetes bronzeado
 - artrite reumatóide
 - esclerodermia
20. Manchas cor café com leite, displasia óssea polioestótica e endocrinopatias estão presentes na seguinte patologia:
- doença de Addison
 - síndrome de Albright
 - síndrome de Peutz-Jeghers
 - síndrome de Jaffe-Lichtenstein
21. Em paciente que sofreu transplante renal e faz uso de ciclosporina, deve-se evitar a utilização dos seguintes antibióticos:
- amoxicilina e cefalexina
 - clindamicina e eritromicina
 - metronidazol e eritromicina
 - metronidazol e tetraciclina
22. O cisto linfoepitelial oral é uma alteração de desenvolvimento que tem como localização preferencial:
- o assoalho da boca
 - a fossa amigdalina
 - a borda lateral da língua
 - o dorso da língua
23. A hemi-hipertrofia pode estar associada, entre outras manifestações sindrômicas, à:
- esclerodermia
 - síndrome de Proteus
 - síndrome de Parry-Romberg
 - síndrome de Crouzon
24. O eritema multiforme é uma patologia que pode ser desencadeada por uma infecção. Em tal situação, os microorganismos envolvidos no desenvolvimento da doença são:
- varicela zoster e herpes simples
 - herpes simples e *Borrelia vincentii*
 - Fusobacterium nucleatum* e herpes simples
 - Mycoplasma pneumoniae* e herpes simples
25. Dermatite, demência e diarreia são sinais e sintomas característicos da pelagra decorrente de deficiência da seguinte vitamina:
- niacina
 - riboflavina
 - tiamina
 - piridoxina
26. Entre as neoplasias malignas abaixo, a que tem melhor prognóstico, por apresentar um curso invasivo relativamente **NÃO** agressivo, é o:
- carcinoma de ducto salivar
 - carcinoma adenóide cístico
 - carcinoma mucoepidermóide
 - melanoma
27. As vesículas são lesões elementares que apresentam conteúdo líquido. Entre as patologias abaixo, a que **NÃO** apresenta vesícula como lesão elementar inicial é:
- herpes zoster
 - impetigo
 - herpangina
 - psoríase
28. São estruturas orais que fazem parte, respectivamente, das mucosas mastigatória, especializada e de revestimento:
- o palato duro, a língua e a gengiva
 - a língua, a gengiva e a bochecha
 - a gengiva, a língua e os lábios
 - a gengiva, as tonsilas e o palato

- 29.** De acordo com o estadiamento TNM um paciente que apresenta um tumor em língua com 2 cm ou menos em sua maior dimensão, metástase em único linfonodo homolateral com mais de 3 cm até 6 cm em sua maior dimensão e ausência de metástases à distância, encontra-se na seguinte classificação:
- $T_0N_2M_0$
 - $T_1N_2M_0$
 - $T_2N_1M_0$
 - $T_2N_2M_0$
- 30.** O lábio duplo é uma condição congênita ou adquirida que pode ser um componente da seguinte síndrome:
- de Ascher
 - de Melkersson Rosenthal
 - de Beckwith-Wiedemann
 - de Down
- 31.** A citopatologia originalmente lançada por Papanicolaou para estudo dos esfregaços das células obtidas da mucosa uterina foi posteriormente adaptada para o diagnóstico do carcinoma epidermóide da mucosa bucal. A classificação do exame citopatológico em classe II, obtida após a leitura de um esfregaço de tecido bucal, corresponde a células:
- sugestivas de malignidade
 - displásicas
 - normais
 - inflamatórias
- 32.** Com respeito às alterações que se observam na resposta imune do paciente infectado pelo HIV, verifica-se que:
- a contagem de linfócitos T CD4, quando superior a 500 células / mm³, caracteriza uma imunossupressão severa
 - a linfocitopenia e a linfocitose são alterações imunológicas que normalmente ocorrem durante o curso da infecção
 - o linfócito T CD8 é a principal célula de defesa infectada
 - a síndrome da linfocitose infiltrativa difusa se dá quando os indivíduos afetados apresentam linfocitopenia de células T CD8 + e linfocitose de células TCD4+
- 33.** Sarcoma de Kaposi é uma neoplasia maligna que tem sido associada, mais recentemente, à infecção pelo seguinte vírus:
- herpesvírus humano (HHV-8)
 - citomegalovírus (HHV-5)
 - Epstein Barr (HHV-4)
 - papilomavírus (HPV-6)
- 34.** Na sialometaplasia necrosante podem ser encontradas, as seguintes alterações histopatológicas:
- necrose gangrenosa acinar, seguida por displasia escamosa dos ductos glandulares
 - necrose isquêmica acinar, seguida por metaplasia escamosa dos ductos glandulares
 - necrose liquefativa acinar, seguida por displasia escamosa dos ductos glandulares
 - necrose caseosa acinar, seguida por metaplasia escamosa dos ductos glandulares
- 35.** O aumento dos níveis de excreção urinária da hidroxiprolina é identificado no exame complementar do seguinte processo patológico:
- displasia fibrosa polioestótica
 - hipervitaminose D
 - miastenia grave
 - hiperparatireoidismo primário
- 36.** A anemia macrocítica é uma alteração hematológica encontrada no seguinte processo patológico:
- síndrome de Paterson-Kelly
 - perda excessiva de sangue
 - anemia perniciosa
 - anemia ferropriva
- 37.** Disostose mandibulofacial, face estreita e coloboma são características da síndrome de:
- Apert
 - Romberg
 - Crouzon
 - Treacher-Collins
- 38.** O tumor de célula granular localiza-se mais comumente:
- na língua
 - na mucosa jugal
 - no assoalho bucal
 - no palato mole
- 39.** A concrecência é uma alteração do desenvolvimento dentário que se caracteriza por:
- aumento de volume de um dente, com a aparência de coroa dupla e presença de um canal radicular
 - aumento de volume de um dente, com a aparência de coroa dupla e presença de dois canais radiculares
 - união de dois dentes adjacentes ligados ao longo das superfícies radiculares pelo cimento e pela dentina subjacente
 - união de dois dentes adjacentes, ligados ao longo das superfícies radiculares pelo cimento e sem confluência da dentina subjacente

- 40.** Constitui processo patológico cuja ocorrência se restringe ao tecido gengival:
- histiocitoma fibroso
 - granuloma piogênico
 - fibroma ossificante periférico
 - fibroma de células gigantes
- 41.** Os testes sorológicos não-específicos utilizados para o diagnóstico da sífilis, nos dois primeiros estágios da doença, tornam-se fortemente positivos após:
- o quinto dia de infecção
 - o segundo dia de infecção
 - a primeira semana de infecção
 - as primeiras três semanas de infecção
- 42.** O tempo de tromboplastina parcial ativada encontra-se prolongado na seguinte alteração da coagulação:
- defeitos relacionados com o fator VII
 - defeitos relacionados com o fator VIII
 - doença decorrente de disfunções plaquetárias
 - doença de von Willebrand
- 43.** Durante o exame físico, o estomatologista identificou uma mancha vermelha na mucosa jugal do paciente. A mancha desapareceu quando o profissional realizou a vitropressão. Esse quadro evidencia a presença da seguinte alteração:
- enantema
 - equimose
 - petéquias
 - víbices
- 44.** Constitui manifestação clínica encontrada na doença de Darier:
- incontinência pigmentar
 - disceratose congênita
 - ceratose folicular
 - displasia ectodérmica
- 45.** Na síndrome de Rendu-Osler-Weber, são encontrados os seguintes processos patológicos:
- icterícia e fragilidade das células endoteliais
 - telangiectasias e fístulas arteriovenosas
 - aneurismas, varicosidades e hemangiomas
 - anemia hemolítica e trombose
- 46.** Entre as lesões que envolvem os ossos da face, aquela que ocorre exclusivamente na mandíbula é o:
- granuloma central de células gigantes
 - granuloma periférico de células gigantes
 - cisto ósseo Aneurismático
 - cisto ósseo de Stafne
- 47.** A displasia cemento-óssea periapical é uma lesão óssea que apresenta a seguinte característica:
- os dentes envolvidos com a doença, geralmente desenvolvem pulpíte irreversível
 - o ligamento periodontal dos dentes envolvidos é atingido desde a fase inicial da doença
 - ocorre preferencialmente em mulheres
 - na fase inicial da doença, os dentes envolvidos possuem calcificações periapicais envolvidas por áreas radiotransparentes
- 48.** O ducto de Wharton é uma estrutura anatômica da seguinte glândula salivar:
- parótida
 - submandibular
 - sublingual
 - acessória da língua
- 49.** Medicamentos que modulam a condução dos íons pela membrana do nervo, reduzindo a excitabilidade, são utilizados no tratamento da nevralgia do trigêmeo. Para o controle dessa doença, o medicamento mais indicado é:
- ácido valpróico
 - claritromicina
 - talidomida
 - aztreonam
- 50.** A doença bolhosa que se caracteriza por ser mucocutânea hereditária e apresentar defeitos nos mecanismos de adesão entre as células epiteliais é:
- pênfigo paraneoplásico
 - pênfigo vulgar
 - epidermólise bolhosa simples
 - penfigóide benigno das membranas mucosas