



Instituto Nacional de Direito Público e Controle Social

Rua Martim Afonso, 536, Cj 01, Bairro São Francisco  
CEP: 80410-060 - Fone/Fax: 41 3076-5576  
www.idejure.org.br - idejure@pop.com.br - Curitiba - Paraná

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO**  
**CONCURSO PÚBLICO Nº 006/2008 - DATA: 24/02/2008**

**I N S T R U Ç Õ E S**

**PROVA TEÓRICA**

**002 – MÉDICO CLÍNICO GERAL II**

- 1.** O candidato está recebendo, juntamente com este caderno de provas, o cartão-resposta. Confira o seu nome. Ao receber o cartão-resposta, o candidato deve assinar no verso do cartão-resposta. Não haverá substituição desse cartão-resposta e do caderno de provas, a não ser em caso de defeito em sua impressão.
- 2.** Este caderno de provas contém 50 (cinquenta) questões, todas com 5 (cinco) alternativas. Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. O caderno de provas só será trocado se apresentar problema de impressão.
- 3.** A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a resposta que julgar certa. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da prova.
- 5.** Preencha o cartão-resposta na mesma seqüência das questões do caderno de provas (de nº 01 à de nº 50). O cartão-resposta NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas. A rasura implicará a anulação da resposta.
- 6.** A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão-resposta é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica azul ou preta, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:  

**A ■ C D E**
- 7.** Não serão consideradas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura.
- 8.** O candidato assume plena e total responsabilidade pelo correto preenchimento do cartão-resposta e sua integridade.
- 9.** A duração da prova é de 04 (quatro) horas. A saída do candidato só será permitida após transcorrida 1 (uma) hora do início da mesma. Os três últimos candidatos a terminar a prova deverão retirar-se da sala simultaneamente, após verificarem e assinarem o lacre do envelope que conterá os cartões-resposta. O candidato só poderá levar consigo o Caderno de Provas, nos últimos 15 (quinze) minutos.
- 10.** Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- 11.** Proibida a divulgação ou impressão da presente prova. ***Direitos Reservados - IDEJURE.***
- 12.** O Gabarito da Prova Objetiva será divulgado e afixado em Mural da Prefeitura Municipal de Vitorino até o dia 26/02/2008. O resultado não será fornecido por telefone.

**BOA SORTE.**



### **CADERNO DE PROVA**

1 – Paciente politraumatizado com trauma cranioencefálico chega ao hospital com abertura ocular ao estímulo doloroso, falando palavras desconexas e localizando estímulo doloroso. Qual sua pontuação na escala de coma de Glasgow?

- A) 12
- B) 11
- C) 10
- D) 9
- E) 8

2 – Com relação à classificação de choque hipovolêmico hemorrágico para um adulto de 70 Kg, estabelecida pelo Advanced Trauma Life Support ( ATLS), é correto afirmar:

- A) uma perda de sangue menor do que 750ml só acarreta taquicardia
- B) uma perda de sangue de até 1000ml representa menos de 15% da volemia
- C) a hipotensão arterial já aparece com perdas maiores que 1000ml da volemia
- D) a administração de sangue está indicada para perdas estimadas de volemia maiores 1500ml
- E) as perdas da volemia maiores 1500ml geralmente estão associadas a taquicardias maiores que 140 bpm

3 – Paciente politraumatizado por acidente automobilístico, no qual houve trauma da região torácica sobre o volante do automóvel, chega à UTI com PA de 70/50 mmHg, pulmões livres e jugulares engurgitadas. Um outro achado de exame físico poderia ser:

- A) hiperfonese de bulhas
- B) pulso paradoxal
- C) desvio lateral da traquéia
- D) pulso alternans
- E) terceira bulha

4 – Qual dos achados abaixo geralmente não é encontrado na embolia pulmonar:

- A) alargamento da diferença alvéolo-arterial de oxigênio
- B) taquicardia
- C) hipercapnia
- D) trombose venosa profunda
- E) hipoxemia

5 – Identifique a seqüência de drogas recomendadas no estado de mal epiléptico refratário, a partir do início das crises:

- A) midazolam, carbamazepina, fenitoína e tiopental
- B) diazepam, fenitoína, pancurônico, fenobarbital
- C) diazepam, fenitoína, fenobarbital e tiopental
- D) fenitoína, lorazepam, fenobarbital e tiopental
- E) Nenhuma das alternativas está correta.



6 – Qual o medicamento de escolha para tratamento da hipertensão arterial em gestante?

- A) captopril
- B) prazosina
- C) losartan
- D) reserpina
- E) alfametildopa

7 – Todas as alternativas apresentam as causas de insuficiência cardíaca de alto débito, EXCETO:

- A) anemia
- B) fístulas arteriovenosas
- C) hipertireoidismo
- D) hipertensão arterial
- E) nenhuma alternativa anterior

8 – O tabagismo é um fator de risco importante para doença aterosclerótica. É correto afirmar:

- A) ocorre maior impacto sobre as mulheres
- B) associação do tabagismo com contraceptivo oral não aumenta o risco de doença arterial coronariana
- C) não existe relação direta entre o número de cigarros/dia e o risco de doença arterial coronariana
- D) o risco cardiovascular após parar de fumar fica semelhante aos não fumantes após 10 anos de abstinência
- E) nenhuma alternativa anterior está correta

9 – Qual dos fatores abaixo não está relacionado à síndrome metabólica?

- A) HDL-colesterol acima de 60 mg/dl
- B) hipertensão arterial sistêmica
- C) obesidade visceral
- D) intolerância a glicose
- E) hiperinsulinemia

10 – A primeira dose da vacina contra a hepatite B é recomendada:

- A) nas primeiras 72 horas de vida
- B) com 7 dias de vida
- C) com 1 mês de vida
- D) com 2 meses de vida
- E) nas primeiras 12 horas de vida



11 – Dentre as doenças abaixo, qual cursa com inabilidade permanente de tolerar o glúten?

- A) doença péptica
- B) retocolite ulcerativa
- C) doença celíaca
- D) mucoviscidose
- E) linfangiectasia intestinal congênita

12 – Qual das alternativas abaixo é a causa mais provável de baixa estatura associada a aumento de peso, atraso na idade óssea, hormônio do crescimento normal, T4 baixo e TSH elevado?

- A) componente genético para baixa estatura
- B) síndrome de Cushing
- C) hipotireoidismo
- D) hiperparatireoidismo
- E) Síndrome de Turner

13 – É incorreto afirmar:

- A) A puberdade precoce verdadeira idiopática é a forma mais comum no sexo feminino
- B) A possibilidade de etiologia tumoral para puberdade precoce é maior no sexo masculino
- C) Em pacientes com puberdade precoce, não há prejuízos na altura final em ambos os sexos
- D) O FSH e LH estão elevados em pacientes com puberdade precoce
- E) O estradiol ou a testosterona estão elevados em pacientes com puberdade precoce

14 – Sobre desnutrição infantil, marque a alternativa incorreta:

- A) a desnutrição primária ocorre por oferta inadequada de alimentos
- B) no Kwashiorkor, encontramos edema, hipoalbuminemia, tecido subcutâneo ainda presente e freqüentemente diarréia
- C) o Marasmo ocorre mais freqüentemente no pré-escolar
- D) no Marasmo, as alterações bioquímicas são pouco intensas
- E) após a fase de emergência do tratamento da desnutrição, utiliza-se esquema nutricional com alto teor calórico e rico em proteínas, vitaminas e sais minerais, em pequenos volumes distribuídos em diversas vezes durante o dia

15 – Na avaliação da insuficiência de crescimento infantil, é incorreto afirmar:

- A) devemos excluir se a criança não é constitucionalmente miúda, através do exame físico, da observação do seu desenvolvimento e da avaliação do tipo constitucional dos familiares
- B) algumas síndromes cromossômicas podem ter relação com déficit de crescimento
- C) se a criança apresenta insuficiência de crescimento e poliúria devemos excluir diabetes melito
- D) a presença de paralisia cerebral não é uma das causas de retardo de crescimento
- E) a maioria dos casos de insuficiência de crescimento ocorre por causas não orgânicas, isto é, privações psicossociais levando a fornecimento energético insuficiente



16 – Sobre o aleitamento materno, qual a alternativa correta?

- A) deve ser orientado como alimentação no primeiro semestre de vida, sempre associado a chás, sucos e vitaminas
- B) o leite materno é o um bom alimento do ponto de vista nutricional, porém não é a primeira escolha para o recém-nato prematuro.
- C) nas crianças de bom nível socioeconômico é a mesma coisa amamentar no seio ou com mamadeira
- D) o aleitamento materno é importante fator para o espaçamento entre gestações
- E) nenhuma está correta

17 – Quanto à vacinação da criança, marque a correta:

- A) recomenda-se a aplicação da vacina BCG ao nascer, aos 3 e 6 meses de vida
- B) a vacina tríplice bacteriana previne a difteria, o tétano e o sarampo
- C) a vacina Sabin apresenta aplicação subcutânea
- D) recomenda-se a aplicação da vacina oral para poliomielite aos 2 , 4 e 6 meses de vida, com reforço aos 15 meses de vida
- E ) a vacina tetravalente previne a difteria, o tétano, a rubéola e meningite e outras infecções por *Haemophilus influenzae* tipo b

18 – Mulher de 32 anos procura a unidade básica de saúde com resultado de colpocitologia oncótica mostrando a presença de células metaplásicas. Nesse caso:

- A) é indicado colposcopia para complementação diagnóstica
- B) deve-se prescrever creme vaginal com antibiótico e repetir a citologia
- C) realizar teste de Schiller e cauterizar eventuais lesões
- D) não é necessário qualquer conduta, pois células metaplásicas são achados normais
- E) deve-se realizar biópsia no colo uterino

19 – A citologia sugestiva de lesões intra-epiteliais escamosas de baixo grau inclui:

- A) atipia coilocitótica ( HPV)
- B) ASC-US
- C) NIC II
- D) NIC III
- E ) metaplasia escamosa

20 – Assinale a afirmação incorreta:

- A) o sangramento genital na gestante pode denunciar a ocorrência de abortamento, pólipos cervicais, miomas, gravidez ectópica ou doença trofoblástica gestacional
- B) os sangramentos da segunda metade da gestação não podem ser conseqüentes a rotura do seio marginal da placenta
- C) os sangramentos cíclicos que podem ocorrer até o terceiro mês da gestação, correspondentes ao período menstrual, devem-se a flutuações hormonais que podem ocorrer nesse período gestacional
- D) os processos infecciosos sistêmicos em gestantes podem envolver riscos fetais como malformações e estar relacionados a abortamentos
- E) para o cálculo da data provável do parto, segue-se a regra de Naegle



21 – Assinale a alternativa incorreta:

- A) o álcool ingerido por gestantes pode levar a alterações no desenvolvimento fetal com encurtamento de membros
- B) filhos de gestantes usuárias de drogas podem apresentar após nascimento síndrome de abstinência
- C) retardo de crescimento intra-uterino pode estar relacionado com hábito tabágico da gestante
- D) cefaléia, escotomas e hiper-reflexia em gestantes podem indicar casos de pré-eclâmpsia ou eclâmpsia
- E) o aumento da incidência de infecção do trato urinário nas gestantes ocorre somente devido a compressão do trato urinário pelo útero

22 – Sobre o puerpério, assinale a alternativa correta:

- A) tem a duração de 8 semanas após o parto
- B) a involução uterina fica comprometida quando partes dos anexos fetais são deixadas no interior do útero ou por infecção
- C) o trabalho de parto prolongado não é fator importante para a predisposição a infecção uterina
- D) o engurgitamento mamário por estase vascular, linfática e láctea não dificulta a sucção do recém-nato
- E) a mastite aguda geralmente ocorre após 4 meses de lactação

23 – Sobre doenças sexualmente transmissíveis, marque a alternativa incorreta:

- A) a sífilis caracteriza-se por cancro duro no local de inoculação e apresenta período de incubação de 3 a 7 dias
- B) a gonorréia, causada por *Nesseria gonorrhoeae*, pode evoluir para doença inflamatória pélvica
- C) a cervivite por *Clamidia trachomatis* pode se apresentar com úlceras no colo uterino e leucorréia purulenta
- D) o cancro mole é causado pelo *Haemophilus ducreyi*
- E) o herpes simples, em sua fase aguda, apresenta evolução de 10 a 20 dias e pode tornar-se recorrente

24 – São fatores de risco para doença inflamatória pélvica, exceto:

- A) multiplicidade de parceiros
- B) iniciação sexual precoce
- C) uso de DIU
- D) doença inflamatória pélvica prévia
- E) uso de antibióticos de repetição

25 – Sobre neoplasia de mama, marque a incorreta:

- A) mulheres com menarca tardia e menopausa precoce tem risco relativo aumentado para a doença
- B) o fator de risco com maior importância é a história familiar
- C) são fatores de risco ambientais : ingestão de ácidos graxos saturados, etilismo e exposição a agentes químicos
- D) para investigação diagnóstica, a primeira escolha é a mamografia
- E) lesões multicêntricas estão relacionadas com altos índices de recidiva local



26 – A hepatite B e a C compartilham qual das seguintes características epidemiológicas?

- A) associar-se a desenvolvimento de hepatite crônica em 50% dos pacientes
- B) a infecção ativa está associada a elevada taxa de mortalidade
- C) a vacinação confere proteção adequada contra a doença
- D) são raras em usuários de drogas intravenosas
- E) colocam o paciente em alto risco de hepatoma

27 – Que combinação de achados fornece o diagnóstico definitivo de fibrose cística?

- A) história familiar de fibrose cística e função pulmonar anormal
- B) função pulmonar anormal e insuficiência pancreática
- C) radiografia de tórax anormal e história familiar de fibrose cística
- D) alta concentração sérica de eletrólitos e radiografia de tórax anormal
- E) insuficiência pancreática e alta concentração de eletrólitos no suor

28 - São sintomas de hipotireoidismo, exceto:

- A) fadiga
- B) diarreia
- C) edema de membros inferiores
- D) intolerância ao frio
- E) pele seca

29 – Uma mulher de 55 anos de idade encontra-se em tratamento para DM tipo II com insulina NPH (35U) cedo após desjejum. As medidas domiciliares das glicemias habitualmente encontram-se assim: 7h = 238 mg/dl, 11h = 155 mg/dl, 16h = 128 mg/dl e 20h = 125mg/dl. Qual seria a alteração no esquema terapêutico mais adequada?

- A) aumentar a dose da insulina
- B) acrescentar insulina regular à dose da NPH
- C) administrar a dose da NPH a noite em vez de pela manhã
- D) acrescentar uma dose de insulina regular antes da ceia
- E) acrescentar uma segunda dose de insulina NPH antes da ceia

30 – São contra-indicações absolutas para fibrinolíticos no infarto agudo do miocárdio, exceto:

- A) acidente vascular cerebral hemorrágico prévio
- B) sangramento digestivo ativo
- C) neoplasia intracraniana conhecida
- D) suspeita de dissecação de aorta
- E) aneurisma volumoso de artérias periféricas



31 – São critérios principais de Framingham, exceto:

- A) dispnéia paroxística noturna
- B) trombose venosa profunda
- C) cardiomegalia
- D) edema agudo de pulmão
- E) ritmo em galope por B3

32 – Sobre abdome agudo, assinale a alternativa correta:

- A) o abdome agudo obstrutivo é o mais freqüente
- B) na isquemia mesentérica, não se evidencia freqüentemente irritação peritoneal , exceto se já houver sofrimento de alça intestinal
- C) o raio X de abdome realizado com paciente em decúbito dorsal é suficiente para avaliar suspeita de abdome agudo perfurativo
- D) a dor a descompressão do abdome, observada durante o exame físico, é decorrente do comprometimento do peritônio visceral
- E) nenhuma alternativa está correta

33 – Politraumatizado, vítima de acidente de moto, dá entrada no pronto socorro com fratura escalonada de costelas, traumas de face, fratura exposta de fêmur, taquicárdico, hipotenso e com escala de coma de Glasgow de 7. Qual a primeira atitude a ser tomada?

- A) Entubação oro-traqueal
- B) acesso venoso para reposição de volume
- C) ventilação com máscara e ambu
- D) imobilização da fratura exposta
- E) tomografia de crânio

34 – São causas de choque cardiogênico, exceto:

- A) infarto agudo do miocárdio
- B) arritmias
- C) hiperviscosidade do sangue
- D) shunt arteriovenoso
- E) lesões valvares

35 – Qual o grupo de anti-hipertensivos que auxiliam nos sintomas dos pacientes portadores de hiperplasia prostática benigna?

- A) diuréticos de alça
- B) diuréticos tiazídicos
- C) alfa 1 bloqueadores
- D) antagonistas do canal de cálcio
- E) betabloqueadores





36 – Hipertensão arterial associada a cefaléia, sudorese e palpitações é compatível com:

- A) hipertireoidismo
- B) feocromocitoma
- C) hipertensão renovascular
- D) hiperaldosteronismo primário
- E) hiperparatireoidismo

37 – Sobre os tumores da tireóide, assinale a correta:

- A) o de melhor prognóstico é o adenocarcinoma indiferenciado
- B) o mais comum é o adenocarcinoma medular
- C) o local mais comum de metástase do adenocarcinoma papilífero é o fígado
- D) o mais raro é o adenocarcinoma folicular
- E) o carcinoma medular secreta calcitonina

38 – São sintomas da síndrome de recuperação nutricional, exceto:

- A) anemia
- B) distensão abdominal
- C) sudorese
- D) recuperação da coloração do cabelo
- E) hepatomegalia

39 – Qual a causa mais comum de abdome agudo obstrutivo em criança pré-escolar?

- A) volvo
- B) invaginação intestinal
- C) brida
- D) suboclusão por áscaris
- E) nenhuma alternativa anterior

40 – Quanto ao pré-natal, podemos afirmar, exceto:

- A) a altura uterina deve ser medida a partir da borda superior da sínfise púbica
- B) a presença de varizes as gestantes justifica a orientação para uso de meias de compressão
- C) em situações normais entre a oitava e a décima segunda semanas, já se observa o colostro na mama da gestante
- D) os batimentos cardíacos fetais devem ser avaliados nas consultas de pré-natal com o doppler , pois a partir da décima a décima segunda semanas, já é possível identificá-los com clareza
- E) não há necessidade de colher citologia oncótica , mesmo que não tenha sido colhida recentemente



41 - Assinale a única frase em que o "a" deve receber acento indicativo de crase.

- A) Dedicava-se a crônica semanal com prazer.
- B) Pegou um lápis e pôs-se a trabalhar.
- C) Leu o texto de ponta a ponta.
- D) A crônica fazia referência a pessoas comuns.
- E) Algumas vezes dirigia-se a seu computador.

42- Assinale a alternativa em que a análise morfológica das palavras grifadas está incorreta.

- A) Os candidatos começaram a escrever. = advérbio
- B) Eu a vi ontem. = pronome pessoal do caso oblíquo
- C) Veja o que você fez. = pronome demonstrativo
- D) O inspetor acaba de chegar. = artigo indefinido
- E) Não sei se cursarei Direito ou Medicina. = conjunção alternativa

43 - Em: "ler os códigos de barra", o verbo em destaque é:

- A) intransitivo.
- B) transitivo indireto.
- C) transitivo direto e indireto.
- D) transitivo direto
- E) impessoal

44- Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente grafadas

- A) Jabuticaba – êmbulo – mágoa
- B) Táboa – óbolo – tussir
- C) Boeiro – íngoia – puleiro
- D) Polenta – nódoa – engolir
- E) N.d.a

45- Hoje, um pai tem o dobro da idade de um filho. Dez anos atrás, o pai tinha o triplo da idade que o filho tinha. Hoje a idade do pai é:

- A) 20
- B) 30
- C) 40
- D) 25
- E) 35

46- Duas empreiteiras foram contratadas por uma prefeitura para pavimentar uma estrada. Cada uma começou em uma extremidade. Sabe-se que uma delas pavimentou  $\frac{2}{5}$  da estrada e a outra os 81 Km restante. Pergunta-se: a extensão total da estrada é?

- A) 135 Km
- B) 125 Km
- C) 160 Km
- D) 152 Km
- E) 140 Km



**Instituto Nacional de Direito Público e Controle Social**

Rua Martim Afonso, 536, Cj 01, Bairro São Francisco  
CEP: 80410-060 - Fone/Fax: 41 3076-5576  
www.idejure.org.br - idejure@pop.com.br - Curitiba - Paraná

47 - Um DVD foi programado para gravar 2 horas. Quanto tempo foi gravado, sendo que o que resta para concluir é  $\frac{1}{4}$  do que já passou?

- A) 1 h 20 min.
- B) 1 h 36 min.
- C) 1 h 18 min.
- D) 1 h 40 min.
- E) 1 h 12 min.

48- São objetos de Lei Complementar as seguintes matérias, exceto:

- A) Regime Jurídico dos Servidores.
- B) Código de Obras;
- C) Código de Postura;
- D) Código Tributário;
- E) n.d.a

49- O Prefeito Municipal não poderá ausentar-se do Município sem licença da Câmara, sob pena de perda do mandato, salvo por período inferior a:

- A) 30 dias.
- B) 10 dias
- C) 5 dias
- D) 15 dias
- E) 20 dias

50- A proposta de emenda a Lei Orgânica Municipal será discutida e votada em dois turnos de discussão e votação, considerando-se aprovada, quando obtiver em ambos:

- A)  $\frac{1}{3}$  dos votos dos membros da Câmara.
- B)  $\frac{1}{3}$  dos votos dos membros presentes.
- C)  $\frac{2}{3}$  dos votos dos membros da Câmara.
- D)  $\frac{2}{3}$  dos votos dos membros presentes
- E)  $\frac{1}{2}$  dos votos dos membros da Câmara

---

BOA SORTE\_\_\_\_\_