



CONCURSO PÚBLICO

9. PROVA OBJETIVA

CIRURGIÃO-DENTISTA

INSTRUÇÕES

- ♦ VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO **60** QUESTÕES OBJETIVAS.
- ♦ PREENCHA COM SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO OS ESPAÇOS RESERVADOS NA CAPA DESTE CADERNO.
- ♦ LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.
- ♦ RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.
- ♦ ASSINALE NA FOLHA DE RESPOSTAS, COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA, A ALTERNATIVA QUE JULGAR CERTA.
- ♦ A DURAÇÃO DA PROVA É DE **3** HORAS.
- ♦ A SAÍDA DO CANDIDATO DO PRÉDIO SERÁ PERMITIDA APÓS TRANSCORRIDA A METADE DO TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA OBJETIVA.
- ♦ AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS E LEVARÁ ESTE CADERNO.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

Nome do candidato _____

Número de inscrição _____

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 05.

Você é o que você come

Quando o francês Jean Brillat-Savarin cunhou, em 1825, a expressão “diga-me o que comes e eu te direi o que és”, referia-se, sobretudo, aos prazeres de uma boa refeição. Em seu tratado de gastronomia, *A Fisiologia do Gosto*, a primeira obra sobre a relação do homem com a comida, ele dizia que a elaboração de um novo prato causava mais felicidade à espécie humana do que a descoberta de uma estrela. Pouco mais de um século depois, na década de 1950, o sabor de uma boa refeição ganhou um tempero de culpa com a descoberta de que a gordura, em excesso, trazia malefícios à saúde. De lá para cá, uma série de estudos vem contribuindo para medicalizar o pão (e a carne, e a massa, e o doce) nosso de cada dia. Alguns alimentos passaram a ser vistos como venenos e outros, como remédios. Entre os dois extremos está você, fazendo as contas de quantas calorias vai ingerir com a feijoada programada para o sábado e pensando se, no momento, é melhor evitar o quinto copo de vinho tinto.

Sem dúvida, as descobertas de médicos nutrólogos e nutricionistas são para ser levadas a sério, mas não devem servir para criar neuroses. Você é, sim, o que come, desde que entenda que, quando sentamos à mesa, o fazemos por motivos que vão além da nutrição pura e simplesmente. Entre eles, degustar iguarias, compartilhar um grande momento com os amigos, participar de rituais e cerimônias familiares e até explorar novas culturas. Tudo isso se perde assim que você começa a encarar a refeição como uma ida à farmácia. Qual a saída? Ter uma dieta equilibrada – em quantidade e qualidade. Tão equilibrada que lhe dê a chance de, vez por outra, cometer alguns crimes nutricionais.

Já está provado que, das dez doenças que mais matam no mundo, cinco estão diretamente associadas a uma dieta de má qualidade: obesidade, infarto, derrame, diabetes e câncer. Não é preciso ser um frequentador compulsivo de spas para perceber que basta uma semana de alimentação regrada para o organismo funcionar melhor. Até o nosso humor pode ser modulado pela alimentação. Certos nutrientes provocam um efeito direto sobre a produção ou inibição de determinados neurotransmissores, responsáveis pelas oscilações do estado de espírito.

Uma dieta, para ser equilibrada e prazerosa, tem de se combinar ao ambiente em que se vive e à genética de cada um. Coma de tudo um pouco e tente transformar o ato de comer numa experiência mais agradável do que consumir uma porção de brócolis ou se entupir de frituras.

(Anna Paula Buchalla, *Veja*, 30.04.2008. Adaptado)

01. De acordo com o texto,

- (A) comer é um prazer insuperável. Prova disso é que o ser humano dá mais valor a esse prazer que a avanços tecnológicos.
- (B) desde o século XIX, vêm se estudando os malefícios que o excesso de comida pode causar às pessoas.
- (C) a expressão “diga-me o que comes e eu te direi o que és” refere-se ao poder que os alimentos têm de prevenir doenças.
- (D) fazer uma boa refeição não significa apenas se alimentar, pois essa prática também constitui uma atividade de socialização.
- (E) os abusos gastronômicos, mesmo que esporádicos, estão proibidos para os indivíduos que desejam ser saudáveis.

02. Considere os termos em destaque e as relações que eles estabelecem nas frases.

- I. Tudo isso se perde *assim que* você começa a encarar a refeição *como* uma ida à farmácia. – tempo e comparação
- II. Tão equilibrada *que* lhe dê a chance de, vez por outra, cometer alguns crimes nutricionais. – consequência
- III. ... consumir uma porção de brócolis *ou* se entupir de frituras. – conclusão

É correto o que se afirma em

- (A) II, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

03. Assinale a alternativa em que há uma expressão em sentido figurado.

- (A) ... a primeira obra sobre a relação do homem com a comida...
- (B) ... de que a gordura, em excesso, trazia malefícios à saúde.
- (C) Entre dois extremos está você, fazendo as contas...
- (D) ... vez por outra, cometer alguns crimes nutricionais.
- (E) Não é preciso ser um frequentador compulsivo de spas...

04. Considere os trechos.

Em seu tratado de gastronomia, A Fisiologia do Gosto...

... causava mais felicidade à espécie humana...

De lá para cá, uma série de estudos vem contribuindo...

Sem dúvida, as descobertas de médicos nutrólogos...

As expressões em destaque expressam, correta e respectivamente, as circunstâncias de

- (A) meio; modo; afirmação; intensidade.
- (B) meio; intensidade; lugar; dúvida.
- (C) causa; meio; lugar; dúvida.
- (D) lugar; modo; tempo; afirmação.
- (E) lugar; intensidade; tempo; afirmação.

05. Considere os trechos.

... é melhor evitar o quinto copo de vinho tinto.

... não devem servir para criar neuroses.

Certos nutrientes provocam um efeito direto...

Assinale a alternativa em que os termos destacados estão substituídos, correta e respectivamente, pelos pronomes adequados.

- (A) evitar-lhe; criá-las; provocam-no
- (B) evitar-lhe; criar-lhes; provocam-no
- (C) evitá-lo; criá-las; provocam-no
- (D) evitá-lo; criá-las; provocam-lhe
- (E) evitá-lo; criar-lhes; provocam-lhe

06. Reconheça a alternativa cujas formas verbais completam, correta e respectivamente, a frase.

Se uma pessoa _____ que seu tipo de alimentação prejudica sua saúde e se, pensando nisso, se _____ a fazer refeições equilibradas, poderá evitar doenças graves.

- (A) vir ... predispor
- (B) ver ... predispor
- (C) vir ... predispor
- (D) ver ... predispor
- (E) ver ... predisponha

07. Assinale a alternativa correta quanto às regras de concordância verbal e nominal estabelecidas pela norma culta.

- (A) No depósito, haviam produtos guardados em recipientes inadequados.
- (B) Faz três anos que os pacientes mantêm uma dieta controlada.
- (C) Ela mesmo prefere preparar suas refeições, pois é vegetariana.
- (D) As adolescentes estavam só no spa, pois seus pais não têm problemas de obesidade.
- (E) Comida gordurosa bem como o sedentarismo pode causar doenças.

08. Assinale a alternativa cujas preposições preenchem, correta e respectivamente, a frase:

Este é o total de calorias _____ qual os frequentadores de spas devem se limitar, e esta é a rotina _____ que eles devem se contentar temporariamente.

- (A) do ... com
- (B) no ... em
- (C) no ... para
- (D) ao ... para
- (E) ao ... com

09. Assinale a alternativa em que ocorre o emprego correto do sinal indicativo de crase.

- (A) Alguns pacientes somente obedecem à uma dieta controlada à custa de muito esforço.
- (B) Comer à beça desperta sentimento de culpa quando, à rigor, o importante é buscar equilíbrio.
- (C) Informaram à paciente que a levarão, em breve, à ala de cirurgias.
- (D) Desde às 14 horas, o centro de terapia intensiva está proibido à visitas.
- (E) À hora marcada, os cientistas estavam prontos à discutir o novo caso.

10. Considere a tirinha.



(Dik Browne, *O melhor de Hagar, o Horrível*)

Na frase de Helga, a preposição *de* estabelece entre as palavras a relação de

- (A) assunto, como em *falar de diversão*.
- (B) caracterização, como em *maço de hortaliças*.
- (C) causa, como em *tremor de frio*.
- (D) modo, como em *ficar de pé*.
- (E) lugar, como em *voltar de Brasília*.

ATUALIDADES

11. A mídia divulgou com grande ênfase uma importante mudança no comércio internacional. A alteração está relacionada à posição no ranque dos países exportadores. Assinale a alternativa que indica corretamente o país que passou a ocupar a primeira posição como exportador.

- (A) Estados Unidos.
- (B) Alemã.
- (C) Japão.
- (D) Índia.
- (E) China.

12. Leia as afirmações sobre a compra da Sadia pela Perdigão e a criação da nova empresa, a BRF.

- I. A nova empresa vai dominar o mercado de vários alimentos como massas e carnes congeladas.
- II. A BRF será uma das maiores exportadoras do Brasil, juntamente com a Vale do Rio Doce e a Petrobrás.
- III. A empresa nasceu com uma grande dívida que será saldada, em parte, com a emissão e venda de ações.
- IV. Os fundos de pensão, liderados pelo Previ do Banco do Brasil, devem ser utilizados para a compra de ações da BRF.

Estão corretas as afirmações

- (A) I, II e IV, apenas.
- (B) II, III e IV, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I e IV, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

13. Leia as afirmações sobre a camada de Pré-Sal.

- I. Os governadores do Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo defendem o argumento segundo o qual os seus Estados devem ser privilegiados na distribuição dos royalties.
- II. O Governo Federal elaborou um novo marco regulatório, isto é, a definição das regras sobre como se dará a exploração do petróleo existente na camada de Pré-Sal.
- III. Na ótica governamental, as empresas internacionais devem ter preferência na exploração do petróleo e cabe à Petrobrás continuar a fazer pesquisas para descobrir novos poços.
- IV. Desde o primeiro semestre o Brasil passou a integrar a Organização do Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Estão corretas as afirmações

- (A) I, II e III, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) I e IV, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

14. Observe a ilustração.



www.bicodocorvo.com.br/.../2009/04/crise.jpg

A história da grande montadora norte-americana confunde-se com a própria história do capitalismo norte-americano. A grave crise da General Motors (GM) alcançou o seu auge na segunda metade de 2008. Assinale a alternativa que contém a posição adotada pelo governo Barack Obama, no primeiro semestre de 2009, para enfrentar a crise da GM.

- (A) Alegou que a crise foi resultado da incompetência administrativa e optou por não auxiliar a empresa.
- (B) Estimulou a fusão da empresa com outras montadoras da região de Detroit que passam por situação semelhante.
- (C) Fez grandes investimentos de capitais na empresa e na prática tornou a GM uma empresa estatal.
- (D) Ampliou a oferta de ações da empresa na Bolsa de Valores, desencadeando uma onda especulativa que decretou a falência da empresa.
- (E) Fortaleceu a GM e a indústria automobilística dos Estados Unidos, ao proibir a importação de carros de outros países por seis meses.

15. No primeiro semestre de 2009, completou 15 anos o plano econômico lançado em 1994, no governo do Presidente Itamar Franco, que teve entre os seus principais resultados o fim da espiral inflacionária que dominava a economia brasileira. Trata-se do Plano

- (A) Cruzado.
- (B) Verão.
- (C) Trienal.
- (D) Real.
- (E) Bresser.

POLÍTICA DE SAÚDE

16. Sobre a lista de doenças de notificação compulsória do Estado de São Paulo, é correto afirmar que

- (A) inclui doenças crônicas como hipertensão arterial e diabetes.
- (B) o fluxo de notificações de agravos à saúde do trabalhador foi regulamentado em 2009.
- (C) é de responsabilidade do Conselho Estadual de Saúde.
- (D) só pode ter acréscimos no âmbito dos municípios com autorização do gestor estadual.
- (E) só é válida para os municípios que a aprovarem nos seus conselhos de saúde.

17. O Pacto pela Saúde

- (A) apresenta mudanças na execução do SUS, entre as quais a substituição do processo de habilitação pela adesão solidária aos termos de compromisso de gestão.
- (B) representa uma ruptura com os rumos da execução do SUS, cujo objetivo maior é aumentar o controle do gestor federal.
- (C) teve seu conteúdo elaborado e publicado pelo Ministério da Saúde, sem a participação de outros gestores ou entidades.
- (D) representa um acordo tripartite das esferas federal, estaduais e municipais, com o objetivo de reorganizar as ações assistenciais de emergência.
- (E) tem como principal problema a ausência de acompanhamento de seu desenvolvimento pelos gestores do SUS das esferas federal, estaduais e municipais.

18. Assinale a alternativa correta sobre o Programa de Saúde da Família.

- (A) Suas equipes são responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias de uma determinada região, composta por vários municípios.
- (B) A atuação das suas equipes é centrada na realização de palestras informativas sobre cuidados com a saúde e doenças mais prevalentes.
- (C) Os agentes comunitários de saúde devem ter formação superior e morar na região de atuação.
- (D) Suas equipes são responsáveis por ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação e reabilitação de agravos mais frequentes.
- (E) A estratégia de saúde da família é definida prioritariamente para os municípios com até 500 mil habitantes.

19. A Emenda Constitucional número 29 teve como objetivo

- (A) modificar a composição dos conselhos de saúde.
- (B) alterar o fluxo de notificação de agravos de notificação compulsória.
- (C) assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde.
- (D) alterar a organização da atenção básica do SUS.
- (E) reiterar a universalidade e a integralidade da assistência à saúde.

20. Observe os dados sobre a Influenza A.

País	MORTES	NÚMERO DE HABITANTES	PORCENTAGEM FINAL
Chile	68	16 802 953	0,4
Argentina	137	39 934 109	0,34
Austrália	37	20 950 604	0,17
Canadá	50	33 169 734	0,15
México	128	107 801 063	0,11
EUA	263	308 798 281	0,08
Reino Unido	29	61 018 648	0,04
Espanha	4	44 592 770	0,04
Brasil	29	191 481 045	0,01

Mortes por Influenza A

Atualização de óbitos: 22 de julho de 2009

(Número de habitantes IBGE, 2008)

Os números da quarta coluna referem-se

- (A) ao coeficiente de mortalidade geral.
- (B) ao coeficiente de letalidade pela Influenza A.
- (C) à razão de mortalidade proporcional pela Influenza A.
- (D) ao coeficiente de incidência da Influenza A.
- (E) ao coeficiente de mortalidade pela Influenza A.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. As estruturas conhecidas como hámulo pterigoide e crista galli estão presentes, respectivamente, nos ossos

- (A) temporal e etmoide.
- (B) esfenoide e temporal.
- (C) esfenoide e etmoide.
- (D) temporal e frontal.
- (E) etmoide e esfenoide.

22. O nervo facial, importante estrutura responsável pela mímica facial, emerge do crânio através do forame

- (A) espinhoso.
- (B) redondo.
- (C) oval.
- (D) estilomastoideo.
- (E) estilopetroso.

23. O único dos ramos do nervo trigêmeo que apresenta íntima relação com o ducto da glândula submandibular é o

- (A) maxilar.
- (B) bucal.
- (C) glossofaríngeo.
- (D) hipoglosso.
- (E) lingual.

24. As agressões às terminações nervosas são classificadas de acordo com a sua severidade. Assim, pode-se definir como correta a seguinte afirmação:

- (A) Em casos de ruptura física de um ou mais axônios, sem injúria do tecido estromal do nervo, pode-se classificar a lesão como axonotmese.
- (B) Embora a velocidade de regeneração dos nervos periféricos varie consideravelmente, pode-se considerar como sendo de 0,5 mm/mês.
- (C) Em casos de neuropraxia, caso não haja realinhamento cirúrgico dos cotos nervosos, as células de Schwann podem se alinhar dentro de um coágulo fibroso, dando origem aos neuromas.
- (D) Axonotmese representa a forma mais branda de lesão nervosa e pode ser caracterizada como uma interrupção passageira da condução nervosa sem perda de continuidade do axônio.
- (E) Quando ocorre neurotmeose, pode-se considerar a continuidade da bainha epineural e dos axônios.

25. O elemento celular preponderante no tecido conjuntivo gengival cuja principal função é a renovação das fibras colágenas é o
- (A) fibroblasto.
 - (B) mastócito.
 - (C) monócito.
 - (D) leucócito.
 - (E) queratócito.
26. As fibras gengivais, elementos responsáveis por prover a rigidez necessária e comprimir a gengiva de encontro ao dente, apresentam alguns tipos distintos com funções específicas. Diante disso, indique qual dos grupos relacionados localiza-se interproximalmente, formando feixes horizontais que se estendem entre o cemento de dentes adjacentes.
- (A) Circular.
 - (B) Transeptal.
 - (C) Dentogengival.
 - (D) Apical.
 - (E) Coronal.
27. A alternativa que melhor define o defeito de desenvolvimento conhecido como Grânulos de Fordyce é:
- (A) Glândulas sebáceas que ocorrem na mucosa oral, caracterizadas como múltiplas lesões papulares branco-amareladas, comumente localizadas na mucosa jugal e vermelhão do lábio superior.
 - (B) Lesão comum em indivíduos negros do sexo masculino, caracterizada por uma aparência branco-acinzentada, geralmente localizada em lábio superior.
 - (C) Granulação geralmente presente no dorso de língua, caracterizada pelo acúmulo de ceratina das papilas filiformes.
 - (D) Granulação de coloração branco-acinzentada, presente no lábio superior, caracterizada pelo acúmulo de ceratina ectópica.
 - (E) Lesão caracterizada por pápulas localizadas frequentemente em rebordo alveolar de recém-nascidos.
28. Tipo de herpes caracterizado por dor unilateral intensa, logo substituída por pequenas vesículas distribuídas linearmente e respeitando a linha média. As características descritas referem-se a
- (A) herpes simples.
 - (B) herpes zoster.
 - (C) herpangina.
 - (D) herpes simples recorrente.
 - (E) estomatite herpética.
29. A doença caracterizada pela tríade lábio duplo, blefarocalasia e aumento atóxico da tireoide é conhecida como síndrome de
- (A) Cross.
 - (B) Gorlin.
 - (C) Ehlers-Danlos.
 - (D) Cushing.
 - (E) Ascher.
30. Doença cujo vírus transmissor tem a capacidade de permanecer viável por mais tempo fora da cavidade bucal e mesmo assim transmitir infecção. A afirmação refere-se a
- (A) AIDS.
 - (B) Hepatite B.
 - (C) Caxumba.
 - (D) Herpes zoster.
 - (E) Herpes simples.
31. Sabendo-se que as perfurações radiculares iatrogênicas constituem um dos maiores problemas da odontologia, marque a alternativa que apresenta a perfuração com pior prognóstico de tratamento.
- (A) Terço cervical tratada tardiamente.
 - (B) Terço apical tratada precocemente.
 - (C) Terço médio tratada precocemente.
 - (D) Terço apical tratada tardiamente.
 - (E) Terço cervical tratada precocemente.
32. A odontologia atual tem feito enorme progresso na prevenção e tratamento precoce das infecções odontogênicas. Para tanto, é importante que os cirurgiões-dentistas tenham conhecimento das fases da infecção e suas características. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta correlação correta entre a característica e tipo de infecção.
- (A) Duração crônica, dor intensa e generalizada, limites difusos, com pus – celulite.
 - (B) Duração crônica, dor localizada, limites bem delimitados, com pus – celulite.
 - (C) Duração aguda, dor intensa e generalizada, limites difusos, sem pus – celulite.
 - (D) Duração aguda, dor localizada, limites difusos, com pus – abscesso.
 - (E) Duração aguda, dor localizada, limites difusos, sem pus – abscesso.
33. Durante o exame clínico de um paciente, observou-se que ele apresentava dor espontânea e contínua, de duração prolongada e sem localização precisa. Diante do quadro clínico descrito, pode-se chegar ao diagnóstico de
- (A) abscesso crônico.
 - (B) pulpíte irreversível.
 - (C) pulpíte reversível.
 - (D) hiperemia pulpar.
 - (E) granuloma.

34. Para a realização de tomada radiográfica do elemento 25 utilizando-se a técnica da bisetritz deveremos ter, respectivamente, ângulos verticais e horizontais de
- (A) 30° e 70°.
 - (B) 45° e 10°.
 - (C) 70° e 30°.
 - (D) 30° e 15°.
 - (E) -5° e 30°.
35. Na última década, cada vez mais tem se utilizado o óxido nítrico como uma ferramenta para controle de ansiedade em odontologia, utilizado juntamente com anestésicos locais. Desta forma, podemos considerar como correta a seguinte afirmação:
- (A) Apesar de bastante utilizado em odontologia, a maior desvantagem na utilização do óxido nítrico em consultórios reside na necessidade absoluta de acompanhante ao paciente após o procedimento.
 - (B) A utilização se dá normalmente com concentração de ataque de 50% de N₂O para 50% de O₂, até que o paciente encontre-se em estado de sedação, só então vai se diminuindo a concentração de N₂O até 20%.
 - (C) A relação de concentração de N₂O:O₂ varia até 70:30 na grande maioria dos aparelhos de anestesia comercializados.
 - (D) Uma relação de concentração segura para a utilização do óxido nítrico em odontologia é de 10% de O₂ e 90% de N₂O.
 - (E) Concentrações de O₂ acima de 30% normalmente provocam náuseas e disforia.
36. Devido ao tamanho das moléculas, presença de flúor e baixa irritabilidade, o ionômero de vidro continua sendo um excelente material para forramento de cavidades. Pela classificação dos cimentos ionoméricos, pode-se classificar esse tipo de ionômero como tipo
- (A) I.
 - (B) II.
 - (C) III.
 - (D) IV.
 - (E) V.
37. Em relação ao amálgama adesivo utilizado em odontologia, pode-se afirmar que
- (A) o amálgama deve ser condensado e só após isso, deve ser aplicado o adesivo.
 - (B) a aplicação do adesivo sem carga pode ser realizada antes ou após a condensação do amálgama.
 - (C) todos os adesivos utilizados na técnica são fotopolimerizáveis.
 - (D) a utilização do adesivo não interfere na resistência do remanescente dentário.
 - (E) essa técnica proporciona maior resistência à fratura quando comparada ao amálgama utilizado sem agentes adesivos.
38. Os vernizes fluoretados, largamente utilizados em odontologia, apresentam a característica de
- (A) liberarem flúor lenta e gradativamente no esmalte.
 - (B) apresentarem baixas concentrações de fluoretos.
 - (C) apresentarem baixa ou nenhuma eficácia no tratamento da sensibilidade de colo dental.
 - (D) não serem tolerantes à água, dificultando a adesão ao dente na presença de saliva.
 - (E) permitirem escovação imediata após a aplicação.
39. Sobre o tratamento restaurador atraumático é correto afirmar que
- (A) é frequentemente sintomático.
 - (B) visa à remoção da dentina atingida pela cárie, através da utilização de instrumentos manuais.
 - (C) não tem vínculo com educação ou motivação do paciente.
 - (D) é considerada uma técnica prévia à adequação do meio bucal.
 - (E) tem caráter provisório.
40. Criança de 6 anos, pesando aproximadamente 20 kg, necessita ser submetida à exodontia do elemento 54. Sabendo-se que o paciente é portador de prolapso de válvula mitral com regurgitação e apresenta história de alergia a penicilina, deve-se utilizar preferencialmente como antibiótico profilático:
- (A) Ampicilina, 1 g, uma hora antes do procedimento.
 - (B) Clindamicina 100 mg, duas horas antes do procedimento.
 - (C) Clindamicina, 400 mg, uma hora antes do procedimento.
 - (D) Cefazolina, 2 g, via oral, uma hora antes do procedimento.
 - (E) Cefazolina, 2 g, via oral, uma hora antes do procedimento.
41. O medicamento amplamente conhecido como agente de reversão para benzodiazepínicos é
- (A) Triazolam.
 - (B) Flumazenil.
 - (C) Fentanil.
 - (D) Alfentanil.
 - (E) Naloxona.
42. Sabendo-se que os antibióticos apresentam diferentes mecanismos de ação e que essa característica torna-se fundamental na escolha do medicamento mais adequado para certa infecção, responda. Dos antibióticos relacionados, o único que atua inibindo a síntese proteica é a
- (A) Penicilina.
 - (B) Anfotericina B.
 - (C) Cefalosporina.
 - (D) Nistatina.
 - (E) Tetraciclina.

43. Em casos de fracasso na técnica de verticalização ortodôntica de dentes, pode-se utilizar a técnica de verticalização cirúrgica, considerada uma técnica utilizada primordialmente para correção do posicionamento de segundos molares impactados devido à presença de terceiros molares. Essa técnica geralmente apresenta melhores resultados em molares quando
- (A) os elementos verticalizados são colocados em oclusão, imediatamente após a cirurgia.
 - (B) as raízes do dente a ser verticalizado estão completamente formadas.
 - (C) as raízes do dente a ser verticalizado apresentam-se 2/3 formadas.
 - (D) se utiliza esplintagem rígida durante os 4 primeiros meses de pós-operatório.
 - (E) se utiliza esplintagem rígida durante os primeiros 60 dias de pós-operatório.
44. Em relação à avaliação do grau de dificuldade cirúrgica quando da indicação de exodontias de terceiros molares impactados, pode-se considerar que
- (A) quanto mais jovem o paciente, menor a dificuldade do procedimento cirúrgico.
 - (B) as impatações horizontais dos molares inferiores são as de maior dificuldade técnica.
 - (C) as impatações verticais correspondem a 40% do total de dentes impactados inferiores e são as que apresentam menor dificuldade técnica.
 - (D) as impatações distoangulares são as que apresentam maior dificuldade técnica.
 - (E) as impatações mesioangulares representam 15% do total de dentes impactados inferiores e são as de menor dificuldade técnica.
45. Durante a tentativa de luxação para exodontia do elemento 18, profundamente impactado, ocorreu o deslocamento do referido dente para a fossa infratemporal. Dentre as condutas relacionadas, pode-se considerar como correta a presente na alternativa:
- (A) tentar deslocar o dente de volta para o alvéolo através de pressão digital em fundo de sulco vestibular, perto da lâmina pterigoide.
 - (B) encaminhar o paciente imediatamente para um centro cirúrgico para se proceder ao procedimento de urgência de remoção do dente sob anestesia geral.
 - (C) remover o dente através de um acesso de Caldwell-Luc para sua melhor visualização.
 - (D) aguardar de 1 a 2 semanas até que, pela ação da musculatura da região, o dente seja deslocado de volta ao alvéolo.
 - (E) estender o acesso para posterior e realizar dissecação da região até encontrar e remover o referido elemento aproveitando ainda o mesmo tempo cirúrgico.
46. Paciente de 9 anos de idade, vítima de trauma dental com fratura coronária do elemento 11 e pequena exposição pulpar, foi levado ao consultório odontológico imediatamente após o trauma. Sabendo-se que se trata de dente hígido e com ápice aberto, o tratamento mais correto para esse paciente seria
- (A) pulpectomia.
 - (B) pulpotomia.
 - (C) curetagem pulpar.
 - (D) capeamento pulpar indireto.
 - (E) capeamento pulpar direto.
47. Durante exame físico de paciente vítima de queda da própria altura, observa-se ferimento lácer-contuso em mento, dificuldade para abrir a boca e alteração oclusal caracterizada principalmente por mordida aberta anterior. Diante do quadro apresentado, a incidência radiográfica mais adequada a ser solicitada seria
- (A) Water's.
 - (B) Hirtz.
 - (C) PA de mandíbula.
 - (D) Towne.
 - (E) Perfil facial.
48. No exame de paciente politraumatizado em pronto-socorro, a sequência mais adequada para o exame é
- (A) desobstruir vias aéreas, checar frequência respiratória e pulso, avaliar nível de consciência e despir o paciente.
 - (B) checar pulso, frequência respiratória, avaliar obstrução de vias aéreas, despir o paciente e realizar avaliação de nível de consciência.
 - (C) despir o paciente, checar frequência respiratória, desobstruir vias aéreas, checar pulso e avaliar nível de consciência.
 - (D) procurar possíveis fraturas de crânio e coluna cervical, avaliar nível de consciência, conter possíveis sangramentos.
 - (E) conter sangramentos, desobstruir vias aéreas, avaliar níveis de consciência e checar frequência respiratória.
49. Em oclusão, durante o movimento de lateralização da mandíbula para direita, o movimento do côndilo do mesmo lado caracterizado pela movimentação lateral é o movimento de
- (A) Fischer.
 - (B) Bennett.
 - (C) Posselt.
 - (D) Spee.
 - (E) Wilson.

50. Em relação ao sistema de códigos desenvolvido pela OMS para avaliação epidemiológica e de necessidade de tratamento periodontal, pode-se afirmar que
- (A) o código 2 é utilizado para representar quadrantes que apresentam bolsas de mais de 6 mm.
 - (B) o código 1 é utilizado para representar sextantes que apresentam bolsas de menos de 3 mm.
 - (C) para a realização do exame, a dentição é dividida em quatro quadrantes e apenas os primeiros molares de cada quadrante são utilizados como referência para o estabelecimento de um código.
 - (D) para a realização do exame, a dentição é dividida em seis sextantes, sendo a medição mais severa do sextante escolhida para representá-lo.
 - (E) para a realização do exame, a dentição é dividida em quatro quadrantes, com três ou mais dentes.
51. As bolsas periodontais são sulcos gengivais patologicamente aprofundados que apresentam características clínicas peculiares, a depender de sua classificação.
- I. Padrão de destruição do osso horizontal.
 - II. O fundo da bolsa localiza-se apicalmente ao osso alveolar.
 - III. As fibras transeptais são dispostas horizontalmente no espaço entre o fundo da bolsa e o osso alveolar.
- As afirmações relacionadas à bolsa supra-óssea é(são)
- (A) apenas a afirmativa I.
 - (B) apenas a afirmativa II.
 - (C) apenas as afirmativas I e II.
 - (D) apenas as afirmativas I e III.
 - (E) apenas as afirmativas II e III.
52. Considere estes itens relativos à recessão gengival.
- I. Movimento ortodôntico na direção labial contribui para recessão gengival.
 - II. A recessão gengival pode causar, embora de forma secundária, hiperemia da polpa e sintomas associados.
 - III. A recessão gengival tende a ser mais frequente em pacientes com gengiva relativamente saudável, pouca placa bacteriana e boa higiene oral.
- Está(ão) correta(s)
- (A) apenas as afirmativas I e II.
 - (B) apenas as afirmativas II e III.
 - (C) apenas a afirmativa I.
 - (D) apenas a afirmativa II.
 - (E) todas as afirmativas.
53. Em relação aos microorganismos mais relevantemente responsáveis pela cárie dentária, responda corretamente.
- (A) Os *Streptococcus mutans* são os principais responsáveis pelo surgimento do processo carioso e não fazem parte da flora bucal de indivíduos saudáveis.
 - (B) Mesmo durante o desenvolvimento da cárie dentária existe equilíbrio quantitativo das bactérias patogênicas.
 - (C) Os *Lactobacillus* são os principais microorganismos responsáveis pelo surgimento das lesões de cárie.
 - (D) Os *Actinomyces* são os principais microorganismos responsáveis pelas lesões cariosas devido à sua capacidade ilimitada de produção de ácidos.
 - (E) Os *Streptococcus mutans* não colonizam todas as superfícies dentárias de forma uniforme, sendo mais frequentes em fissuras e superfícies proximais.
54. A fluoretação da água é considerada a forma mais barata e eficaz de administrar flúor a grupos de pessoas. A respeito desse método de fluoretação, considere estas afirmações:
- I. O nível de flúor em ppm deve sofrer variação de acordo com a temperatura média das cidades.
 - II. Quando a água fluoretada é utilizada para o preparo de alimentos, o valor de flúor torna-se insuficiente para a prevenção da cárie.
 - III. O flúor ingerido através da água de abastecimento é rapidamente absorvido pelo estômago e 40 a 60% é excretado pelos rins.
- Pode-se dizer que
- (A) apenas a afirmativa I está correta.
 - (B) as afirmativas I e II estão corretas.
 - (C) as afirmativas I e III estão corretas.
 - (D) as afirmativas II e III estão corretas.
 - (E) todas as afirmativas estão corretas.
55. A técnica de Knutson para aplicação de flúor tópico prevê a utilização de fluoreto de sódio a
- (A) 0,5% em 2 aplicações.
 - (B) 1% em 2 aplicações.
 - (C) 2% em 4 aplicações.
 - (D) 4% em 4 aplicações.
 - (E) 5% em 2 aplicações.
56. A remoção de micro-organismos patológicos, tornando um objeto seguro para ser manipulado por um profissional de saúde, chama-se
- (A) Esterilização.
 - (B) Descontaminação.
 - (C) Antissepsia.
 - (D) Assepsia.
 - (E) Desinfecção.

57. Indique qual dos materiais relacionados apresenta o menor tempo para conclusão do processo de esterilização.
- (A) Glutaraldeído a 1%.
 - (B) Água oxigenada.
 - (C) Álcool a 70%.
 - (D) Ácido paracético a 0,2%.
 - (E) Formaldeído a 40%.
58. A trombocitopatia, conhecida como doença de Von Willebrand, é considerada uma desordem hereditária caracterizada pela deficiência do fator de coagulação:
- (A) V.
 - (B) VII.
 - (C) VIII.
 - (D) X.
 - (E) XII.
59. Paciente de 25 anos de idade procurou atendimento odontológico, relatando determinado problema na formação do coágulo de fibrina pela via intrínseca da cadeia de coagulação. Diante disso, o exame que mais deve ser levado em consideração para se checar o diagnóstico é
- (A) Tempo de sangramento.
 - (B) Tempo de coagulação.
 - (C) Contagem de plaquetas.
 - (D) Tempo de protrombina.
 - (E) Tempo de tromboplastina parcial.
60. Em relação às manifestações bucais e tratamento da sífilis adquirida, assinale a alternativa correta.
- (A) A lesão primária da sífilis adquirida é conhecida como goma.
 - (B) Os cancros costumam apresentar-se na sífilis adquirida como lesões ulceradas e extremamente dolorosas.
 - (C) A sífilis adquirida é uma doença cuja confirmação diagnóstica através de exame de microscopia só pode ser feito a partir do aparecimento das lesões terciárias.
 - (D) Aproximadamente 50% dos pacientes que tiveram sífilis primária, manifestam sinais da doença terciária.
 - (E) As reações sorológicas para a sífilis são sempre positivas enquanto o cancro está presente.