



CONCURSO PÚBLICO 2009/PREFEITURA DE IGREJA NOVA

CARGO:MÉDICO PSF

- Para fazer a prova você usará este caderno e um cartão-resposta.
- Verifique, no caderno de provas, o número de folhas e se seqüência de questões, no total de 30 (**trinta**) está correta, e também se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique, imediatamente, ao fiscal qualquer irregularidade.
- O cartão resposta é o documento único e final para correção eletrônica. Não amasse, não dobre, não rasure o seu cartão resposta.
- A adequada marcação deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta **azul ou preta**, é de inteira responsabilidade do candidato, sendo este o documento válido para a correção das questões da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 (**cinco**) alternativas diferentes de respostas (**A, B, C, D e E**). Apenas **uma** delas constitui a resposta **correta** em relação ao enunciado da questão.
- Suponha que a questão nº 01 tenha a resposta C como correta.
- Veja como marcar esta resposta.

QUESTÃO	ALTERNATIVAS				
01	A	B	C	D	E

- Deve-se estar atento para:
- Não rasurar o cartão resposta, pois não será fornecido outro cartão
- Não escrever no verso do cartão resposta
- Preencher completamente o espaço reservado a marcação da resposta correta
- Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco no verso de suas folhas de prova:
- Considerar-se-á excluído do processo seletivo do concurso o candidato que:
- Tornar-se culpado de incorreções ou descortesia com qualquer membro da equipe encarregada da realização da prova;
- For surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito, ou por qualquer outra forma;
- For apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na tentativa de burlar a prova, ou for responsável por falsa identificação pessoal;
- Ausentar-se da sala de prova, antes da entrega do cartão de resposta e de assinar a ata de presença;
- Recusar-se a proceder a identificação de seu cartão resposta, devidamente assinado no espaço próprio e identificado pelo digiselo.
- Aos fiscais não existe a autorização para emissão de esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Sendo esta atribuição de única e exclusiva responsabilidade do candidato.
- Para maiores esclarecimentos e acompanhamento das etapas do processo seletivo, consulte o nosso site pelo endereço eletrônico: www.ipedec.com.br

BOA PROVA

MÉDICO PSF

1. Paciente do sexo feminino, 40 anos, apresentou um episódio de tontura seguido de pré-síncope após caminhada de 30 minutos no plano. Avaliada no ambulatório, constatou-se apenas ritmo cardíaco irregular e pulso 170 bpm. O ECG revelou ausência de ondas P e intervalo PR irregular. Qual dos exames é mais importante na avaliação da causa da arritmia?

- a) Cintilografia miocárdica.
- b) Monitoração eletrocardiográfica ambulatorial
- c) Ecocardiograma com Doppler.
- d) Teste ergométrico
- e) Dosagem hormonal de TSH

2. Paciente do sexo masculino, de 75 anos de idade, queixa-se de dor lombar aguda há quase 3 semanas. Refere ainda insônia e perda de 5 kg nos últimos 7 meses. Nega melhora da dor após uso de anti-inflamatórios não hormonais, derivados morfínicos e repouso no leito. A hipótese diagnóstica mais provável para o caso é de:

- a) Fibromialgia
- b) Lombalgia mecânica
- c) Fratura vertebral por osteoporose senil
- d) Comprometimento metastático da coluna lombar
- e) Estenose do canal medular

3. Mulher, 72 anos, há cinco dias com dor intensa nas regiões escapular direita, com períodos de acalmia, piorando no período noturno. Exame físico: taquicardia, palidez cutânea, placas eritematosas encimadas por vesículas isoladas e agrupadas, algumas com discreta umbilicação, que se distribuem desde a região escapular até a região esternal direita. O diagnóstico provável é:

- a) Impetigo estafilocócico
- b) Dermatite venenata
- c) Notalgia parestésica
- d) Herpes zoster
- e) Neurite intercostal associada à celulite bolhosa

4. Homem, 43 anos, branco, sabe ser hipertenso há 3 anos. Faz uso irregular de medicação e está há 3 semanas sem anti-hipertensivo. Queixa-se de cefaléia constante que não melhora com analgésicos. Exame físico: PA= 210X140. mmHg, FC= 64 bpm, B2 hiperfonética em foco aórtico, edema de papila bilateral, com focos hemorrágicos retinianos. A conduta deve ser:

- a) Orientar o paciente para fazer uso regular da medicação anti-hipertensiva e retornar para acompanhamento ambulatorial
- b) Internar o paciente para controle pressórico com medicações anti-hipertensivas intravenosas e por via oral, concomitantemente
- c) Prescrever medicação anti-hipertensiva sublingual e encaminhar para acompanhamento em Unidade Básica de Saúde
- d) Manter o paciente em observação, retornando a prescrição das medicações antihipertensivas
- e) Prescrever medicação anti-hipertensiva sublingual e solicitar avaliação do oftalmologista

5. Homem, 42 anos, diabético há 12 anos, com retinopatia e neuropatia. Apresenta PA= 160X100 mmHg, proteinúria de 24h= 2,6 g/l e creatinina plasmática=2,mg/dl. A principal hipótese diagnóstica é de:

- a) Doença isquêmica renal
- b) Nefropatia diabética incipiente
- c) Pielonefrite crônica, provavelmente por infecções urinárias de repetição
- d) Insuficiência renal crônica secundária a nefropatia diabética
- e) Nefropatia hipertensiva

6. Qual a doença infecciosa mais associada a abscesso esplênico?

- a) Apendicite
- b) Diverticulite
- c) Endocardite
- d) Colecistite
- e) Pielonefrite

7. Uma adolescente, passando o feriado fora de casa, leva uma mordida de um cachorro na face. O cão é da casa onde está hospedada e tem atestado de vacina antirrábica atualizado. A conduta para prevenção da raiva deve ser:

- a) Limpeza no local da mordida
- b) Iniciar vacinação anti-rábica o mais rápido possível
- c) Procurar o Posto de saúde assim que retornar ao Rio
- d) Acompanhar a saúde do cão por 20 dias
- e) Nenhum cuidado especial, pois o cão é conhecido e vacinado

8. O fator etiológico mais freqüente no desenvolvimento da apendicite aguda é:

- a) Troca de flora colônica
- b) Obstrução da luz do apêndice
- c) Hiperplasia linfóide
- d) Infestação intestinal por áscaris
- e) Dilatação do ceco

9. Qual das patologias abaixo que costuma cursar no paciente com AIDS e que não está estritamente relacionada ao grau de imunodeficiência?

- a) Sarcoma de Kaposi
- b) Infecção por mycobacteria
- c) Toxoplasmose
- d) Linfoma
- e) Infecção fúngica

10. Na insuficiência hepática com encefalopatia, está contra-indicado o uso de :

- a) Hiperventilação.
- b) Aminoglicosídeos.
- c) Benzodiazepínicos.
- d) Oxigênios.
- e) Manitol.

11. Assinale dentre os psicofármacos abaixo, qual o que Não pertence ao grupo dos antidepressivos tricíclicos.

- a) Amitriptilina.
- b) Nortriptilina.
- c) Doxepina.
- d) Trimipramina.
- e) Fluoxetina.

12. Qual a causa mais comum da Síndrome de Cushing ?

- a) Hiperplasia supra-renal bilateral.
- b) Disfunção hipotálamo-hipofisária.
- c) Tuberculose supra-renal.
- d) Uso abusivo de esteróide anabolizante.
- e) Carcinoma de supra-renais

13. Qual é o local mais comum de obstrução intestinal causada por cálculos biliares?

- a) Duodeno.
- b) Jejun proximal.
- c) Íleo.
- d) Ceco.
- e) Cólon ascendente

14. Jovem de 22 anos, sexualmente ativa com múltiplos parceiros, tem apresentado nas últimas 24 horas dor em fossa ilíaca direita, acompanhada de náuseas e ritmo intestinal normal. O exame físico revela dor à palpação superficial e profunda em fossa ilíaca direita com descompressão dolorosa. O exame laboratorial denota discreta leucocitose (12000 leucócitos por mm cúbico, 05 bastões, 01 eosinófilo, hematócrito de 34%). Após cinco horas de observação, paciente torna-se taquicárdica, sudoreica com pulsos finos e hipotensa. O Cirurgião de Plantão decide então por:

- a) realizar uma laparotomia exploradora.
- b) repetir o hematócrito.
- c) submeter a paciente a uma tomografia.
- d) manter a observação.
- e) realizar um exame ginecológico

15. A melhor forma para evitar infecções em pacientes com anemia falciforme é:

- a) vacina antipneumocócica e antihemófilos.
- b) penicilina profilática e vacina antihemófilos.
- c) vacina antipneumocócica e penicilina profilática.
- d) imunoglobulina e vacina antipneumocócica.
- e) imunoglobulina e penicilina profilática.

16. A condição abaixo em que o uso de corticóide constitui-se num risco que geralmente supera a sua indicação é:

- a) o choque séptico.
- b) a meningite tuberculosa.
- c) a encefalite herpética
- d) o estado de mal asmático.
- e) o traumatismo cranioencefálico

17. Homem, 45 anos, referindo inapetência, cansaço aos médios esforços e emagrecimento de 5 kg no último mês. Ao exame, mostrava-se com palidez cutânea, hálito urêmico, flapping; relata bom volume urinário. Os exames laboratoriais mostravam 2600 hemácias, hemoglobina de 6,0, hematócrito de 21%, uréia de 234 mg%, creatinina de 11 mg%, cálcio de 7,6 mg%, fósforo de 6,4 mg%; na ultra-sonografia o rim direito media 8,2 x 3,5 e, o rim esquerdo, 8,1 x 3,8 com ecogenicidade aumentada. Foi internado para realização de hemodiálise para compensação do quadro. Este caso sugere:

- a) Insuficiência renal aguda
- b) Insuficiência renal crônica
- c) Nefrite tubulointersticial aguda
- d) Glomerulonefrite aguda
- e) Glomerulonefrite crônica

18. Mulher, 24 anos, deu entrada na emergência em estado confusional, com vômitos, taquipnéica, desidratada, febril, com estertores crepitantes em base de pulmão direito. Exames mostraram: glicose 588 mg%, sódio 128 mEq/l, potássio 5,8 mEq/l, creatinina 1,9 mg%, osmolaridade plasmática 318 mOsm/l, pH 7.20, pCO 27 mmHg, HCO 9 mEq/l. Com base nesses dados, o diagnóstico mais provável é:

- a) Coma hiperosmolar
- b) Cetoacidose diabética
- c) Neuropatia autonômica
- d) Acidose respiratória
- e) Sepses

19. Quais os segmentos pulmonares mais freqüentemente acometidos na tuberculose pulmonar?

- a) Posterior e lateral basal e apical do lobo inferior.
- b) Lingular , do lobo médio e apical do lobo superior.
- c) Apical e anterior do lobo superior e lateral basal do lobo inferior.
- d) Apical do lobo superior, apical do lobo inferior e posterior do lobo superior.
- e) Basal posterior e lingular.

20. Sobre os glicocorticóides inalatórios podemos afirmar:

- a) são contra-indicados durante a gravidez;
- b) não são absorvidos pela circulação sistêmica;
- c) são úteis imediatamente após o exercício para prevenir bronco-constricção induzida por exercício;
- d) são melhor utilizados quatro vezes ao dia;
- e) estão associados a risco aumentado de glaucoma quando usados em doses altas.

21. De acordo com a utilização dos recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) em finalidades diversas das previstas na Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta:

- a) Poderá ser transferida desde que seja fiscalizado pelo Conselho de Saúde
- b) Constitui crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas
- c) Poderá ser transferida desde que seja comunicado ao Ministério da Saúde
- d) Constitui emprego regular de verbas ou rendas públicas
- e) Poderá ser transferida desde que seja comunicado ao Ministério da Saúde e fiscalizado pelo Conselho de Saúde

22. São instâncias colegiadas do SUS:

- a) O Ministério da Saúde e a Conferência de Saúde
- b) A Fundação Nacional de Saúde e o Ministério da Saúde
- c) O Ministério da Saúde e o Conselho de Saúde
- d) O Conselho de Saúde e Fundação Nacional de Saúde
- e) A Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde

23. Conforme a Lei nº 8.080/1990, podemos afirmar que a assistência à saúde é:

- a) Livre a entidade filantrópicas
- b) Livre à iniciativa privada
- c) Proibida à iniciativa privada
- d) Livre à iniciativa pública e privada
- e) Livre à iniciativa privada

24. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

- a) Descentralização, atendimento integral, participação da comunidade
- b) Centralização, atendimento integral, participação da comunidade
- c) Centralização, atendimento integral, participação dos setores públicos
- d) Descentralização, atendimento setorial, participação dos serviços privados
- e) Centralização, atendimento integral, participação dos serviços de saúde

25. À direção nacional do Sistema Único de Saúde cabe, exclusivamente:

- a) A execução e a implementação das políticas relativas às condições dos ambientes de trabalho
- b) A formulação e a implementação da política de controle das agressões ao meio ambiente
- c) A formulação e a implementação das políticas de saneamento básico
- d) A formulação e a coordenação da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras
- e) A formulação, avaliação e apoio das políticas de alimentação e nutrição

Leia o texto abaixo e responda às questões:

Estudo dos EUA constata que tratamento de autismo em bebês é eficaz

O tratamento de autismo se mostra mais eficaz quanto mais cedo for iniciado. Um estudo realizado nos Estados Unidos constatou resultados animadores em crianças diagnosticadas com a doença e que começaram a ser tratadas de forma mais rigorosa a partir do 1º ano de vida.

Um grupo de pesquisadores da Universidade de Washington concluiu que o tratamento pode amenizar muito os sintomas da doença. Foram avaliadas 48 crianças autistas, entre 1 ano de meio e 2 anos e meio.

Um grupo foi selecionado aleatoriamente para receber um tratamento especializado, conhecido como *Early Start Denver*, focado na interação e na comunicação - as maiores dificuldades das crianças autistas. A outra parte era atendida de forma menos abrangente e intensa.

Em uma das etapas ao que o primeiro grupo foi submetido, os pais e terapeutas seguram repetidamente brinquedos muito próximos ao rosto da criança, para que ela seja obrigada a manter contato visual. Em outro exercício, a criança é recompensada por usar palavras para pedir brinquedos. Foram quatro horas de atenção dos terapeutas durante cinco dias na semana, e o tratamento era repetido em casa, com os pais, por pelo menos mais cinco horas semanais.

<http://veja.abril.com.br/noticia/saude/estudo-eua-constata-tratamento-autismo-bebes-eficaz-515822.shtml>

26. Segundo o texto:

I – O tratamento ameniza os sintomas da doença.

II – 48 crianças de 2 anos e meio foram avaliadas na pesquisa.

III – O grupo de crianças que receberam o tratamento *Early Start Denver* foi selecionado aleatoriamente.

Está (ao) incorreta (s):

- a) Apenas I
- b) I, II e III
- c) Apenas II e III
- d) Apenas I e III
- e) Apenas I e II

