



MUNICÍPIO DE CONTENDA - PARANÁ

CONCURSO PÚBLICO – 2009

PROVA OBJETIVA



AUXILIAR DE ENFERMAGEM – PSF

1) De acordo com o Manual de Processamento de Artigos e Superfícies do Ministério da Saúde, as pinças utilizadas em curativos constituem-se em material classificado como artigo crítico, o que requer que sejam submetidas ao seguinte processo de esterilização:

- (A) formaldeído
- (B) autoclave
- (C) óxido de etileno
- (D) água em ebulição

2) É considerada área prioritária de intervenção na Atenção Básica, definidas na Norma Operacional Básica da Assistência à Saúde (NOAS) 2001:

- (A) eliminação da hanseníase
- (B) redução das DSTs/AIDS
- (C) controle das endemias
- (D) controle da violência

3) O ciclo menstrual tem duração média de 28 dias e seu início corresponde ao:

- (A) 14º dia após a menstruação
- (B) 7º dia após a menstruação
- (C) 1º dia da menstruação
- (D) Último dia da menstruação

4) A dupla proteção é o estímulo à prevenção das Doenças Sexualmente Transmissíveis – DSTs e à gravidez indesejada. É um exemplo de dupla proteção o uso de:

- (A) dois preservativos masculinos juntos
- (B) preservativo masculino e preservativo feminino juntos
- (C) tabela e DIU
- (D) diafragma e preservativo masculino

5) A Febre Maculosa é uma doença que tem se mostrado freqüente em alguns municípios brasileiros, apresentando letalidade alta quando diagnosticada tardiamente, e é transmitida ao ser humano por:

- (A) bovinos e equinos
- (B) mosquitos
- (C) carrapatos
- (D) cães e gatos

6) Pode-se verificar o pulso nas seguintes artérias:

- (A) cervical, abdominal, peitoral
- (B) frontal, diagonal, peitoral
- (C) abdominal, temporal, dorsal
- (D) radial, femoral, carótida

7) Dentre as funções da Vigilância Epidemiológica estão as ações abaixo listadas, EXCETO:

- (A) processamento de dados coletados
- (B) divulgação de informações pertinentes
- (C) análise e interpretação dos dados coletados
- (D) normatização de funcionamento e qualidade de bens e serviços de saúde

8) Qual é, respectivamente, a dose e a via de administração da vacina contra sarampo?

- (A) 0,5 mL, SC
- (B) 1,0 mL, ID
- (C) 0,5 mL, ID

(D) 1,0 mL, IM

9) O Ministério da Saúde, através do Programa Nacional de Imunização, faz as seguintes considerações sobre o esquema da vacina contra tétano, EXCETO:

- (A) ao indicar a vacina tipo dupla adulta (dT), devem-se considerar as doses anteriores da Tríplice ou dupla infantil (DPT ou DT).
- (B) o volume da vacina contra o Tétano é freqüentemente de 0,5mL, e a aplicação é através da via intramuscular profunda. Pode ser de 1,0mL, de acordo com a orientação do fabricante.
- (C) os trabalhadores devem ser vacinados com três doses da vacina contra Tétano, independente das doses anteriores.
- (D) a vacina dupla DT é indicada para crianças até 6 anos e 11 meses de idade.

10) Em se tratando de assistência à criança, podem-se considerar como causas clínicas da desidratação, EXCETO:

- (A) clima quente
- (B) diarreia
- (C) queimaduras
- (D) diabetes mellitus

11) Qual a medida mais comum para avaliação nutricional, sendo de fácil obtenção, de baixo custo e de boa sensibilidade?

- (A) Altura
- (B) Peso
- (C) Pregas cutâneas
- (D) Circunferências corporais

12) Qual a posição em que normalmente o paciente deve ser aspirado?

- (A) Dorsal
- (B) Lateral esquerdo
- (C) Lateral direito
- (D) de Fowler

13) O banho no leito é uma técnica que possui a finalidade de:

- (A) lavar da região mais suja para a mais limpa
- (B) lavar o paciente por imersão
- (C) diminuir o número de microrganismos da pele e das mucosas
- (D) expor um segmento do corpo de cada vez

14) Sobre as ações do Auxiliar de Enfermagem em caso de DPOC, correlacione as colunas:

- 1) Orientação quanto aos fatores de risco. () Orientar quanto à necessidade de exercícios respiratórios.
- 2) Apoio ao tratamento. () Orientar sobre a necessidade de abolir ou reduzir o hábito de fumar.
- 3) Prevenção de complicações. () Estimular a ingestão de líquidos, em média 2,5L por dia.

A seqüência correta, de cima para baixo, é:

- (A) 1, 2, 3
- (B) 2, 3, 1
- (C) 3, 2, 1
- (D) 3, 1, 2

15) Para exame de urocultura em um paciente deambulante, o procedimento correto de coleta de urina é:

- (A) sem higiene íntima
- (B) realizar higiene íntima e depois coletar a urina com sonda de Folley
- (C) realizar higiene íntima, desprezar o 1º jato e coletar o restante da urina
- (D) instalar sonda vesical e coletar a urina

- 16) A causa mais comum de hipotireoidismo em adultos é a tireoidite de Hashimoto, na qual:
- (A) o sistema imune ataca a tireóide
 - (B) a tetania é o principal sintoma
 - (C) o bócio exoftálmico é o principal sintoma
 - (D) a falta de ingestão de iodo é a principal etiologia
- 17) Uma mulher de trinta e cinco anos apresentando cistocele acentuada solicita orientações sobre métodos anticoncepcionais. Diante deste quadro clínico, contra indica-se:
- (A) minipílula
 - (B) diafragma
 - (C) pílula combinada
 - (D) preservativo masculino
- 18) No programa de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil faz-se a medida dos seguintes dados antropométricos:
- (A) peso e pressão arterial
 - (B) altura e pulso apical
 - (C) peso e respiração
 - (D) estatura e peso
- 19) Quanto ao Programa de Saúde da Família-PSF, pode-se dizer que:
- (A) se baseia na interiorização do profissional médico
 - (B) faz uso exclusivo de recursos da secretaria municipal de saúde
 - (C) integra os governos estadual e municipal quanto às questões de saúde curativa da população
 - (D) utiliza os princípios da territorialização e vigilância à saúde da população
- 20) No tratamento de feridas em domicílio o auxiliar de enfermagem deve:
- (A) solicitar ao médico o acompanhamento do cirurgião vascular
 - (B) usar solução fisiológica ou água limpa na limpeza das feridas por se tratar de substâncias neutras quanto à biotoxidade
 - (C) revitalizar o estado nutricional do paciente
 - (D) orientar os familiares quanto à necessidade do uso de antibióticos
- 21) Os idosos são grandes consumidores de analgésicos pertencentes à classe dos antiinflamatórios não esteróides. Essas substâncias são prejudiciais ao sistema:
- (A) urinário
 - (B) respiratório
 - (C) endócrino
 - (D) cardiovascular
- 22) Em relação às quedas e à instabilidade postural em pessoas idosas, é correto afirmar que:
- (A) representam a principal causa de incapacidade entre os idosos
 - (B) as quedas ocorrem com maior frequência em idosos do sexo masculino
 - (C) a maior parte das quedas de pessoas idosas ocorre nas ruas e em locais públicos
 - (D) idosos ativos possuem maior propensão a sofrer quedas do que os inativos
- 23) A via correta de administração da insulina é indispensável para um tratamento sem risco. A via de administração da insulina é:
- (A) oral
 - (B) endovenosa
 - (C) intramuscular
 - (D) subcutânea
- 24) As Normas Universais de Proteção ao Trabalhador da Saúde indicam que, após o uso de agulhas e seringas, seja adotado o seguinte procedimento:
- (A) esterilizar em Autoclave
 - (B) desprezar em recipiente de parede dura e com tampa
 - (C) reencapar a agulha com o protetor plástico
 - (D) colocar em solução de hipoclorito de sódio a 1%

- 25) Para que haja um controle efetivo da AIDS é necessário conhecer sua cadeia de transmissão.
Os modos de transmissão do vírus HIV são:
- (A) suor, picada de inseto, relação sexual
 - (B) via sexual, transfusão de sangue, uso compartilhado de agulhas e seringas
 - (C) saliva, pratos e talheres, relação sexual
 - (D) vasos sanitários, relação sexual, agulhas e seringas contaminadas
- 26) A aplicação de produtos químicos específicos em depósitos de água, como garrafas, latas, pneus e vasos de plantas, é uma medida de prevenção e controle da dengue. Esta medida visa eliminar o vetor em sua forma de:
- (A) ovos
 - (B) proglotes
 - (C) larvas
 - (D) mosquitos
- 27) As duas leis que organizam o Sistema Único de Saúde – SUS são:
- (A) 8.080 e 8.142
 - (B) 8.090 e 8.042
 - (C) 8.070 e 8.142
 - (D) 8.088 e 8.042
- 28) O auxiliar de enfermagem, antes de administrar digitálicos a um trabalhador de 40 anos, deve aferir o seguinte sinal:
- (A) PVC
 - (B) frequência de pulso
 - (C) tensão arterial
 - (D) temperatura axilar
- 29) A técnica do auto-exame de mamas deverá ser ensinada a toda mulher pelos profissionais de saúde em suas ações educativas, com a orientação de que seja realizada na seguinte periodicidade:
- (A) anualmente
 - (B) trimestralmente
 - (C) mensalmente
 - (D) semestralmente
- 30) Assinale o órgão responsável pela fiscalização do exercício profissional do Auxiliar de Enfermagem:
- (A) Ministério do Trabalho
 - (B) Secretaria Estadual de Saúde
 - (C) Associação Brasileira de Enfermagem
 - (D) Conselho Regional de Enfermagem