



**01** – A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, regulando para todo o território nacional as ações e os serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas de direito público ou privado. Considerando o Sistema Único de Saúde (SUS), incluído no citado dispositivo legal, assinale o que for correto.

- 01) Mesmo em caráter complementar a iniciativa privada não poderá participar do SUS.
- 02) O SUS é constituído de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público.
- 04) A direção do SUS é única, sendo exercida na União, pelo Ministério da Saúde, nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios, pelas respectivas Secretarias da Saúde ou órgãos equivalentes.
- 08) A fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano constam do campo de atuação do SUS.
- 16) O SUS, no nível municipal, poderá ser organizado em distritos, com o propósito da integração de recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.

**02** – Quanto às competências da direção municipal do SUS, assinale o que for correto.

- 01) Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde.
- 02) Participar do planejamento, da programação e da organização da rede regionalizada e hierarquizada do SUS, em articulação com sua direção estadual.
- 04) Fica vedada a participação do SUS no controle e na fiscalização dos procedimentos dos serviços privados de saúde.
- 08) Colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana e atuar junto aos órgãos municipais e estaduais para controlá-las.
- 16) Participar da execução, do controle e da avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho.

**03** – As ações de saúde pública no Brasil devem estar voltadas, ao mesmo tempo, para o indivíduo e para a comunidade, para a prevenção e para o tratamento, sempre respeitando a dignidade humana. Nesse contexto e no que se refere aos princípios, definidos em lei, que embasam essas ações, assinale o que for correto.

- 01) Universalidade de acesso.
- 02) Não hierarquização da rede de serviços.
- 04) Integralidade de assistência.
- 08) Ênfase na centralização dos serviços.
- 16) Descentralização político-administrativa.


**04** – A Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, alterou dispositivos da Constituição Federal relacionados em destaque para o setor de saúde, para assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações e dos serviços públicos de saúde. Nesse contexto, assinale o que for correto.

- 01) A Emenda Constitucional nº 29/2000 alterou dispositivos constitucionais para assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações públicas da saúde.
- 02) A Emenda Constitucional nº 29/2000 alterou dispositivos constitucionais para assegurar os recursos mínimos para o financiamento dos serviços públicos da saúde.
- 04) Pela Emenda Constitucional nº 29/2000 o Estado poderá intervir no Município que não aplicar o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e no desenvolvimento do ensino e/ou nas ações e nos serviços de saúde.
- 08) Pela Emenda Constitucional nº 29/2000 as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, deverão ser estabelecidas por Lei Complementar, mediante avaliação a ser feita anualmente.
- 16) Pela Emenda Constitucional nº 29/2000 a União poderá intervir no Estado, ou no Distrito Federal, quando não ocorrer a aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e no desenvolvimento do ensino e/ou nas ações e no serviços de saúde.



**05** – A Norma Operacional Básica nº 01/91 do Sistema Único de Saúde (NOB-SUS 01/91) teve por objetivo fornecer as primeiras instruções aos responsáveis pela implantação e operacionalização do Sistema Único de Saúde, estabelecendo os aspectos de natureza operacional e os intrinsecamente necessários ao gerenciamento dos serviços e das ações de saúde, como também do controle, do acompanhamento e da fiscalização da aplicação de recursos.

- 01) A NOB-SUS 01/91 estabeleceu a constituição dos Conselhos de Saúde, para funcionamento em caráter permanente e deliberativo, com representação paritária e compostos por representantes dos governos, dos prestadores de serviços e dos profissionais de saúde (50%) e usuários (50%), para atuação na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.
- 02) A NOB-SUS 01/91 estabeleceu a linha básica dos Fundos de Saúde, de natureza contábil e financeira, vinculados aos objetivos do SUS e detentores de prévia autorização pelo legislativo para aplicação de suas receitas através de dotação consignada na Lei de Orçamento ou em crédito adicional.
- 04) Os Fundos de Saúde referidos na NOB-SUS 01/91 constaram como de gerência pelo órgão de saúde da esfera correspondente e fiscalizados pelo Conselho de Saúde respectivo.
- 08) O Relatório de Gestão ficou estabelecido na NOB-SUS 01/91 como requisito básico para a transferência automática de recursos aos Municípios, devendo ser elaborado com a abordagem dos seguintes aspectos: finalidades especiais, plano de trabalho elaborado, plano de trabalho executado e resultados alcançados.
- 16) A NOB-SUS 01/91 estabeleceu que a avaliação técnica e financeira do SUS em todo o Território Nacional seria efetuada e coordenada pelo Ministério da Saúde e INAMPS, em cooperação técnica com os Estados, Distrito Federal e Municípios.



**06** – A respeito do estado de mal epiléptico, assinale o que for correto.

- 01) As crises prolongadas potencialmente podem causar dano cerebral.
- 02) O tratamento precoce se justifica devido às crises não controladas predispor o cérebro a crises de mais difícil controle.
- 04) As condutas para estado de mal epiléptico devem ser adotadas após 5 minutos contínuos de crise ou a ocorrência de duas ou mais crises sem que seja recuperada a consciência entre os ataques.
- 08) Algumas das causas frequentes de estado de mal epiléptico são suspensão da medicação anti-convulsivante, uso de álcool ou drogas e TCE.
- 16) As medicações mais frequentemente usadas são: diazepam, fenitoína e fenobarbital.

**07** – Um paciente com 65 anos em PCR na monitorização das pás do cardioversor demonstra assistolia. Nesse caso, assinale o que for correto.

- 01) O primeiro passo é realizar a desfibrilação elétrica a 360 Joules.
- 02) A PCR em assistolia é de pior prognóstico e caracteriza a ausência de atividade elétrica no coração.
- 04) Deve-se iniciar infusão de volume e procurar tratamento adequado baseado nas causas mais frequentes de assistolia.
- 08) O uso de marcapasso transcutâneo está indicado.
- 16) Deve-se aplicar o suporte avançado de vida (RCP, monitorização, intubação endotraqueal e acesso venoso).

**08** – Em relação à corticoterapia utilizada na crise aguda de asma, assinale o que for correto.

- 01) É indicada como rotina no estado de mal asmático.
- 02) Diminui a frequência de internações e de evoluções graves.
- 04) Pode ser feita em dose única.
- 08) Pode ser feita por via oral.
- 16) Só deve ser iniciada após a falha da inaloterapia e duas doses EV de aminofilina.

**09** – Paciente feminina de 24 anos, com história de dores abdominais em abdome superior, ocasionais há 6 meses, fazendo uso de inibidor de bomba de prótons com melhora relativa. Há 3 dias passou a apresentar dor em abdome superior em faixa tipo aperto e com irradiação para dorso, com náuseas e vômitos e calafrios e icterícia. Tem exames de hemograma com 21.400 leucócitos e 8 bastonetes, TGO = 418, TGP = 385 e amilase = 1410. Dentro do quadro apresentado, assinale o que for correto.

- 01) A principal hipótese diagnóstica é de hepatite viral.
- 02) O tratamento pode ser domiciliar com repouso, dieta e hidratação.
- 04) A ecografia de abdome irá auxiliar no diagnóstico etiológico.
- 08) Altas doses de morfina devem ser utilizadas para controle da dor.
- 16) Pode-se pensar em pancreatite biliar como diagnóstico.

**10** – Homem de 58 anos, tabagista (1 maço/dia dos 12 aos 50 anos), com história de tosse, expectoração mucoide diária e dispnéia aos grandes esforços, procurou atendimento médico por aumento da tosse e expectoração purulenta com piora da dispneia (aos mínimos esforços) há 2 dias. O paciente prefere fazer uso de broncodilatador inalatório de curta ação quando necessário. Nesse caso, assinale o que for correto no que se refere às medidas recomendadas.

- 01) Intensificar o uso de broncodilatador inalatório.
- 02) Prescrever prednisona por via oral por um determinado período.
- 04) Acrescentar brometo de ipratrópio inalatório.
- 08) Solicitar exame de Gram e cultura de escarro.
- 16) Prescrever antibiótico como amoxicilina, doxiciclina, ou sulfametoxazol associado à trimetoprima.

**11** – Indique as situações em que a pericardiocentese deve ser realizada em todos os pacientes.

- 01) Tamponamento cardíaco.
- 02) Suspeita de dissecção de aorta.
- 04) Derrame pericárdico maior que 20 mm (diástole).
- 08) Suspeita de pericardite purulenta ou tuberculosa.
- 16) Derrame pericárdico que diminui com uso de anti-inflamatórios.

**12** – No que se refere aos medicamentos que, sempre que possível, devem fazer parte do receituário de paciente com insuficiência cardíaca, visando maior impacto na sobrevida, assinale o que for correto.

- 01) Espironolactona.
- 02) Vasodilatador.
- 04) Digital.
- 08) B-bloqueador.
- 16) Inibidores da ECA.

**13** – No que se refere às contra-indicações de uso de B-bloqueadores no IAM, assinale o que for correto.

- 01) Broncoespasmo prévio.
- 02) Diabetes mellitus.
- 04) BAV de 2º e 3º graus.
- 08) ICC descompensada.
- 16) PA sistólica <90 mmHg e FC <60 bpm.

**14** – No que se refere às manifestações da hipoglicemia, assinale o que for correto.

- 01) Sudorese e tremores.
- 02) Apresentação assintomática.
- 04) Choque hipovolêmico.
- 08) Sinais neurológicos focais, simulando AVC.
- 16) Delírium e coma.

**15** – Sobre a síndrome coronariana aguda e a terapia trombolítica, assinale o que for correto.

- 01) Em paciente com neoplasia intracraniana é indiferente o uso de terapia trombolítica.
- 02) Mesmo o paciente apresentando história de dissecação de aorta, a trombólise deverá ser iniciada.
- 04) É contraindicação absoluta para o uso de trombolítico o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica estágio III.
- 08) Em gestantes, poderá ser utilizada a terapia trombolítica.
- 16) Caso o eletrocardiograma apresente supradesnível do segmento ST, deve-se providenciar trombólise o mais rápido possível.

**16** – No que se refere às condições de elevação de CK-MB, na ausência de infarto agudo do miocárdio, assinale o que for correto.

- 01) Embolia pulmonar.
- 02) Miocardite.
- 04) Insuficiência renal crônica.
- 08) Cirurgia de próstata ou útero.
- 16) Trauma de intestino delgado ou diafragma.

**17** – Vítima de ferimento por arma de fogo em abdome inferior, choque grau IV, apresentou parada cardio-respiratória ao chegar à sala de emergência. No que se refere às condutas mais corretas para reanimação dessa vítima, assinale o que for correto.

- 01) Massagem cardíaca externa.
- 02) Toracotomia para clampeamento da aorta descendente.
- 04) Intubação orotraqueal.
- 08) Massagem cardíaca direta.
- 16) Laparotomia para clampeamento da aorta abdominal.

**18** – No que se refere à presença de sinais que devem alertar para a possibilidade de hipervolemia, antes da reposição volêmica inicial, assinale o que for correto.

- 01) Edema.
- 02) Estertores crepitantes.
- 04) Engurgitamento de jugular.
- 08) Dispneia.
- 16) Bradicardia.

**19** – No que se refere aos sinais clínicos de embolia pulmonar, assinale o que for correto.

- 01) Dispneia.
- 02) Dor torácica.
- 04) Febre.
- 08) Hemoptise.
- 16) Tosse.

**20** – No que se refere às alterações mais típicas da fase inicial do choque, assinale o que for correto.

- 01) Bradipneia.
- 02) Taquipneia.
- 04) Hipotensão.
- 08) Taquicardia.
- 16) Alteração do nível de consciência.