

1ª Parte – Português

Leia o seguinte fragmento de texto retirado do livro *Vidas Secas*, de Graciliano Ramos.

“A vida na fazenda se tornava difícil. Sinhá Vitória benzia-se tremendo, manjava o rosário, mexia os beiços rezando rezas desesperadas. Encolhido no banco do copiar, Fabiano espiava a caatinga amarela, onde as folhas secas se pulverizam, trituradas pelos redemoinhos, e os garranchos se torciam, negros, torrados. No céu azul as últimas arribações tinham desaparecido. Pouco a pouco os bichos se finavam, devorados pelo carrapato. E Fabiano resistia, pedindo a Deus um milagre.

Mas, quando a fazenda se despovoou, viu que tudo estava perdido, combinou a viagem com a mulher, matou o bezerro morrinheiro que possuíam, salgou a carne, largou-se com a família, sem se despedir do amo. Não poderia nunca liquidar aquela dívida exagerada. Só lhe restava jogar-se ao mundo, como negro fugido.

01. O termo “*difícil*”, presente em “A vida na fazenda se tornava difícil”, tem função sintática de:

- a) Objeto indireto.
- b) Predicativo do sujeito.
- c) Objeto direto.
- d) Adjetivo.
- e) Predicativo do objeto.

02. Em: “*Sinhá Vitória benzia-se tremendo, manjava o rosário, mexia os beiços rezando rezas desesperadas.*”, a oração reduzida em destaque estaria corretamente desenvolvida se estivesse assim escrita:

- a) Sinhá Vitória benzia-se enquanto tremia (...).
- b) Sinhá Vitória benzia-se porque tremia (...).
- c) Sinhá Vitória benzia-se a medida que tremia (...).
- d) Sinhá Vitória benzia-se após tremer (...).
- e) Sinhá Vitória benzia-se tendo em vista que tremia (...).

03. Na oração: “*Encolhido no banco do copiar, Fabiano espiava a caatinga amarela, onde as folhas secas se pulverizam, trituradas pelos redemoinhos, e os garranchos se torciam, negros, torrados.*”, a expressão “banco do copiar” significa:

- a) Lugar para se estudar com vista para a rua.
- b) Assento usado como apoio para escrever.
- c) Assento na varanda.
- d) Banco da escrivaninha.
- e) Mesa de estudos.

04. A oração “(...) onde as folhas secas se pulverizam”, tem função sintática equivalente à:

- a) Minha vontade é que você aprenda português.
- b) Não saia daqui sem que eu lhe chame.
- c) A liberdade é um bem tão precioso que cada um quer ser dono até da alheia.
- d) O fato de que és mudo na te impede de trabalhar.
- e) O animal mais veloz do mundo é o avestruz, que chega a atingir cerca de 120 km/h.

05. Em qual das orações há discordância da norma culta conforme as regras de pontuação?

- a) Afinal, quem manda aqui sou eu, ou são vocês?
- b) Uma mão lava a outra, e a poluição suja as duas.
- c) Os mendigos pediam dinheiro ou comida?
- d) Mau curso primário, mau curso secundário, produzem mau candidato à universidade.
- e) NDR

06. Dentre as proposições a seguir, assinale a que expressa uma inverdade em relação à norma culta da língua portuguesa.

- a) O verbo chamar é transitivo direto ou transitivo indireto, indiferentemente, quando no sentido de considerar, como em: “Chamei-o palhaço” ou “Chamei-o de palhaço”.
- b) O verbo pisar é um verbo transitivo direto, portanto não admite preposição, conforme exemplo: “Não pise na grama”.
- c) O verbo puxar é transitivo indireto no sentido de “sair semelhante”, como em “O puxou ao pai, e não há mãe.”
- d) O reparar, quando significar observar, é transitivo indireto: “Repare no corpo desta garota.”
- e) O verbo sobressair, sem ser pronominal, é transitivo indireto: O jogador que mais sobressaiu nos jogos do Brasil foi o goleiro.

07. Leia o texto a seguir e em seguida responda o que se pede.

Apontamentos sobre o Prêmio Nobel

O Prêmio Nobel reverencia cientistas, pesquisadores, escritores e poetas. No entanto, a maior repercussão ocorre em dois prêmios, Literatura e Paz. A opinião pública espontaneamente dedica aos ganhadores dessas categorias a maior atenção. Os prêmios de ciências, é claro, são importantes, mas a repercussão fica muito concentrada no segmento especializado ou mais restrito da opinião pública.

O Nobel da Paz tem sido concedido a personalidades que deixam às margens restrições daqueles de pensamento mais ortodoxo, dos que entendem o prêmio como uma homenagem ao pacifismo, aos que rejeitam todas as formas de violência. Claro que esta é uma apreciação linear, superficial, pois algumas vezes a violência faz-se como uma ação preventiva, para adiante obter uma paz duradoura. (...)

MENEZES, Fernando. *Divirta-se e aprenda. Editora Construir, 2009.*

É possível depreender do texto a seguinte informação:

- I. O Prêmio Nobel é concedido àqueles de pensamento ortodoxo.
- II. A opinião pública rejeita todo tipo de violência.
- III. A violência às vezes é um passo para a paz.
- IV. A opinião pública reverencia pesquisadores e poetas, priorizando essas categorias na entrega do Nobel.

- a) Todas estão corretas.
- b) Todas estão erradas.
- c) Apenas I e IV estão erradas.
- d) Apenas III está correta.
- e) Apenas I está correta.

Leia o texto a seguir e tome-o como base para responder as questões **08** e **09**.

Problemas

Os candidatos que participaram da eleição municipal e **que** largaram banners nos postes de iluminação estão sendo convocados pela Justiça Eleitoral para fazerem a retirada. Caso não retirem suas propagandas, o juiz eleitoral da 175ª Zona Eleitoral, Fernando Ferreira de Moraes, vai adotar medidas enérgicas, como a aplicação de multas no valor de 50 mil UFIRs.

Curitiba, *Gazeta do Povo*. 7 nov. 2004.

08. A oração sublinhada pode ser classificada como *Oração Subordinada*:

- a) Adverbial Final.
- b) Adverbial condicional.
- c) Adjetiva restritiva.
- d) Substantiva Predicativa.
- e) Adverbial consecutiva.

09. O pronome *que*, em destaque no texto tem função sintática de:

- a) Predicativo do sujeito.
- b) Objeto direto.
- c) Sujeito.
- d) Adjunto adverbial.
- e) Complemento Nominal.

10. A seguinte frase foi retirada de uma propaganda de “Canecas” (bebedouros) para animais, numa revista de produtos agrícolas: “*A vida útil das Canecas fabricadas com Resinas Plásticas, estão atreladas à abrasividade dos produtos transportados.*” Como se percebe, há desconformidades em relação à norma culta da língua. Aponte a alternativa que corrige a falha que há no texto.

- a) “*A vida útil das Canecas fabricadas com Resinas Plásticas estão atreladas à abrasividade dos produtos transportados.*”
- b) “*A vida útil das Canecas fabricadas com Resinas Plásticas, está atreladas à abrasividade dos produtos transportados.*”
- c) “*A vida útil das canecas fabricadas com resinas plásticas, estão atreladas à abrasividade dos produtos transportados.*”
- d) “*A vida útil das Canecas fabricadas com Resinas Plásticas, estão atreladas à abrasividade dos produtos transportados.*”
- e) “*A vida útil das canecas fabricadas com resinas plásticas está atrelada à abrasividade dos produtos transportados.*”

2ª Parte – Sistema Único de Saúde – SUS

11. São critérios para transferência de recursos para estados, distrito federal e municípios, EXCETO:

- a) Perfil demográfico da região.
- b) Perfil epidemiológico da população a ser coberta.
- c) Características quantitativas e qualitativas da rede de saúde da área.
- d) Desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior.
- e) Níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais e federais.

12. Referente ao Índice de Swaroop & Uemura é INCORRETO afirmar:

- a) É um dos indicadores de nível de vida do qual a saúde faz parte.
- b) Indica a porcentagem de pessoas que morreram com 60 anos ou mais em relação ao total de óbitos ocorridos em uma determinada população.
- c) Países desenvolvidos: valores entre 80% e 90%.
- d) Países subdesenvolvidos: índice pode atingir 50% ou menos.
- e) Classificação: 1º grupo: índice igual ou superior a 75%; 2º grupo: variando de 50 a 74%; 3º grupo: variando de 25 a 49%; 4º grupo: valores inferiores a 25%.

13. As características abaixo são de:

- Ocorrência coletiva de uma determinada doença que no decorrer de um largo período histórico, acomete sistematicamente, mantendo uma incidência constante.
- Presença constante de uma doença ou um agente infeccioso em uma área geográfica.

- a) Endemia
- b) Epidemia
- c) Epidemiologia descritiva
- d) Epidemiologia analítica
- e) Pandemia

14. São possíveis intervenções contra mortalidade de menores de 5 anos, EXCETO:

- a) Melhorando a atenção pré-natal.
- b) Melhorando o atendimento ao parto e ao recém-nascido.
- c) Prevenindo o excesso de peso ao nascer.
- d) Melhorando a nutrição materna.
- e) Reduzindo o fumo durante a gestação.

15. Sobre Programa Nacional de Imunizações –PNI (1973) é INCORRETO afirmar:

- a) Criado com o objetivo de coordenar as ações de imunizações que se caracterizavam pela descontinuidade e pela reduzida área de cobertura.
- b) O PNI é parte integrante do Programa Ampliado de Imunizações (PAI), da Organização Pan-Americana da Saúde.
- c) Brasil – elevada taxa de morbidade e mortalidade por doenças imunopreveníveis.

- d) As secretarias municipais são responsáveis pela coordenação do Programa.
- e) Objetivo do Programa: oferecer todas as vacinas com qualidade a todas as crianças que nascem em nosso país, tentando alcançar coberturas vacinais de 100%.

16. São Critérios de inclusão de doenças e agravos na lista de notificação, EXCETO:

- a) Magnitude: doenças de elevada frequência – altas taxas de incidência, prevalência, mortalidade.
- b) Potencial de disseminação: elevado poder de transmissão da doença.
- c) Transcendência: severidade – taxa de letalidade, hospitalização e sequelas. Relevância social e econômica.
- d) Vulnerabilidade: medida pela disponibilidade de instrumentos específicos de prevenção e controle da doença.
- e) Compromissos internacionais: situações emergenciais que impõe a notificação imediata de todos os casos suspeitos.

17. Sobre febre tifóide é INCORRETO afirmar:

- a) É doença endêmica, relacionada com água não-tratada e sem condição de higiene.
- b) O período de incubação é geralmente assintomático e dura, em média, cerca de 5 dias.
- c) Após o período de incubação, segue-se o período invasivo, quando então surgem sintomas como fraqueza, dor de cabeça, astenia e náuseas. A febre acompanha esses sintomas, tornando-se alta por volta do quinto dia.
- d) O período seguinte, chamado período de estado, caracteriza-se por febre, typhus (topor), diarreia líquida e aumento do baço.
- e) O último período é o de defervescência, quando, se a evolução for favorável, os sintomas podem regredir. Há, no entanto, casos em que surgem complicações graves, como hemorragias e perfuração intestinal.

18. Sobre saúde da criança é INCORRETO afirmar:

- a) Mais da metade das mortes de menores de um ano ocorre nos primeiros seis dias, isto poderia ser evitado por uma boa assistência ao pré-natal e ao parto, acesso da mãe à informação e controle social dos serviços públicos.
- b) Após o nascimento a mãe deve continuar tendo toda atenção necessária, principalmente se o bebê nascer prematuro ou com peso abaixo de 2.500g.
- c) A criança que nasce antes de completar os nove meses de gestação requer cuidados especiais, pois está com a saúde fragilizada - chamada também como imaturidade orgânica.
- d) No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, as afecções perinatais são responsáveis por 30% das mortes de crianças.
- e) As soluções para evitar a morte de crianças podem ser encontradas na família, na comunidade, no serviço de saúde ou a partir da formulação de políticas públicas de saúde nos Conselhos. Pode ser também a soma de esforços intersetoriais de governo e sociedade. Cada localidade tem o poder de descobrir e prevenir as causas pelas quais adoecem ou morrem as crianças, e assim diminuir o sofrimento humano.

19. São fatores relacionados à Tuberculose no mundo, EXCETO:

- a) Empobrecimento da população.
- b) Aumento dos índices de migrações externas apenas.
- c) Envelhecimento da população mundial.
- d) Aparecimento da resistência a múltiplos fármacos.
- e) Reduzido interesse da comunidade científica e dos formadores de políticas públicas em relação à tuberculose.

20. São agravos de notificação imediata via fax, telefone ou e-mail, além da digitação e transferência imediata, por meio magnético, através do Sinan os caso suspeito de, EXCETO:

- a) Botulismo
- b) Carbúnculo ou "antraz"
- c) Cólera
- d) Febre amarela
- e) Tétano neonatal

3ª Parte – Conhecimentos Específicos

21. Sobre tuberculose (TB) é INCORRETO afirmar:

- a) A tuberculose (TB) é uma doença infecto-contagiosa, que permanece entre as principais enfermidades, que acometem a humanidade.
- b) Trata-se da doença infecciosa com as maiores taxas de mortalidade em nível mundial, em adultos, juntamente com a infecção pelo vírus da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA/AIDS).
- c) Também apresenta-se com grandes repercussões sócio-econômicas, pois acomete predominantemente a população adulta e produtiva.
- d) A TB pode acometer diferentes sítios do organismo humano, porém o pulmão é o órgão mais freqüentemente envolvido.
- e) O diagnóstico precoce da TB é importante para que a resposta terapêutica ao uso de antibacterianos seja satisfatória, principalmente nos pacientes imunossuprimidos, como aqueles infectados pelo HIV. Neste grupo, o tratamento medicamentoso precoce resulta em menor morbi/mortalidade.

22. Referente ao ducto torácico é INCORRETO afirmar:

- a) Começa no abdome, como um saco dilatado, a cisterna do quilo, que está na frente da décima segunda vértebra torácica, atrás e a direita da aorta.
- b) O ducto torácico segue para cima a partir da cisterna do quilo, através do hiato esofágico no diafragma e ao lado direito da aorta.
- c) O maior ducto linfático do corpo, é o ducto torácico, a parede do ducto tem uma maior riqueza em fibras musculares lisas que a de grandes veias.
- d) No ducto torácico, as fibras musculares mais relevantes no abdome e vão decrescendo no tórax e região cervical respectivamente. Esse

dado corresponde a necessidade fisiológica que a linfa tem de manter seu fluxo em direção cranial, para desembocar nos ângulos venosos entre as veias jugular interna e subclávia de cada lado, na transição linfáticovenosa, observa-se que as fibras musculares lisas encontram-se desordenadas em alguns pontos e com um arranjo helicoidal em outros.

e) No adulto seu comprimento varia de 38 a 45 cm.

23. A linfa é impulsionada por diversos fatores, alguns deles estão descritos abaixo e NÃO se inclui:

- a) Contração de músculos esqueléticos.
- b) Movimentos ativos do corpo.
- c) Pulsações de artérias.
- d) Compressão externa dos tecidos.
- e) Na região cervical, pela gravidade (com o indivíduo em posição ortostática).

24. O mediastino superior é dividido do mediastino inferior, assim, são limites do mediastino superior, EXCETO:

- a) Inferior - plano imaginário.
- b) Superior - abertura superior do tórax.
- c) Laterais - pleuras parietais dos pulmões esquerdo e direito.
- d) Posterior - as vértebras de T4 a T12.
- e) Anterior - manúbrio do esterno .

25. São achados que podem estar associados à trombose do seio cavernoso, EXCETO:

- a) Lesão do nervo oculomotor.
- b) Lesão do nervo troclear.
- c) Lesão do nervo abducente.
- d) Lesão do nervo oftálmico.
- e) Lesão do nervo facial.

26. Referente ao exame do aparelho respiratório é INCORRETO afirmar:

- a) A inspeção estática pode mostrar assimetria torácica provocada por alterações da coluna vertebral.
- b) Na palpação do frêmito torácico vocal usa-se a região palmar dos quirodáctilos nas regiões supraescapular, inter-escapulo vertebral, infraescapular e infra-axilar de cima para baixo e em seguida comparando lado a lado.
- c) A expansão das bases, ápices e regiões infraclaviculares é uma importante atribuição da palpação.
- d) A região escapular é avaliada pela percussão dígito-digital tendo grande valor semiótico.
- e) A ausculta da tosse não pode faltar no exame do aparelho respiratório.

27. São medicamentos que não devem ser utilizados ou devem ser evitados em pacientes com dengue:

- I. Ibuprofeno
- II. Diclofenaco
- III. Nimesulida
- IV. Dimenidrinato
- V. Fosfato de codeína

- a) I, II, III.
- b) I, III, V.
- c) II, IV, V.

d) II e V.

e) I, II, III, IV, V.

28. Referente à conduta terapêutica em pacientes com dengue do tipo C, sem hipotensão é INCORRETO afirmar:

- a) Leito de observação em unidade com capacidade para realizar hidratação venosa sob supervisão médica por período mínimo de 48 horas.
- b) Hidratação endovenosa (EV) imediata: 25 ml/kg em quatro horas, com soro fisiológico ou ringer lactato, de preferência em bomba de infusão contínua. Repetir esta fase até 3 vezes se não houver melhora do hematócrito ou de sinais hemodinâmicos.
- c) Reavaliação clínica e de hematócrito após quatro horas e de plaquetas após 12 horas.
- d) Se houver melhora clínica e laboratório, iniciar etapa de manutenção com 25ml/kg em cada uma das etapas seguintes (8 e 12 horas); se a resposta for inadequada, repetir a conduta anterior, reavaliando ao fim da etapa. A prescrição pode ser repetida por até três vezes.
- e) Se houver melhora, passar para etapa de manutenção com 25 ml/kg em cada uma das etapas seguintes (8 e 12 horas). Se a resposta for inadequada, tratar como paciente com hipotensão.

29. Alguns dos pontos principais a serem avaliados no exame clínico do paciente com trauma agudo de crânio são, EXCETO:

- a) Sinais vitais.
- b) Investigação de sinais de fratura de crânio (hemotímpano, equimose periorbital ou retroauricular).
- c) Otorréia ou rinorréia.
- d) Exame neurológico.
- e) Resposta palmar.

30. Referente à pressão craniana e a escala de Glasgow é INCORRETO afirmar:

- a) São sinais precoces de aumento da pressão intracraniana um decréscimo de 3 ou mais pontos na escala de Glasgow,
- b) São também sinais de aumento da pressão intercraniana: mudanças no diâmetro pupilar e sua reação à luz, alterações respiratórias e surgimento de paresias.
- c) A escala de coma de Glasgow é um instrumento fundamental na avaliação neurológica, com influência no tratamento e nos resultados clínicos do paciente.
- d) Para sua aplicação em crianças abaixo de 2 anos, confere-se pontuação máxima ao item de resposta verbal se o paciente chora quando estimulado.
- e) Outro ponto fundamental para avaliação terapêutica e tomada de decisão em trauma agudo de crânio é a determinação da gravidade do paciente.

31. Observe as alternativas abaixo e indique a INCORRETA:

- a) A associação de episódios de hipoglicemia, atraso de desenvolvimento somático e motor com hepatomegalia volumosa de consistência macia, praticamente faz o diagnóstico clínico de glicogenose.
- b) A galactosemia pode se apresentar no período neonatal de forma crônica e fulminante, mas é mais comum com a manifestação aguda após 2 semanas de ingestão de lactose, com anorexia, letargia, vômitos, diarreia, pouco ganho de peso e convulsões.
- c) Ainda na galactosemia, o fígado está aumentado, mas é de consistência firme e geralmente aparece icterícia.
- d) Na fructosemia o sinal cardinal é o vômito e o fígado está aumentado e endurecido. Existe progressão da doença hepática e a criança tem curiosa aversão a comidas doces.
- e) A forma infantil de cistinose tem no rim a agressão principal e as lipidoses não apresentam hipoglicemia e mostram esplenomegalia.

32. São possíveis mecanismos de ação dos probióticos no controle de diarreias, EXCETO:

- a) Produção de substâncias com ação antimicrobiana.
- b) Competição por nutrientes.
- c) Inibição da adesão de patógenos a células epiteliais do intestino.
- d) Modificação de toxinas microbianas ou de receptores para toxinas.
- e) Efeitos estimulatórios sobre a imunidade local específica e não a natural.

33. São exemplos de doenças transmitidas por gotículas, EXCETO:

- a) Infecções entéricas por *Shigella* sp, rotavirus e hepatite A - para crianças com incontinência fecal.
- b) Coqueluche.
- c) Caxumba.
- d) Rubéola.
- e) Escarlatina.

34. Na Sepse Clínica (sem confirmação laboratorial) temos o critério 1 do qual apresenta pelo menos um dos seguintes sinais ou sintomas sem outra causa reconhecida: febre (T axilar > 37,5°C), hipotermia (T axilar < 36,0°C), apnéia, bradicardia ou sinais de choque; e os seguintes critérios que NÃO se inclui:

- a) Hemograma com três parâmetros alterados.
- b) Proteína C reativa em quantitativa elevada.
- c) Hemocultura não realizada ou negativa.
- d) Evidência de infecção em outro sítio.
- e) Instituição de terapia antimicrobiana para sepse pelo médico.

35. Sobre o Princípio da Beneficência é INCORRETO afirmar:

- a) A beneficência tem sido associada à excelência profissional desde os tempos da medicina grega e está expressa no Juramento de Hipócrates: “Usarei o tratamento para ajudar os doentes, de acordo com minha habilidade e julgamento e nunca o utilizarei para prejudicá-los”. Beneficência quer dizer fazer o bem.
- b) De uma maneira prática, isto significa que temos a obrigação moral de agir para o benefício do outro. Este conceito, quando é utilizado na área de cuidados com a saúde, que engloba todas as profissões das ciências biomédicas, significa fazer o que é melhor para o paciente, apenas do ponto de vista ético.
- c) É usar todos os conhecimentos e habilidades profissionais a serviço do paciente, considerando, na tomada de decisão, a minimização dos riscos e a maximização dos benefícios do procedimento a realizar.
- d) O princípio da Beneficência obriga o profissional de saúde a ir além da Não-Maleficência (não causar danos intencionalmente) e exige que ele contribua para o bem estar dos pacientes, promovendo ações: a) para prevenir e remover o mal ou dano que, neste caso, é a doença e a incapacidade; e b) para fazer o bem, entendido aqui como a saúde física, emocional e mental.
- e) A Beneficência requer ações positivas, ou seja, é necessário que o profissional atue para beneficiar seu paciente. Além disso, é preciso avaliar a utilidade do ato, pesando benefícios versus riscos e/ou custos.

36. Sobre a artrite psoriásica é INCORRETO afirmar:

- a) A artrite psoriásica faz parte do grupo das espondiloartropatias.
- b) É uma doença soronegativa para o fator reumatóide e que pode apresentar-se com diversos padrões de envolvimento articular: oligoartrite assimétrica, poliartrite simétrica tipo artrite reumatóide ou assimétrica, envolvendo as articulações interfalangeanas distais, espondilite com ou sem sacroileíte e formas intermediárias.
- c) O início da artrite pode ser concomitante, preceder ou surgir após as lesões cutâneas e/ou ungueais que caracterizam a psoríase.
- d) Quando as lesões não estão presentes ou não são observadas ao exame físico, o paciente costuma receber erroneamente o diagnóstico de artrite idiopática juvenil de subtipo oligo ou poliarticular.
- e) As lesões cutâneas típicas são eritematoescamosas de limites precisos e em muitos casos com halo periférico claro.

37. Physostigmine é um antídoto de:

- I. Agentes anticolinérgicos
- II. Anti-histamínicos
- III. Fenotiazinas
- IV. Benzodiazepínicos
- V. Metahemoglobina

Estão CORRETAS:

- a) I e II.
- b) II e III.
- c) I, II, III.
- d) III e IV.
- e) II e V.

38. A necrose avascular do tipo Legg-Calve-Perthes refere-se a que local?

- a) Cabeça do fêmur.
- b) Cabeça do segundo metatarso.
- c) Semi-lunar.
- d) Tuberosidade do calcâneo.
- e) Epífise vertebral.

39. Sobre desenvolvimento motor é INCORRETO afirmar:

- a) O desenvolvimento motor normal sofre ação da maturação neurológica, do código genético de cada ser, além das experiências captadas através de manuseio e do meio ambiente.
- b) A evolução motora propicia tanto maior independência como melhor capacidade de adaptação a fatos sociais.
- c) Todos os movimentos dependem do eixo central que desempenha, como estrutura locomotora, função dupla: a de alinhar os segmentos vertebrais bem como estabilizá-los, estática ou dinamicamente.
- d) As extremidades, caracterizadas por cabeça, membros superiores e membros inferiores estão ligadas ao tronco, fazendo com que a sua postura, incluindo a pelve, interfira na postura corporal, bem como no movimento de quaisquer dos segmentos que o constituem.
- e) Existem planos em que os movimentos podem acontecer. Calais-Germain define esses planos em frontal, posterior e transversal, mostrando como a transferência de peso e, conseqüentemente, o movimento pode ser visto e analisado.

40. Referente a doenças de Huntington é INCORRETO afirmar:

- a) Doença degenerativa do Sistema Nervoso Central.
- b) Causada pela perda marcante de células nos Glânglios de Base.
- c) Afeta a capacidade cognitiva, movimentos e equilíbrio emocional.
- d) Sintomas aparecem entre os 30 e 50 anos, mas pode aparecer em crianças ou idosos (10%).
- e) Nem todo indivíduo afetado possui um genitor afetado.

FIM DO CADERNO