



Fundação Oswaldo Cruz

Concurso Público 2010

Tecnologista em Saúde Pública

Prova Objetiva

Código da prova

C3088

Endoscopia Digestiva

Instruções:

- ▶ Você deverá receber do fiscal:
 - a) um caderno com o enunciado das 60 (sessenta) questões, sem repetição ou falha;
 - b) uma folha destinada à marcação das suas respostas.
- ▶ Ao receber a folha de respostas, você deve:
 - a) conferir se seu nome, número de identidade, cargo e perfil estão corretos.
 - b) verificar se o cargo, perfil e código da prova que constam nesta capa são os mesmos da folha de respostas. **Caso haja alguma divergência, por favor comunique ao fiscal da sala.**
 - c) ler atentamente as instruções de preenchimento da folha de respostas;
 - d) assinar a folha de respostas.
- ▶ É sua responsabilidade preencher a folha de respostas, que será o único documento válido para a correção.
- ▶ Você deverá preencher a folha de respostas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
- ▶ Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro cometido por você.
- ▶ As questões da prova são identificadas pelo número que se situa acima do enunciado.
- ▶ O tempo disponível para essa prova é de **4 (quatro) horas**, incluindo o tempo para a marcação da folha de respostas.
- ▶ Durante as primeiras duas horas você não poderá deixar a sala de prova, salvo por motivo de força maior.
- ▶ Você somente poderá levar o caderno de questões caso permaneça em sala até 30 (trinta) minutos antes do tempo previsto para o término da prova.
- ▶ Ao terminar a prova, você deverá entregar a folha de respostas ao fiscal e assinar a lista de presença.



FUNDAÇÃO
GETULIO VARGAS
FGV PROJETOS

Língua Portuguesa

Texto

A era do sustentável

Provavelmente a única chance de salvar efetivamente as florestas tropicais e aqueles que lá vivem é encontrar uma forma para que elas possam coexistir com a lógica do mundo moderno, inclusive no Brasil. Ambientalistas do mundo inteiro reconhecem, no íntimo, que nesses países de enormes desigualdades sociais, onde estão as últimas florestas tropicais intactas, a pressão sobre os recursos naturais é grande e as formas de fiscalização das eventuais leis de proteção são muito frágeis.

Esta lógica significa uma função econômica para a floresta, explorando-a sem destruí-la e sem exaurir seus recursos naturais. É nesta linha que o uso sustentado das florestas ganhou grande força na consciência dos formadores de opinião que defendem o meio ambiente.

É também neste caminho que várias experiências e inúmeras pesquisas estão fervilhando no momento, pelo Brasil e pelo mundo afora. Aqui, vemos o trabalho nas reservas extrativistas, o fornecimento de matéria-prima para a indústria de cosméticos e farmacêutica, a exploração de madeira certificada.

O conceito de uso sustentado dos recursos naturais vai muito além das florestas, para hoje estar incorporado a todas as atividades da humanidade. O reciclar, reutilizar, substituir e otimizar deixaram de ser “moda” para se tornarem obrigação de quem deseja garantir a qualidade das futuras gerações.

(Peter Milko)

01

O pensamento nuclear do texto pode ser expresso do seguinte modo:

- (A) a exploração das florestas deve ser feita de maneira sustentável, sem que haja perdas futuras com a devastação da reserva natural.
- (B) para a salvação das florestas tropicais brasileiras, é indispensável definir uma estratégia que possa preservar ecossistemas, como a Mata Atlântica.
- (C) é indispensável, para a preservação das nossas florestas, a adoção de uma política preservacionista e do aprimoramento da fiscalização.
- (D) o Brasil precisa adotar urgentemente medidas que estejam no mesmo caminho das inúmeras pesquisas modernas.
- (E) o futuro de nossas florestas está dependente da adoção de medidas urgentes de preservação ambiental, que só pode ser obtida se for permitido um extrativismo limitado.

02

No título do texto ocorre o seguinte fato gramatical:

- (A) a modificação de classe gramatical do vocábulo sustentável.
- (B) o uso indevido de uma forma verbal como substantivo.
- (C) a utilização de um substantivo por outro.
- (D) o emprego inadequado de um adjetivo.
- (E) um erro de concordância nominal.

03

Como epígrafe deste texto aparece um pensamento de Lester Brown: “Uma sociedade sustentável é aquela que satisfaz suas necessidades, sem diminuir as perspectivas das gerações futuras”.

O segmento do texto que se relaciona mais de perto a esse pensamento é:

- (A) “Provavelmente a única chance de salvar efetivamente as florestas tropicais e aqueles que lá vivem é encontrar uma forma para que elas possam coexistir com a lógica do mundo moderno, inclusive no Brasil”.
- (B) “Ambientalistas do mundo inteiro reconhecem, no íntimo, que nesses países de enormes desigualdades sociais, onde estão as últimas florestas tropicais intactas, a pressão sobre os recursos naturais é grande e as formas de fiscalização das eventuais leis de proteção são muito frágeis”.
- (C) “Esta lógica significa uma função econômica para a floresta, explorando-a sem destruí-la e sem exaurir seus recursos naturais”.
- (D) “É nesta linha que o uso sustentado das florestas ganhou grande força na consciência dos formadores de opinião que defendem o meio ambiente”.
- (E) “O conceito de uso sustentado dos recursos naturais vai muito além das florestas, para hoje estar incorporado a todas as atividades da humanidade”.

04

O texto é um editorial de uma revista intitulada *Horizonte geográfico*.

A respeito do conteúdo desse texto é correto afirmar que:

- (A) trata-se de uma opinião pessoal sustentada por pesquisadores de todo o mundo.
- (B) refere-se a uma sugestão de atuação na área ambiental para o governo brasileiro.
- (C) mostra um caminho moderno para o desenvolvimento econômico.
- (D) apresentado no primeiro parágrafo, o assunto é analisado nos dois seguintes.
- (E) ainda que argumentativo, o texto carece de uma conclusão.

05

O título do texto fala da “era do sustentável”, referindo-se:

- (A) a um tempo distante, quando o equilíbrio ambiente / economia estará presente.
- (B) a um tempo passado, quando as florestas permaneciam intactas.
- (C) ao momento presente, quando a política da sustentabilidade é dominante.
- (D) à expressão de um desejo para a preservação das florestas tropicais.
- (E) a uma época imediatamente futura em que o meio ambiente ficará intacto.

06

Assinale a alternativa que apresente o adjetivo que indica uma opinião do enunciador do texto.

- (A) Recursos naturais.
- (B) Reservas extrativistas.
- (C) Inúmeras pesquisas.
- (D) Futuras gerações.
- (E) Única chance.

07

“Provavelmente a única chance de salvar efetivamente as florestas tropicais e aqueles que lá vivem é encontrar uma forma para que elas possam coexistir com a lógica do mundo moderno, inclusive no Brasil. Ambientalistas do mundo inteiro reconhecem, no íntimo, que nesses países de enormes desigualdades sociais, onde estão as últimas florestas tropicais intactas, a pressão sobre os recursos naturais é grande e as formas de fiscalização das eventuais leis de proteção são muito frágeis”.

Nesse primeiro parágrafo do texto, o único termo sublinhado que tem o referente anterior corretamente identificado é:

- (A) aqueles = que lá vivem.
- (B) que = aqueles.
- (C) elas = florestas tropicais e aqueles que lá vivem.
- (D) nesses países = mundo inteiro.
- (E) onde = Brasil.

08

Assinale a alternativa que mostra uma modificação **inadequada** de um segmento por um outro equivalente semanticamente.

- (A) Lógica do mundo moderno = lógica mundial moderna.
- (B) Ambientalistas do mundo inteiro = ambientalistas de todo o mundo.
- (C) Leis de proteção = leis protecionistas.
- (D) Uso dos recursos naturais = uso natural dos recursos.
- (E) Para a indústria de cosméticos e farmacêutica = para a indústria farmacêutica e de cosméticos.

09

O segmento do texto que mostra um **erro** ortográfico é:

- (A) “Provavelmente a única chance de salvar efetivamente as florestas tropicais e aqueles que lá vivem é encontrar uma forma para que elas possam coexistir com a lógica do mundo moderno, inclusive no Brasil”.
- (B) “É também neste caminho que várias experiências e inúmeras pesquisas estão fervilhando no momento, pelo Brasil e pelo mundo afora”.
- (C) “Aqui, vemos o trabalho nas reservas extrativistas, o fornecimento de matéria-prima para a indústria de cosméticos e farmacêutica, a exploração de madeira certificada”.
- (D) “O conceito de uso sustentado dos recursos naturais vai muito além das florestas, para hoje estar incorporado a todas as atividades da humanidade”.
- (E) “O reciclar, reutilizar, substituir e otimizar deixaram de ser “moda” para se tornarem obrigação de quem deseja garantir a qualidade das futuras gerações”.

10

Assinale a alternativa que **não** mostra ideia ou forma aumentativa / superlativa.

- (A) “Provavelmente a única chance de salvar efetivamente as florestas tropicais...”.
- (B) “...nesses países de enormes desigualdades sociais...”.
- (C) “a pressão sobre os recursos naturais é grande”.
- (D) “as formas de fiscalização das eventuais leis de proteção são muito frágeis”.
- (E) “o uso sustentado das florestas ganhou grande força na consciência...”.

Clínica Médica Pediátrica**11**

Um médico está de plantão na emergência e atende um lactente de 5 meses com múltiplas fraturas e hematoma no rosto. Segundo relato da mãe, a criança caiu quando tentava descer as escadas de sua casa.

Após prestar os cuidados iniciais e imediatos, deve ser adotada a seguinte conduta:

- (A) encaminhar o lactente para Instituto Médico Legal para exames.
- (B) orientar a mãe e acompanhantes sobre prevenção de acidentes na infância.
- (C) orientar a mãe para colocação de uma cancela, com a finalidade de impedir o acesso do lactente à escada.
- (D) comunicar ao Conselho Tutelar a suspeita de maus-tratos.
- (E) comunicar o ocorrido à Delegacia Policial mais próxima.

12

Um médico é chamado pela enfermeira da sala de vacina no posto de saúde para avaliar criança de 5 anos que veio para fazer dose de reforço das vacinas recomendadas pelo Ministério da Saúde. A enfermeira está em dúvida sobre a aplicação do reforço da tríplice viral e bacteriana, pois a criança é asmática e está fazendo uso de corticóide inalatório há uma semana.

Assinale a alternativa que indique a orientação correta neste caso.

- (A) Solicitar que sejam aplicadas as duas vacinas no paciente.
- (B) Substituir a vacina tríplice bacteriana pela vacina acelular.
- (C) Solicitar a suspensão do uso do corticóide para programar a vacina posteriormente.
- (D) Aplicar somente a vacina tríplice viral.
- (E) Aplicar somente a vacina tríplice bacteriana e fazer a viral após 2 meses de suspensão do corticóide.

13

Um médico atende recém nascido com cinco dias de vida, acompanhado pela avó e pela mãe, que relatam que o parto foi operatório (não sabem qual foi a indicação), peso de nascimento 3.300g, a termo, Apgar 8 e 9, alta da maternidade com 48 horas de vida.

A mãe relata que está produzindo pouco leite e que o recém nascido está em regime de aleitamento materno exclusivo. O peso no dia da consulta é de 3100g, perda de 200g e a mãe relata que o recém nascido evacua diversas vezes ao dia e urina em torno de 6 a 8 vezes.

Diante deste quadro, assinale a orientação correta a ser adotada.

- (A) Internar o recém nascido para pesquisa de processo infeccioso inicial.
- (B) Iniciar hidratação oral complementar ao aleitamento, pois o recém nascido perdeu peso em relação ao nascimento.
- (C) Manter o aleitamento exclusivo e pelos dados expostos orientar que o recém nascido está normal.
- (D) Iniciar reposição com fórmula tendo o cuidado de dar pelo copinho para preservar a sucção.
- (E) Ensinar a mãe a técnica de ordenha e iniciar medicações para ela na tentativa de aumentar a produção do leite.

14

Um médico é chamado ao hospital para opinar sobre o caso de um pai que está reclamando junto à direção, que o pediatra prescreveu, para seu filho de 2 anos, uma medicação que só está liberada para maiores de 5 anos e que esta medicação poderia causar algum dano maior ao paciente. O pediatra confirma a informação de que, segundo a resolução da ANVISA, a medicação só está liberada para ser prescrita a partir de 5 anos, porém ele argumenta, e apresenta artigos de revistas indexadas americanas e europeias, que naqueles países a medicação em questão está liberada para crianças de 2 anos de idade.

De acordo com tais fatos e segundo o Código de Ética Médica:

- (A) o pediatra errou ao prescrever a medicação mesmo embasado em literatura internacional.
- (B) o pediatra alega que prescreveu medicação baseado em estudo experimental que estava fazendo no hospital.
- (C) o pediatra agiu corretamente baseado no seu direito de autonomia sobre o paciente.
- (D) a literatura internacional liberando a medicação na faixa etária em questão garante ao pediatra o direito da prescrição .
- (E) o pediatra deveria ter solicitado aos pais um documento por escrito, dando ciência da medicação e da não liberação da medicação pela ANVISA para a faixa etária.

15

Mãe trás seu filho de 5 anos para atualizar caderneta de vacinação. Um médico se cientifica da necessidade de reforço da tríplice viral e bacteriana, porém a mãe relata que aos 15 meses de idade, três dias após a aplicação da tríplice bacteriana, seu filho apresentou crise convulsiva.

Assinale a afirmativa que indique a melhor conduta a ser seguida.

- (A) Fazer medicação específica antes da aplicação da vacina e depois vacinar normalmente.
- (B) Substituir pela dupla tipo adulto.
- (C) Substituir a tríplice bacteriana pela dupla do tipo infantil.
- (D) Internar paciente para tratar possíveis eventos adversos após aplicação da vacina.
- (E) Aplicar a vacina tetravalente.

16

Um médico atende auma paciente de 13 anos e constata que ela está grávida. A adolescente, extremamente desorientada, proíbe que ele comente o fato com seus responsáveis, alegando ter condições para resolver o problema sozinha.

Assinale a afirmativa que indique a melhor conduta para este caso.

- (A) Comunicar o fato a assistente social para que as providências cabíveis sejam tomadas.
- (B) Comunicar o fato à policia para investigação de paternidade por se tratar de menor de idade.
- (C) Baseado no princípio da inviolabilidade da integridade física psíquica e moral você deveria concordar com a paciente e guardar segredo do fato.
- (D) Respeitar o Estatuto da Criança e do Adolescente em relação ao sigilo médico e solicitar suporte psicológico para a adolescente.
- (E) Comunicar o fato aos responsáveis pela adolescente.

17

Em relação à epidemiologia dos problemas da criança no Brasil, assinale a afirmativa correta.

- (A) Por causa do incentivo da campanhas diversas pelo país, observa-se tendência decrescente de mortalidade e morbidade por injúrias físicas.
- (B) Excetuando o primeiro ano de vida, as injúrias ou causas externas causam mais mortes de crianças ou jovens do que o somatório das principais outras doenças.
- (C) A idade da criança não influencia na gravidade da injúria sofrida, outros fatores externos tem maior importância.
- (D) O fator social pobreza não tem influência nas taxas de injúrias físicas sofridas pelas crianças.
- (E) Não se pode relacionar o gênero com as taxas de injúrias físicas sofridas pelas crianças.

18

Para o diagnóstico ambulatorial de tuberculose em crianças é correto se basear:

- (A) na análise da história epidemiológica, clínica e radiológica.
- (B) no exame de baciloscopia do escarro.
- (C) na presença ou não de vacinação realizada de forma e na idade correta.
- (D) na cultura do escarro em meio de Lowenstein-Jensen.
- (E) no lavado broncoalvelolar e PCR.

19

Em relação ao uso da penicilina benzatina como parte do tratamento da sífilis congênita, de acordo com as normas do Ministério da Saúde, assinale a afirmativa correta.

- (A) Poderá ser usada em qualquer caso de sífilis congênita.
- (B) Não deve ser usada quando houver comprometimento neurológico.
- (C) Somente poderá ser utilizada se a mãe recebeu terapia não penicilínica como forma de tratamento na gravidez.
- (D) Terá indicação precisa quando da presença de alterações radiológicas.
- (E) Em casos de sífilis congênita deve ser dado preferência a penicilina cristalina ou mesmo procaína em todos os casos.

20

Segundo critérios de Tanner, a primeira manifestação da puberdade no sexo feminino é:

- (A) menarca.
- (B) adrenaquia.
- (C) pubarca.
- (D) telarca.
- (E) ciclos anovulatórios.

21

Um médico, em um exame de um recém nascido, faz a manobra de Barlow e ela é positiva. Neste caso, a articulação comprometida é a do:

- (A) pé.
- (B) coluna vertebral.
- (C) cotovelo.
- (D) ombro.
- (E) quadril.

22

Em relação ao crescimento e ao exame físico normal de uma criança, assinale a afirmativa correta.

- (A) A menina é em geral mais pesada do que o menino ao nascimento.
- (B) O perímetro cefálico de uma criança a termo ao nascer é em torno de 60 cm.
- (C) Os dentes incisivos inferiores são os primeiros a surgirem, por volta de 6 meses de idade.
- (D) Tremores ou mioclonias são sinais de gravidade quando presentes no período neonatal.
- (E) Presença de hidrometrocolpos em recém nascido pode ser achado normal ao exame físico.

23

Em relação ao Risco de Mortalidade Pediátrica (PRISM), é correto afirmar que:

- (A) é projetado para avaliações de populações não sendo válido com finalidade de tomada de decisões isoladamente para um paciente.
- (B) o PRISM pode ser utilizado quando da tomada de decisões que envolvem ética médica.
- (C) o PRISM, por ter seu sistema de coleta individualizado, não pode ser utilizado como padrão para apontar melhora ou deterioração de uma unidade.
- (D) o sistema de Avaliação de Fisiologia Aguda e Saúde Crônica (APACHE) é mais utilizado em unidades de terapia de crianças em relação ao PRISM.
- (E) o PRISM avalia somente o desempenho, não sendo suficiente para comparar o uso de recursos entre várias unidades.

24

Assinale a alternativa que apresente os marcos de desenvolvimento normal, nos dois primeiros anos de vida.

- (A) Descobre brinquedo após vê-lo sendo escondido aos 8 meses e rola para decúbito ventral aos 4 meses.
- (B) Junta as mãos na linha média aos 3 meses e fixa o olhar momentaneamente no local onde um objeto desapareceu aos 4 meses.
- (C) Senta sem apoio aos 6 meses e segura o chocalho aos 2 meses.
- (D) Fixa o olhar nas próprias mãos aos 2 meses e bate dois cubos entre si aos 4 meses.
- (E) Sustenta a cabeça com firmeza quando sentado aos 2 meses e balbucia monossílabas aos 6 meses.

25

De acordo com a Constituição Federal Brasileira de 1988, a saúde deve ser entendida como:

- (A) bem estar social e físico.
- (B) dever do cidadão e dever do estado.
- (C) atitude a ser tomada pelo cidadão e por empresários do setor.
- (D) um direito do cidadão, direito este garantido por políticas sociais e econômicas.
- (E) atitudes particulares ou privadas baseadas em políticas sociais públicas.

26

Assinale a alternativa que enumere os setores responsáveis pelo financiamento do Sistema Único de Saúde:

- (A) iniciativa privada e União.
- (B) União e iniciativa privada.
- (C) somente a União.
- (D) Distrito Federal, União, Estados e Municípios.
- (E) de alguns Estados e de todos os Municípios.

27

Segundo o conceito do SUS, assinale a alternativa que apresente as ações previstas no sistema de vigilância epidemiológica.

- (A) Divulgação de estatísticas municipais sobre agravos de doenças mais prevalentes.
- (B) Recomendar e adotar medidas de prevenção de controle das doenças ou agravos.
- (C) Controle e prevenção a nível hospitalar de doenças e possíveis focos de infecção.
- (D) Informar aos gerentes municipais sobre a correta participação individual de cada esfera responsável na prevenção de doenças.
- (E) Avaliar o impacto de novas tecnologias adotadas pelo sistema com finalidade de sua universalização.

28

Têm direito à assistência médica pelo SUS no Brasil:

- (A) todos os brasileiros contribuintes da Seguridade Social.
- (B) somente os indivíduos brasileiros e residentes no país.
- (C) todos os indivíduos, independente de serem brasileiros ou não, independente de qualquer condição.
- (D) brasileiros que tenham carteira de trabalho assinada.
- (E) indivíduos brasileiros ou não que apresentem condições sociais que justifiquem tal assistência médica.

29

Assinale a alternativa que indique as patologias em que pode ser encontrado o “rosário costal”.

- (A) Doenças renais crônicas e raquitismo.
- (B) Raquitismo e osteogênese imperfecta.
- (C) Escorbuto e doenças renais crônicas.
- (D) Osteogênese imperfecta e escorbuto.
- (E) Raquitismo e escorbuto.

30

O achado de pulso femoral ausente ou fraco e pulso radial vigoroso sugere o diagnóstico de:

- (A) transposição de grandes vasos da base.
- (B) estenose pulmonar.
- (C) persistência do canal arterial.
- (D) coarctação da aorta.
- (E) comunicação interventricular.

Endoscopia Digestiva

31

Para atendimento a uma criança com menos de 4 kg de peso, nascida a termo, uma unidade de endoscopia digestiva pediátrica bem planejada deve dispor de endoscópio para realização de esofagogastroduodenoscopia com tubo de inserção com diâmetro externo de:

- (A) 9,8 mm.
- (B) 2 mm.
- (C) 2,8 mm.
- (D) 7,9 mm.
- (E) 4 a 5 mm.

32

Pacientes pediátricos com problemas neurológicos, apresentam também, com frequência, problemas gastrointestinais. A sedação nesses pacientes é imprevisível.

Em relação ao peso da criança, a dose de meperidina se aplicada no procedimento endoscópico, deve ser de:

- (A) 0,5 a 1 mg/kg.
- (B) 1 a 2 mg/kg.
- (C) 0,1 a 0,2 mg/kg.
- (D) 2 a 5 mg/kg.
- (E) o uso de meperidina está totalmente contra-indicado.

33

As contra-indicações para a realização de endoscopia digestiva alta pediátrica estão relacionadas a seguir, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) instabilidade cardiovascular.
- (B) prematuro de 1,5 kg.
- (C) choque.
- (D) perfuração de vísceras ocas.
- (E) lesões cervicais instáveis.

34

Pequenas manchas avermelhadas, bem delimitadas, únicas ou múltiplas, na grande maioria assintomáticas, localizadas em geral na porção superior do esôfago e encontradas em cerca de 10% das esofagogastroduodenoscopias, indicam como diagnóstico mais provável:

- (A) mucosa gástrica ectópica.
- (B) sífilis secundária.
- (C) roséola.
- (D) sarcoma de Kaposi.
- (E) melanoma.

35

Criança de quatro anos, ingeriu acidentalmente, soda cáustica. A mãe, de imediato, a levou ao setor de emergência de um hospital pediátrico.

Diante do caso, a melhor conduta a ser adotada pelo Gastropediatra quanto à realização de uma endoscopia digestiva alta, é:

- (A) em 24 a 48 horas após o acidente.
- (B) um mês após o acidente, tratando inicialmente o paciente com corticoterapia.
- (C) três semanas após o acidente, quando se inicia a cicatrização pela proliferação de fibroblastos.
- (D) seis semanas após o acidente, tempo em que, em geral, se completa a reepitelização da mucosa.
- (E) em caso de ingestão de corrosivo, a endoscopia digestiva alta está contra-indicada, se não houver antes uma boa avaliação radiológica.

36

São má-formações que podem dificultar ou impedir a progressão do endoscópio, **exceto**:

- (A) hipoplasia de mandíbula.
- (B) estenose de coanas.
- (C) laringotraqueomalacia.
- (D) fissuras palatinas.
- (E) nódulos na faringe.

37

Das anomalias congênitas do esôfago a mais comum é:

- (A) fístula traqueoesofágica (fístula em H).
- (B) estenose congênita do esôfago.
- (C) atresia do esôfago.
- (D) mucosa ectópica do esôfago.
- (E) hérnia de hiato.

38

Criança de dez anos, feminina, natural do Rio de Janeiro, deu entrada em serviço de emergência de hospital geral com quadro de hematemese. Durante a anamnese, a mãe relatou que antes a filha jamais havia apresentado qualquer problema gástrico, mas logo após o almoço ela iniciou episódio de vômitos prolongados. Acabou por vomitar o equivalente a uma xícara de café de sangue vivo misturado com sangue coagulado.

Assinale a afirmativa que apresenta o provável diagnóstico.

- (A) Lesão de Dieulafoy.
- (B) Síndrome de Mallory-Weiss.
- (C) Dispepsia aguda.
- (D) Infecção aguda por *Helicobacter pylori*.
- (E) Lesão gástrica pós-stress.

39

Em endoscopia pediátrica, os corpos estranhos ingeridos com maior frequência pelas crianças são:

- (A) sementes.
- (B) alimentos.
- (C) ossos.
- (D) moedas.
- (E) brinquedos.

40

Assinale a afirmativa que indica o percentual de casos de refluxo gastroesofágico que se resolvem, espontaneamente, em crianças a partir de um ano de idade.

- (A) 20%.
- (B) 40%.
- (C) 50%.
- (D) 60%.
- (E) 80%.

41

Assinale a afirmativa que apresenta o significado de *coristoma do esôfago*:

- (A) presença de restos traqueobrônquicos ectópicos localizados na parede esofagiana, resultante da anomalia na divisão do intestino primitivo.
- (B) defeito de desenvolvimento caracterizado pela presença de segmento de 2 a 4 cm do tubo esofágico em que a parede é mais espessa às custas de hipertrofia de fibras musculares lisas.
- (C) defeito de revacuolização do intestino primitivo.
- (D) tipo de anomalia esofagiana também conhecida como fístula em "H".
- (E) anel vascular que a endoscopia digestiva alta identifica como uma compressão pulsátil no esôfago.

42

Paciente masculino, branco, de 14 anos, natural do Rio de Janeiro, chegou ao serviço de emergência por apresentar impactação de bolo alimentar no esôfago. O paciente relatou também dor à deglutição e queimação retroesternal. Durante a anamnese relatou que a impactação e a disfagia vêm ocorrendo com certa frequência. Após retirada do bolo alimentar o exame endoscópico evidenciou uma mucosa esofagiana hiperemiada, com erosões lineares e anéis circunferenciais à semelhança do tubo traqueal. Ainda foi observado uma distribuição de pontos brancos pelas paredes do esôfago.

O diagnóstico mais provável é:

- (A) esofagite péptica.
- (B) esofagite por *Candida*.
- (C) esofagite eosinofílica.
- (D) esofagite traumática.
- (E) esofagite consequente à síndrome da imunodeficiência adquirida.

43

Criança infectada por vírus HIV apresenta recusa para se alimentar. Foi submetida à endoscopia digestiva alta que evidenciou, em esôfago, placas lineares e confluentes com ulceração.

O endoscopista deve classificar o achado pela escala de Kodsi de esofagite em:

- (A) grau I.
- (B) grau II.
- (C) grau III.
- (D) grau IV.
- (E) grau V.

44

Paciente de 7 anos com diagnóstico de tumor cerebral foi submetido à colonoscopia. O examinador encontra em região colorretal lesões polipóides com aspecto adenomatoso.

O provável diagnóstico deste paciente é:

- (A) síndrome de Turcot.
- (B) síndrome de Gardner.
- (C) síndrome de Peutz-Jeghers.
- (D) síndrome de Cronkhite-Canada.
- (E) síndrome de Cowden.

45

Em neonatos a única indicação diagnóstica para a realização da CPER (colangiopancreatografia endoscópica retrógrada) é:

- (A) pancreatite aguda não regredida.
- (B) icterícia obstrutiva.
- (C) litíase coledociana.
- (D) fístulas pancreáticas.
- (E) colestase neonatal.

46

Criança de 3 anos foi submetida à colonoscopia por quadro importante de diarreia e queda de estado geral. O laudo endoscópico concluiu tratar-se de um caso de colite pseudomembranosa.

O agente causador desta doença é:

- (A) *Salmonella*.
- (B) *Shigella*.
- (C) *Yersinia*.
- (D) *Clostridium difficile*.
- (E) *Staphylococcus aureus*.

47

Criança foi levada ao pediatra por apresentar quadro persistente de diarreia, sendo submetida a exame endoscópico e realizadas biópsias durante o procedimento. A histopatologia revelou atrofia vilositária parcial.

Sobre esse caso, analise as afirmativas a seguir.

- I. A histopatologia é sugestiva de infecção por giardíase.
- II. O diagnóstico histológico é compatível com diagnóstico clínico de dermatite herpetiforme.
- III. A intolerância à proteína alimentar cursa com diarreia por diminuição das vilosidades intestinais.

Assinale:

- (A) se apenas a afirmativa I estiver correta.
- (B) se apenas a afirmativa II estiver correta.
- (C) se apenas a afirmativa III estiver correta.
- (D) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

48

Assinale a alternativa que indica a causa mais comum de sangramento retal em bebês:

- (A) enterocolite alérgica.
- (B) hiperplasia nodular linfóide.
- (C) polipose colônica.
- (D) amebíase.
- (E) divertículo de Meckel.

49

A seguir estão relacionadas contra-indicações relativas à realização de gastrostomia endoscópica percutânea na criança, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) coagulopatia.
- (B) ascite volumosa.
- (C) indentação clara na parede gástrica anterior.
- (D) infecção intra-abdominal grave.
- (E) cicatrização insuficiente.

50

Em relação à infecção pela bactéria *Helicobacter pylori*, analise as afirmativas a seguir.

- I. Pode causar gastrite aguda na fase inicial da contaminação.
- II. O linfoma tipo Malt regride após a erradicação da infecção em um ano.
- III. A úlcera péptica primária associada à infecção por *H. pylori* tem maior frequência em crianças após 5 anos de idade.

Assinale:

- (A) se apenas a afirmativa I estiver correta.
- (B) se apenas a afirmativa II estiver correta.
- (C) se apenas a afirmativa III estiver correta.
- (D) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

51

Assinale a afirmativa que indica a doença causada por hipertensão portal sinusoidal intra-hepática.

- (A) Trombose da veia porta.
- (B) Esclerose hepatoportal.
- (C) Fibrose hepática congênita.
- (D) Doença de Wilson.
- (E) Esquistossomose.

52

Em relação à doença celíaca, analise as afirmativas a seguir.

- I. É uma doença autossômica recessiva.
- II. O diagnóstico por métodos sorológicos incluem pesquisa de anticorpo antitransglutaminase, anticorpo anti gliadina, anti-reticulina e antiendomísio.
- III. A histopatologia do fragmento retirado por biópsia na endoscopia digestiva alta revela atrofia das criptas com diminuição do índice mitótico.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a alternativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

53

Criança de 12 anos de idade, residente na zona rural, deu entrada na emergência de hospital com quadro de lesões cutâneas, febre, distensão abdominal, diarreia mucossanguinolenta, hepatomegalia e linfadenopatia. Submetida à colonoscopia, o exame evidenciou presença de ulcerações superficiais e formações polipóides com distribuição segmentar.

A hipótese diagnóstica mais provável para este caso é:

- (A) colite pseudomembranosa viral.
- (B) esquistossomose.
- (C) retocolite ulcerativa idiopática.
- (D) doença de Crohn.
- (E) paracoccidiodomicose.

54

Criança com diarreia importante e comprometimento do estado geral foi submetida à colonoscopia que evidenciou lesões segmentadas semelhantes às pedras de calçamento.

O diagnóstico mais provável para estes achados endoscópicos, é:

- (A) colite pseudomembranosa.
- (B) síndrome de Peutz-Jeghers.
- (C) retocolite ulcerativa idiopática.
- (D) doença de Crohn.
- (E) síndrome da polipose juvenil.

55

Na acalásia congênita são tratamentos aceitos:

- I. dilatação pneumática.
- II. injeção de toxina botulínica.
- III. miotomia de Heller.

Assinale:

- (A) se apenas o tratamento I estiver correto.
- (B) se apenas o tratamento II estiver correto.
- (C) se apenas o tratamento III estiver correto.
- (D) se apenas os tratamentos I e III estiverem corretos.
- (E) se todos os tratamentos estiverem corretos.

56

Dentre os fármacos utilizados em uma unidade de endoscopia digestiva encontra-se o midazolam.

O pico de efeito sedativo desse fármaco ocorre em:

- (A) um a três minutos.
- (B) três a cinco minutos.
- (C) dez minutos.
- (D) quinze minutos.
- (E) trinta minutos.

57

Com relação aos cuidados a serem tomados diante de uma criança imunodeficiente que necessita ser submetida à endoscopia digestiva alta, analise as afirmativas a seguir.

- I. Deve ser realizado um preparo semelhante ao de uma criança imunocompetente.
- II. Considere a necessidade de biópsias duodenais se o paciente apresenta deficiência de IgA seletiva.
- III. Deve ser realizada antibioticoterapia profilática de rotina na prevenção de complicações infecciosas.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

58

Paciente masculino, 13 anos, deu entrada no serviço de emergência, com quadro de hemorragia digestiva alta de vulto, com repercussão hemodinâmica. À ectoscopia, encontrava-se pálido, acianótico, anictérico e taquipnéico. Submetido à endoscopia digestiva alta, o examinador observou esôfago normal, estômago com lago mucoso sanguinolento, que foi lavado e aspirado. Após a lavagem foi possível visualizar dois cordões varicosos justacárdicos. Um dos cordões ainda apresentava sangramento ativo de baixo débito.

Classifique segundo, Forrest, o sangramento observado ao exame.

- (A) Forrest Ia.
- (B) Forrest Ib.
- (C) Forrest IIa.
- (D) Forrest IIIb.
- (E) Forrest III.

59

As estenoses esofagianas são abordadas endoscopicamente visando tratamento. Um método de dilatação de estenose largamente empregado nas unidades de endoscopia digestiva é o das velas de Savary-Gilliard.

Indique a patologia que **menos** se beneficia com esse método:

- (A) doença péptica.
- (B) doença infecciosa.
- (C) ingestão de substâncias cáusticas.
- (D) esôfago de Barrett.
- (E) acalásia.

60

Assinale a afirmativa que melhor caracterize o perfil do paciente, cujo preparo para endoscopia digestiva baixa, seja apenas a ingestão de água e chás de 12 a 24 horas antes da hora marcada para o exame, supositório de glicerina e clister com soro fisiológico.

- (A) escolar com diarreia.
- (B) pré-escolar com diarreia.
- (C) pré-escolar sem diarreia.
- (D) lactente.
- (E) criança com imunodeficiência.