



# Fundação Oswaldo Cruz

Concurso Público 2010

**Tecnologista em Saúde Pública**

Prova Objetiva

Código da prova

**C3095**

**Uroginecologista**

## Instruções:

- ▶ Você deverá receber do fiscal:
  - a) um caderno com o enunciado das 60 (sessenta) questões, sem repetição ou falha;
  - b) uma folha destinada à marcação das suas respostas.
- ▶ Ao receber a folha de respostas, você deve:
  - a) conferir se seu nome, número de identidade, cargo e perfil estão corretos.
  - b) verificar se o cargo, perfil e código da prova que constam nesta capa são os mesmos da folha de respostas. **Caso haja alguma divergência, por favor comunique ao fiscal da sala.**
  - c) ler atentamente as instruções de preenchimento da folha de respostas;
  - d) assinar a folha de respostas.
- ▶ É sua responsabilidade preencher a folha de respostas, que será o único documento válido para a correção.
- ▶ Você deverá preencher a folha de respostas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
- ▶ Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro cometido por você.
- ▶ As questões da prova são identificadas pelo número que se situa acima do enunciado.
- ▶ O tempo disponível para essa prova é de **4 (quatro) horas**, incluindo o tempo para a marcação da folha de respostas.
- ▶ Durante as primeiras duas horas você não poderá deixar a sala de prova, salvo por motivo de força maior.
- ▶ Você somente poderá levar o caderno de questões caso permaneça em sala até 30 (trinta) minutos antes do tempo previsto para o término da prova.
- ▶ Ao terminar a prova, você deverá entregar a folha de respostas ao fiscal e assinar a lista de presença.



FUNDAÇÃO  
GETULIO VARGAS  
FGV PROJETOS

## Língua Portuguesa

Texto

### A era do sustentável

Provavelmente a única chance de salvar efetivamente as florestas tropicais e aqueles que lá vivem é encontrar uma forma para que elas possam coexistir com a lógica do mundo moderno, inclusive no Brasil. Ambientalistas do mundo inteiro reconhecem, no íntimo, que nesses países de enormes desigualdades sociais, onde estão as últimas florestas tropicais intactas, a pressão sobre os recursos naturais é grande e as formas de fiscalização das eventuais leis de proteção são muito frágeis.

Esta lógica significa uma função econômica para a floresta, explorando-a sem destruí-la e sem exaurir seus recursos naturais. É nesta linha que o uso sustentado das florestas ganhou grande força na consciência dos formadores de opinião que defendem o meio ambiente.

É também neste caminho que várias experiências e inúmeras pesquisas estão ferverilhando no momento, pelo Brasil e pelo mundo afora. Aqui, vemos o trabalho nas reservas extrativistas, o fornecimento de matéria-prima para a indústria de cosméticos e farmacêutica, a exploração de madeira certificada.

O conceito de uso sustentado dos recursos naturais vai muito além das florestas, para hoje estar incorporado a todas as atividades da humanidade. O reciclar, reutilizar, substituir e otimizar deixaram de ser “moda” para se tornarem obrigação de quem deseja garantir a qualidade das futuras gerações.

(Peter Milko)

#### 01

O pensamento nuclear do texto pode ser expresso do seguinte modo:

- (A) a exploração das florestas deve ser feita de maneira sustentável, sem que haja perdas futuras com a devastação da reserva natural.
- (B) para a salvação das florestas tropicais brasileiras, é indispensável definir uma estratégia que possa preservar ecossistemas, como a Mata Atlântica.
- (C) é indispensável, para a preservação das nossas florestas, a adoção de uma política preservacionista e do aprimoramento da fiscalização.
- (D) o Brasil precisa adotar urgentemente medidas que estejam no mesmo caminho das inúmeras pesquisas modernas.
- (E) o futuro de nossas florestas está dependente da adoção de medidas urgentes de preservação ambiental, que só pode ser obtida se for permitido um extrativismo limitado.

#### 02

No título do texto ocorre o seguinte fato gramatical:

- (A) a modificação de classe gramatical do vocábulo sustentável.
- (B) o uso indevido de uma forma verbal como substantivo.
- (C) a utilização de um substantivo por outro.
- (D) o emprego inadequado de um adjetivo.
- (E) um erro de concordância nominal.

#### 03

Como epígrafe deste texto aparece um pensamento de Lester Brown: “Uma sociedade sustentável é aquela que satisfaz suas necessidades, sem diminuir as perspectivas das gerações futuras”.

O segmento do texto que se relaciona mais de perto a esse pensamento é:

- (A) “Provavelmente a única chance de salvar efetivamente as florestas tropicais e aqueles que lá vivem é encontrar uma forma para que elas possam coexistir com a lógica do mundo moderno, inclusive no Brasil”.
- (B) “Ambientalistas do mundo inteiro reconhecem, no íntimo, que nesses países de enormes desigualdades sociais, onde estão as últimas florestas tropicais intactas, a pressão sobre os recursos naturais é grande e as formas de fiscalização das eventuais leis de proteção são muito frágeis”.
- (C) “Esta lógica significa uma função econômica para a floresta, explorando-a sem destruí-la e sem exaurir seus recursos naturais”.
- (D) “É nesta linha que o uso sustentado das florestas ganhou grande força na consciência dos formadores de opinião que defendem o meio ambiente”.
- (E) “O conceito de uso sustentado dos recursos naturais vai muito além das florestas, para hoje estar incorporado a todas as atividades da humanidade”.

#### 04

O texto é um editorial de uma revista intitulada *Horizonte geográfico*.

A respeito do conteúdo desse texto é correto afirmar que:

- (A) trata-se de uma opinião pessoal sustentada por pesquisadores de todo o mundo.
- (B) refere-se a uma sugestão de atuação na área ambiental para o governo brasileiro.
- (C) mostra um caminho moderno para o desenvolvimento econômico.
- (D) apresentado no primeiro parágrafo, o assunto é analisado nos dois seguintes.
- (E) ainda que argumentativo, o texto carece de uma conclusão.

#### 05

O título do texto fala da “era do sustentável”, referindo-se:

- (A) a um tempo distante, quando o equilíbrio ambiente / economia estará presente.
- (B) a um tempo passado, quando as florestas permaneciam intactas.
- (C) ao momento presente, quando a política da sustentabilidade é dominante.
- (D) à expressão de um desejo para a preservação das florestas tropicais.
- (E) a uma época imediatamente futura em que o meio ambiente ficará intacto.

#### 06

Assinale a alternativa que apresente o adjetivo que indica uma opinião do enunciador do texto.

- (A) Recursos naturais.
- (B) Reservas extrativistas.
- (C) Inúmeras pesquisas.
- (D) Futuras gerações.
- (E) Única chance.

**07**

“Provavelmente a única chance de salvar efetivamente as florestas tropicais e aqueles que lá vivem é encontrar uma forma para que elas possam coexistir com a lógica do mundo moderno, inclusive no Brasil. Ambientalistas do mundo inteiro reconhecem, no íntimo, que nesses países de enormes desigualdades sociais, onde estão as últimas florestas tropicais intactas, a pressão sobre os recursos naturais é grande e as formas de fiscalização das eventuais leis de proteção são muito frágeis”.

Nesse primeiro parágrafo do texto, o único termo sublinhado que tem o referente anterior corretamente identificado é:

- (A) aqueles = que lá vivem.
- (B) que = aqueles.
- (C) elas = florestas tropicais e aqueles que lá vivem.
- (D) nesses países = mundo inteiro.
- (E) onde = Brasil.

**08**

Assinale a alternativa que mostra uma modificação **inadequada** de um segmento por um outro equivalente semanticamente.

- (A) Lógica do mundo moderno = lógica mundial moderna.
- (B) Ambientalistas do mundo inteiro = ambientalistas de todo o mundo.
- (C) Leis de proteção = leis protecionistas.
- (D) Uso dos recursos naturais = uso natural dos recursos.
- (E) Para a indústria de cosméticos e farmacêutica = para a indústria farmacêutica e de cosméticos.

**09**

O segmento do texto que mostra um **erro** ortográfico é:

- (A) “Provavelmente a única chance de salvar efetivamente as florestas tropicais e aqueles que lá vivem é encontrar uma forma para que elas possam coexistir com a lógica do mundo moderno, inclusive no Brasil”.
- (B) “É também neste caminho que várias experiências e inúmeras pesquisas estão fervilhando no momento, pelo Brasil e pelo mundo afora”.
- (C) “Aqui, vemos o trabalho nas reservas extrativistas, o fornecimento de matéria-prima para a indústria de cosméticos e farmacêutica, a exploração de madeira certificada”.
- (D) “O conceito de uso sustentado dos recursos naturais vai muito além das florestas, para hoje estar incorporado a todas as atividades da humanidade”.
- (E) “O reciclar, reutilizar, substituir e otimizar deixaram de ser “moda” para se tornarem obrigação de quem deseja garantir a qualidade das futuras gerações”.

**10**

Assinale a alternativa que **não** mostra ideia ou forma aumentativa / superlativa.

- (A) “Provavelmente a única chance de salvar efetivamente as florestas tropicais...”.
- (B) “...nesses países de enormes desigualdades sociais...”.
- (C) “a pressão sobre os recursos naturais é grande”.
- (D) “as formas de fiscalização das eventuais leis de proteção são muito frágeis”.
- (E) “o uso sustentado das florestas ganhou grande força na consciência...”.

**Clínica médica****11**

Com relação ao novo Código de Ética Médica, em vigor a partir de 13 de abril de 2010, analise as afirmativas a seguir.

- I. O capítulo “Direito dos Médicos” estabelece em um de seus artigos que é direito do médico indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas cientificamente reconhecidas e respeitadas a legislação vigente.
- II. O capítulo “Responsabilidade Profissional” estabelece em um de seus artigos que por estar essa profissão inserida no contexto da sociedade como um todo, é vedado ao médico, independentemente dos ditames de sua consciência pessoal, deixar de realizar atos médicos permitidos por lei.
- III. O capítulo “Relação com Pacientes e Familiares” estabelece em um de seus artigos que é vedado ao médico desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de morte.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

**12**

A Lei n. 8.080 de 19 de setembro de 1990 estabelece que o conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, de administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público constituem o Sistema Único de Saúde – SUS.

A respeito da participação da iniciativa privada no SUS assinale a afirmativa correta.

- (A) É independente e não articulada ao sistema, como garantido na constituição brasileira.
- (B) É complementar e organizada de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- (C) Garante as necessidades de maior complexidade do sistema de saúde, sendo as de menor complexidade exclusivas do SUS.
- (D) É prevista apenas em situações emergenciais, definidas pelos conselhos de saúde.
- (E) É prevista apenas em situações emergenciais, definidas pelas secretarias estaduais de saúde.

**13**

Em estudos epidemiológicos de coorte, a medida de indivíduos que apresentam resposta positiva para o fenômeno estudado (uma doença, por exemplo) durante o período de observação, em relação ao total de indivíduos no início do experimento é denominado(a):

- (A) tendência central.
- (B) prevalência.
- (C) variância.
- (D) incidência.
- (E) desvio padrão.

**14**

Um paciente com insuficiência coronariana aguda e crise hipertensiva, foi medicado com nitroglicerina venosa em infusão contínua. Por se queixar de dispneia durante o tratamento, foi analisada a oximetria de pulso em um dos dedos da mão, que revelou saturação de O<sub>2</sub> de 86%. As extremidades permaneceram aquecidas, com o tempo de enchimento capilar normal. Com a administração de oxigênio sob máscara não houve mudança na medida da saturação de O<sub>2</sub>. O Rx de tórax teve laudo normal e a gasometria arterial revelou pH = 7,4; PaO<sub>2</sub> = 106 mmHg; pCO<sub>2</sub> = 34 mmHg; BE = -3.

O diagnóstico mais provável para explicar o baixo valor da saturação de O<sub>2</sub> na oximetria de pulso nesse caso é:

- (A) a presença de insuficiência ventricular esquerda sistólica.
- (B) a presença de embolia pulmonar.
- (C) a presença de insuficiência ventricular direita.
- (D) a presença de insuficiência ventricular esquerda diastólica.
- (E) a presença de metahemoglobinemia.

**15**

Estudos farmacológicos e clínicos permitem identificar drogas que podem ser usadas em dose única diária com vantagens em relação aos esquemas de múltiplas doses ao dia. A esse respeito, analise as afirmativas a seguir.

- I. A levofloxacina tem eficácia comprovada quando prescrita uma vez ao dia em casos de pneumonia comunitária grave.
- II. A gentamicina apresenta menor nefrotoxicidade em dose única diária mesmo em casos de sepsis urinária grave.
- III. A daptomicina tem eficácia comprovada em dose única diária em casos de infecção cutânea grave.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

**16**

Dentre as diferentes formas de reação inflamatória destaque a forma granulomatosa, tipicamente presente na tuberculose.

Assinale a alternativa que apresente somente doenças que podem evoluir com reação inflamatória do tipo granulomatosa.

- (A) Sarcoidose, hanseníase, febre da arranhadura do gato
- (B) Brucelose, hanseníase, difteria
- (C) Hanseníase, brucelose, meningococcemia
- (D) Sarcoidose, linfogranuloma inguinal, meningococcemia
- (E) Sarcoidose, brucelose, difteria

**17**

O baço pode sofrer processo patológico que resulte na diminuição de seu volume. Assinale a alternativa que apresente a doença que pode ocorrer o fenômeno de redução do volume do baço por uma circunstância patológica.

- (A) Malária crônica
- (B) Anemia megaloblástica
- (C) Policitemia vera
- (D) Anemia falciforme
- (E) Esquistossomose

**18**

O diagnóstico de Coagulação Intravascular Disseminada (CID) é de caráter clínico com suporte laboratorial. Assinale a alternativa que contenha os principais exames laboratoriais recomendados para o diagnóstico de CID.

- (A) Tempo de protrombina, tempo de sangramento, tempo parcial de tromboplastina e produto de degradação da fibrina.
- (B) Tempo de protrombina, tempo de sangramento, produto de degradação da fibrina, contagem de plaquetas.
- (C) Tempo de protrombina, fibrinogênio sérico, produto de degradação da fibrina e d-dímero.
- (D) Tempo de protrombina, contagem de plaquetas, fibrinogênio sérico, d-dímero ou produto de degradação da fibrina.
- (E) Tempo parcial de tromboplastina, tempo de sangramento, fibrinogênio, produtos de degradação da fibrina.

**19**

No resultado de um hemograma, os valores do número de hemácias (em milhões/mm<sup>3</sup>), hemoglobina (em g/dL) e do hematócrito (em %) foram respectivamente 3,2; 9,0 e 26. Assinale a alternativa que contenha os valores respectivamente relacionados ao VCM (volume corpuscular médio em fl), HCM (hemoglobina corpuscular média em pg) e CHCM (concentração de hemoglobina corpuscular média em %).

- (A) VCM 78,0 HCM 30,3 CHCM 32,3
- (B) VCM 81,2 HCM 28,1 CHCM 34,6
- (C) VCM 82,0 HCM 30,3 CHCM 28,4
- (D) VCM 78,0 HCM 28,1 CHCM 32,3
- (E) VCM 82,0 HCM 29,2 CHCM 32,3

**20**

Assinale a alternativa em que o Teste de Coombs Direto tem a sua maior utilidade diagnóstica.

- (A) Nos pacientes antes de receber qualquer transfusão sanguínea.
- (B) Na pesquisa de anticorpos naturais do fator Rh.
- (C) Na anemia hemolítica auto-imune.
- (D) Nas provas de compatibilidade ou provas cruzadas.
- (E) Na avaliação materna no período pré-natal.

**21**

Em pacientes no Setor de Emergência hospitalar, com dispnéia de origem cardíaca, assinale a alternativa que apresente exame complementar com a melhor sensibilidade e especificidade para o aumento da pressão diastólica final (Pd2) do ventrículo esquerdo.

- (A) Eletrocardiograma (ECG).
- (B) Desidrogenase láctica (DLH).
- (C) Transaminase oxalacética (TGO).
- (D) Creatinofosfoquinase (CPK).
- (E) Peptídeo Natriurético Cerebral (BNP).

**22**

As alternativas a seguir incluem uma das causas de crise de dor abdominal de origem metabólica, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Diabetes.
- (B) Uremia.
- (C) Porfiria.
- (D) Anemia falciforme.
- (E) hiperlipidemia.

**23**

O resultado de uma hemocultura em paciente com síndrome séptica em período pós-operatório de cirurgia abdominal revelou a presença de *Escherichia Coli* produtora de beta-lactamase de espectro estendido (ESBL).

Em relação às bactérias gram-negativas, produtoras de ESBL, analise as afirmativas a seguir.

- I. As beta-lactamases de espectro estendido são atualmente observadas apenas em bactérias gram-negativas identificadas em pacientes em ambiente hospitalar definindo a infecção como de origem hospitalar.
- II. As beta-lactamases de espectro estendido não interferem com a sensibilidade bacteriana a cefalosporinas de terceira geração como a ceftazidima, que pode assim ser habitualmente indicada em infecções por essas bactérias.
- III. As beta-lactamases de espectro estendido habitualmente não interferem com a sensibilidade bacteriana a antibióticos carbapenêmicos, que podem assim serem habitualmente indicados em infecções por essas bactérias.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

**24**

Em pacientes com dor abdominal por inflamação peritoneal, a intensidade da dor depende do tipo e da quantidade do material que entra em contacto com a superfície peritoneal para um dado intervalo de tempo.

Considerando um pequeno e mesmo volume de material, de exposição súbita, de curta evolução, assinale a alternativa em que se encontra o material capaz de provocar maior intensidade de dor.

- (A) fezes neutras contaminadas.
- (B) sangue.
- (C) urina.
- (D) doença inflamatória pélvica bacteriana.
- (E) suco ácido gástrico.

**25**

Em exame de hematoscopia realizado em paciente com anemia, o esfregaço periférico evidenciou a presença de hemácias do tipo em capacete e esquizócitos.

Assinale a alternativa que indique a forma de anemia que apresenta esses achados como sua característica diagnóstica mais importante.

- (A) Anemia megaloblástica.
- (B) Anemia hemolítica microangiopática.
- (C) Anemia por doença crônica inflamatória.
- (D) Anemia ferropriva após reposição de ferro.
- (E) Anemia falciforme.

**26**

Assinale a alternativa que indique teste de função pulmonar que é aferido pela espirometria e tem sua maior utilidade na avaliação de obstrução de vias aéreas.

- (A) Capacidade Pulmonar Total.
- (B) Volume Residual.
- (C) Volume Expiratório Final em 1 segundo.
- (D) Capacidade Residual Funcional.
- (E) Volume de Reserva Expiratória.

**27**

A retossigmoidoscopia e a colonoscopia são exames que apresentam, entre suas indicações, a possibilidade de identificação e retirada de lesões patológicas associadas ao desenvolvimento de um futuro câncer colo-retal.

Assinale a alternativa que contenha a lesão patológica com maior potencial para o desenvolvimento de câncer colo-retal.

- (A) pólipos adenomatosos vilosos.
- (B) pólipos hiperplásicos.
- (C) pólipos adenomatosos tubulares.
- (D) pólipos associados à colite ulcerativa.
- (E) pólipos juvenis esporádicos.

**28**

Um importante conceito epidemiológico é o valor preditivo de um teste. A respeito do valor preditivo, analise as afirmativas a seguir.

- I. O valor preditivo negativo é a probabilidade de não ter a doença quando o resultado do teste é negativo (normal) e depende da sensibilidade do teste e será melhor quanto mais sensível for o teste.
- II. O valor preditivo positivo é a probabilidade de doença em paciente com o resultado de um teste positivo (anormal) e não depende da prevalência da doença, sendo essa uma de suas vantagens.
- III. O valor preditivo negativo é a probabilidade de não ter a doença quando o resultado do teste é negativo (normal) e depende da prevalência da doença.

Assinale:

- (A) se somente a afirmativa I estiver correta.
- (B) se somente a afirmativa II estiver correta.
- (C) se somente a afirmativa III estiver correta.
- (D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
- (E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

**29**

Pacientes que apresentam episódios de fenômenos trombóticos arteriais ou venosos podem necessitar de investigação para a hipótese de serem portadores de trombofilias.

As alternativas a seguir apresentam testes laboratoriais indicados para o diagnóstico das trombofilias, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Anticorpo anti-cardiolipina IgG.
- (B) Proteína S.
- (C) Anticoagulante lúpico.
- (D) Atividade anti-Xa.
- (E) Anti-trombina III.

**30**

As alternativas a seguir indicam medicações que são atualmente recomendadas para o tratamento farmacológico no estado de mal epilético ou status epilepticus, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Midazolam.
- (B) Fenobarbital.
- (C) Diazepam.
- (D) Carbamazepina.
- (E) Fenitoína.

## Uroginecologista

**31**

Com relação às drogas para o tratamento da bexiga hiperativa, assinale a afirmativa correta.

- (A) A oxibutinina tem ação antimuscarínica e relaxante direta da musculatura lisa.
- (B) A tolterodina tem ação beta-agonista, consequentemente com menores efeitos colaterais.
- (C) A toxina botulínica A provoca a liberação da acetilcolina na junção colinérgica pré-sináptica.
- (D) A imipramina tem vários mecanismos de ação, aumentando o poder de contração vesical.
- (E) A darifenacina tem ação relaxante musculotrópica.

**32**

Dentre os *slings* utilizados para o tratamento da incontinência urinária de esforço, assinale a alternativa que apresente os que estão mais associados a erosão uretral ou vaginal.

- (A) de fásia de reto abdominal.
- (B) de parede vaginal.
- (C) de fásia cadavérica.
- (D) de submucosa intestinal suína.
- (E) sintéticos.

**33**

Assinale a alternativa que apresente as condições clínicas em que existe melhor indicação para utilizar *slings* transobturatórios.

- (A) Mulheres diabéticas.
- (B) Mulheres muito magras.
- (C) Mulheres com cirurgias pélvicas anteriores.
- (D) Mulheres com incontinência urinária mista.
- (E) Mulheres com vários partos vaginais anteriores.

**34**

As fístulas vesicovaginais podem ser abordadas cirurgicamente por via vaginal ou abdominal.

Assinale a alternativa que indique ser a via vaginal a melhor opção cirúrgica:

- (A) após radioterapia pélvica.
- (B) orifício único e abaixo da barra interureteral.
- (C) fístulas recidivadas.
- (D) quando existe fístula ureteral associada.
- (E) quando o volume de drenagem da fístula é muito grande.

**35**

No tratamento das fístulas vesicovaginais pode ser feita a eletrocoagulação endoscópica do orifício fistuloso.

Assinale a alternativa que indique a situação em que pode ser realizado este procedimento.

- (A) fístulas com orifícios maiores que 5 mm.
- (B) fístulas após radioterapia.
- (C) fístulas recidivadas.
- (D) fístulas com orifícios menores que 3 mm.
- (E) não deve ser tentada em qualquer situação, devido aos elevados riscos do procedimento.

**36**

Após tratamento para incontinência urinária de esforço na mulher, com *sling*, pode ocorrer obstrução urinária.

A esse respeito, a urodinâmica não é um bom exame para este diagnóstico porque:

- (A) o padrão urodinâmico feminino considerado normal é muito variável.
- (B) é comum existir bexiga hiperativa concomitante.
- (C) a história e o exame físico são suficientes para o diagnóstico de obstrução.
- (D) a cistoscopia é o melhor exame para diagnóstico de obstrução.
- (E) existe dificuldade para cateterismo uretral em mulheres obstruídas dificultando a realização do exame.

**37**

Assinale a alternativa que completa corretamente o fragmento a seguir.

A *injeção intravesical de toxina botulínica requer atenção especial em pacientes com .....*

- (A) cistite intersticial.
- (B) cistite actínica.
- (C) hipertensão arterial com o uso de vários anti-hipertensivos.
- (D) miastenia gravis.
- (E) bexiga hiperativa neurogênica.

**38**

O prolapso genital é provavelmente multifatorial.

As alternativas a seguir apresentam fatores de risco que apresentam comprovação científica de causa-efeito, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Menopausa.
- (B) Parto vaginal.
- (C) Aumento da massa corporal.
- (D) Envelhecimento.
- (E) Histerectomia.

**39**

Assinale a alternativa que apresente a técnica cirúrgica, empregada no tratamento dos prolapso genitais, que está em desuso devido à demora na recuperação do paciente e ao elevado índice de recorrências.

- (A) Sutura da fásia do anel perivesical, associada a colporrafia anterior.
- (B) Promonto fixação da cúpula vaginal.
- (C) Miorrafia dos elevadores do ânus.
- (D) Colpopexia transcoccígea.
- (E) Fixação da cúpula vaginal ao ligamento sacroespinhoso.

**40**

Assinale a alternativa que apresente o distúrbio sexual feminino que está mais frequentemente associado a uma causa orgânica.

- (A) Vaginismo.
- (B) Dispareunia.
- (C) Aversão sexual.
- (D) Redução do desejo sexual.
- (E) Anorgasmia.

**41**

Assinale a alternativa que completa corretamente o trecho a seguir.

*A complacência vesical pode estar reduzida no estudo urodinâmico de pacientes com .....*

- (A) bexiga flácida.
- (B) mielomeningocele.
- (C) uso prolongado de parassimpaticolíticos.
- (D) uso prolongado de cateter vesical de demora.
- (E) enurese secundária.

**42**

Durante a cistometria pode ocorrer um aumento da pressão vesical por redução da complacência ou por contração vesical involuntária.

Assinale a alternativa que indique a manobra correta que pode ser feita para diagnosticar o aumento da pressão vesical.

- (A) Mandar o paciente tossir e observar a pressão do detrusor.
- (B) Mandar o paciente urinar e analisar o fluxo/pressão.
- (C) Esvaziar a bexiga e reiniciar o enchimento vesical.
- (D) Medir a pressão retal e compará-la à vesical.
- (E) Interromper a infusão do soro e observar o nível pressórico do detrusor.

**43**

O cateter vesical para medir a pressão vesical no estudo urodinâmico, deve ter o seguinte calibre:

- (A) maior que 20 CH.
- (B) maior que 12 CH.
- (C) entre 8 e 12 CH.
- (D) entre 4 e 7 CH.
- (E) menor que 4 CH.

**44**

O estudo urodinâmico de uma mulher com suspeita de cistite intersticial mostra capacidade cistométrica máxima de 420 mL e presença de contrações não inibidas.

A esse respeito é correto afirmar que:

- (A) a associação com a cistoscopia confirmará a hipótese de cistite intersticial.
- (B) os dados urodinâmicos excluem a possibilidade de cistite intersticial.
- (C) deve-se repetir a urodinâmica após a paciente estar em uso de anti-muscarínicos controlando as contrações não inibidas.
- (D) só os dados da urodinâmica, associados à história clínica, confirmam o diagnóstico de cistite intersticial.
- (E) é necessária a biópsia vesical para confirmação do diagnóstico de cistite intersticial.

**45**

A vídeourodinâmica está contra-indicada em mulheres:

- (A) grávidas
- (B) com incontinência pós operatória.
- (C) com prolapso genitais severos.
- (D) com suspeita de divertículo uretral.
- (E) com bexiga hiperativa idiopática.

**46**

Assinale a alternativa que apresente uma característica da chamada incontinência de esforço oculta.

- (A) Perda de urina apenas em ortostase.
- (B) A paciente informa ter incontinência e a mesma não ocorre no estudo urodinâmico.
- (C) A incontinência só ocorre após a redução do prolapso genital.
- (D) A incontinência só ocorre com a paciente tossindo e em ortostase.
- (E) A incontinência só ocorre após a retirada do espelho vaginal.

**47**

Nas mulheres com incontinência urinária de esforço, assinale a afirmativa **incorreta**.

- (A) A fisioterapia pélvica pode melhorar 40 a 50% das pacientes.
- (B) A incontinência de esforço associada à prolapso genital severo, sempre deve ser tratada cirurgicamente.
- (C) Aquelas mulheres com incontinência de esforço grave devem ser tratadas com cirurgia imediata.
- (D) Mulheres com boa musculatura pélvica respondem mal à fisioterapia.
- (E) Mulheres com musculatura pélvica fraca devem ser operadas imediatamente.

**48**

A utilização de cirurgia retro-púbicas aberta para incontinência urinária feminina pode ser seguida por complicações.

Assinale a alternativa que apresenta a complicação exclusiva da cirurgia de Marshall-Marchetti-Krantz.

- (A) Prolapso genital.
- (B) Bexiga hiperativa.
- (C) Lesão ureteral.
- (D) Obstrução urinária.
- (E) Osteíte púbica.

**49**

O diafragma pélvico é formado pelos músculos:

- (A) elevador do ânus e transverso.
- (B) pubococígeos, íleococígeos e coccígeos.
- (C) pubococígeos e íleococígeos.
- (D) piriformes e coccígeos.
- (E) piriformes, glúteos e íleococígeos.

**50**

Em relação à classificação anatômica dos prolapso pélvicos assinale a afirmativa **incorreta**.

- (A) Prolapso uterino é associado ao compartimento vaginal médio.
- (B) Nos prolapso de compartimento anterior existem dois tipos de cistocele, além da combinação delas.
- (C) Nas enteroceles, as posteriores são mais comuns.
- (D) As retoceles são divididas em altas ou baixas.
- (E) As enteroceles pós operatórias podem acompanhar as retoceles.

**51**

Assinale a alternativa que indique o procedimento cirúrgico que está comumente associado à dispareunia.

- (A) Colporrafia anterior.
- (B) Colpopectia sacra.
- (C) Colporrafia posterior.
- (D) Suspensão íleocóccigea.
- (E) Suspensão do ligamento úterosacro.

**52**

Em relação aos *slings tension free*, assinale a afirmativa **incorreta**.

- (A) No passado, os *slings* eram colocados no colo vesical.
- (B) A utilização de telas de polipropileno monofilamentar resulta na melhor incorporação de tecido fibroso.
- (C) A tela deve ser apoiada na porção média da uretra.
- (D) O procedimento pode ser realizado apenas com anestesia local.
- (E) as mulheres idosas apresentam menor taxa de continência do que as mais jovens, com o uso de *slings* sintéticos.

**53**

Assinale a alternativa que indique a complicação exclusiva dos *slings* transobturatórios.

- (A) Perfuração uretral.
- (B) Dor na perna.
- (C) Erosão.
- (D) Hemorragia.
- (E) Disfunção miccional pós operatória.

**54**

Nas pacientes em uso contínuo de cateter vesical de demora, assinale a alternativa que indique o procedimento recomendado.

- (A) Colocar desinfetante na bolsa coletora.
- (B) Usar antibióticos profilaticamente.
- (C) Lavar a genitália frequentemente.
- (D) Esvaziar a bolsa coletora a cada 8 horas.
- (E) Colocar antimicrobianos no meato uretral.

**55**

Assinale a alternativa que indique a causa mais frequente de fístula vesico-uterina.

- (A) Cesareana.
- (B) Cateterismo vesical traumático.
- (C) Parto vaginal após primeiro parto por cesareana.
- (D) Migração de dispositivo intra-uterino (DIU).
- (E) Rompimento uterino no trabalho de parto.

**56**

As alternativas a seguir apresentam complicações que mulheres com divertículo de uretra podem apresentar, **à exceção de uma**. Assinale-a.

- (A) Aparecimento de carcinoma no divertículo.
- (B) Infecção urinária recorrente.
- (C) Litíase vesical.
- (D) Dispareunia.
- (E) Gotejamento pós miccional.

**57**

Com o envelhecimento ocorrem modificações no aparelho urinário da mulher.

A esse respeito, assinale a afirmativa correta.

- (A) A excreção de líquidos ingeridos é maior durante a noite.
- (B) A capacidade vesical fica menor.
- (C) Passa a haver maior capacidade para adiar a micção.
- (D) É menos comum ocorrerem contrações não inibidas.
- (E) A contração do esfíncter externo (rabdoesfíncter) torna-se mais forte.

**58**

Em relação ao estudo urodinâmico, assinale a afirmativa **incorreta**.

- (A) Na fluxometria o paciente deverá urinar pelo menos 150mL para o exame ser considerado confiável.
- (B) Na cistometria, a velocidade de infusão alta poderá produzir alterações pressóricas irregulares (artefatos).
- (C) A avaliação cistométrica não sofre interferência pela presença de refluxo vesicoureteral.
- (D) A determinação da pressão de perda pela manobra de Valsalva deve ser avaliada à partir de pelo menos 150 mL de volume infundido.
- (E) Em até 40% dos homens poderá ocorrer uma diferença de até 2 mL/s no fluxo máximo, entre diferentes micções.

**59**

Assinale a alternativa que indique o melhor tratamento a ser utilizado em uma paciente com refluxo vesicoureteral severo e bexiga de capacidade muito pequena.

- (A) Uso de drogas parassimpaticolíticas.
- (B) Injeção vesical de toxina botulínica.
- (C) Ureterossigmoidostomia.
- (D) Neobexiga ileal.
- (E) Ampliação vesical com reimplante ureteral.

**60**

Em relação às fístulas uretero-vaginais, assinale a afirmativa **incorreta**.

- (A) A etiologia mais frequente são as histerectomias.
- (B) A cirurgia aberta, imediata ou após 6 meses, é a única conduta eficaz.
- (C) Ocorre micção normal, associada à incontinência total.
- (D) O diagnóstico pode ser feito pela urografia excretora ou pela pielografia retrógrada.
- (E) Outras etiologias para as fístulas são o trauma pélvico e após radioterapia.