

MÉDICO DO TRABALHO

16 - Entre as medidas específicas da profilaxia medicamentosa para o acidentado biologicamente por provável vírus HIV, podemos destacar que o tempo ideal de início da administração de drogas anti-retrovirais é de até:

- A) 4 horas, devendo ser iniciado no máximo até 48 horas após o acidente
- B) 2 horas, devendo ser iniciado no máximo até 72 horas após o acidente
- C) 6 horas, devendo ser iniciado no máximo até 36 horas após o acidente
- D) 8 horas, devendo ser iniciado no máximo até 24 horas após o acidente

17 - A Norma Regulamentadora 17 – Ergonomia - estabelece parâmetros que permitam:

- A) adaptar as características dos trabalhadores às condições de trabalho
- B) adaptar as condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores
- C) garantir um desempenho eficiente do trabalhador à empresa
- D) proporcionar saúde ao trabalhador através da redução da insalubridade

18 - O mesotelioma é um câncer que pode ser considerado um sinalizador de exposição ambiental e ocupacional ao:

- A) vanádio
- B) chumbo
- C) níquel
- D) amianto

19 - Trabalhador com 41 anos, masculino. Sua atividade ocupacional compreendia o acompanhamento do processo das linhas de produção. Há 1 ano passou a ser encarregado de três linhas. Refere a existência de ritmo intenso, falta de autonomia, falta de reconhecimento em relação ao desempenho. Iniciou quadro psíquico manifestado após mudanças organizacionais na empresa, que automatizou o processo produtivo e demitiu trabalhadores. O processo de adoecimento iniciou-se por meio de sonhos com o serviço e alterações do sono. O paciente relatava sentir-se "perturbado", tenso pela pressão por produção, aquém das suas possibilidades. Diante deste quadro, pode-se diagnosticar:

- A) Estresse pós traumático.
- B) Neurastenia
- C) Psicose laboral
- D) Depressão paranóide

20 - Algumas substâncias químicas interferem na síntese do heme da hemoglobina, por interferência em sistemas enzimáticos como a ALA-desidratase, a coproporfirinogenase e a heme-sintetase. O conjunto de substâncias tóxicas, presentes em ambientes de trabalho, que podem interferir na síntese e na biotransformação do heme, é:

- A) benzeno, organoclorado e organofosforado
- B) chumbo, hexaclorobenzeno e cloreto de vinila
- C) cádmio, fosgênio e alumínio
- D) níquel, cromo e mercúrio

21 - O manganês, o metanol e o dissulfeto de carbono nas exposições ocupacionais podem ser responsáveis pela seguinte doença neurológica:

- A) Ataxia cerebelosa
- B) Transtorno do nervo trigêmeo
- C) Parkinsonismo secundário
- D) Neuropatia periférica

22 - A síndrome do túnel do carpo, nas lesões de esforço repetitivo, é definida pela compressão do:

- A) tendão do polegar
- B) nervo mediano na altura do punho
- C) nervo radial na raiz do polegar
- D) tendão flexor da região palmar

23 - A asma brônquica é uma doença prevalente em nosso meio. Existem vários casos de asma ocupacional ainda sem diagnóstico e que permanecem em exposições ocupacionais adversas agravando o quadro clínico. O método, de baixo custo e objetivo para realizar o diagnóstico de asma ocupacional ou relacionada ao trabalho é:

- A) Radiografia de tórax
- B) Espirometria seriada
- C) Dosagem de IgE
- D) Medida seriada de pico de fluxo

24 - Em uma empresa terceirizada, os dados obtidos nos exames médicos deverão ser registrados em prontuário clínico individual, que ficará sob a responsabilidade do médico-coordenador do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO. Em havendo substituição do médico, os arquivos deverão ser:

- A) destruídos após análise do RH
- B) entregues ao RH da próxima empresa contratada
- C) guardados pelo médico que saiu da empresa
- D) transferidos ao médico sucessor

25 - A dermatite de contato presente entre trabalhadores da construção civil causada pelo contato com cimento, pode ser devido à presença de:

- A) bicromato de potássio
- B) calcário
- C) bicromato de sódio
- D) fenotiazinas

26 - O angiossarcoma de fígado pode ser considerado de origem ocupacional quando existe exposição ao:

- A) cloreto de vinila
- B) álcool isopropílico
- C) arsênico
- D) cádmio

27 - Processos produtivos com exposição a substâncias tais como pentaclorofenol, dinitrofenol, hexaclorociclohexano (BHC), podem estar relacionadas à presença de:

- A) câncer de cérebro
- B) liposarcoma
- C) mielodisplasia
- D) mieloma

28 - Trabalhador com 34 anos, masculino, bancário. Durante nove anos trabalhou na compensação de cheques quando desenvolveu quadro clínico de LER/DORT. Ficou afastado por dois anos. Ao retornar ao trabalho foi transferido, à sua revelia, para Agência Bancária, na função de caixa, distante de sua residência. A chefia da agência pressionava-o para atendimento rápido aos clientes. Referiu como fontes de grande tensão: transferência para outra agência sem consulta prévia, pressões intensas por parte da gerência, medo da perda do emprego em razão do processo de fechamento de agências. Após um ano e quatro meses como caixa, apresentou quadro clínico de gastrite. Sentia-se perseguido e com "medo de tudo", tendo sido demitido, em outubro, por abandono de emprego. Sua fala ilustra

este ponto: "Comecei a sentir medo de tudo, muita cobrança no serviço, saía de lá com o pescoço duro e não conseguia dormir. Não conseguia ir ao banco. Parecia que alguém estava me vigiando, qualquer coisa me assustava, o sono era agitado e fiquei muito agressivo com meu filho mais velho". Meses depois o trabalhador foi internado pela mãe, pois o filho estava em casa "parado", isolado, sem atender nem aos telefonemas. Diante deste quadro o diagnóstico pode ser de :

- A) Psicose orgânica
- B) Síndrome de fadiga
- C) Neurastenia
- D) Depressão paranóide

29 - Segundo a NR 9, da Portaria nº 3.214, do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, as ações para minimizar a probabilidade de que as exposições a agentes ambientais ultrapassem os limites de exposição devem incluir:

- A) o controle médico e a informação aos trabalhadores
- B) a informação e o tratamento aos trabalhadores
- C) a avaliação ambiental e o sigilo profissional
- D) o monitoramento periódico da vigilância e o uso de EPIs

30 - A atividade ou situação de exposição que possui risco considerado para o aparecimento de carcinoma de bexiga é:

- A) limpeza de cadim em fornos
- B) catador de lixo urbano
- C) emissões de forno de coque
- D) inalação de poeiras orgânicas

31 - A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA - tem como objetivo:

- A) o desenvolvimento de serviços de engenharia de segurança e em medicina do trabalho
- B) a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho
- C) a eliminação ou neutralização da insalubridade nos locais de trabalho
- D) a adaptação das condições de trabalho às características dos trabalhadores

32 - Tuberculose pode ser considerada uma doença relacionada ao trabalho em diferentes condições de exposição. A condição de trabalho que favorece a exposição ao *M. tuberculosis* é :

- A) laboratórios de biologia
- B) mineração
- C) fábrica de baterias
- D) indústria metal-mecânica

33 - O exercício de trabalho em condições de insalubridade, segundo a NR 15, assegura ao trabalhador a percepção de adicional, incidente sobre o salário mínimo da região, equivalente a:

- A) 30%, para insalubridade de grau máximo
- B) 40%, para insalubridade de grau mínimo
- C) 20%, para insalubridade de grau médio
- D) 10%, para insalubridade de grau mediano

34 - Segundo o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA – a adoção de medidas de proteção deverá seguir a seguinte sequência:

- A) caráter administrativo → proteção coletiva
- B) caráter de organização do trabalho → caráter administrativo
- C) proteção individual → proteção coletiva
- D) caráter de organização do trabalho → proteção individual

35 - A exposição aos organofosforados pode resultar em:

- A) aumento de acetilcolina e inibição da colinesterase
- B) redução da acetilcolina e inibição da colinesterase
- C) aumento da acetilcolina e estimulação da colinesterase
- D) redução da acetilcolina e estimulação da colinesterase

36 - As propostas relativas ao meio ambiente de trabalho da Convenção 148 - Organização Internacional do Trabalho – dizem respeito ao ruído e vibrações e à contaminação:

- A) do ar
- B) biológica
- C) do solo
- D) da água

37 - O principal hidrocarboneto alifático, alvo da vigilância em saúde do trabalhador, principalmente nos centros urbanos, é:

- A) a benzina
- B) o xileno
- C) a gasolina
- D) o tolueno

38 - A perda auditiva induzida por ruídos caracteriza-se por ser:

- A) sempre neurosensorial, por comprometer as células de órgão de Córti
- B) quase sempre unilateral
- C) sempre reversível, quando instalada precocemente

D) provocador de perdas profundas, acima de 90 dB (NA) nas frequências baixas

39 - A doença que pode ser considerada do trabalho em pessoas expostas aos ambientes úmidos e com imersões de parte do corpo em água é a:

- A) Leptospirose
- B) Brucelose
- C) Psoríase
- D) Candidíase

40 - Após exposição ocupacional a material biológico, para o profissional de saúde exposto, previamente vacinado, com resposta vacinal conhecida e adequada e, além disso, sabendo-se que o paciente fonte é positivo para HBsAg, a recomendação para profilaxia de hepatite B é:

- A) nenhuma medida específica
- B) uma dose de vacina contra hepatite B
- C) iniciar tratamento para hepatite B
- D) iniciar quimioprofilaxia contra hepatite B