

**INDEC - CONCURSOS PÚBLICOS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ**  
**MÉDICO SMS E - DERMATOLOGIA**  
**INSTRUÇÕES**

NÃO ABRA O CADERNO DE PROVAS ANTES DE RECEBER ORDEM PARA FAZÊ-LO

01. Este caderno de provas contém 40 questões de múltipla escolha.
02. Para cada questão existe apenas uma resposta correta.
03. Leia atentamente a questão no caderno e escolha a alternativa que julgar correta.
04. Marque as respostas no gabarito conforme instruções constantes no mesmo com caneta (*azul ou preta*).
05. As respostas a lápis ou rasuras serão consideradas erradas.
06. Faça a sua prova em silêncio, para que todos façam também.
07. Não será permitida qualquer espécie de consulta.
08. Não será fornecido outro caderno de provas, exceto no caso do item 12.
09. O tempo de duração da prova é aquele anotado na lousa.
10. Coloque o seu nome, assinatura e o cargo para qual está fazendo o concurso.
11. Coloque a data da realização do mesmo e o número de sua inscrição.
12. Verifique se a prova contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, falta de questões etc. Encontrando falhas, levante a mão. O fiscal *Atenderá você e trocará o seu caderno.*

NOME: \_\_\_\_\_

CARGO: \_\_\_\_\_ INSCR. Nº: \_\_\_\_\_

ASSINATURA: \_\_\_\_\_ DATA: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

R.G. Nº: \_\_\_\_\_ DATA NASC.: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

SALA: \_\_\_\_\_ LOCAL: \_\_\_\_\_

## MÉDICO SMS E – DERMATOLOGIA

1. A espectinomicina tem ação bacteriostática em:  
a) ( ) cancro mole  
b) ( ) gonorréia  
c) ( ) Sífilis  
d) ( ) linfogranuloma venéreo
2. A dermatose que mais frequentemente se relaciona com Morbus Fungóide é:  
a) ( ) psoríase  
b) ( ) alopecia mucinosa  
c) ( ) Pitiríase rubra pilar  
d) ( ) Pitiríase Rósea de Gilbert
3. O Nevo de Spitz deve ser enquadrado como:  
a) ( ) afecção cancerizável  
b) ( ) neoplasia imperfeita ( pseudo – câncer)  
c) ( ) carcinoma in situ  
d) ( ) estado cancerígeno
4. O líquem escleroso e atrófico da genitália é observado:  
a) ( ) igualmente em pretos e brancos  
b) ( ) 10 vezes mais em mulheres que em homens  
c) ( ) 3 vezes mais em pretos que em brancos  
d) ( ) 3 vezes mais em mulheres que em homens
5. O epitelioma basocelular tem origem em:  
a) ( ) epitélio glandular  
b) ( ) células névicas  
c) ( ) epitélio de revestimento  
d) ( ) fibroblastos
6. A doença com predominância significativa em pacientes do sexo masculino é:  
a) ( ) dermatomiosite  
b) ( ) periarterite nodosa  
c) ( ) lúpus eritematoso sistêmico  
d) ( ) esclerodermia sistêmica
7. A terapêutica sistêmica mais eficiente para a cromomicose é:  
a) ( ) iodato de potássio    b) ( ) griseofulvina    c) ( ) anfotericina B    d) ( ) 5 fluorocitosina
8. Lesões no palato, ulcero-vegetantes, mamelonadas, às vezes separadas por dois sulcos que se cruzam, conhecidos como Cruz de Escomel, ocorrem em:  
a) ( ) papilomatose florida oral  
b) ( ) glossite losângica mediana  
c) ( ) Granulomatose de Wegener  
d) ( ) leishmaniose tegumentar americana
9. As Células de Stamberg-Reed estão presentes em:  
a) ( ) Doença de Jodgkin    b) ( ) Sarcoma de Kaposi    c) ( ) linfoma de Welss    d) ( ) Micose Fungóide
10. A idiosincrasia é manifestação:  
a) ( ) alérgica    b) ( ) não-alérgica    c) ( ) colateral    d) ( ) auto-imune
11. No diagnóstico histológico da sífilis terciária, tem importância a presença de:  
a) ( ) fibroblastos    b) ( ) treponemas    c) ( ) eosinófilos    d) ( ) plasmócitos
12. Na macroscopia de uma cultura de dermatófitos, observamos colônias creme, granuladas, com aspecto de “pó-de-arroz” e com verso castanho – avermelhado (ferrugem) .Esta descrição é compatível com :  
a) ( ) Microsporum gypseum    c) ( ) Trichopyton tonsurans  
b) ( ) Trichopyton mentagrophytes var. granulare    d) ( ) Microsporum canis
13. A ficomicose subcutânea (zigomicose) é encontrada preferencialmente em:  
a) ( ) pescoço e cabeça    c) ( ) pés e mãos  
b) ( ) axilas e regiões ínguino-crurais    d) ( ) regiões glúteas e coxas
14. Na dermatomiosite, os exames complementares mais específicos são:  
a) ( ) aldolase e CPK    c) ( ) LDH e CPK  
b) ( ) aldolase e transaminases    d) ( ) CPK e transaminases

15. No exame citológico de dermatite herpetiforme, encontramos:  
a) ( ) células inflamatórias com predomínio de eosinófilos  
b) ( ) células inflamatórias com predomínio de neutrófilos  
c) ( ) neutrófilos e, acidentalmente, células acantolíticas  
d) ( ) queratinócitos segregados e células inflamatórias, neutrófilos e eosinófilos
16. Manchas brancas marfínicas, reticuladas ou arboriformes, localizadas em cavidade oral, solitária ou concomitantes com lesões cutâneas, ocorrem em:  
a) ( ) leucoplasia  
b) ( ) sífilis secundária  
c) ( ) líquem plano  
d) ( ) líquem escleroso e atrófico
17. As principais complicações das eritrodermias são:  
a) ( ) infecções da pele, glomerulonefrite, insuficiência cardio-vascular  
b) ( ) pneumonia, osteomielite, polineurite  
c) ( ) hepatite, glomerulonefrite, insuficiência renal  
d) ( ) n.d.a
18. A imunofluorescência direta ( IgG) em faixa, padrão homogêneo, na junção dermo-epidérmica ocorre em:  
a) ( ) penfigóide  
b) ( ) esclerodermia sistêmica  
c) ( ) lúpus eritematoso sistêmico  
d) ( ) dermatite herpetiforme
19. Na pustulose subcórnea, os melhores resultados terapêuticos são obtidos com:  
a) ( ) sulfona  
b) ( ) antibiótico  
c) ( ) cloroquina  
d) ( ) n.d.a
20. A presença de Microabcessos de Pautrier na epiderme sugere o diagnóstico de:  
a) ( ) reticulóide actínico  
b) ( ) papulose linfomatóide  
c) ( ) Hodgkin  
d) ( ) micose fungóide
21. No exame do couro cabeludo, a proporção dos cabelos na fase anágena é de:  
a) ( ) 1%  
b) ( ) 20%  
c) ( ) 85%  
d) ( ) 8%
22. Para o diagnóstico diferencial etiológico da Necrólise tóxica epidérmica, é conclusiva:  
a) ( ) presença de eosinófilos na bolha  
b) ( ) altura da clivagem da bolha  
c) ( ) vascularite no assoalho da bolha  
d) ( ) n.d.a
23. O angioqueratoma da Fordyce é moléstia que geralmente se inicia em:  
a) ( ) lábios  
b) ( ) gengivas  
c) ( ) bolsa escrotal  
d) ( ) glânde
24. O herpes simples labial pode estar relacionado a:  
a) ( ) paraneoplasia  
b) ( ) eritema polimorfo  
c) ( ) colite membranosa  
d) ( ) n.d.a
25. A síndrome de Ramsay Hunt é complicação de:  
a) ( ) herpes simples  
b) ( ) gonorréia  
c) ( ) herpes zoster  
d) ( ) erisipela
26. A reação de Montenegro tem a mais alta especificidade para o diagnóstico de leishmaniose tegumentar a partir de:  
a) ( ) 1 semana  
b) ( ) 4 semanas  
c) ( ) 8 semanas  
d) ( ) 2 semanas
27. Em relação a doença de Worlinger–Kollopp, é correto afirmar que:  
a) ( ) evolui agudamente e com mal prognóstico  
b) ( ) evolui lentamente e tem bom prognóstico  
c) ( ) apresenta baixo epidermotropismo  
d) ( ) n.d.a
28. O leprechaunismo tem como principal alteração endocrinológica:  
a) ( ) hiperglicemia  
b) ( ) hipoglicemia  
c) ( ) hipotireoidismo  
d) ( ) hipertireoidismo
29. O acometimento do fígado em pacientes com hanseníase vircho–wiana, necropsiados, situa-se aproximadamente em:  
a) ( ) 10%  
b) ( ) 50%  
c) ( ) 20%  
d) ( ) 95%
30. O medicamento utilizado na terapêutica da hanseníase que tem ação contra a doença e a reação é:  
a) ( ) sulfona  
b) ( ) etionamida  
c) ( ) rifampicina  
d) ( ) clofazimina

31. José, servidor público municipal, cometeu um ato de improbidade, no exercício de sua função. De acordo com o artigo 187, do Estatuto dos Funcionários Públicos de Sumaré, José terá

- I. suspensão dos direitos políticos;
- II. ressarcimento ao erário;
- III. disponibilidade de bens;
- IV. perda da função pública;
- V. ação penal cabível.

Estão corretas APENAS as afirmações

- a)  I, II, IV e V.
- b)  II, III, e IV.
- c)  I, II, III, IV e V.
- d)  IV e V.

32. A aposentadoria compulsória ocorrerá aos

- a)  70 anos de idade, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço.
- b)  70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
- c)  65 anos de idade, se homem, e aos 60 anos, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
- d)  65 anos de idade, se homem, e aos 60 anos, se mulher, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço.

33. A aposentaria será:

INVALIDEZ PERMANENTE	COMPULSÓRIA	VOLUNTÁRIA
a) <input type="checkbox"/> com proventos integrais quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável.	70 anos de idade, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço.	35 anos de serviços, se homem, e aos 30 anos, se mulher, com proventos integrais.
b) <input type="checkbox"/> com proventos proporcionais quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável.	65 anos de idade, se homem, e aos 60 anos, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.	70 anos de idade com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
c) <input type="checkbox"/> proventos integrais quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei.	70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço	35 anos de serviços, se homem, e aos 30 anos, se mulher, com proventos integrais.
d) <input type="checkbox"/> com os proventos proporcionais ao tempo de contribuição	aos 30 anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, e 25 anos, se professora, com proventos integrais.	35 anos de serviços, se homem, e aos 30 anos, se mulher, com vencimentos integrais.

34. A fixação de quadro de lotação numérica de cargos e funções, sem o qual não será permitida a nomeação ou contratação de servidores é:

- a)  obrigatória.
- b)  proibida.
- c)  facultativa.
- d)  permitida.

35. A liberdade de filiação político- partidária aos servidores municipais é

- a)  proibida.
- b)  assegurada.
- c)  obrigatória.
- d)  facultativa.

36. Os recursos financeiros do sistema municipal de saúde vinculados a Secretaria, da saúde e higiene serão subordinados ao planejamento e controle do conselho:

- a)  do serviço social
- b)  da saúde
- c)  da vigilância sanitária
- d)  da infância e juventude

37. A instalação ou extinção de quaisquer serviços públicos de saúde deve ser aprovada e discutida:

- a)  no âmbito da Educação
- b)  na Câmara Municipal
- c)  Plano Diretor da Vigilância Sanitária
- d)  Pelo Sistema Único de Saúde e Conselho Municipal

38. Compete ao município, assinale V ou F.

- a)  saneamento básico e controle de endemias e epidemias.
- b)  verbas especiais para lazer e diversão da população.
- c)  elaboração e atualização da proposta orçamentária do SUS para o município.
- d)  a administração do fundo municipal de saúde.

39. As ações e serviços de saúde realizados no município integram e constituem o sistema de saúde, são organizados de acordo com as seguintes diretrizes: Exceto.

- a) ( ) secretaria de saúde, e higiene, e gestora, sistema de saúde.
- b) ( ) integralidade na prestação das ações adequadas as realidades epidemiológica.
- c) ( ) participação em nível de decisão de entidades representativas dos usuários dos trabalhadores.
- d) ( ) as instituições privadas poderão participar de forma efetiva no sistema municipal de saúde.

40. É dever do poder público municipal buscar recursos para atender as leis e garantirem qualidade de vida dos portadores de necessidades especiais; Assinale a alternativa incorreta, estes recursos são:

- a) ( ) coibir o acesso ao trabalho e escolas, dificultando a inclusão.
- b) ( ) montagem e manutenção dos centros de aprendizagem, reabilitação, e recuperação de deficientes físicos.
- c) ( ) acessibilidades nas escolas.
- d) ( ) assegurar convênios para reabilitação de deficientes através de entidades filantrópicas e unidade pública sem fins lucrativos.