



CONCURSO PÚBLICO

29. PROVA OBJETIVA

MÉDICO UROLOGISTA AMBULATÓRIO

- ♦ VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO **60** QUESTÕES OBJETIVAS.
- ♦ CONFIRA SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO IMPRESSOS NA CAPA DESTE CADERNO.
- ♦ LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.
- ♦ RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.
- ♦ MARQUE, NA FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS, LOCALIZADA NO VERSO DESTA PÁGINA, A LETRA CORRESPONDENTE À ALTERNATIVA QUE VOCÊ ESCOLHEU.
- ♦ TRANSCREVA PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA, TODAS AS RESPOSTAS ANOTADAS NA FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS.
- ♦ A DURAÇÃO DA PROVA É DE **4** HORAS.
- ♦ A SAÍDA DO CANDIDATO DA SALA SERÁ PERMITIDA APÓS TRANSCORRIDA A METADE DO TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA.
- ♦ AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO, PODENDO DESTACAR ESTA CAPA PARA FUTURA CONFERÊNCIA COM O GABARITO A SER DIVULGADO.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.



FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

QUESTÃO	RESPOSTA
01	A B C D E
02	A B C D E
03	A B C D E
04	A B C D E
05	A B C D E

06	A B C D E
07	A B C D E
08	A B C D E
09	A B C D E
10	A B C D E

11	A B C D E
12	A B C D E
13	A B C D E
14	A B C D E
15	A B C D E

16	A B C D E
17	A B C D E
18	A B C D E
19	A B C D E
20	A B C D E

QUESTÃO	RESPOSTA
21	A B C D E
22	A B C D E
23	A B C D E
24	A B C D E
25	A B C D E

26	A B C D E
27	A B C D E
28	A B C D E
29	A B C D E
30	A B C D E

31	A B C D E
32	A B C D E
33	A B C D E
34	A B C D E
35	A B C D E

36	A B C D E
37	A B C D E
38	A B C D E
39	A B C D E
40	A B C D E

QUESTÃO	RESPOSTA
41	A B C D E
42	A B C D E
43	A B C D E
44	A B C D E
45	A B C D E

46	A B C D E
47	A B C D E
48	A B C D E
49	A B C D E
50	A B C D E

51	A B C D E
52	A B C D E
53	A B C D E
54	A B C D E
55	A B C D E

56	A B C D E
57	A B C D E
58	A B C D E
59	A B C D E
60	A B C D E

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de números **01** a **05**.

O silêncio dos pais

Há pouco tempo recebi a visita de um amigo acompanhado por um casal com um filho pequeno. O garoto, inquieto, se remexia no colo da mãe e gritava, enquanto conversávamos. Sem me pedir, a mãe pegou um tamborzinho hindu que estava dependurado na parede e deu para o filho brincar. O menino se acalmou. Continuei a conversa com um olho nas visitas, outro no tambor. Tratava-se de um presente enviado por uma grande amiga que vive na Inglaterra. Na despedida, o garoto continuava com o tambor. Sorridente, a mãe declarou:

– Agora não dá mais para tirar dele!

– Sinto muito, mas é de estimação – respondi.

Brava, a mulher convenceu o filho a me devolver o tamborzinho. Soube mais tarde que me achou um “mal-educado”. Pensei: e o garoto? Vai crescer achando que pode entrar na casa alheia e pegar o que quiser!

Certa vez recebi a visita de um casal de amigos com o filho de 6 anos. O pimpolho começou a pular no meu pufe de camurça, sem parar, como se fosse uma cama elástica. A mãe orgulhosamente me olhou e sorriu. O pai nem prestou atenção. As botinhas sujavam o tecido. Timidamente, pedi:

– Pare de pular, senão vai estragar o pufe.

Ofendida, a mãe disse não gostar que dessem ordens a seu filho. Meu pufe ficou cheio de marcas e tive de trocar o tecido!

É injusto dizer que isso é coisa de brasileiro. Recentemente, em uma viagem a Edimburgo, na Escócia, tomei um ônibus turístico, que percorria a cidade com um guia explicando seus principais pontos. No primeiro banco se sentava uma mulher com uma menininha linda, de uns 2 anos. A garota não parava de gritar. O passeio se tornou torturante. A guia tentava delicadamente conter a garota. A mãe não dizia uma palavra. Finalmente, a guia pediu:

– Por favor, fique quieta. Deixe os outros passageiros aproveitarem!

A menina não entendeu. A mãe continuou muda. Ausente.

Quando criança, eu tinha uma boa ideia de como devia me comportar. Minha mãe avisava ao sair de casa:

– Não vá fazer manha!

Cresci com a noção de que se deve respeito ao próximo, portanto é terrível ver cenas em que pais deixam os filhos tripudiarem sem um gesto sequer.

Definir limites é importante. Que educação é essa que não ensina respeito ao próximo? Mas talvez certos pais modernos achem que também podem tudo. Esse é o problema.

(Walcyr Carrasco, *Veja São Paulo*, 21.04.2010. Adaptado)

01. Assinale a alternativa em que a conjunção estabelece, entre as orações, a relação de **conclusão**.

- (A) O garoto, inquieto, se remexia no colo da mãe e gritava, **enquanto** conversávamos.
- (B) – Sinto muito, **mas** é de estimação – respondi.
- (C) Meu pufe ficou cheio de marcas e tive de trocar o tecido!
- (D) **Quando** criança, eu tinha uma boa ideia de como devia me comportar.
- (E) ... **portanto** é terrível ver cenas em que pais deixam os filhos tripudiarem sem um gesto sequer.

02. De acordo com o texto, é correto afirmar que

- (A) a mãe que exigiu levar o tamborzinho agiu corretamente, pois as crianças não devem passar por frustrações.
- (B) o cronista foi intransigente quando reclamou do garoto que pulava em seu pufe, pois não se deve tolher a iniciativa das crianças.
- (C) a mãe da garotinha que estava no ônibus turístico tinha autoridade sobre a filha, mas não interferiu por estar distraída com o passeio.
- (D) alguns pais não têm competência para educar os filhos e, por esse motivo, formarão pessoas sem limites e inaptas para viverem em sociedade.
- (E) os brasileiros fazem jus à fama de povo mal-educado, pois são numerosos os exemplos de nossa falta de cidadania em comparação a outros países.

03. Considere as afirmações sobre o emprego da próclise, isto é, do pronome oblíquo antes do verbo.

- I. Em – Soube mais tarde que **me** achou um “mal-educado”. – a partícula atrativa é um pronome relativo.
- II. Em – A mãe orgulhosamente **me** olhou e sorriu. – a partícula atrativa é um advérbio.
- III. Em – Cresci com a noção de que **se** deve respeito ao próximo... – a partícula atrativa é uma conjunção.

É correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

04. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, o texto a seguir.

A mãe insistiu para _____ dar o tamborzinho ao seu filho, mas não _____ dei ao garoto, pois era de estimação. Para _____, esse garoto crescerá achando que pode tudo.

- (A) eu ... o ... mim
- (B) eu ... lhe ... mim
- (C) eu ... lhe ... eu
- (D) mim ... o ... eu
- (E) mim ... lhe ... mim

05. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as frases a seguir.

O cronista fez uma viagem ____ Escócia.

Alguns pais se recusam ____ dizer não aos filhos.

Graças ____ boa educação que recebeu, o cronista exercita a cidadania.

Para o cronista, os pais modernos se submetem ____ vontades dos filhos.

- (A) a ... à ... à ... as
- (B) a ... a ... a ... às
- (C) à ... a ... à ... às
- (D) à ... à ... à ... as
- (E) à ... a ... a ... às

06. Considere o texto.

*Ibirapuera inaugura brinquedo acessível
a criança deficiente*

Neste domingo, antevéspera do Dia da Criança, um novo brinquedo, acessível para crianças com deficiência, será inaugurado no parque Ibirapuera.

A nova atração conta com rampas de acesso e corrimãos, para crianças com mobilidade reduzida, e piso tátil, para orientação de crianças com deficiência visual, além de intervenções sonoras, como instrumentos de percussão.

Segundo a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, o brinquedo também é voltado para crianças sem deficiência, já que a ideia é levar aos parques a perspectiva de inclusão com algo que não seja atrativo apenas para um segmento específico.

Para Thais Frota, arquiteta especializada em acessibilidade, o brinquedo “possibilita a brincadeira entre todas as crianças sem segregar. Além disso, a mãe em cadeiras de rodas pode acompanhar o filho que não tem deficiência.”

A administração do parque afirmou que o projeto começou após a Lei n.º 11.982, de julho de 2009, que obriga parques a adaptarem pelo menos 5% de seus brinquedos para a utilização por pessoas que tenham algum tipo de deficiência.

(Luiz Gustavo Cristino, *Folha de S.Paulo*, 08.10.2010. Adaptado)

De acordo com a leitura do texto, pode-se concluir que

- (A) o novo brinquedo do parque do Ibirapuera foi projetado privilegiando as crianças que têm deficiência auditiva, pois há intervenções sonoras.
- (B) crianças não portadoras de deficiências também poderão se utilizar do brinquedo, mas em situações pré-determinadas pelo parque.
- (C) brinquedos, como o do Ibirapuera, provavelmente serão incorporados a outros parques, pois há uma lei que exige essa adaptação.
- (D) a aquisição de brinquedos desse tipo se deve à iniciativa dos frequentadores do mais famoso parque de São Paulo.
- (E) há uma falha no projeto, pois o brinquedo está instalado em local ainda inacessível para os pais com deficiência.

07. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal e nominal.

- (A) Foram impressas, em papel de péssima qualidade, os formulários e as fichas de inscrição.
- (B) Tamires sentiu-se meio constrangida ao saber que não fora escolhida para o cargo.
- (C) Vão haver discussões acirradas durante a execução deste projeto.
- (D) Fazem algumas horas que a paciente está na mesa de cirurgia.
- (E) Ocorreu, durante o inverno, várias alterações de temperatura.

08. Considere as afirmações sobre a tirinha.



(Dick Browne. *O melhor de Hagar, o Horrível*. v.1 Porto Alegre : L&PM Pocket, 2009)

- I. A atitude do pai, no segundo quadrinho, e as atitudes da garotinha evidenciam comportamentos que se opõem.
- II. Ao ouvir o comentário de Hagar, o jovem se irritou, pois foi uma observação sem fundamento algum.
- III. Na expressão – Qual é a sua, “coroa”? – empregou-se a linguagem figurada das palavras.

É correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

09. Assinale a frase correta quanto ao emprego do plural.

- (A) Os pôsteres da campanha publicitária já chegaram da gráfica.
- (B) Os cidadãos precisam vigiar os políticos eleitos.
- (C) Os chapéus encomendados pelos atores estão perfeitos para a cena.
- (D) Compramos pãozinhos doces para o lanche.
- (E) Os degraus da escada estão escorregadios por causa da chuva.

10. Assinale a alternativa em que o verbo em destaque está empregado corretamente.

- (A) Espera-se que todos os atores **estejem** preparados para a estreia.
- (B) Quando eles **verem** o novo modelo do carro, reconhecerão as linhas arrojadas.
- (C) Se Amanda **manter** esse ritmo de trabalho, não evitará o estresse.
- (D) As crianças **vem** ao parque e se divertem nos brinquedos.
- (E) Todos os dias, nós **pomos** a correspondência em ordem.

ATUALIDADES

11. Em agosto de 2010, manifestando-se sobre a gripe H1N1, a diretora-geral da Organização Mundial de Saúde, Margaret Chan,
- (A) reconheceu a supervalorização dos riscos dessa gripe.
 - (B) criticou a vacinação em massa, considerada desnecessária e cara.
 - (C) confirmou a erradicação dessa gripe no mundo inteiro.
 - (D) alertou para a mutação desse vírus, que se tornou mais agressivo.
 - (E) anunciou o início da fase pós-pandêmica dessa doença.

12. *A associação da (...) com a (...) poderá ampliar a oferta de voos para os consumidores brasileiros. (...)*
Na sexta, as duas empresas anunciaram a intenção de unir as duas companhias, por meio da troca de ações. (...)
A operação depende do aval da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) e do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).

(Folha de S.Paulo, 17.08.2010)

As duas companhias aéreas são

- (A) Gol e United.
 - (B) Azul e Continental.
 - (C) Varig e Delta.
 - (D) TAM e LAN.
 - (E) Webjet e Avianca.
13. Em agosto de 2010, morreu a professora Dorina de Gouvêa Nowill, uma das maiores ativistas pela inclusão social no Brasil. Em 1946, ela criou uma fundação que, em 1991, recebeu seu nome. Seu trabalho estava voltado para os
- (A) portadores do vírus HIV.
 - (B) cadeirantes.
 - (C) deficientes visuais.
 - (D) autistas.
 - (E) portadores da Síndrome de Down.

14. *A falta d'água no oeste e no sul do (...), provocada pela seca que se estende desde o mês de agosto nas duas regiões, está fazendo com que as prefeituras tenham de recorrer a poços artesianos para obter água potável.*
Em todo o Estado, 40 mil famílias já foram atingidas pelo isolamento depois que os rios baixaram a níveis mínimos. Dos 62 municípios (...), 29 decretaram situação de emergência. (...)
Em São Paulo de Olivença, sete pessoas morreram por causa de água contaminada entre agosto e setembro deste ano.

(Folha de S.Paulo, 20.10.2010. Adaptado)

Essa situação atinge o Estado do

- (A) Amazonas.
- (B) Pará.
- (C) Tocantins.
- (D) Piauí.
- (E) Mato Grosso.

15. O relatório divulgado pela Agência Internacional de Energia Atômica, em setembro de 2010, informou que o Irã
- (A) seguiu à risca os termos do acordo mediado por Brasil e Turquia em maio.
 - (B) acelerou seu programa nuclear e vetou a entrada de inspetores da agência.
 - (C) já desenvolveu a tecnologia necessária para a construção de bombas atômicas.
 - (D) diminuiu sensivelmente a quantidade de urânio enriquecido a baixo teor.
 - (E) cooperou com a agência e reafirmou o caráter pacífico de suas atividades.

16. *A oposição (...) impôs um revés ao presidente Hugo Chávez nas eleições legislativas de anteontem.*
Com as 67 cadeiras obtidas nas urnas, não só impediu que o governo alcançasse a meta de assegurar dois terços dos 165 deputados como desferiu um golpe simbólico: somadas, as principais forças opositoras alcançaram mais de 50% dos votos nacionais.

(Folha de S.Paulo, 28.09.2010)

Essas eleições ocorreram

- (A) na Colômbia.
 - (B) no Chile.
 - (C) no Uruguai.
 - (D) na Venezuela.
 - (E) no Peru.
17. De acordo com dados divulgados pelo IBGE em setembro de 2010, o Produto Interno Bruto brasileiro, no segundo trimestre deste ano,
- (A) cresceu 0,8% em relação ao primeiro trimestre de 2009.
 - (B) diminuiu 9,1% em relação ao primeiro trimestre de 2010.
 - (C) manteve-se igual ao do mesmo período de 2009.
 - (D) diminuiu 5,7% em relação ao primeiro trimestre de 2009.
 - (E) cresceu 1,2% em relação ao primeiro trimestre de 2010.

18. *Cuba irá libertar outros três presos políticos, sob a condição de que eles partam para a Espanha. Com essa decisão, chega a 39 o número de dissidentes libertados após um acordo firmado entre o presidente Raúl Castro e a Igreja Católica.*
Em julho, Cuba se comprometeu a libertar em um prazo de três a quatro meses um total de 52 dissidentes presos em 2003.

(www.estadao.com.br/noticia, 27.09.2010)

Esses dissidentes estavam presos porque

- (A) tentaram fugir do país, com ajuda de exilados na Europa.
- (B) foram condenados por fazerem oposição ao governo.
- (C) apoiaram um golpe para reconduzir Fidel Castro ao poder.
- (D) passaram segredos militares a espiões venezuelanos.
- (E) planejaram um atentado contra o papa, que visitava o país.

19. A Comissão Europeia – o braço executivo da UE – deu ontem prazo de duas semanas para que a França cumpra a legislação do bloco ou sofra a abertura de um processo legal devido (...).

“A França não está aplicando a lei europeia sobre livre movimento como deveria, então decidimos dar início a um procedimento contra a França por infringi-la”, afirmou ontem a comissária de Justiça, Viviane Reding.

(Folha de S.Paulo, 30.09.2010)

A Comissão Europeia (CE) anunciou ontem a suspensão de queixa contra a França (...).

Na sexta-feira passada, (...) o governo francês aceitou aplicar adequadamente a normativa europeia de 2004 que garante a livre circulação dos cidadãos do bloco (...).

Paris fez “o que foi pedido” e, por isso, o braço executivo do bloco abandonou a ameaça de abrir um processo por infração (...).

(Folha de S.Paulo, 20.10.2010)

A Comissão Europeia abriria um processo contra a França devido

- (A) ao projeto de lei que proíbe o uso de símbolos religiosos e étnicos em locais públicos.
- (B) às medidas discriminatórias contra os imigrantes das ex-colônias africanas.
- (C) às deportações de ciganos, principalmente para a Romênia e a Bulgária.
- (D) aos escândalos que envolvem a evasão de divisas facilitada pela existência do bloco.
- (E) à exigência de visto para a entrada de cidadãos dos países-membros.

20. Perto de completar quatro anos no poder, o presidente Rafael Correa, segundo diversos analistas, saiu fortalecido da crise política causada na quinta-feira pela (...).

Ontem, Correa, que tem mais de 60% de aprovação popular, afirmou pelo canal estatal 2 (...) “Não conseguirão transformar o país em uma nova Honduras.”

(O Estado de S.Paulo, 03.10.2010)

Essa crise política relaciona-se à

- (A) rebelião das forças policiais, interpretada como uma tentativa de golpe.
- (B) proposta do presidente de modificar a Constituição para permitir sua reeleição.
- (C) reação popular contra medidas de estatização de empresas.
- (D) resistência do Congresso ao projeto presidencial de aumento de mandato.
- (E) greve geral decretada pelos sindicatos, entendida como interferência externa.

21. Considere as seguintes competências:

- I. ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde;
- II. participar da execução das ações de saneamento básico;
- III. fiscalizar e inspecionar o teor nutricional dos alimentos;
- IV. colaborar na proteção do meio ambiente do trabalho.

Segundo a Constituição Federal, são competências do Sistema Único de Saúde aquelas mencionadas nos itens:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) I, II e III, apenas.
- (C) I, III e IV, apenas.
- (D) I, II e IV, apenas.
- (E) II e III, apenas.

22. As ações e os serviços de saúde em nosso país são considerados de relevância pública e sua execução deve ser feita

- (A) apenas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado.
- (B) apenas diretamente pelo Poder Público.
- (C) apenas por serviços terceirizados.
- (D) apenas por pessoas físicas ou jurídicas de direito público.
- (E) pelo Poder Público e por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado.

23. No Município de Diadema, de acordo com sua Lei Orgânica, é correto afirmar que

- (A) é permitida a designação ou nomeação para cargos ou funções diretivas na área da saúde, de pessoas que participam da direção, gerência ou administração de entidade do setor privado.
- (B) é permitida, em casos excepcionais, a destinação de recursos públicos para auxílios e subvenções a instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) os serviços de saúde do setor privado têm a autonomia e independência na definição de sua forma de funcionamento, não podendo ser objeto de ação restritiva por parte da Secretaria Municipal de Saúde.
- (D) o Poder Público Municipal poderá intervir nos serviços de saúde de natureza privada, necessários ao alcance dos objetivos do sistema, em conformidade com a lei.
- (E) o controle social no município, por meio do Conselho Municipal de Saúde, é exercido apenas por representantes dos setores organizados da sociedade civil.

24. Ao se afirmar que a saúde
- é um direito de todos,
 - integra todas as áreas da vida humana, e
 - que cada pessoa deve ser atendida de acordo com suas necessidades,
- resgatam-se, respectivamente, os seguintes princípios do Sistema Único de Saúde:
- (A) integralidade, universalidade e equidade.
 - (B) universalidade, integralidade e equidade.
 - (C) integralidade, universalidade e igualdade.
 - (D) justiça social, abordagem holística e individualidade.
 - (E) direito universal, integralidade, individualidade.
25. A Instituição da União responsável pela Vigilância Sanitária é a(o)
- (A) Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária.
 - (B) Secretaria Nacional de Vigilância em Saúde.
 - (C) Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria Nacional de Vigilância em Saúde.
 - (D) Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
 - (E) Superintendência de Vigilância e Inspeção Sanitária.
26. O coeficiente de mortalidade infantil, um dos mais sensíveis indicadores de saúde, é obtido, referindo-se a um dado período de tempo, pela divisão do número de óbitos de crianças
- (A) menores de 1 ano pelo total da população.
 - (B) menores de 1 ano pelo número total de nascimentos.
 - (C) menores de 1 ano pelo número de nascidos vivos.
 - (D) menores de 1 mês pelo número total de nascimentos.
 - (E) menores de 1 mês pelo número de nascidos vivos.
27. Numa dada população, constituída por 1 000 pessoas, ao longo de um período de tempo, foram diagnosticados 10 casos novos de câncer de colo de útero. No que se refere ao coeficiente de incidência dessa patologia, é correto afirmar que ele é
- (A) igual a 10%.
 - (B) igual a 1%.
 - (C) igual a 0,1%.
 - (D) superior ao da média nacional.
 - (E) impossível de ser calculado com os dados apresentados.
28. As medidas adotadas após a sobrevivência das consequências da doença, representadas pela instalação de deficiências funcionais, são denominadas de
- (A) prevenção primária.
 - (B) prevenção secundária.
 - (C) prevenção terciária.
 - (D) prevenção quaternária.
 - (E) medidas paliativas.
29. Com relação à inclusão, pelo gestor municipal do Sistema Único de Saúde, de outros agravos ou doenças na Lista das Doenças de Notificação Compulsória – DNC, em seu município, é correto afirmar que
- (A) é permitido, desde que comunicado ao gestor nacional.
 - (B) é permitido, desde que comunicado ao gestor estadual.
 - (C) é permitido, desde que comunicado aos gestores nacional e estadual.
 - (D) é permitido, desde que se trate de caso inusitado ou de surto ou epidemia.
 - (E) não é permitido.
30. De acordo com a Lista das DNC no Estado de São Paulo, dentre outras, só devem ser notificadas, após confirmação diagnóstica:
- (A) Esquistossomose, Hanseníase e Tracoma.
 - (B) Hanseníase, Malária e Rubéola.
 - (C) Cólera, Coqueluche e Dengue.
 - (D) Dengue, Difteria e Hanseníase.
 - (E) Febre Maculosa, Hantavirose e Hepatites Virais.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. A próstata é derivada da seguinte estrutura embrionária:

- (A) seio urogenital primitivo.
- (B) ductos mesonéfricos (ductos de Wolff).
- (C) ductos paramesonéfricos (ductos de Müller).
- (D) tubérculo urogenital.
- (E) mesonefro.

32. A integração do reflexo miccional ocorre no(a)

- (A) medula Sacral.
- (B) medula Torácica.
- (C) ponte.
- (D) bulbo.
- (E) giro paracentral cortical esquerdo.

33. Nas estenoses de JUP, uma das alternativas para o tratamento de pacientes sintomáticos é a realização das endopielotomias. Os resultados das endopielotomias a longo prazo são inferiores aos das cirurgias convencionais como, por exemplo, a pieloplastia a Anderson-Hynes. Nas endopielotomias, a incisão na região da estenose de JUP não deve ser realizada na sua face posterior, pois há risco de lesão arterial. A artéria mais frequentemente seccionada nas endopielotomias na região posterior é a

- (A) artéria segmentar anterior.
- (B) artéria segmentar posterior.
- (C) artéria póstero-superior.
- (D) artéria póstero-lateral.
- (E) ramo posterior da artéria segmentar anterior.

34. Um paciente do sexo masculino, de 21 anos, refere ter tido relação sexual sem usar preservativos, com mulher desconhecida, há 7 dias. No momento, refere que surgiram múltiplas úlceras no pênis, bastante dolorosas, com bordas e fundo irregulares. Na região inguinal direita, refere presença de gânglios dolorosos à palpação. Nesse caso, a principal hipótese diagnóstica é a(o)

- (A) sífilis primária.
- (B) linfogranuloma venéreo.
- (C) donovanose.
- (D) herpes simples.
- (E) cancro mole.

35. O tipo de cálculo mais comum na população adulta feminina é o de

- (A) estruvita.
- (B) cistina.
- (C) oxalato de cálcio.
- (D) fosfato de cálcio.
- (E) ácido úrico.

36. Um homem de 35 anos apresenta-se com dores em cólica na região lombar direita há alguns meses, com piora na última semana. Na investigação diagnóstica, foi realizado exame de Urina I, que demonstrou leucocitúria e microhematúria com cultura negativa. Realizou uma tomografia computadorizada de abdome e pelve, que demonstrou presença de um divertículo calicial inferior direito, com 3 cm, associado à hidronefrose dessa região, com presença de cálculo com 1,5 cm dentro do divertículo. A melhor conduta nesse caso é a

- (A) litotripsia extracorpórea por ondas de choque no rim direito.
- (B) litotripsia extracorpórea com passagem de duplo J prévia ao procedimento no rim direito.
- (C) ureteroscopia flexível no rim direito com ureterolitotripsia e extração do cálculo.
- (D) nefrolitotripsia percutânea direita, com extração do cálculo e fulguração do divertículo.
- (E) ureteroscopia semirrígida e passagem de duplo J no rim direito.

37. As fistulas vesicouterinas são bastante incomuns na população e os seus principais fatores etiológicos são uma inadequada assistência ao trabalho de parto e a presença de alterações placentárias como, por exemplo, o acretismo placentário. Didaticamente, elas podem ser divididas em 3 tipos, sendo que o tipo I também é chamado de síndrome de Youssef. As características clínicas dessa síndrome são:

- (A) amenorreia e hematúria cíclica sem perdas urinárias.
- (B) menstruação preservada, hematúria cíclica e episódios constantes ou periódicos de incontinência urinária.
- (C) menstruação preservada, ausência de hematúria cíclica e episódios constantes ou periódicos de incontinência urinária.
- (D) amenorreia sem hematúria e com perdas urinárias.
- (E) amenorreia com hematúria e com episódios constantes de perdas urinárias.

38. Um paciente de 35 anos sofreu trauma raquimedular no nível de T5, há 2 anos. Apresenta-se com paraplegia de membros inferiores e com redução da força muscular nos membros superiores. Faz acompanhamento regular com urologista e urina através do uso de cateterismo intermitente limpo, realizado pelo seu cuidador 6 vezes ao dia. No último ano, apresentou 3 episódios de infecção urinária febril e, devido a esse fato, o Urologista solicitou um Estudo Urodinâmico. Durante esse Estudo, na fase de cistometria, o paciente referiu cefaleia importante com pressão arterial de 190 X 110 mmHg, frequência cardíaca de 64 batimentos por minuto, associada a sudorese e vasodilatação cutânea.
- Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o diagnóstico e a melhor conduta para esse caso.
- (A) Infecção do trato urinário com bacteremia e suspensão imediata do exame com introdução de antibioticoterapia e encaminhamento para o pronto-socorro.
- (B) Disreflexia autonômica e suspensão imediata do exame, sentar o paciente, afrouxar as roupas, esvaziar a bexiga e introduzir nifedipina sublingual.
- (C) Disreflexia autonômica e suspensão imediata do exame associada a uso de corticoesteroides, esvaziamento da bexiga e afrouxamento das roupas.
- (D) Infecção do trato urinário e suspensão imediata do exame com introdução de antibioticoterapia.
- (E) Disreflexia autonômica e suspensão imediata do exame. A retirada dos cateteres e o esvaziamento da bexiga cessam a disreflexia e o paciente deve ser liberado após a estabilização hemodinâmica.
39. Um homem de 55 anos vai ao consultório para avaliação com o Urologista. Apresenta-se assintomático do ponto de vista urinário e não apresenta queixas relacionadas aos genitais. Trouxe exames de rotina cujos resultados são os seguintes: PSA 2008 : 1,80, PSA 2009 : 2,45, PSA 2010 : 3,70, Urina I e urocultura normais, ultrassom de próstata com volume prostático de 45 gramas e resíduo pós-miccional ausente. No toque retal, a próstata apresentava consistência fibroelástica sem nódulos. No histórico da família refere que o pai apresentou câncer de próstata. Nesse caso clínico, a conduta mais adequada é a(o)
- (A) dosagem de PSA em 3 meses.
- (B) acompanhamento urológico regular com realização de PSA semestral e, caso haja aumento do PSA acima de 4,0, indicar biópsia de próstata.
- (C) biópsia de próstata guiada por ultrassom transretal com 6 fragmentos.
- (D) biópsia de próstata guiada por ultrassom transretal com 24 fragmentos.
- (E) biópsia de próstata guiada por ultrassom transretal com 12 fragmentos.
40. O(s) sinal(is) clínico(s) mais comum(s) nos casos de neoplasias renais é(são)
- (A) hematúria microscópica.
- (B) massa palpável.
- (C) massa palpável, hematúria e dor no flanco.
- (D) dor lombar.
- (E) hematúria macroscópica.
41. O tipo de tumor vesical mais comum nos pacientes com extrofia vesical é o
- (A) carcinoma espinocelular de bexiga.
- (B) carcinoma de células transicionais de bexiga.
- (C) adenocarcinoma de bexiga.
- (D) leiomiosarcoma de bexiga.
- (E) sarcoma de células fusiformes.
42. Um paciente do sexo masculino veio ao ambulatório para esclarecimento de lesão peniana. Refere que há 30 dias teve relação sexual, sem usar preservativos, com mulher desconhecida. Refere que há 3 dias surgiu uma lesão ulcerada única, rosada e pouco dolorosa localizada no prepúcio peniano. Apresenta também adenopatia não supurativa unilateral direita e nega presença de secreção uretral. Nesse caso, o diagnóstico mais provável é o(a)
- (A) sífilis primária.
- (B) donovanose.
- (C) cancro mole.
- (D) linfogranuloma venéreo.
- (E) herpes genital.
43. Um paciente masculino de 22 anos deu entrada no PS, vítima de acidente automobilístico em alta velocidade. Estava sem cinto de segurança e dirigindo o veículo, sendo ejetado do veículo após a colisão. Na admissão apresentava-se consciente, hemodinamicamente estável, com pressão arterial de 140 X 90 mmHg, pulso de 92 bpm e presença de hematúria macroscópica sem coágulos. Após minuciosa investigação diagnóstica foi encontrado somente uma laceração parenquimatosa renal direita com 1,3 cm estendendo-se, aproximadamente, até a medula renal, sem ruptura do sistema coletor. Nesse caso, o diagnóstico e a conduta mais adequados são, respectivamente,
- (A) trauma renal grau IV e tratamento cirúrgico.
- (B) trauma renal grau III e tratamento conservador.
- (C) trauma renal grau IV e tratamento conservador.
- (D) trauma renal grau V e tratamento cirúrgico.
- (E) trauma renal grau II e tratamento conservador.

44. Os blastemas metanefrogênicos são 2 grupamentos celulares primitivos amorfos, contínuos e independentes entre si. São adjacentes aos brotos ureterais e posicionados inicialmente na posição pélvica. As principais malformações macroscópicas são aquelas que alteram o número, a superfície, o volume, a forma, a migração e a rotação dos parênquimas renais. Os rins em ferradura ocorrem devido a uma falha na separação dos polos inferiores renais. Dentre as características apresentadas nas alternativas a seguir, assinale aquela que não está presente nos rins em ferradura.
- (A) Os cálices são mediais aos bacinetes.
 - (B) O istmo é um tecido fibroso que une os polos inferiores renais. No istmo não existem cálices renais, porém podem existir vasos sanguíneos múltiplos e aberrantes.
 - (C) A vascularização múltipla e a artéria mesentérica inferior são fatores limitantes para que o rim em ferradura migre superiormente.
 - (D) Os rins em ferradura geralmente posicionam-se mais baixo que os rins normais e mais alto que o rim em bolo, e os bacinetes são anteriorizados.
 - (E) O acesso cirúrgico nos rins em ferradura deve ser bem planejado, devido a algumas peculiaridades anatômicas presentes nesse tipo de patologia.
45. A varicocele é mais frequente do lado esquerdo e ocorre devido à dilatação das veias do plexo venoso pampiniforme, sendo uma das causas de infertilidade na população masculina. A prevalência da varicocele na população masculina com infertilidade é de
- (A) 10%.
 - (B) 20%.
 - (C) 35%.
 - (D) 50%.
 - (E) 60%.
46. Uma criança de 2 anos de idade apresenta-se com testículos não palpáveis bilateralmente. No exame físico, não se palpa os testículos na bolsa escrotal e nas regiões inguinais bilateralmente. Foi realizado exame de ultrassonografia e tomografia computadorizada, sem identificação dos testículos na cavidade abdominal. A dosagem hormonal de LH e gonadotrofinas foi realizada e não apresentou alterações. Nesse caso, a conduta mais adequada é a
- (A) aplicação de hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH) por via nasal.
 - (B) aplicação de gonadotrofinas coriônicas intramuscular 1 500 UI/m², 2 vezes por semana, até a dose máxima de 15 000 UI.
 - (C) observação clínica até os 2 anos de idade e, se não houver descida dos testículos até esta idade, é indicada a videolaparoscopia diagnóstica.
 - (D) videolaparoscopia diagnóstica.
 - (E) observação clínica até os 2 anos de idade, com dosagem seriada de hormônios e exames de imagem. Se não houver descida dos testículos até essa idade, é indicada a exploração cirúrgica bilateral.
47. Um homem de 54 anos, tabagista e etilista crônico, refere ter múltiplas parceiras e raramente utiliza preservativos durante as relações sexuais. No exame físico apresenta uma lesão localizada na glândula peniana, ulcerada, fétida, medindo aproximadamente 3,5 cm de diâmetro e sangrante ao toque. Na região inguinal direita apresenta presença de gânglios palpáveis e dolorosos. O paciente foi submetido à biópsia prévia da lesão, que demonstrou um carcinoma espinocelular de pênis (CEC). Sabe-se que a presença de gânglios palpáveis na região inguinal não necessariamente significa metástase linfática do carcinoma espinocelular peniano. A porcentagem de gânglios inguinais palpáveis que não correspondem a metástases linfáticas nos casos de CEC de pênis é de
- (A) 10%.
 - (B) 20%.
 - (C) 30%.
 - (D) 40%.
 - (E) 50%.
48. As recidivas bioquímicas após prostatectomia radical retro-púbica ocorrem em, aproximadamente, 30% dos homens submetidos ao tratamento cirúrgico. A elevação do PSA pós-prostatectomia radical pode significar uma recidiva local ou uma recidiva sistêmica. Dentre os parâmetros apresentados nas alternativas a seguir, o que não se associa com as recidivas sistêmicas é o(a)
- (A) Gleason menor que 7.
 - (B) invasão das vesículas seminais.
 - (C) tempo de duplicação do PSA menor que 10 meses.
 - (D) elevação precoce do PSA pós-operatório.
 - (E) PSA pré-operatório acima de 20 mg/mL com invasão extensa da cápsula prostática bilateralmente.
49. Os feocromocitomas são tumores derivados dos feocromócitos presentes na medula adrenal. O quadro clínico dos feocromocitomas relaciona-se à produção exacerbada de catecolaminas e caracteriza-se por hipertensão arterial sistêmica, sudorese, taquicardia, cefaleia, tontura e vômitos. Geralmente, manifesta-se em surtos e aproximadamente 10% dos pacientes apresentam níveis pressóricos normais. Em alguns casos, pode haver coexistência de múltiplos tumores, dentre eles a neoplasia endócrina múltipla tipo II (NEM II). Além do feocromocitoma, a Síndrome de NEM II é caracterizada por
- (A) adenocarcinoma de ovário, adenoma de hipófise e adenocarcinoma de tireoide.
 - (B) carcinoma medular de tireoide e adenoma de paratireoide.
 - (C) carcinoma folicular de tireoide e adenoma de hipófise.
 - (D) adenocarcinoma de pâncreas e adenocarcinoma de tireoide.
 - (E) síndrome de Marfan e adenoma de paratireoide.

50. Um homem de 68 anos foi submetido à ressecção transuretral de tumor vesical devido à lesão vesical lateral direita observada no ultrassom dos rins e das vias urinárias. O paciente traz o resultado do exame anátomopatológico que demonstrou um carcinoma de células transicionais de bexiga, com comprometimento de mucosa e submucosa, estendendo-se além da lâmina própria, sendo que a camada muscular apresentava-se livre de neoplasia. O estadiamento anátomopatológico foi pT1NxMx. Nesse caso, foi indicada a realização de terapia complementar com onco-BCG. Com relação às indicações para realização de onco-BCG, assinale a alternativa que não contém uma indicação formal de aplicação de onco-BCG intravesical.
- (A) Presença de carcinoma *in situ*.
 - (B) Tumores multifocais.
 - (C) Tumores localizados na cúpula vesical.
 - (D) Tumores de alto grau.
 - (E) Tumores maiores que 3 cm.
51. As causas mais comuns em adultos de priapismo de alto e baixo fluxo são
- (A) fístula arteriovenosa e anemia falciforme.
 - (B) fístula arteriovenosa e farmacoterapia intracavernosa.
 - (C) hemodiálise e anemia falciforme.
 - (D) fístula arteriovenosa e uso de drogas vasodilatadoras.
 - (E) hemodiálise e uso de drogas vasodilatadoras.
52. A causa mais comum de hidronefrose antenatal é a(o)
- (A) refluxo vesicoureteral.
 - (B) válvula de uretra posterior.
 - (C) megaureter.
 - (D) válvula de Ureter.
 - (E) estenose de JUP.
53. A bacteriúria assintomática é a presença de bactérias na urina sem lesão tecidual associada. A bactéria mais comum nos casos de bacteriúria assintomática é a *Escherichia coli*. Dentre as situações apresentadas nas alternativas a seguir, não há necessidade de tratamento da bacteriúria assintomática em
- (A) pacientes em uso de cateterismo intermitente.
 - (B) pacientes diabéticos.
 - (C) pacientes imunodeprimidos.
 - (D) gestantes.
 - (E) pacientes com neoplasias.
54. Dentre as associações apresentadas nas alternativas a seguir, assinale a que está correta.
- (A) Nephronophtisis juvenil e síndrome de Von Hippel Lindau.
 - (B) Doença de Peyronie e contratura de Dupuytren.
 - (C) Oncocitoma renal e esclerose tuberosa.
 - (D) Síndrome de Von Hippel Lindau e adenocarcinoma vesical.
 - (E) Rim em esponja medular e síndrome de Reiter.
55. Um paciente de 68 anos, assintomático, apresenta-se com os seguintes resultados de exames: PSA total: 20 mg/dL (exame repetido e confirmado); Urina I e Urocultura sem alterações; ultrassom com próstata com 35 gramas, sem resíduo pós-miccional; rins e vias urinárias sem alterações. O exame de toque retal demonstrou próstata com 50 gramas, com lado direito endurecido. O paciente foi submetido à biópsia transretal de próstata com 12 fragmentos e o resultado foi adenocarcinoma Gleason 7 (4 + 3) em todos os fragmentos do lado direito (6/12 fragmentos) e 2 fragmentos apicais no lado esquerdo. O estadiamento sistêmico não evidenciou presença de metástases à distância pela tomografia computadorizada e pela cintilografia óssea. Optou-se por realização de ressonância nuclear magnética para estadiamento local da doença, sendo demonstrada doença com extensão extracapsular do lado direito. O Urologista optou por tratar o paciente com hormonioterapia associada à radioterapia e hormonioterapia após à radioterapia por mais 3 anos (Esquema de Bolla).
- O principal objetivo da hormonioterapia neoadjuvante nos homens com tumores de próstata T3, é a(o)
- (A) aumento da sobrevida câncer específica.
 - (B) aumento da sobrevida global.
 - (C) melhora do controle local da doença.
 - (D) redução do tempo de aparecimento de metástases à distância.
 - (E) aumento da sobrevida livre de metástases.
56. O desenvolvimento do Projeto Genoma e os avanços tecnológicos têm proporcionado grandes avanços relacionados à biologia molecular dos tumores urológicos. Aproximadamente, 80% dos carcinomas renais são carcinomas de células claras e 10 a 15% correspondem aos tumores de origem papilar. Dentre as alterações genéticas apresentadas nas alternativas a seguir, a que não está presente nos casos de carcinomas de células renais é a
- (A) mutação do p53.
 - (B) expressão do c-erb B1.
 - (C) deleção do cromossomo 3p.
 - (D) trissomia do cromossomo 7 e 17.
 - (E) perda do gene VHL.

57. O melhor exame para estadiamento local do câncer de próstata é o(a)
- (A) PET scan.
 - (B) tomografia computadorizada de abdome.
 - (C) ultrassom transretal de próstata.
 - (D) cintilografia com samário.
 - (E) ressonância nuclear magnética com bobina endorectal.
58. A região da uretra mais frequentemente afetada nos traumas de bacia é a _____ e a porcentagem de lesão uretral associada é de _____%.
- Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas da frase.
- (A) uretra membranosa ... 10 a 15
 - (B) uretra membranosa ... 30
 - (C) uretra bulbar ... 30
 - (D) uretra bulbar ... 40
 - (E) uretra bulbar ... 50
59. Um homem de 39 anos apresenta-se com os seguintes sintomas urinários: jato urinário fraco e intermitente, esvaziamento vesical incompleto, noctúria, polaciúria, urgência miccional e gotejamento terminal com uma qualidade de vida insatisfatória. O IPSS calculado foi de 28. No toque retal, a próstata mediu 25 gramas e tinha consistência fibroelástica e o antígeno prostático específico (PSA) foi de 1,5 mg/mL. O ultrassom demonstrou próstata com 25 gramas com resíduo pós-miccional de 215 mL e não se observou alterações nos rins e nas vias urinárias. Nesse caso, a conduta mais adequada é a
- (A) prostatotomia.
 - (B) avaliação urodinâmica.
 - (C) RTU de próstata.
 - (D) introdução de alfa-bloqueador.
 - (E) introdução de alfa-bloqueador e anticolinérgicos.
60. Das alternativas a seguir, a que não é uma indicação absoluta de intervenção cirúrgica da próstata (RTU de próstata ou prostatectomia transvesical) é a presença de
- (A) litíase vesical.
 - (B) hematúria.
 - (C) LUTS com alteração da qualidade de vida.
 - (D) hidronefrose bilateral.
 - (E) infecções urinárias de repetição.