

INSTRUÇÕES

Leia ATENTAMENTE as INSTRUÇÕES abaixo, **antes de iniciar a prova:**

1. O candidato recebe, juntamente com este **Caderno de Provas**, o **Cartão-Resposta**, único e insubstituível. **Conferir a escrita correta do nome constante no Cartão-Resposta.**
2. O **Cartão-Resposta** apresenta um campo em que o candidato deve assinar.
3. Este **Caderno de Provas** contém 30 questões, todas com 5 (cinco) alternativas.
4. Para cada questão existe apenas UMA resposta a ser assinalada pelo candidato.
5. O valor de cada questão das provas é 0,33 (trinta e três décimos de ponto)
6. O **Caderno de Provas** só será trocado se apresentar problema de impressão, caso isso ocorra, solicite ao **Fiscal de Sala** que tome as providências necessárias.
7. Ao terminar a Prova, o candidato deverá entregar ao **Fiscal de Sala** o seu **Cartão-Resposta** e o seu **Caderno de Prova**.
8. A interpretação das questões, bem como das instruções, fazem parte da prova.
9. Eventuais questionamentos sobre a elaboração de questões, podem ser comunicados ao fiscal. Contudo, **NÃO AGUARDE RESPOSTA**, pois a ocorrência constará em ata pelo **Fiscal de Sala**, para que a respectiva questão seja analisada posteriormente. Na dúvida, assinale a que mais lhe convier.
10. Sobre o **Cartão-Resposta**:
 - preencha totalmente o círculo correspondente à letra escolhida com caneta esferográfica tinta azul ou preta;
 - a rasura no **Cartão-Resposta** anula a respectiva resposta;
 - não será fornecido outro **Cartão-Resposta**;
 - não será atribuído ponto à questão que tenha como resposta mais de uma alternativa assinalada no **Cartão-Resposta**;
 - o **Cartão-Resposta** será lido por leitora ótica.
 - o preenchimento do **Cartão-Resposta** deve ser feito dentro do horário normal de prova.
11. Na última página do **Caderno de Provas**, o candidato encontrará um espaço para anotar suas respostas, de acordo com as preenchidas do Cartão-Resposta.
Se desejar, preencha-o, recorte-o e leve-o consigo.
12. A **duração da prova** é de 4 (quatro) horas,
13. A saída do candidato só será permitida após transcorrida 1 (uma) hora do início da prova.
14. Os três últimos candidatos a terminar a prova deverão permanecer na respectiva sala para saída conjunta.
15. Os **Cadernos das Provas Objetivas** e o **Gabarito Oficial**, contendo as alternativas corretas às respectivas questões, serão divulgados a partir das 18 horas do dia seguinte ao da prova.
16. O resultado do concurso será publicado no **Site e no Órgão Oficial do Município**.

Goioere, Junho de 2010.

A COMISSÃO

PROVA PARA O CARGO DE DENTISTA

Questão 01

Paciente do gênero feminino, 9 anos de idade, apresenta clinicamente o dente 85 em infraoclusão, e o dente 46 mesializado. O exame radiográfico mostrou a presença do germe do dente 45 com metade de sua raiz formada e anquilose no dente 85. O tratamento para o dente 85 é:

- a) Esperar esfoliação;
- b) Extrair imediatamente;
- c) Extrair ortodonticamente;
- d) Seccionar a coroa;
- e) Adaptar coroa de aço.

Questão 02

Paciente do gênero masculino, 7 anos de idade, que ao exame clínico, constatou-se a presença de dois dentes na região dos incisivos centrais superiores, que erupcionaram após a esfoliação dos incisivos centrais superiores decíduos. Estes dentes apresentavam forma conóide, e tamanho reduzido. Ao exame radiográfico, constatou-se a presença dos incisivos centrais superiores localizados logo abaixo. Esta ocorrência e o tratamento são:

- a) Dens in dente e tratamento endodôntico;
- b) Dens in dente e remoção cirúrgica com seccionamento;
- c) Microdente e reposição estética com resina composta;
- d) Mesiodens e remoção cirúrgica;
- e) Mesiodens e aguardar esfoliação.

Questão 03

Na mecânica da exodontia via fórceps, um ponto básico, porém fundamental é a escolha correta do instrumental. Com relação aos fórceps (número) mais utilizados, assinale a alternativa correta que mostre a qual (is) dente (s) estes são indicados:

- a) fórceps 17: molares superiores;
- b) fórceps 1: pré-molares superiores;
- c) fórceps 18 R: molares superiores lado direito;
- d) fórceps 151 – molares inferiores;
- e) fórceps 18 L – molares inferiores lado esquerdo.

Questão 04

O paciente apresenta um dente retido e impactado na região do dente 45, que necessita ser removido por indicação ortodôntica. Pergunta-se quais as técnicas de localização radiográfica que poderiam ser utilizadas:

- a) Técnica de Marmmaz e periapical;
- b) Técnica oclusal total de mandíbula e P.A. de mandíbula;
- c) Técnica de Clarck e Miller Winter;
- d) Técnica de Waters e submentovertix;
- e) Técnica de Le Master e Hirtz.

Questão 05

O exame radiográfico revelou que a restauração do elemento 36 tem profundidade de $\frac{1}{2}$ da espessura de dentina, e uma área radiolúcida sob o material restaurador de aproximadamente 1 mm, sem envolvimento pulpar. Ao substituir a restauração, os materiais de proteção pulpar indicados para essa cavidade são (na ordem em que serão inseridos na cavidade):

- a) hidróxido de cálcio e verniz cavitário;
- b) cimento de fosfato de zinco e verniz cavitário;
- c) cimento de hidróxido de cálcio e cimento de fosfato de zinco;
- d) verniz cavitário e cimento de óxido de zinco e eugenol;
- e) cimento de hidróxido de cálcio e cimento de ionômero de vidro.

Questão 06

No atendimento endodôntico de um paciente alérgico à água sanitária, qual solução **não** deve ser utilizada?

- a) Soro fisiológico;
- b) EDTA;
- c) Clorexidina;
- d) Solução de Milton;
- e) Povidini.

Questão 07

No caso do tratamento endodôntico de um possível granuloma apical, qual a medicação intracanal indicada para neutralizar a região contaminada a longo prazo:

- a) Hidróxido de Cálcio P.A. + veículo aquoso.
- b) Hidróxido de Cálcio cimento + iodofórmio.
- c) Hidróxido de Cálcio P.A. + veículo viscoso.
- d) Otosporin + iodofórmio.
- e) Nenhuma das alternativas.

Questão 08

Um paciente do gênero masculino com 50 anos de idade é portador de prótese parcial fixa satisfatória, dos dentes 13 a 23. No exame radiográfico observou-se a presença, no dente 22, de um núcleo metálico fundido bastante calibroso e lesão periapical causada por insucesso de tratamento endodôntico prévio. A conduta clínica indicada é?

- a) Amputação da raiz deste dente e seu envolvimento como elemento suspenso na prótese fixa;
- b) Alívio oclusal e acompanhamento radiográfico por seis meses;
- c) Remoção da prótese e do núcleo e retratamento endodôntico;
- d) Antibioticoterapia e acompanhamento radiográfico por seis meses;
- e) Apicectomia com obturação retrógrada.

Questão 09

A Psicologia Infantil oferece grandes contribuições ao tratamento odontológico e ao manejo da criança na clínica. É correto afirmar que:

- a) existem métodos aplicados para determinar, com alta precisão, como será o comportamento de cada criança sob determinada forma de tensão;
- b) padronizar as condutas no consultório é bastante útil, uma vez que as crianças apresentam respostas iguais aos mesmos estímulos;
- c) conhecer a criança implica entender o sincronismo evolutivo que existe entre o desenvolvimento somático e o psíquico;
- d) o cirurgião-dentista deve basear-se na idade cronológica da criança, que é mais importante que o seu nível de desenvolvimento mental e emocional;
- e) para conquistar a confiança e transmitir segurança à criança, o cirurgião-dentista deve assumir atitudes excessivamente paternas ou autoritárias.

Questão 10

Após a remoção completa da restauração insatisfatória, verifica-se que a nova restauração será igualmente extensa, e pode-se usar recursos auxiliares para melhorar sua retenção e estabilidade no remanescente coronário e, conseqüentemente, sua longevidade. A opção mais indicada para este caso seria:

- a) pino intrarradicular cimentado no conduto e restauração com resina composta microhíbrida ou de nanopartículas;
- b) cimentação de um núcleo metálico fundido no conduto radicular e restauração com resina composta microhíbrida;

- c) pino intradentinário autorosqueável fixado na parede cervical e restauração com resina composta microhíbrida;
- d) pino intrarradicular cimentado no conduto e restauração com resina composta de micropartículas;
- e) pino intradentinário autorosqueável fixado na parede axial e restauração com resina composta de micropartículas.

Questão 11

Após a confecção da restauração, quantas cúspides devem ser observadas para reproduzir com fidelidade a anatomia original do dente 36?

- a) 2;
- b) 3;
- c) 4;
- d) 5;
- e) 6.

Questão 12

Qual é a área de inervação do nervo alveolar inferior?

- a) Todos os dentes da hemi-arcada inferior, lábio inferior e mucosa vestibular a partir do forame mentoniano;
- b) Todos os dentes da hemi-arcada inferior, lábio inferior e mucosa vestibular de toda hemi-arcada inferior;
- c) 2/3 anteriores da língua, soalho bucal e mucosa lingual de toda hemi-arcada inferior;
- d) Nenhuma das anteriores;
- e) Mucosa jugal (bochecha) e mucosa vestibular dos molares inferiores.

Questão 13

São características do Tratamento Restaurador Atraumático:

- a) Foi inicialmente desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde (1994) para comunidades favorecidas, mas que apresentam muito medo frente ao tratamento odontológico convencional;
- b) A etapa restauradora é capaz de conter o avanço da cárie dentária independente dos demais métodos de controle;
- c) Sua proposta inicial era de ser realizado em ambientes alheios ao consultório odontológico, porém devido as suas características conservadoras pode ser perfeitamente aplicável no consultório para certos tipos de pacientes;
- d) Dentre os materiais e equipamentos utilizados para a técnica do ART convencional, incluem-se apoio para o paciente e operador, material restaurador, boa iluminação, jogo clínico e canetas de alta e baixa rotação;
- e) Nenhuma alternativa está correta.

Questão 14

São as primeiras células a chegarem no processo inflamatório e não estão presentes em tecidos saudáveis.

- a) Mastócitos;
- b) Neutrófilos ;
- c) Macrófagos;
- d) Eosinófilos;
- e) Células NK.

Questão 15

Níveis sanguíneos elevados de neutrófilos e eosinófilos podem indicar respectivamente:

- a) Infecção bacteriana e infecção parasitária;
- b) Infecção parasitária e infecção bacteriana;
- c) Infecção fúngica e infecção bacteriana;
- d) Infecção viral e infecção parasitária;
- e) Infecção viral e infecção fúngica.

Questão 16

O Brasil Sorridente é um programa que engloba diversas ações do Ministério da Saúde e busca melhorar as condições de saúde bucal da população brasileira. Esse programa propõe:

- a) fluoretação das águas de abastecimento de 50% dos municípios brasileiros;
- b) distribuição de kits de cremes dentais e escovas dentais para todas as famílias atendidas pelo Programa;
- c) construção de Centros de Referência para tratamentos especializados tais como endodontia, periodontia, cirurgia buco-maxilofacial e ortodontia;
- d) formação de equipes de saúde bucal compostas por um cirurgião-dentista e um auxiliar de consultório dentário para atendimento a populações carentes;
- e) criação de equipes de saúde bucal aptas a realizar extrações dentárias, restaurações e aplicações tópicas de flúor, além de educação para saúde.

Questão 17

Em relação ao Sistema Único de Saúde é **falso** afirmar:

- a) Os diferentes níveis de atenção (primária, secundária, terciária) servem para potencializar os recursos disponíveis e racionalizar o trabalho;
- b) A atenção primária caracteriza-se por um conjunto de ações com diferenciação tecnológica quanto aos recursos humanos e equipamentos, orientadas à resolução de problemas de saúde de maior complexidade, mas ainda em nível ambulatorial;

- c) O processo de descentralização do SUS foi legitimado pela Constituição Federal de 1988 e inclui a direção única em cada esfera de governo;
- d) O SUS é a união de todas as ações e serviços de saúde público e privados que visam garantir a todos os cidadãos brasileiros o acesso à promoção da saúde, prevenção de doenças e assistência médica;
- e) A descentralização possibilita que cada município trabalhe com autonomia, conforme as necessidades e realidades de sua região, não necessitando de autorização da esfera federal.

Questão 18

JCV, 46 anos está com AIDS e devido à deficiência do seu sistema imunológico está desenvolvendo um quadro de herpes na cavidade oral. Analise as seguintes afirmações:

- I- A deficiência do sistema imunológico se deve ao fato do vírus HIV atacar seu alvo que é o LyTCD4.
- II- As células do sistema imunológico responsáveis pelo ataque a infecções virais são os basófilos e os LyTCD8.
- III- Se JVC for atendido no consultório odontológico, o dentista não precisará se preocupar com contaminação por herpes se a ferida já estiver sem exsudato, pois os vírus já foram todos eliminados.
- IV- JCV estará mais suscetível a infecções bacterianas, pois o LtCD4 é a célula da resposta específica para bactérias.
- V- Tanto o vírus HIV como o do Herpes são inespecíficos, podendo se ligar em qualquer receptor de qualquer célula do nosso organismo.

Assinale a afirmativa correta:

- a) Somente as afirmações I e V estão corretas;
- b) Todas as afirmações estão corretas;
- c) As afirmações I, II e IV estão corretas;
- d) As afirmações II, III e V estão incorretas;
- e) As afirmações II, III e IV estão corretas.

Questão 19

A medida de maior alcance do ponto de vista da Saúde Pública para a prevenção da cárie dentária é a (o):

- a) Aplicação de selantes nos grupos de risco;
- b) Fluoretação da água de abastecimento público;
- c) Remoção das placas bacterianas apenas;
- d) Tratamento das lesões incipientes;
- e) Supressão dos alimentos adesivos, particularmente entre as refeições.

Questão 20

Um paciente do gênero masculino terá que receber uma restauração em resina composta no elemento 11, que sofreu uma fratura horizontal do terço incisal, causada por um trauma. Quais estruturas anatômicas o cirurgião dentista terá que reconstruir durante a restauração?

- a) borda incisal e ângulos;
- b) aresta oclusal e ângulos;
- c) borda vestibular e borda incisal;
- d) borda mesial e ângulos;
- e) borda lingual e borda incisal.

Questão 21

Qual é a área de inervação do nervo alveolar superior posterior?

- a) polpa e periodonto dos dentes molares superiores exceto raiz méso-vestibular do 2º molar superior;
- b) polpa e periodonto dos dentes molares superiores exceto raiz méso vestibular do 1º molar superior;
- c) polpa e periodonto dos dentes pré-molares superiores exceto raiz méso-vestibular do 1º molar superior;
- d) polpa e periodonto dos dentes pré-molares superiores exceto raiz méso- vestibular do 2º molar superior;
- e) polpa e periodonto dos dentes incisivos e canino superiores exceto raiz méso-vestibular do 1º molar superior.

Questão 22

Em relação ao tratamento da doença cárie, não se pode afirmar:

- a) Por muito tempo o diagnóstico, detecção da lesão cáriosa baseou-se apenas na sua presença clínica desconsiderando outros fatores determinantes da doença;
- b) Dentre as vantagens das restaurações preventivas estão a preservação do tecido dental sadio, facilidade no reparo das restaurações e preparos cavitários conservativos;
- c) Pacientes, independentemente da atividade de cárie, devem receber a aplicação de selantes, visto que este método bloqueia a fonte de nutrientes de microrganismos;
- d) A odontomia profilática (Hyatt, 1923) preconizava a eliminação de sulcos e fissuras da superfície oclusal, por ser esta a superfície mais susceptível ao processo da doença cárie;
- e) O sucesso do tratamento desta doença somente ocorrerá quando houver uma associação de métodos educativos-preventivos e curativos.

Questão 23

Analise as afirmações abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta:

- I - As classes menos favorecidas da população brasileira, há algumas décadas, estão recebendo informações sobre a importância da higiene dentária.
- II - O principal objetivo do tratamento odontológico deve ser a promoção e a manutenção de saúde bucal e todos os esforços devem ser direcionados para evitar tratamentos invasivos.
- III- O atual governo criou o Brasil Sorridente e este programa é uma versão antiga de propostas levadas a efeito em governos anteriores.
- IV- Para a técnica do tratamento restaurador atraumático, o material de eleição é o cimento de ionômero de vidro convencional, pois esse não é tão sensível à umidade quanto as resinas.

A alternativa correta é:

- a) somente as afirmações I e II são verdadeiras;
- b) somente as afirmações II e IV são verdadeiras;
- c) somente as afirmações III e IV são verdadeiras;
- d) somente as afirmações II e III são verdadeiras;
- e) somente as afirmações I e III são verdadeiras.

Questão 24

As associações de penicilinas ao *ácido clavulânico* justificam-se porque o mesmo:

- a) Atinge facilmente os microorganismos Gram-negativos;
- b) É específico para os microorganismos Gram-positivos;
- c) É um potente inibidor da transpeptidase de parede celular;
- d) Inativa as Beta-lactamases bacterianas;
- e) Possui um espectro de atividade semelhante ao da penicilina G.

Questão 25

Paciente do gênero masculino, 28 anos de idade, apresenta quadro de destruição periodontal compatível com periodontite de estabelecimento precoce generalizada, para a qual se receitou um antibiótico, em doses adequadas por 7 dias. Também foram realizados procedimentos mecânicos cabíveis para o controle desta situação. Qual é o antibiótico de primeira escolha nesta situação:

- a) Ampicilina;
- b) Cefalexina;
- c) Tetraciclina;
- d) Eritromicina;
- e) Metronidazol.

Questão 26

Paciente do gênero masculino, 41 anos, leucoderma, procurou atendimento em um especialista em estomatologia, apresentando mácula escura, azulada, ovalada, bem delimitada, com cerca de 6mm de diâmetro, localizada em rebordo alveolar inferior. Qual a hipótese mais provável e o que poderia ser feito, além de biópsia, para esclarecer o diagnóstico?

- a) Pigmentação melânica fisiológica racial; procurar outras lesões;
- b) Hemangioma; fazer diascopia e observar que a lesão permanece azulada;
- c) Nevo azul; perguntar se houve exposição ao sol;
- d) Lesão hemorrágica; fazer diascopia e observar que a lesão fica isquêmica;
- e) Tatuagem por amálgama; fazer radiografia e verificar radiopacidade no interior da lesão.

Questão 27

Paciente com 85 KG, necessita de infiltração com anestésico local do tipo articaina 4% com adrenalina 1:100.000. Qual a dose, em tubetes, que poderíamos utilizar ?

- a) Aproximadamente 5 tubetes;
- b) Aproximadamente 2 tubetes;
- c) Aproximadamente 7 tubetes;
- d) Aproximadamente 10 tubetes;
- e) Aproximadamente 12 tubetes.

Questão 28

Em um dente com cárie profunda, resposta positiva ao teste de vitalidade pulpar, normalidade do periodonto de sustentação e que apresentou uma pequena exposição pulpar após remoção da cárie. Qual deve ser o procedimento clínico em um dente decíduo e num dente permanente, respectivamente:

- a) Pulpotomia e pulpectomia.
- b) Proteção pulpar direta e proteção pulpar direta.
- c) Proteção pulpar direta e pulpotomia.
- d) Pulpotomia e proteção pulpar direta.
- e) Nenhuma das alternativas.

Questão 29

No abscesso periapical agudo do dente decíduo, que apresenta mais de 2/3 da raiz reabsorvida, qual o procedimento clínico:

- a) Antibioticoterapia e exodontia;
- b) Antibioticoterapia e tratamento endodôntico;
- c) Analgésico e exodontia;
- d) Analgésico e tratamento endodôntico;
- e) Nenhuma das alternativas.

Questão 30

Realizarmos uma anestesia com Bupivacaína em um paciente e este apresentou quadro de alergia. Qual a seqüência medicamentosa melhor indicada para combatermos este choque anafilático ?

- a. Adrenalina, corticóide e anti-histamínico;
- b. Anti-histamínico, corticóide e adrenalina;
- c) Adrenalina, anti-histamínico e corticóide;
- d) Corticóide, adrenalina e anti-histamínico;
- e) Nenhuma das alternativas.

GABARITO

QUESTÃO	ALTERNATIVA
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	