


CONCURSO PÚBLICO

019. PROVA OBJETIVA

CIRURGIÃO-DENTISTA
(ESTOMATOLOGIA CLÍNICA – HSPE)

- ♦ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 60 questões objetivas.
- ♦ Confira seu nome e número de inscrição impressos na capa deste caderno.
- ♦ Leia cuidadosamente as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ♦ Responda a todas as questões.
- ♦ Marque, na folha intermediária de respostas, localizada no verso desta página, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ♦ Transcreva para a folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, todas as respostas anotadas na folha intermediária de respostas.
- ♦ A duração da prova é de 3 horas e 30 minutos.
- ♦ A saída do candidato da sala será permitida após transcorrida a metade do tempo de duração da prova.
- ♦ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo destacar esta capa para futura conferência com o gabarito a ser divulgado.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.



FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

QUESTÃO	RESPOSTA				
01	A	B	C	D	E
02	A	B	C	D	E
03	A	B	C	D	E
04	A	B	C	D	E
05	A	B	C	D	E

06	A	B	C	D	E
07	A	B	C	D	E
08	A	B	C	D	E
09	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E

11	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E

16	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E

QUESTÃO	RESPOSTA				
21	A	B	C	D	E
22	A	B	C	D	E
23	A	B	C	D	E
24	A	B	C	D	E
25	A	B	C	D	E

26	A	B	C	D	E
27	A	B	C	D	E
28	A	B	C	D	E
29	A	B	C	D	E
30	A	B	C	D	E

31	A	B	C	D	E
32	A	B	C	D	E
33	A	B	C	D	E
34	A	B	C	D	E
35	A	B	C	D	E

36	A	B	C	D	E
37	A	B	C	D	E
38	A	B	C	D	E
39	A	B	C	D	E
40	A	B	C	D	E

QUESTÃO	RESPOSTA				
41	A	B	C	D	E
42	A	B	C	D	E
43	A	B	C	D	E
44	A	B	C	D	E
45	A	B	C	D	E

46	A	B	C	D	E
47	A	B	C	D	E
48	A	B	C	D	E
49	A	B	C	D	E
50	A	B	C	D	E

51	A	B	C	D	E
52	A	B	C	D	E
53	A	B	C	D	E
54	A	B	C	D	E
55	A	B	C	D	E

56	A	B	C	D	E
57	A	B	C	D	E
58	A	B	C	D	E
59	A	B	C	D	E
60	A	B	C	D	E

CONHECIMENTOS GERAIS

POLÍTICA DE SAÚDE

- 01.** A Constituição Federal, ao tratar do “atendimento integral” – uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde – dá prioridade apenas às atividades
- (A) preventivas e assistenciais.
 - (B) preventivas, assistenciais e de reabilitação.
 - (C) de promoção da saúde e de assistência.
 - (D) preventivas.
 - (E) assistenciais.
- 02.** A legislação estabelece como instâncias de participação da comunidade na gestão do SUS apenas
- (A) as Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde.
 - (B) as Conferências de Saúde, os Conselhos de Saúde e os Conselhos Gestores.
 - (C) os Conselhos de Saúde e os Conselhos Gestores.
 - (D) as Conferências de Saúde Municipais, Estaduais e Nacional.
 - (E) o Conselho Nacional de Secretários de Saúde – Conass e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde – Conasems.
- 03.** Além do atendimento integral, são diretrizes do SUS:
- (A) a equidade e a universalidade.
 - (B) a gratuidade e a universalidade.
 - (C) a descentralização e a participação da comunidade.
 - (D) a descentralização e a equidade.
 - (E) a gratuidade e a participação da comunidade.
- 04.** A estratégia de Saúde da Família
- (A) prevê a implantação de equipes multiprofissionais em serviços de saúde de baixa, média e alta complexidade.
 - (B) propõe que suas equipes atuem com ações voltadas para todos os agravos de uma dada comunidade, dos mais frequentes aos mais raros.
 - (C) coloca a necessidade de se ultrapassarem os limites classicamente definidos para a atenção básica no Brasil.
 - (D) foi iniciada em 2001, tendo apresentado um crescimento pouco expressivo desde então.
 - (E) prevê resultados de longo prazo na mudança do perfil de morbi-mortalidade, não tendo ainda produzido alterações importantes nos principais indicadores de saúde das populações assistidas pelas equipes de Saúde da Família.
- 05.** As responsabilidades de
- I. ordenar a formação de recursos humanos;
 - II. coordenar a execução das políticas de qualificação de recursos humanos em seu território;
 - III. avaliar o desempenho das equipes de atenção básica sob sua supervisão são, respectivamente, das esferas gestoras em Atenção Básica
- (A) federal, estadual e municipal.
 - (B) federal, municipal e estadual.
 - (C) estadual, federal e municipal.
 - (D) estadual, municipal e federal.
 - (E) municipal, estadual e federal.
- 06.** O Ministério da Saúde, ao apresentar o Pacto pela Saúde 2006,
- (A) constatou que o SUS, ao completar uma década e meia de existência, não conseguiu se estruturar enquanto um sistema de saúde sólido e que ainda presta serviços de qualidade insatisfatória à população brasileira.
 - (B) previu que ele deverá ser revisado a cada 10 anos pelos gestores do SUS, com base nos princípios constitucionais e na análise da série histórica dos indicadores de saúde.
 - (C) partiu da constatação de que o Brasil, mesmo sendo um país continental e com muitas diferenças e iniquidades regionais, necessita de uma ação padronizada e uniforme na operacionalização do seu sistema de saúde.
 - (D) priorizou ampliar e qualificar a estratégia de Saúde da Família nas áreas mais distantes dos grandes centros urbanos e com os piores indicadores de saúde de suas populações.
 - (E) definiu como temas prioritários a saúde do idoso; o câncer de colo de útero e de mama; a mortalidade infantil e materna; as doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza; a promoção da saúde e a atenção básica à saúde.
- 07.** Numa reunião com a comunidade, foram feitas as seguintes perguntas referentes à tuberculose:
- I. Ela é uma doença que atinge exclusivamente os pulmões?
 - II. Todas as pessoas que entrarem em contato com o bacilo de Koch vão desenvolver a doença?
 - III. Todo paciente com tuberculose pode transmitir a doença?
- As respostas corretas para essas perguntas são, respectivamente:
- (A) sim, sim e sim.
 - (B) não, não e não.
 - (C) sim, não e não.
 - (D) sim, sim e não.
 - (E) não, sim e não.

Considere o enunciado a seguir para responder às questões de números 08 e 09.

“Numa dada comunidade composta por 100 000 habitantes, ao longo de um ano foram registrados 100 casos de câncer de pulmão, sendo que destes 10 evoluíram para óbito.”

08. O coeficiente de letalidade por câncer de pulmão foi de

- (A) 0,01%.
- (B) 0,1%.
- (C) 1%.
- (D) 10%.
- (E) 100%.

09. O coeficiente de mortalidade por câncer de pulmão foi de

- (A) 1 por 100.
- (B) 10 por 1 000.
- (C) 100 por 1 000.
- (D) 0,1 por 1 000.
- (E) 10 por 100 000.

10. Fazem parte da Lista de Doenças de Notificação Compulsória Imediata, no Estado de São Paulo, dentre outras, as seguintes doenças:

- (A) botulismo, carbúnculo e hanseníase.
- (B) cólera, peste e raiva humana.
- (C) febre tifoide, hanseníase e hepatites virais.
- (D) leptospirose, malária e peste.
- (E) coqueluche, dengue e rubéola.

ATUALIDADES

11. No dia 24 de agosto deste ano (2011), vários portais e jornais brasileiros repercutiram a informação da Agência Reuters sobre a afirmação da Administração de Informação de Energia (AIE) dos EUA de que as exportações americanas de etanol mais que dobraram nos primeiros cinco meses de 2011 e, com isso, os EUA devem superar o Brasil como maior exportador pelo resto do ano. No dia 6 de setembro, esses dados foram confirmados com a explicação de que, segundo a Agência Estado, “o clima desfavorável em áreas de produção do Brasil reduziu a produção de cana-de-açúcar neste ano-safra, tornando o produto mais caro e menos atrativo se comparado ao etanol dos Estados Unidos, cuja principal matéria-prima é

- (A) o arroz.”
- (B) a beterraba.”
- (C) o milho.”
- (D) o girassol.”
- (E) o eucalipto.”

12. Centenas de pessoas, em sua maioria jovens, raspam a cabeça em solidariedade e apoio ao presidente, que vem se submetendo a sessões de quimioterapia para tratamento de um câncer.

(<http://www.observadorpolitico.org.br>. Adaptado)

Essa solidariedade foi prestada ao presidente

- (A) Rafael Ortega, do Equador.
- (B) Evo Morales, da Bolívia.
- (C) Fernando Lugo, do Paraguai.
- (D) Hugo Chávez, da Venezuela.
- (E) Sebastián Piñera, do Chile.

13. O agrônomo e pesquisador Josias Correa de Faria, um dos coordenadores de pesquisa da Embrapa, que buscava um produto resistente à doença chamada de mosaico dourado, anunciou, no dia 28 de agosto deste ano (2011), o sucesso dos experimentos que resultaram na primeira planta geneticamente modificada do Brasil. Ele afirmou que “enquanto numa cultura convencional, à época de alta incidência de mosca branca, são necessárias aplicações semanais de agrotóxico, na cultura transgênica

- (A) do feijão essa prática será desnecessária.”
- (B) do amendoim será preciso somente uma aplicação no momento do plantio.”
- (C) da soja bastará uma aplicação na preparação do solo para plantio.”
- (D) do sorgo essa prática será necessária somente no período da chuva.”
- (E) da lentilha será necessária somente uma aplicação na época da florada.”

14. No dia 06 de setembro de 2011, a Agência Estado informava que “o governo vai cobrar taxa antidumping retroativa.” A finalidade do governo, segundo a matéria, é impedir algumas empresas de
- (A) importar produtos com isenção fiscal nos países de origem.
 - (B) armazenar produtos durante determinado tempo para forçar a alta de preços.
 - (C) exportar abaixo do preço de custo praticado no país de origem até inviabilizar a concorrência.
 - (D) exportar o produto para um país não produtor e depois importá-lo a um preço maior.
 - (E) maquiagem um produto agregando-lhe um valor irreal com o acréscimo de selos ou etiquetas.

15. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostrou que o IPCA encerrou agosto em 0,37%, resultado dentro das expectativas, contra 0,16% em julho. Em 12 meses, a inflação é de 7,23%, a maior desde junho de 2005, e bem distante do teto da meta de 6,5%. Os alimentos responderam por grande parte da alta e cabe notar que as coletas privadas de preços continuam mostrando que esse grupo pode voltar a pressionar o IPCA agora em setembro.

(Valor Online, 06.09.2011. Adaptado)

Por IPCA entende-se o índice de preços calculado

- (A) pelo IBGE depois de apuradas variações regionais. Ele corresponde a um número que tenta refletir a inflação em um contexto nacional.
- (B) de acordo com a variação de preços de uma cesta de produtos padrão em um determinado período.
- (C) com base na variação dos preços no mercado atacadista de todo o território brasileiro.
- (D) considerando o custo de vida de famílias com renda média de R\$ 2,8 mil.
- (E) levando em consideração famílias com rendimentos entre 1 e 40 salários mínimos nas 11 regiões metropolitanas pesquisadas.

16. O Windows 7, supondo em sua configuração padrão, possui um recurso novo em relação à versão anterior, que permite armazenar todos os arquivos e documentos pessoais ou de trabalho de um usuário, bem como arquivos de músicas, imagens e vídeos, em um elemento de armazenamento. Por meio do Painel de Navegação do Windows Explorer, esse elemento pode ser localizado e acessado. Ele se denomina
- (A) Bibliotecas.
 - (B) Meus Arquivos.
 - (C) Meus Documentos.
 - (D) Minhas Pastas.
 - (E) Pastas do Usuário.

17. No MS-Word 2010, a partir da guia Página Inicial, grupo Parágrafo, pode-se chegar aos três ícones apresentados a seguir.



Tais ícones representam, respectivamente,

- (A) Apagar Linhas; Exibir Planilha; Emoldurar.
- (B) Calculadora; Exibir Planilha; Exibir Margens.
- (C) Desenhar Linhas de Grade; Calculadora; Exibir Margens.
- (D) Desenhar Tabela; Exibir Linhas de Grade; Bordas e Sombreamento.
- (E) Quadricular; Calculadora; Bordas e Sombreamento.

18. Considere a planilha, elaborada no MS-Excel 2010.

	A	B	C
1	João	Paulo	
2	Eduardo	Carlos	
3	Manoel	Antonio	
4			

Posteriormente, foi inserida a fórmula a seguir na célula C4.

=CONCATENAR(A1;"-";B1)

O resultado produzido em C4 será:

- (A) João
 - (B) Paulo
 - (C) JoãoPaulo
 - (D) João Paulo
 - (E) João-Paulo
19. Dentre os possíveis endereços de *e-mail* apresentados, assinale o que apresenta uma estrutura válida.

- (A) meu@email:servidor.com
- (B) meu:email@servidor.com
- (C) meu.email@servidor.com
- (D) meu@email@servidor.com
- (E) @meuemail.servidor.com

20. Considere as seguintes afirmações a respeito da estrutura do URL (*Uniform Resource Locator*) utilizado para localizar recursos da internet:

- I. inclui o endereço do recurso na internet;
- II. identifica o protocolo de acesso utilizado;
- III. inclui uma senha de acesso.

Sobre as afirmações, é correto o contido em

- (A) I, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I e III, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Após a extração do primeiro molar superior esquerdo, deve-se ter o seguinte cuidado com o alvéolo dentário:
- (A) se não houver lesão periapical ou detrito, o alvéolo não deve ser curetado.
 - (B) se uma lesão periapical for visualizada na radiografia periapical e houver um granuloma preso ao dente quando ele for removido, a região periapical deve ser vigorosamente curetada.
 - (C) as corticais vestibular e lingual expandidas não devem ser comprimidas de volta para sua configuração inicial, se tiver sido planejada a instalação de um implante logo após ou no futuro.
 - (D) se não tiver sido planejada a instalação de um implante na região da extração, o alvéolo deve ser comprimido o máximo possível, além da sua forma original, para permitir a coaptação das bordas do tecido gengival, facilitando a sutura.
 - (E) se os dentes tiverem sido removidos devido à doença periodontal, o tecido de granulação deve ser mantido no interior do alvéolo, já que esse tecido fornece uma cicatrização rápida.
22. Para a realização de uma extração múltipla, foi necessária a execução de um retalho para reestabelecer o contorno e alisar o osso alveolar. Assinale a alternativa que contém informações corretas em relação ao retalho.
- (A) Quando o retalho é determinado, sua base deve ser mais estreita que a margem livre, para manter o suprimento sanguíneo adequado.
 - (B) O retalho deve ser de espessura parcial, já que o periósteo é o principal tecido responsável pela cicatrização óssea.
 - (C) A posição correta para o final da incisão relaxante vertical é no ângulo mesial ou distal do dente.
 - (D) Se for feita remoção de osso sobre um determinado dente, a incisão deve estar centralizada no defeito ósseo criado pela cirurgia.
 - (E) Se o tecido do palato anterior precisar ser rebatido, tanto a artéria quanto o nervo nasopalatinos não devem ser incisados no nível do forâmen, já que existe grande probabilidade de sangramento nessa região.
23. Após o reposicionamento de um retalho mucoperiosteal, é realizada a sutura. Assinale a alternativa que contém informações corretas em relação à sutura.
- (A) Suturas mais frouxas resultam, com mais frequência, em deiscência que suturas mais apertadas.
 - (B) Sempre que possível, o nó deve ser colocado sobre a linha de incisão.
 - (C) Ao passar a agulha através do tecido, ela deve penetrar na superfície da mucosa obliquamente para evitar a laceração da camada superficial do retalho quando é dado o nó.
 - (D) O fio de sutura deve ser passado da parte móvel do retalho para o tecido inserido.
 - (E) O nó da sutura em retalho mucoperiosteal deve ser apertado com bastante força para garantir a estabilidade das bordas da ferida.

24. Se um fragmento de raiz pequeno, profundamente inserido no osso e não infectado fraturar, e os métodos fechados de remoção não tiverem êxito, deve-se considerar a possibilidade de deixar a raiz no processo alveolar quando o risco da cirurgia for maior que o seu benefício. Encontra-se tal condição nas seguintes situações:
- se a remoção da raiz for causar destruição excessiva do tecido circunvizinho;
 - se a remoção da raiz colocar em risco estruturas anatômicas importantes;
 - se as tentativas de remoção da raiz residual puderem deslocá-la para dentro dos espaços teciduais ou para dentro do seio maxilar.
- Está correto o contido em
- I, apenas.
 - II, apenas.
 - III, apenas.
 - I e II, apenas.
 - I, II e III.
25. Levando-se em consideração os Sistemas de Classificação de dentes impactados (determinação da angulação, classificação de Pell e Gregory e classificação de Pell e Gregory A, B, C), a posição dental que apresenta maior dificuldade para sua remoção é a impacção
- mesioangular com relação no ramo classe 1 e uma profundidade classe A.
 - distoangular com relação no ramo classe 3 e uma profundidade classe C.
 - distoangular com relação no ramo classe 2 e uma profundidade classe B.
 - horizontal com relação no ramo classe 2 e uma profundidade classe B.
 - vertical com relação no ramo classe 1 e uma profundidade classe A.
26. Disfunção temporomandibular em que o côndilo faz translação anterior à frente da eminência articular e trava nessa posição. Indica-se, nesses casos, a aplicação de pressão para baixo sobre os dentes posteriores e pressão para cima sobre o queixo, acompanhadas por deslocamento posterior da mandíbula.
- O texto refere-se à seguinte disfunção temporomandibular:
- deslocamento anterior do disco com redução.
 - anquilose intracapsular.
 - luxação.
 - deslocamento anterior do disco sem redução.
 - subluxação.
27. Diante da avulsão total de um dente do seu alvéolo, o paciente deve ser orientado para enxaguar o dente e reposicioná-lo, mas se o paciente não consegue reposicioná-lo, os meios mais adequados de armazenagem são:
- solução salina balanceada de Hanks / leite.
 - água destilada /saliva.
 - leite / saliva.
 - soro fisiológico / água destilada.
 - antisséptico / solução salina balanceada de Hanks.
28. Após o reimplante de um dente maduro avulsionado, ele deve ser radiografado e esplintado. Assinale a alternativa que contém informações corretas em relação à estabilização aplicada ao dente.
- A estabilização deve ser totalmente rígida.
 - A estabilização deve permanecer durante 30 a 45 dias.
 - Quanto mais dentes forem necessários para estabilizar o dente avulsionado, maiores são as chances de ocorrer uma união fibrosa.
 - A estabilização deve permanecer durante 7 a 10 dias.
 - É desejável que a estabilização promova a união óssea, em vez da fibrosa.
29. Assinale a alternativa que contém informações corretas em relação às lesões em tecidos moles.
- As feridas de tecidos moles associadas ao traumatismo dentoalveolar são sempre tratadas antes do tratamento das lesões nos tecidos duros.
 - Em lacerações que se estendem pela espessura total do lábio, após a primeira sutura realizada na junção mucocutânea, a ferida é fechada em planos de dentro para fora.
 - A contusão é uma solução de continuidade nos tecidos epiteliais e subepiteliais.
 - O tratamento cirúrgico das contusões envolve quatro etapas principais: limpeza, desbridamento, hemostasia e fechamento.
 - Uma laceração pequena na face interna do lábio ou língua, normalmente não requer fechamento (suturas), cicatrizando bem por primeira intenção.
30. Raros indivíduos são sensíveis a anestésicos locais. A hipersensibilidade parece ocorrer mais proeminentemente com anestésicos locais do tipo éster. A alternativa que contém somente anestésicos locais do tipo éster é:
- prilocaína, procaína.
 - mepivacaína, lidocaína.
 - tetracaína, mepivacaína.
 - lidocaína, bupivacaína.
 - procaína, tetracaína.

31. A duração da anestesia por bloqueio nervoso depende das características físicas do anestésico local empregado. Considerando essa afirmação, assinale a alternativa que contém um anestésico de ação curta, um anestésico de ação intermediária e um anestésico de ação longa, respectivamente.
- (A) Procaína, tetracaína e lidocaína.
(B) Mepivacaína, etidocaína e procaína.
(C) Bupivacaína, tetracaína e etidocaína.
(D) Procaína, lidocaína e bupivacaína.
(E) Tetracaína, mepivacaína, prilocaína.
32. A Amoxicilina é uma penicilina semissintética, é um congêneres químico e farmacológico da Ampicilina e destina-se a uso oral. Assinale a alternativa que contém informações corretas em relação à Amoxicilina.
- (A) Sofre absorção mais lenta do que a Ampicilina no trato gastrointestinal.
(B) Apresenta menor espectro antimicrobiano do que a Ampicilina.
(C) Pode ser ingerida com alimentos.
(D) Apresenta concentração plasmática igual as da Ampicilina após administração oral da mesma dose.
(E) Não é sensível à penicilinase.
33. Pequenos cistos de desenvolvimento são um achado comum na cavidade bucal de crianças recém-nascidas. Assinale a alternativa que contém informações corretas em relação aos cistos palatinos do recém-nascido.
- (A) As pérolas de Epstein e os nódulos de Bohn são exemplos desses cistos.
(B) São também denominados de cistos gengivais do recém-nascido.
(C) São mais comuns na região anterior do rebordo alveolar superior.
(D) Os sintomas mais comuns são tumefação no rebordo e ausência de dor.
(E) O tratamento desses cistos envolve enucleação cirúrgica.
34. Em relação à Hipoplasia de Turner, analise as afirmações a seguir, classificando como verdadeiras (V) ou falsas (F).
- () É uma anormalidade dentária influenciada por fatores idiopáticos.
() É um defeito que pode ser causado por doença inflamatória periapical dos dentes decíduos sobrejacentes.
() Os defeitos na dentina variam de áreas focais de coloração branca, amarela ou marrom até extensa hipoplasia que pode atingir a totalidade da coroa.
() A injúria traumática aos dentes decíduos pode causar alterações na dentição subjacente e a formação de dentes de Turner.
- A classificação correta, de cima para baixo, é:
- (A) V, V, F, V.
(B) F, V, F, V.
(C) F, F, V, V.
(D) V, F, F, V.
(E) F, F, F, V.
35. A perda da superfície dos dentes é um processo fisiológico que ocorre com o decorrer do envelhecimento, mas pode ser considerado patológico quando o grau de destruição cria problemas funcionais, estéticos ou de sensibilidade dental. Em relação aos desgastes da estrutura dental, afirma-se:
- I. a perimólise pode ser ocasionada pela exposição dentária a secreções gástricas;
II. a demastigação apresenta características tanto de atrição como de abrasão;
III. a erosão é a perda de estrutura dental causada por processo químico somado à interação bacteriana com o dente.
- Está correto o contido em
- (A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II, III.
36. Assinale a alternativa que contém informações corretas em relação à formação da dentina.
- (A) Nos dentes em oclusão, a deposição da dentina inicia-se nas regiões apicais e progride coronariamente.
(B) Diante de dano grave, os odontoblastos podem morrer, resultando no preenchimento dos túbulos dentinários com processos odontoblásticos degenerados (tratos mortos).
(C) A dentina secundária fisiológica pode ser observada em áreas de injúria focal (atrição, fratura, erosão, abrasão e cárie).
(D) Os odontoblastos que formam a dentina primária morrem, sendo a dentina secundária fisiológica produzida por uma nova geração de células semelhantes a odontoblastos, recrutadas das células indiferenciadas da polpa.
(E) Com a idade, as câmaras pulpares diminuem significativamente em altura e mais extensivamente em largura, devido à deposição da dentina.

37. Os abscessos periapicais, se não tratados, podem disseminar-se pelas áreas de menor resistência, gerando sérias alterações.

Em relação às complicações dos abscessos, analise as afirmações a seguir, classificando-as como verdadeiras (V) ou falsas (F).

- () A trombose do seio cavernoso pode ocorrer quando a infecção originária dos pré-molares e molares superiores perfura a cortical vestibular e se estende para o seio maxilar, para o espaço pterigopalatino ou para a fossa infratemporal, alcançando a órbita pela fissura orbitária inferior, podendo estender-se para o seio cavernoso.
- () A angina de Ludwig pode desenvolver-se da extensão de uma infecção aguda de um molar inferior, abscessos periamigdalianos ou parafaringeanos, lacerações orais, fraturas da mandíbula ou sialoadenites submandibulares.
- () Com a progressão do abscesso, a secreção purulenta pode estender-se, perfurar a cortical, e difundir-se para os tecidos moles, resultando em osteomielite.
- () A trombose do seio cavernoso pode ocorrer a partir de uma infecção nos dentes superiores anteriores, na qual a infecção perfura a superfície vestibular do osso maxilar e atinge o espaço canino com disseminação para o seio cavernoso através das veias da face.

A classificação correta, de cima para baixo, é:

- (A) V, V, F, F.
- (B) F, V, F, V.
- (C) F, V, F, F.
- (D) V, V, F, V.
- (E) V, V, V, V.

38. Após a extração de um dente, é formado um coágulo sanguíneo no local e sua organização final é feita por tecido de granulação, substituição por um osso fibrilar e, finalmente, por osso maduro. A destruição do coágulo inicial impede a cicatrização apropriada e pode causar

- (A) alveolite úmida.
- (B) osteomielite.
- (C) osteíte alveolar.
- (D) osteíte condensante.
- (E) periostite proliferativa.

39. As formas clínicas da candidose oral que apresentam aparência de placas brancas são:

- (A) eritematosa e mucocutânea.
- (B) queilite angular e atrofia papilar central.
- (C) síndrome candidose endócrina e candidose atrófica crônica.
- (D) pseudomembranosa e atrofia papilar central.
- (E) pseudomembranosa e mucocutânea.

40. As células epiteliais infectadas mostram degenerações balonizantes, que se caracterizam pela acantólise e o núcleo claro e aumentado. Essas células epiteliais acantolíticas são denominadas de células de Tzanck.

Assinale a alternativa que contém apenas micro-organismos associados com as características histopatológicas descritas.

- (A) vírus herpes simples, vírus Epstein-Barr e citomegalovírus.
- (B) vírus varicela-zoster, *Treponema pallidum* e vírus Epstein-Barr.
- (C) togavírus, paramixovírus e *Candida* sp.
- (D) citomegalovírus, *Actinomyces israeli* e vírus varicela-zoster.
- (E) togavírus, vírus da imunodeficiência humana (HIV) e *Histoplasma capsulatum*.

41. As manchas de Koplik são máculas pequenas branco-azuladas sobre área eritematosa observadas na mucosa labial e jugal. Tratam-se de manifestações orais da (do)

- (A) rubéola.
- (B) caxumba.
- (C) sarampo.
- (D) citomegalovírus.
- (E) mononucleose infecciosa.

42. Em relação à síndrome de Sjögren, afirma-se:

- I. envolve principalmente as glândulas salivares e lacrimais;
- II. trata-se de uma doença hereditária, comum em crianças;
- III. o principal sintoma oral é a xerostomia.

Está correto o contido em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I, II e III.

43. Assinale a alternativa que contém informações corretas em relação aos antibióticos prescritos para infecções orais.

- (A) Antibióticos de espectro reduzido proporcionam a oportunidade para o desenvolvimento de resistência a um grande número de bactérias.
- (B) Antibióticos bacteriostáticos devem ser evitados em pacientes que possuem um sistema de defesa comprometido.
- (C) O conselho da ADA (Associação Dental Americana) recomenda aos dentistas o uso somente de antibióticos de amplo espectro para infecções simples.
- (D) A amoxicilina com ácido clavulânico é um antibiótico de espectro reduzido.
- (E) A moxifloxacina é indicada para crianças e mulheres grávidas por possuir baixa toxicidade.

44. Nome dado à hiperplasia que se desenvolve em associação com as bordas de uma prótese total ou parcial mal adaptada:
- (A) epúlide fissurada.
 - (B) mucinose bucal focal.
 - (C) epúlide granulomatosa.
 - (D) tumor de célula granular.
 - (E) lipoma.
45. Assinale a alternativa correta em relação aos hemangiomas.
- (A) São anomalias estruturais dos vasos sanguíneos sem proliferação endotelial.
 - (B) É comum a transformação maligna de um hemangioma.
 - (C) São mais comuns nos homens do que nas mulheres, e ocorrem mais frequentemente nos brancos do que em outros grupos raciais.
 - (D) São neoplasias de tecidos em desenvolvimento.
 - (E) Possuem características de hamartomas.
46. Doença caracterizada por bolhas, devido a uma produção anormal de autoanticorpos contra glicoproteínas da superfície das células epiteliais. Um achado característico é que uma bolha pode ser induzida na pele / mucosa aparentemente normal caso se exerça firme pressão lateral (injúria).
- O texto refere-se
- (A) ao pênfigo.
 - (B) ao eritema multiforme.
 - (C) à epidermólise bolhosa adquirida.
 - (D) ao eritema migratório.
 - (E) à necrólise epidérmica tóxica.
47. Assinale a alternativa que contém informações corretas em relação ao líquen plano.
- (A) O líquen plano reticular apresenta lesões extremamente doloridas e envolve a região posterior da mucosa da bochecha bilateralmente.
 - (B) O líquen plano reticular é menos comum que o líquen plano erosivo e quando as lesões são confinadas à mucosa gengival pode produzir um quadro conhecido como gengivite descamativa.
 - (C) No líquen plano erosivo, pode ocorrer separação epitelial, resultando na apresentação rara do líquen plano bolhoso.
 - (D) No líquen plano erosivo, observa-se ausência de degeneração hidrópica.
 - (E) No líquen plano reticular, as estrias de Wickham não são observadas.
48. Assinale a alternativa que contém informações corretas em relação ao lúpus eritematoso.
- (A) O aspecto mais significativo e importante do lúpus eritematoso sistêmico é o exantema característico com aspecto de asa de borboleta sobre as regiões zigomática e nasal.
 - (B) Os pacientes com lúpus eritematoso cutâneo crônico apresentam grandes envoltimentos renais e cardíacos.
 - (C) No lúpus eritematoso sistêmico, os homens são afetados mais do que as mulheres.
 - (D) O lúpus eritematoso cutâneo subagudo apresenta características clínicas intermediárias entre o lúpus eritematoso sistêmico e o lúpus eritematoso cutâneo crônico.
 - (E) A luz solar em geral diminui as lesões de pele características.
49. Assinale a alternativa que contém apenas tumores odontogênicos mistos.
- (A) ameloblastoma, odontoma composto e cementoblastoma.
 - (B) carcinoma odontogênico de células claras, fibroma ameloblástico e odontoameloblastoma.
 - (C) mixoma odontogênico, carcinoma ameloblástico e odontoma complexo.
 - (D) tumor odontogênico de células granulares, tumor odontogênico epitelial calcificante e tumor odontogênico escamoso.
 - (E) fibrossarcoma ameloblástico, fibro-odontoma ameloblástico e odontoma complexo.
50. A sífilis primária tem como característica:
- (A) a goma.
 - (B) o cancro.
 - (C) as placas mucosas.
 - (D) o condiloma lata.
 - (E) a *lues maligna*.
51. Assinale a alternativa que contenha doenças causadas apenas por fungos.
- (A) Aspergilose, toxoplasmose e erisipela.
 - (B) Febre escarlate, histoplasmose e paracoccidiodomicose.
 - (C) Candidose, mononucleose infecciosa, histoplasmose.
 - (D) Criptococose, zigomicose e coccidiodomicose.
 - (E) Aspergilose, noma e lepra.

52. A manifestação oral mais comum da infecção pelo HIV é:
- (A) candidose.
 - (B) sarcoma de Kaposi.
 - (C) gengivite ulcerativa necrosante.
 - (D) eritema gengival linear.
 - (E) periodontite ulcerativa necrosante.
53. Assinale a alternativa que contém a sequência em ordem crescente em relação ao tamanho da hemorragia.
- (A) Púrpura, petéquias, equimose e hematoma.
 - (B) Hematoma, Petéquias, equimose e púrpura.
 - (C) Petéquias, púrpura, equimose e hematoma.
 - (D) Púrpura, equimose, petéquias e hematoma.
 - (E) Equimose, petéquias, púrpura e hematoma.
54. A leucoplasia pode se tornar displásica e até invasiva. As alterações histopatológicas das células epiteliais displásicas incluem:
- (A) diminuição da razão núcleo/citoplasma.
 - (B) diskeratose.
 - (C) núcleos hipocromáticos.
 - (D) diminuição da atividade mitótica.
 - (E) núcleos e células diminuídos.
55. Paciente negro, 50 anos, apresenta estrias esbranquiçadas distribuídas na mucosa jugal bilateralmente, assintomáticas e que não são removidas por raspagem. O aspecto esbranquiçado diminui muito ou desaparece quando a bochecha é evertida e esticada.
- O texto refere-se a:
- (A) hiperplasia epitelial focal.
 - (B) candidíase pseudomembranosa.
 - (C) líquen plano erosivo.
 - (D) eritroleucoplasia.
 - (E) leucoedema.
56. Assinale a alternativa correta em relação à neuralgia trigeminal.
- (A) O ramo mandibular é o ramo mais comumente afetado.
 - (B) A maioria dos casos de neuralgia trigeminal é causada por um músculo pressionando e sulcando a raiz do nervo trigêmeo.
 - (C) É caracterizada por uma dor de baixa intensidade e longa duração.
 - (D) A dor na neuralgia trigeminal é precipitada por um leve toque em um “ponto-gatilho” presente na pele ou mucosa dentro da distribuição do ramo nervoso envolvido.
 - (E) A dor da neuralgia trigeminal é normalmente deflagrada pela pressão sobre um dente.
57. De acordo com a classificação da IASP (Associação Internacional para o Estudo da Dor), a odontalgia atípica é uma dor
- I. pulsátil severa nos dentes na ausência de uma patologia principal;
 - II. lenta e progressiva ao longo do tempo;
 - III. cuja sua origem só é encontrada pela radiografia e não clinicamente.
- Está correto apenas o contido em
- (A) I.
 - (B) II.
 - (C) III.
 - (D) I e III.
 - (E) II e III.
58. Uma tomada radiográfica “de bochecha estufada” pode evidenciar a presença de
- (A) cálculos da glândula sublingual.
 - (B) cálculos da glândula submandibular.
 - (C) cálculos parotídeos.
 - (D) um adenoma canalicular.
 - (E) uma hiperplasia adenomatoide.
59. Os tumores benigno e maligno mais comuns de glândulas salivares são, respectivamente,
- (A) adenoma pleomórfico e oncocitoma.
 - (B) adenoma pleomórfico e carcinoma mucoepidermoide.
 - (C) adenoma de células basais e adenocarcinoma polimorfo.
 - (D) papiloma intraductal e adenocarcinoma de células acinares.
 - (E) tumor de Warthin e carcinoma mucoepidermoide.
60. Assinale a alternativa que contém as lesões potencialmente cancerizáveis mais comuns encontrados na boca.
- (A) Ceratose actínica e fibrose submucosa bucal.
 - (B) Líquen plano e leucoplasia pilosa oral.
 - (C) Nevo intradérmico e queilose actínica.
 - (D) Sífilis e vírus herpes simples.
 - (E) Leucoplasia e eritroplasia.

