



**REDES SOCIAIS A SERVIÇO DA FÉ**

*Religiosos já acusaram a Internet de corromper jovens e crianças, graças à vastidão de conteúdo - inclusive sexual – nela disponível. Mas hoje, os tempos são outros. Agora, a interatividade virtual é ferramenta para arrebanhar e interagir com fiéis. Até o papa Bento XVI, que ainda escreve com caneta tinteiro, deu o aval para o uso das redes sociais pela Igreja. A bênção foi concedida no 45º Dia Mundial das Comunicações, há pouco mais de um mês. Muito antes, porém, religiosos e espiritualistas já usufruíam da evolução das mídias. Twitter e Facebook são novos instrumentos para a fidelização de fiéis e multiplicação do rebanho online.*

Revista JC. Jornal do Commercio. p. 15. 27.03.2011.

**01. Sobre o trecho, é CORRETO afirmar que**

- A) ele declara uma rejeição à mídia por todos os segmentos sociais.
- B) a interatividade virtual é instrumento atual para congregar fiéis.
- C) todas as religiões precisam estar conectadas à Internet.
- D) o papa abomina o uso da Internet por parte dos fiéis católicos.
- E) a igreja católica se mantém indiferente aos avanços tecnológicos.

**02. Ao utilizar-se do trecho**

“Até o papa Bento XVI, que ainda escreve com caneta tinteiro, deu o aval...”

**o autor**

- A) excluiu o representante da igreja católica do cenário abordado.
- B) incluiu o papa no contexto citado, com o uso do termo “até”.
- C) demonstrou a insensibilidade do papa frente às mídias tecnológicas.
- D) esboçou um ar irônico ante a postura do papa.
- E) repudiou a participação do papa no cenário da tecnologia atual.

**03. O trecho “Muito antes, porém, religiosos e espiritualistas já usufruíam da evolução das mídias.” expressa que**

- A) uma parcela significativa de sacerdotes utiliza a Internet há um ano apenas.
- B) após a bênção papal, muitos fiéis começaram a utilizar a Internet.
- C) antes mesmo da bênção do papa, pessoas ligadas à religião e espiritualidade já faziam uso da tecnologia.
- D) antes da bênção papal, religiosos e espiritualistas repeliam a evolução das mídias.
- E) espiritualistas e religiosos despertaram para as mídias em período posterior à bênção papal.

**04. Segundo o texto abaixo:**

“Twitter e Facebook são novos instrumentos para a fidelização de fiéis e multiplicação do rebanho online”.

**é CORRETO afirmar que**

- A) todas as ferramentas online começaram a ser acessadas pelos fiéis.
- B) existem instrumentos na mídia de difícil acesso aos fiéis.
- C) com o twitter e o facebook, com certeza, haverá uma congregação de fiéis no âmbito presencial.
- D) todo rebanho online necessitará acessar o twitter e o facebook.
- E) tanto o twitter como o facebook favorecerão uma maior adesão de fiéis ao ambiente virtual.

**05. Tomando-se o título do texto, “Redes sociais a serviço da fé”, se permutássemos o termo serviço por disposição, estaria CORRETO o que se afirma na alternativa**

- A) A preposição “a” receberia o acento grave.
- B) A preposição “da” seria permutada pela preposição “com”.
- C) O texto não sofreria qualquer mudança.
- D) Estaria correto o texto: Redes sociais à disposição contra a fé.
- E) Estaria incorreto o texto: Redes sociais à disposição da fé.

**06. No trecho “Muito antes, porém, religiosos e espiritualistas já usufruíam...”, o termo sublinhado**

- A) exprime ideia de alternância.
- B) poderia ser substituído por *portanto*, sem causar prejuízo semântico.
- C) denota circunstância temporal.
- D) poderia ser permutado por *entretanto*, sem acarretar qualquer prejuízo semântico.
- E) exprime ideia de causalidade.

**07. No tocante à Concordância, analise os itens abaixo:**

- |   |
|---|
| I. “...há pouco mais de um mês.”  |
| II. “...graças à vastidão de conteúdo – inclusive sexual- nela <u>disponível</u> ”. |

**Sobre eles, é CORRETO afirmar que**

- A) no item I, o verbo existente é pessoal com o sujeito “um mês”.
- B) no item II, o termo sublinhado concorda com o termo “sexual”.
- C) no item I, o verbo existente poderia ser permutado por “existe”.
- D) no item II, o termo sublinhado se refere ao termo “conteúdo”.
- E) no item I, se o termo “mês” estivesse no plural, o verbo “haver” com ele concordaria.

**08. Em qual das alternativas abaixo, a tonicidade dos dois termos sublinhados recai na última sílaba?**

- A) “...graças à vastidão de conteúdo...”
- B) “...já usufruíam da evolução das mídias”.
- C) “ ... a fidelização de fiéis e multiplicação do rebanho online”.
- D) “Até o papa Bento XVI...” e “A bênção foi concedida...”
- E) “...– inclusive sexual – nela disponível” e “...há pouco mais de um mês”.

**09. Sobre o verbo sublinhado no trecho abaixo:**

<i>“Muito antes, porém, religiosos e espiritualistas já <u>usufruíam</u> da evolução das mídias.”</i>
---

**é CORRETO afirmar que**

- A) exige complemento sem ser regido de preposição.
- B) exige dois complementos.
- C) não pede complemento.
- D) tem como complemento os termos *religiosos* e *espiritualistas*.
- E) exige complemento regido de preposição.

**10. Assinale a alternativa cujos termos sublinhados completam o sentido de um nome e vêm regidos de preposição, caracterizando, assim, a existência da Regência Nominal.**

- A) “...religiosos e espiritualistas já usufruíam da evolução das mídias.”
- B) “...graças à vastidão de conteúdo - inclusive sexual - ...”
- C) “A bênção foi concedida no 45º Dia Mundial das Comunicações Sociais...”
- D) “...há pouco mais de um mês .”
- E) “...que ainda escreve com caneta tinteiro...”

<b>CONHECIMENTOS DO SUS</b>
-----------------------------

**11. A Lei 8.080, também chamada de Lei Orgânica da Saúde, define princípios e diretrizes para o Sistema Único de Saúde. O conjunto contínuo e articulado de ações e serviços, preventivos e curativos, individuais e coletivos, em todos os níveis de complexidade é considerado como um direito de**

- A) universalização da assistência.
- B) hierarquização da rede de serviços de saúde.
- C) integralidade da assistência.
- D) descentralização político-administrativa.
- E) hierarquização da assistência.

**12. Acerca da organização de serviços de saúde, analise os itens seguintes.**

- |   |
|---|
| I. O Sistema Único de Saúde possui níveis de atenção básica, de média e de alta complexidade. Essa divisão visa facilitar a organização e o planejamento das ações e dos serviços de saúde. |
| II. A atenção de alta complexidade é considerada a mais importante, pois nela se inserem serviços e ações essenciais ao restabelecimento da condição de saúde de um indivíduo.              |
| III. Todos os municípios brasileiros devem oferecer três níveis de atendimento em seu território. Afinal, os usuários possuem o direito de serem atendidos conforme a sua necessidade.      |
| IV. Independentemente de outros níveis, a atenção básica deve ser oferecida em todos os municípios do país.   |

**Estão CORRETOS apenas**

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) I e IV.
- D) II e III.
- E) II e IV.

**13. A regionalização dos serviços de saúde significa**

- A) a organização dos serviços segundo o volume da demanda.
- B) a descentralização administrativa das instituições da área de saúde.
- C) as distribuições de cargos e funções, segundo critérios administrativos definidos.
- D) a descentralização política, técnica e administrativa da assistência à saúde.
- E) as distribuições de cargos e funções, segundo critérios geográficos definidos.

**14. Recursos para financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) são provenientes das seguintes fontes, EXCETO:**

- A) Orçamento da União.
- B) Orçamento dos Municípios.
- C) Contribuição direta dos usuários.
- D) Orçamento da Seguridade Social.
- E) Orçamento dos Estados.

**15. Em relação à Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS/SUS), assinale a alternativa CORRETA.**

- A) Os municípios são excluídos do processo decisório do SUS sobre as políticas municipais de saúde.
- B) Tem como exigência preliminar e obrigatória para a gestão intermunicipal a realização da Programação Pactuada e Integrada (PPI).
- C) É contrária aos princípios de universalidade e equidade do SUS.
- D) Foi elaborada para ser inicialmente implantada nas regiões Sul e Sudeste do país.
- E) Antecede a NOB/96 que define as instâncias de gestão do SUS.

**16. Em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa CORRETA.**

- A) Tem como presidente o Ministro da Saúde e como órgão máximo de decisão o Congresso Nacional.
- B) Tem como diretrizes gerais a universalidade do acesso, a descentralização administrativa, a integralidade das ações e a participação popular.
- C) Exclui o setor privado da assistência médica pública.
- D) Sustenta-se com os recursos da CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras).
- E) Repassa ao Ministério da Previdência 20% da verba que arrecada para suporte das aposentadorias que se iniciaram antes de 1988, ano da promulgação da Constituição que criou o SUS.

**17. Em nível municipal, a avaliação de política de saúde será feita periodicamente, através de**

- A) editais publicados em jornais.
- B) conferências municipais de saúde.
- C) seminário interno da Secretaria de Saúde.
- D) Congresso da Associação de Moradores.
- E) audiências públicas na Câmara dos Vereadores.

**18. Os Conselhos de Saúde têm a seguinte característica:**

- A) caráter provisório, até que a Câmara de Vereadores organize uma comissão na área da saúde.
- B) caráter permanente e somente consultivo.
- C) composto exclusivamente por representantes do setor público, do setor filantrópico e das instituições de ensino.
- D) caráter permanente e deliberativo.
- E) suas decisões não precisam de homologação pelo chefe do poder legalmente constituído, em cada esfera de Governo.

**19. Os Conselhos de Saúde são as instâncias máximas de definição das políticas de saúde nos âmbitos federal, estadual, municipal e, eventualmente, no distrital. Neles é garantida a participação de diferentes setores da sociedade, cuja representação deve ter a seguinte paridade:**

- A) 50% de usuários, 25% de trabalhadores da saúde e 25% de instituições públicas e privadas.
- B) 50% de trabalhadores da saúde, 25% de instituições públicas e privadas e 25% de usuários.
- C) 50% de instituições públicas e privadas, 25% de usuários e 25% de trabalhadores da saúde.
- D) 50% de poder legislativo, 25% de poder executivo e 25% do poder judiciário.
- E) 50% de usuários, 25% do poder legislativo e 25% de trabalhadores da saúde.

**20. Segundo a Constituição Federal de 1988, o Sistema Único de Saúde (SUS) é definido como um sistema descentralizado, com comando único em cada esfera de governo, o que implica que**

- A) Estados e Municípios financiem somente com recursos próprios seus respectivos sistemas de saúde.
- B) é necessário delegar autonomia para que Estados e Municípios formulem e implementem as respectivas políticas de saúde.
- C) cabe à União somente a responsabilidade pela execução das ações de Saúde Pública.
- D) cabe à União a responsabilidade exclusiva pelo financiamento das ações de Saúde Pública.
- E) cabe à União a responsabilidade exclusiva do financiamento da assistência médica hospitalar através das AIH.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**21. Com relação aos achados endoscópicos comuns da retocolite ulcerativa inespecífica, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) Friabilidade.
- B) Processo inflamatório contínuo.
- C) Granulosidade.
- D) Pedra de calcamento.
- E) Apagamento da trama vascular.

**22. Com relação ao tratamento das fístulas perianais na doença de Crohn, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) Metronidazol e ciprofloxacino são antibióticos incluídos no esquema do tratamento das fístulas acima.
- B) Não há indicações definidas ao uso do infliximabe no tratamento das fístulas na doença de Crohn.
- C) Em algumas situações, pode-se indicar o uso de supositórios de ácido 5-aminossalicílico.
- D) O fato de uma fístula parar de drenar não necessariamente significa que houve o seu fechamento; ao contrário, esse fechamento pode levar muitos meses para acontecer.
- E) A presença de abscessos pode ser um indicativo de falha terapêutica das fístulas.

**23. Em relação ao tratamento da síndrome do intestino irritável, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) Tegaserode é um agonista dos receptores 5HT 3 da serotonina.
- B) Brometo de pinavério é um bloqueador dos canais de cálcio.
- C) Trimebutina é um agonista opioide.
- D) Brometo de otilonio tem atividade bloqueadora do canal de cálcio.
- E) Buspirona tem ação espasmolítica.

**24. Assinale a alternativa INCORRETA em relação ao câncer colorretal.**

- A) O potencial de malignização de um pólipos adenomatoso é de cerca de 10%.
- B) Os pólipos tubulares são os mais frequentes dos pólipos adenomatosos.
- C) Os pólipos vilosos são os que possuem risco maior de malignização.
- D) Os pólipos hamartomatosos também podem sofrer transformação maligna.
- E) Os pólipos hiperplásicos são raros no cólon.

**25. Em relação ao carcinoma gástrico, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) Representa cerca de 10% de todos os casos de cânceres no mundo.
- B) O *Helicobacter pylori* é considerado um fator importante na gênese do câncer gástrico, sendo a prevalência estimada deste microorganismo no Brasil, em torno de 70 a 90%.
- C) Sal, asbesto, nitratos e benzopireno são fatores dietéticos que podem contribuir para o aparecimento do câncer gástrico.
- D) A mucosa de cotos gástricos principalmente com a reconstrução gastrojejunal à Billroth II possui risco de desenvolver câncer gástrico 4 a 5 vezes maior do que a população normal.
- E) Pela classificação macroscópica de Borrmann, só não há infiltração no Borrmann tipo I.

**26. Com relação à diverticulite, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) O uso de antibióticos pode chegar a 14 dias ou até mais.
- B) O ultrassom e a tomografia abdominais são considerados os exames de primeira escolha para o diagnóstico da diverticulite, sendo a tomografia ainda melhor.
- C) Acomete cerca de 10 a 25% dos portadores da doença diverticular.
- D) O tempo máximo para se indicar a cirurgia nos casos de diverticulite é em torno de 12 horas, após o início do processo inflamatório.
- E) Tanto o enema opaco como a colonoscopia devem ser evitados em presença da diverticulite.

**27. Quanto ao esôfago de Barrett, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) Caracteriza-se por epitélio escamoso associado à metaplasia intestinal, sendo esta metaplasia em geral incompleta.
- B) Mais frequente no sexo masculino, em brancos e asiáticos.
- C) A maioria dos pacientes não apresenta hérnia de hiato.
- D) Secreções duodenais são importantes na gênese da doença.
- E) Há risco de ocorrer transformação maligna nos segmentos longo e curto do esôfago de Barrett.

**28. Com relação às hepatites virais, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) O vírus B é um DNA vírus.
- B) O vírus A é um RNA vírus.
- C) O vírus C é um RNA vírus.
- D) O vírus B e o vírus C são oncogênicos.
- E) Hepatite fulminante é comum na hepatite C.

**29. Para a Hepatite C, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) O genótipo 4 é o mais frequente no Brasil.
- B) O vírus C é o principal agente causador das hepatites pós-transfusionais.
- C) A transmissão por contato sexual e vertical pode ocorrer na Hepatite C.
- D) O Elisa é o primeiro teste diagnóstico da Hepatite C.
- E) A confirmação do Elisa é realizada pela determinação qualitativa do RNA do VHC.

**30. Na acalásia chagásica, é CORRETO afirmar que**

- A) a manometria é o método padrão ouro para o diagnóstico da doença.
- B) a pressão do esfíncter inferior esofágico é inferior à observada na população geral.
- C) o tratamento cirúrgico já é indicado a partir da acalásia de grau II, enquanto que, no grau I, a dilatação pneumática da cárdia é o tratamento de escolha.
- D) a principal limitação ao tratamento com injeções endoscópicas da toxina botulínica é justificada pelo seu custo elevado, apesar de não necessitar de repetição de injeções posteriores.
- E) uma alternativa ao uso da toxina é a utilização de antagonistas do cálcio, como a nifedipina a qual, além de seu baixo custo, é isenta de efeitos colaterais nas doses usuais para o tratamento da acalasia.

**31. Na hemorragia digestiva, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) Na classificação de Forrest, na doença ulcerosa péptica sangrante, o tipo IIb corresponde ao coágulo aderido.
- B) De um modo geral, podemos estimar uma perda sanguínea de mais de 2000 ml em presença de uma pressão sistólica menor que 90 mmHg e frequência cardíaca acima de 120 bpm.
- C) O tratamento do sangramento na doença diverticular dos cólons é eminentemente clínico, pois a maioria dessas hemorragias cessa espontaneamente.
- D) Na grande maioria das vezes, torna-se necessário o tratamento endoscópico da hemorragia na síndrome de Mallory-Weiss.
- E) São causas raras de hemorragia digestiva baixa a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa.

**32. Na pancreatite aguda, todas as condutas abaixo estão incorretas, EXCETO UMA. Assinale-a.**

- A) O uso de antibióticos é indicado em todos os pacientes com pancreatite aguda, sendo o imipenem um dos mais utilizados.
- B) Para o tratamento da dor, o uso da meperidina está contraindicada devido à possibilidade de esta droga causar espasmo do esfíncter de Oddi.
- C) A passagem de sonda nasogástrica, de um modo geral, é indicada, apenas, nos casos de vômitos ou íleo paralítico.
- D) A administração de insulina deve ser iniciada a partir de valores glicêmicos de 160 a 180 mg%.
- E) Além da dieta zero, o uso de atropina é outro fator importante para a redução da secreção pancreática.

**33. Na pancreatite crônica,**

- A) a ascite quase sempre decorre da rotura de cisto pancreático.
- B) a evolução da doença independe da interrupção hábito etílico.
- C) doenças cardiovasculares são uma das causas mais frequentes de morte.
- D) o tratamento da ascite inicialmente é clínico.
- E) a trombose da veia esplênica pode originar varizes gástricas.

**34. Para o câncer pancreático, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) A história familiar ocorre em até 10% dos casos.
- B) A maioria das neoplasias pancreáticas consiste em carcinomas de células acinares.
- C) A colangiopancreatografia por ressonância magnética permite estudar as vias biliares, os ductos pancreáticos bem como o parênquima pancreático.
- D) A colangiopancreatografia retrógrada endoscópica vem deixando de ser um teste sensível para o diagnóstico do câncer pancreático.
- E) A ultrassonografia endoscópica pode detectar lesões menores do que 2cm.

**35. Na doença celíaca, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) A biópsia endoscópica do intestino delgado é o principal exame para o seu diagnóstico.
- B) O estudo radiológico do intestino delgado é normal na maioria dos casos dessa doença.
- C) Os testes sorológicos são métodos úteis para o diagnóstico dessa doença.
- D) Os testes sorológicos são úteis na monitorização do tratamento dessa doença.
- E) Quando se preconiza o tratamento com cálcio e vitamina D, os raios x ósseos têm muita importância na monitorização destes suplementos.

**36. Assinale a alternativa INCORRETA em relação à icterícia.**

- A) A maioria das síndromes ictericas estão associadas à colestase.
- B) As icterícias não-colestáticas caracterizam-se pela presença de hiperbilirrubinemia direta.
- C) A icterícia se manifesta de forma clínica, quando os níveis séricos de bilirrubinas elevam-se acima de 2,5 mg/dl.
- D) Na colestase extra-hepática, a ultrassonografia mostra dilatação das vias biliares intra-hepáticas.
- E) Nas icterícias colestáticas, ocorre elevação das transaminases em presença de lesões hepatocelulares.

**37. Assinale a alternativa INCORRETA em relação à ascite.**

- A) O achado clínico de ascite não é detectado em pacientes com menos de 700 ml de líquido.
- B) Quando ocorre a hipertensão portal, ocorre um aumento de mediadores vasoativos que levam à vasodilatação arteriolar esplâncnica, tais como o óxido nítrico e prostaglandinas.
- C) A ascite pode ser observada em cirróticos com boa reserva do parênquima hepático.
- D) Uma das contra-indicações ao implante da válvula de Le Veen é a presença de ascite refratária.
- E) Nas paracenteses, recomenda-se a infusão 10 g de albumina para cada litro de ascite drenada.

**38. Em relação à doença ulcerosa péptica, é INCORRETO afirmar que**

- A) a úlcera gástrica é mais frequentemente relacionada ao uso dos AINES do que a úlcera duodenal.
- B) a infecção pelo *Helicobacter pylori* é responsável por cerca de 80% de portadores de úlcera gástrica.
- C) a reinfeção é considerada atualmente pouco frequente, mesmo em regiões de alta prevalência.
- D) em geral, recomenda-se, no máximo, mais dois tratamentos da infecção pelo *Helicobacter pylori*, após a falha da primeira tentativa de erradicação da bactéria.
- E) dentre as indicações da levofloxacina no tratamento do *Helicobacter pylori* destaca-se o seu uso no primeiro esquema de tratamento junto à claritromicina.

**39. Com relação ao álcool nas doenças do fígado, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) No alcoolismo, a probabilidade de surgimento da cirrose ocorre pela ingestão diária de 40 a 80mg/dia de etanol por, no mínimo, 5 anos.
- B) O sexo feminino é mais sensível às agressões hepáticas do etanol em relação ao sexo masculino.
- C) Na doença hepática crônica, há um predomínio do nível sérico da alanina transaminase (ALT) sobre a aspartato aminotransferase (AST).
- D) A gama GT eleva-se em 90% dos casos da doença crônica hepática por álcool.
- E) Na biópsia hepática, na hepatite crônica alcoólica, podemos encontrar corpúsculos de Mallory.

**40. Assinale a opção INCORRETA com relação ao fígado e às drogas.**

- A) O adenoma é o principal tumor hepático de origem medicamentosa.
- B) A claritromicina pode causar hepatite colestática.
- C) As hepatites medicamentosas são mais frequentes em idosos.
- D) Não há preferência de sexo para lesões hepáticas, induzidas por medicamentos.
- E) O omeprazol pode causar lesão hepática.

**41. Assinale a alternativa CORRETA relacionada à AIDS e ao aparelho digestivo.**

- A) No pâncreas, o principal agente oportunista causador de pancreatite aguda é o *citomegalovírus*.
- B) A candidíase esofágica é adequadamente tratada com cetoconazol associada à anfotericina B na maioria dos casos.
- C) O *citomegalovírus* raramente causa colite em portadores de AIDS.
- D) Causa rara de proctites na AIDS é a infecção pelo *Herpes simplex*.
- E) A infecção intestinal pelo *Clostridium difficile* acomete frequentemente não só o intestino grosso como também o intestino delgado.

**42. Sobre as diarreias, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) A presença de leucócitos nas fezes confirma o diagnóstico de diarreia aguda não inflamatória.
- B) Nas diarreias, a leucopenia com desvio para a esquerda pode sugerir etiologia por *Shigella*.
- C) A diarreia dos viajantes tem como um dos principais agente etiológicos a *Escherichia coli*.
- D) A diarreia pelo *Clostridium difficile* pode ser tratada com vancomicina, durante 7 a 14 dias.
- E) O tratamento antimicrobiano empírico de escolha das diarreias, quando indicado, hoje em dia se faz com quinolonas.

**43. Sobre o megacólon congênito, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) A forma mais comum é a que se restringe ao reto e ao sigmoide.
- B) Ocorre por volta da 12ª semana de vida intrauterina.
- C) Há ausência congênita de ambos os plexos: dos gânglios mioentéricos de Auerbach e submucosos de Meissner.
- D) A enterocolite é considerada uma complicação grave da doença.
- E) A radiografia do abdome é específica para o diagnóstico do megacólon congênito.

**44. Em relação às colecistopatias, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) Os cálculos de colesterol, em geral, são mistos, constituídos, também, mas, em menor quantidade, de sais biliares, sais de cálcio e outras substâncias.
- B) Há relatos de hereditariedade em alguns casos de colelitíase.
- C) A lama biliar deve ser tratada cirurgicamente (colecistectomia) devido à frequente evolução para formação dos cálculos maiores.
- D) A tríade de Charcot caracteriza a presença de colangite.
- E) O tratamento da vesícula hidrópica é cirúrgico (colecistectomia).

**45. Sobre a Dispepsia Funcional (DF), assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) Estudos demonstram que a secreção basal e o pico de ácido gástrico de portadores da DF não diferem dos indivíduos sem esta condição.
- B) Na DF, os sintomas costumam acordar o paciente durante a madrugada.
- C) Retardo no esvaziamento gástrico é verificado em metade dos portadores da DF.
- D) A melhora sintomatológica com placebo pode ocorrer em mais da metade dos casos.
- E) Pacientes com intolerância a leite excluem a possibilidade de dispepsia funcional.

**46. Sobre as parasitoses intestinais, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) a giardíase pode ser tratada com albendazol em doses semelhantes às utilizadas para a strongiloidíase.
- B) a nitazoxanida não é efetiva no tratamento da strongiloidíase.
- C) oxamniquina e praziquantel são drogas de eficácia comparada no tratamento da esquistossomose.
- D) o praziquantel pode tratar a teníase, embora seja baixo índice de cura.
- E) a ivermectina tem eficácia comprovada na ascariíase.

**47. Assinale a alternativa INCORRETA em relação ao mecanismo de ação dos medicamentos abaixo:**

- A) Bisacodil - laxativo estimulante.
- B) Sene - formador de massa.
- C) Lactulose - laxativo osmótico.
- D) Plantago - formador de massa.
- E) Macrogol - laxativo osmótico.

**48. Sobre as colecistopatias, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) Dentre as bactérias frequentemente encontradas nas colecistites agudas calculosas, temos a *Echerichia coli*.
- B) A perfuração vesicular é uma das complicações da colecistite, ocorrendo, em geral, para peritônio livre.
- C) O sinal clínico de Murphy é um sinal específico valioso para o diagnóstico da colecistite aguda.
- D) Na colecistite aguda não complicada, a leucocitose raramente ultrapassa 10.000 células por mm<sup>3</sup>.
- E) É rotineiro o uso de antibióticos em portadores de colecistite aguda.

**49. Sobre o megacólon chagásico, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) O fecaloma ocorre em mais da metade dos casos.
- B) O diagnóstico do volvo é realizado pela radiografia simples do abdome.
- C) Dentre todas as complicações do megacólon, a mais grave é a perfuração para peritônio livre.
- D) É raro em idosos.
- E) Sua incidência parece ser um pouco maior em relação ao megaesôfago.

**50. Assinale a alternativa CORRETA relacionada à pseudo-obstrução intestinal.**

- A) Pode ocorrer na doença de Chagas.
- B) A sua persistência além de 1 mês caracteriza a forma crônica.
- C) O hipertireoidismo pode ser um fator etiológico.
- D) Não há relatos na literatura de uso de antidepressivos como causa de pseudo-obstrução intestinal.
- E) Não há evidências de história familiar.