

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno com o enunciado das 40 (quarenta) questões objetivas divididas nas seguintes sessões:

LÍNGUA PORTUGUESA		CONHECIMENTOS DE SUS		CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS	
Questões	Pontos	Questões	Pontos	Questões	Pontos
1 a 10	2	11 a 20	2	21 a 40	3

b) Uma (1) Folha de Respostas, destinada às respostas das questões objetivas formuladas nas provas, a ser entregue ao fiscal no final.

02- Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem na confirmação de inscrição. Caso contrário, notifique **IMEDIATAMENTE** o fiscal.

03- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio da Folha de Respostas, preferivelmente à caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul.

04- Tenha muito cuidado com a Folha de Respostas para não a **DOBRAR, AMASSAR** ou **MANCHAR**. A folha somente poderá ser substituída caso esteja danificada em suas margens superior ou inferior – **BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA**.

05- Na prova, as questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima do enunciado.

06- Na folha de respostas, as mesmas estão identificadas pelo mesmo número e as alternativas estão identificadas acima da questão de cada bloco de respostas.

07- Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar **UMA RESPOSTA**. A marcação de nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a questão, **MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA**.

08- Na **Folha de Respostas**, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo **TODO O ESPAÇO** compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando **caneta esferográfica de tinta preta ou azul**, de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcação completamente, procurando deixar menos "espaços em branco" possível dentro do retângulo, sem invadir os limites dos retângulos ao lado.

09- **SERÁ ELIMINADO** do Concurso o candidato que:

a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelhos de calcular, bem como rádios gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;

b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o **Caderno de Questões e/ou a Folha de Respostas**.

10- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua **Folha de Respostas**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões **NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA**.

11- Quando terminar, entregue ao fiscal o Caderno de Questões e a Folha de Respostas, e **ASSINE A LISTA DE PRESENÇA**.



◆ Língua Portuguesa ◆

Questão 01

Assinale a alternativa que contém uma frase em que há uma palavra formada por derivação parassintética.

- A) A presença da nobreza conferiu à vida carioca caráter modelar.
- B) A vinda da Corte fez surgir uma classe social, a bem dizer repatriada.
- C) Esta é, hoje, a Biblioteca Nacional, símbolo do poder das letras.
- D) Quando família real portuguesa chegou o Rio, o Português já era uma língua vitoriosa.
- E) Vale considerarmos que a linguagem é a expressão do pensamento.

Questão 02

O seguinte fragmento foi retirado de uma notícia publicada na imprensa nacional:

“Ao ficar sozinho no quarto do hospital, protegido pela tenda de oxigênio e pelas paredes do aposento, deu-se conta, afinal, da gravidade da sua situação. Os médicos estavam lutando por prolongar a vida de um homem _____ coração trabalhara bem mais que o seu próprio dono.”

A alternativa que contém o termo que preenche corretamente a lacuna no fragmento acima é

- A) do qual.
- B) cujo.
- C) que.
- D) o qual.
- E) de cujo.

Questão 03

A palavra “efêmero” pode significar, conforme se lê no dicionário do Aurélio, aquilo que é “pouco duradouro”, “passageiro”. Assinale a alternativa abaixo que contém a palavra com sentido contrário ao do termo destacado.

- A) mutante.
- B) permanente.
- C) provisório.
- D) temporário.
- E) transitório.

Questão 04

Assinale a alternativa em que a forma verbal presente no fragmento selecionado apresenta idéia de hipótese ou possibilidade:

- A) A evolução dos falares medievos resultou nas línguas nacionais existentes hoje.
- B) A maioria dos estudiosos contesta a noção dicotômica de certo e errado em língua.
- C) É bem provável que a primeira palavra proferida na Lua tenha sido “OK”.
- D) Pesquisas linguísticas garantem que a capacidade da fala é inerente à natureza humana.
- E) Sobre a fala das gentes das cavernas não há registro confiável, só existem indícios.

Questão 05

Sabendo-se que a figura de **personificação** ou **prosopopéia** consiste em atribuir características humanas a seres inanimados ou irracionais, reconhece-se que esse recurso expressivo está presente na frase:

- A) Constatamos que o tempo se escoara: já era quase noite.
- B) Disfarçando o olhar, o aluno espiou as horas.
- C) Passara se voando o último ônibus que o transportaria à praia.
- D) Um chuvisco ralo brincava no ar da tarde.
- E) Urgia que se protegessem as árvores centenárias.

Questão 06

Marque a alternativa em que a frase está construída de forma escoreta, de acordo com todos os níveis da língua padrão escrita:

- A) A história foi repetida bastantes vezes.
- B) Amo ela com toda força do meu coração juvenil.
- C) Ela estava toda encabulada com a proposta.
- D) Mudei-me para o interior há muitos anos atrás.
- E) O navio naufragou rapidamente, emergindo no mar encapelado.

Questão 07

Para pontuar períodos compostos em que surgem orações subordinadas substantivas, basta considerar as funções sintáticas por elas exercidas. Não se separam, por exemplo, com vírgula, a oração principal das orações subjetivas, objetivas diretas, objetivas indiretas, completivas nominais e predicativas – afinal, sujeitos, complementos verbais e nominais não se separam, por vírgulas, dos termos a que se ligam; o mesmo se pode dizer do predicativo nos predicados nominais.

Por esse entendimento, marque a alternativa que contém um período pontuado indevidamente.

- A) Algumas pessoas vivem presas unicamente às suas profissões, aos seus interesses pessoais.
- B) É surpreendente constatar que, apesar de tudo, muitos ainda acreditam em resolver nossos problemas com promessas demagógicas.
- C) Não se confia mais em que tudo possa ser resolvido apenas por palavras, por intenções.
- D) Peço-lhe compreender nossos problemas com moradia, com emprego fixo, com salários baixos.
- E) Vive-me pedindo, que o ajude, que interfira em seu favor, que realize as suas obrigações.

Questão 08

Indique a alternativa que contém erro na separação de sílábica.

- A) cul-tua-va; di-á-lo-go.
- B) en-toa-ção; ab-rup-to.
- C) pers-pi-caz; obs-curo.
- D) pneu; subs-cre-ver.
- E) trans-atlân-ti-co, i-guais.

Questão 09

Das seguintes alternativas, marque aquela que apresenta a frase em que o adjetivo sublinhado não corresponde ao sentido indicado à direita.

- A) A verdade é formarmos uma sociedade **fendida**. (dividida, desunida).
- B) Era um homem **inepto** para realizar aquela tarefa. (tolo, idiota).
- C) Este desnível **clamoroso** nos confere o título de campeões da injustiça social. (gritante, muito evidente).
- D) O fato, por ser **contemporâneo**, foi devidamente divulgado na imprensa. (coevo, coetâneo).
- E) Todo esse mar de **alienados** compõe a periferia dos patrícios desvalidos. (ansioso, ávido).

Questão 10

Marque a alternativa que apresenta uso indevido do sinal indicativo de crase.

- A) Dirigiu-se àquele lugar sagrado para todos.
- B) Esta é a questão a que fizemos referência na assembleia.
- C) Lá vai a pessoa à quem deste a notícia alarmante.
- D) O assaltante foi morto a tiro.
- E) O Curso funciona de segunda a sexta-feira.

◆ **Conhecimentos de SUS** ◆

Questão 11

Nos casos em que o Sistema Único de Saúde for insuficiente para garantir a cobertura assistencial à população de uma área, poderá ser formalizada, por contrato ou por convênio, a participação complementar de serviços privados. Nesta situação terão preferência:

- A) Os hospitais sob gestão dos seguro-saúde.
- B) Os hospitais gerais de nível terciário.
- C) As entidades filantrópicas.
- D) Os serviços de diagnóstico complementar.
- E) Os hospitais com serviço de urgência.

Questão 12

O programa de Atenção Básica nos municípios e no Distrito Federal exige a criação de Unidades Básicas de Saúde (UBS), acopladas ou não ao Programa de Saúde da Família, que devem estar inscritas no cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde. Para as UBS com programa de Saúde da Família em grandes centros urbanos recomenda-se:

- A) 1 UBS para até 12 mil habitantes.
- B) 1 UBS para até 10 mil habitantes.
- C) 1 UBS para até 8 mil habitantes.
- D) 1 UBS para até 15 mil habitantes.
- E) 1 UBS para até 20 mil habitantes.

Questão 13

Na organização de redes loco regionais de atenção integral às urgências os serviços de terapia intensiva fazem parte do componente:

- A) Pré hospitalar móvel.
- B) Pré hospitalar fixo.
- C) Pós hospitalar.
- D) Hospitalar dia.
- E) Hospitalar.

Questão 14

A participação popular no SUS é feita através das Conferências de Saúde e dos Conselhos de Saúde. Os Conselhos de Saúde são órgãos deliberativos permanentes compostos por:

- A) 20% de usuários e 80% do governo, trabalhadores de saúde e prestadores privados.
- B) 90% de usuários e 10% do governo, trabalhadores de saúde e prestadores privados.
- C) 10% de usuários e 90% do governo, trabalhadores de saúde e prestadores privados.
- D) 50% de usuários e 50% do governo, trabalhadores de saúde e prestadores privados.
- E) 70% de usuários e 30% do governo, trabalhadores de saúde e prestadores privados.

Questão 15

A Política Nacional de Atenção Básica, pela portaria nº 648/GM, de 28 de março de 2006, estabelece que cada Agente Comunitário de Saúde deve atender uma população de no máximo:

- A) 750 habitantes.
- B) 550 habitantes.
- C) 650 habitantes.
- D) 450 habitantes.
- E) 850 habitantes.

Questão 16

Comissões Intersetoriais de âmbito nacional subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde devem articular políticas e programas de interesse para a saúde cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do SUS. Exemplo de atividade cuja articulação cabe as Comissões Intersetoriais é:

- A) Educação básica.
- B) Saneamento e meio ambiente.
- C) Educação profissionalizante.
- D) Saúde do adolescente.
- E) Transporte urbano.

Questão 17

No âmbito do SUS, na esfera federal, os recursos financeiros originários do orçamento da Seguridade Social, de outros orçamentos da união, e de outras fontes, serão administrados pelo Ministério da Saúde através do Fundo:

- A) Nacional de Saúde.
- B) Orçamentário Federal.
- C) Nacional do Bem Estar Social.
- D) Nacional de Seguridade Social.
- E) Orçamentário de Seguridade Social.

Questão 18

Exemplo de prioridade do Pacto de Gestão do SUS, de acordo com a portaria GM/MS 399, de 22 de fevereiro de 2006, é:

- A) Implementar um projeto permanente de mobilização social.
- B) Elaborar e divulgar a carta dos direitos dos usuários do SUS.
- C) Definir inequívocamente a responsabilidade sanitária de cada instância do SUS.
- D) Implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa.
- E) Elaborar e implantar a Política Nacional de Promoção da Saúde.

Questão 19

Considerar que todos têm direito aos serviços de saúde, diminuir desigualdades tratando desigualmente os desiguais e investir mais onde a carência é maior caracteriza um princípio de justiça social do SUS definido como:

- A) Integralidade.
- B) Universalização.
- C) Hierarquização.
- D) Descentralização.
- E) Equidade.

Questão 20

O bloco de financiamento para a Assistência Farmacêutica inclui os componentes ditos Básico, Estratégico e de Medicamentos de Dispensação Excepcional. Exemplo de medicamento que poderá ser fornecido por financiamento para Programa Estratégico inclui aqueles usados no tratamento da:

- A) Dengue.
- B) Influenza.
- C) Doença de Chagas.
- D) Leptospirose.
- E) Hipertensão arterial.

◆ **Conhecimentos Específicos** ◆

Questão 21

Qual exame é indicado para avaliação dos fatores II, V, VII e X?

- A) Tempo de Protrombina.
- B) Tempo de tromboplastina.
- C) Hemograma.
- D) Tempo de sangramento.
- E) Prova do laço

Questão 22

Paciente que apresenta queixa de perda de paladar no terço posterior da língua, sugere complicações com qual par craniano?

- A) V.
- B) XI.
- C) IX.
- D) VII.
- E) XII.

Questão 23

A tireotoxicose pode ocorrer em pacientes com

- A) Síndrome de Reiter.
- B) Doença de Graves.
- C) Doença de Still.
- D) Síndrome de Steiner.
- E) Doença de Cushing.

Questão 24

Quais são as regiões inervadas sensitivamente pelos ramos terminais do nervo infra-orbitário?

- A) Pálpebra superior, asa do nariz e lábio superior.
- B) Pálpebra inferior, asa do nariz, lábio superior e lábio inferior.
- C) Pálpebra inferior, asa do nariz e lábio superior.
- D) Pálpebra inferior, lábio superior e mucosa do palato mole.
- E) Lábio superior e região geniana.

Questão 25

Qual espaço tecidual potencial pode levar a uma mediastinite se for atingido por uma infecção odontogênica?

- A) Submentoniano.
- B) Bucal.
- C) Fossa canina.
- D) Retrofaríngeo.
- E) Infratemporal.

Questão 26

Qual antibiótico atua inibindo a síntese protéica bacteriana, através da inibição da ligação às unidades 50S dos ribossomas?

- A) Eritromicina.
- B) Penicilina.
- C) Cefalosporina.
- D) Tetraciclina.
- E) Aminoglicosídeos.

Questão 27

Qual a dose máxima recomendada de uma solução anestésica de lidocaína a 2% em um homem de 70 Kg, em número de tubetes anestésicos?

- A) 2.
- B) 4.
- C) 8.
- D) 14.
- E) 10.

Questão 28

Com relação ao Ceratocistos Odontogênicos é INCORRETO afirmar que

- A) apresentam alta taxa de recidiva.
- B) são mais comuns na mandíbula do que na maxila.
- C) apresentam histologicamente epitélio ceratinizado.
- D) apresentam-se radiograficamente multiloculares.
- E) podem estar associados à Síndrome de Gorlin e Goltz.

Questão 29

Qual alternativa representa uma artropatia rara, benigna e caracterizada pelo desenvolvimento metaplásico de nódulos cartilaginosos dentro da membrana sinovial?

- A) Condroma.
- B) Condrosarcoma.
- C) Condromatose Sinovial.
- D) Osteíte articular.
- E) Fibroma Condromixóide.

Questão 30

Qual técnica cirúrgica é usada para tratamento de lesões císticas intra-ósseas, pela qual se remove uma parte da lesão mantendo-a aberta em solução de continuidade com a mucosa oral?

- A) Marsupialização.
- B) Descompressão.
- C) Cauterização.
- D) Enucleação.
- E) Ressecção segmentar.

Questão 31

Pacientes com insuficiência renal em estágio final necessitam de esquemas especiais de prescrição de medicamentos, sendo mais fácil reajustar esquemas terapêuticos por meio de maior espaçamento entre doses. Para isto leva-se em conta a creatinina sérica (Cr sérica), que expressa a função renal. Qual a fórmula que se pode empregar para calcular o intervalo entre as doses nos pacientes com insuficiência renal?

Considere:

Tir: intervalo em insuficiência renal.

T usual: intervalo em indivíduo normal.

- A) $Tir = Cr \text{ sérica} \times T \text{ usual}$.
- B) $Tir = Cr \text{ sérica} \times T \text{ usual} / 2$.
- C) $Tir = Cr \text{ sérica} \times T \text{ usual} / 4$.
- D) $Tir = Cr \text{ sérica} \times T \text{ usual} / 10$.
- E) $Tir = Cr \text{ sérica} \times T \text{ usual} / 100$.

Questão 32

Assinale a alternativa CORRETA relacionada à transmissão do impulso nervoso e modo de ação dos anestésicos locais, segundo a teoria do receptor específico na fibra nervosa.

- A) As fibras desmielinizadas transmitem o impulso nervoso mais lentamente do que as mielinizadas; a ação dos anestésicos se dá deslocando íons cálcio do receptor do canal de sódio, o que leva o anestésico a se ligar a este receptor, levando ao bloqueio do canal de sódio, que, por sua vez, leva a redução na condutância do potássio, o que leva a depressão na velocidade de despolarização elétrica, causando a não obtenção do nível do potencial limiar juntamente com a inexistência de potenciais de ação propagados, o que é chamado de bloqueio da condutância.
- B) As fibras desmielinizadas transmitem o impulso nervoso mais rapidamente do que as mielinizadas; a ação dos anestésicos se dá deslocando íons cálcio do receptor do canal de cloro, o que leva o anestésico a se ligar a este receptor, levando ao bloqueio do canal de sódio, que, por sua vez, leva a redução na condutância do potássio, o que leva a depressão na velocidade de despolarização elétrica, causando a não obtenção do nível do potencial limiar juntamente com a inexistência de potenciais de ação propagados, o que é chamado de bloqueio da condutância.
- C) As fibras desmielinizadas transmitem o impulso nervoso mais lentamente do que as mielinizadas; a ação dos anestésicos se dá deslocando íons cloro do receptor do canal de sódio, o que leva o anestésico a se ligar a este receptor, levando ao bloqueio do canal de sódio, o que, por sua vez, leva à redução na condutância do sódio, o que leva a depressão na velocidade de despolarização elétrica, causando a não obtenção do nível do potencial limiar juntamente com a inexistência de potenciais de ação propagados, o que é chamado de bloqueio da condutância.
- D) As fibras desmielinizadas transmitem o impulso nervoso mais lentamente, pois o impulso se dá por saltos, ao contrario das mielinizadas; a ação dos anestésicos se dá deslocando íons cálcio do receptor do canal de sódio, o que leva o anestésico a se ligar a este receptor, levando ao bloqueio do canal de sódio, o que leva a redução na condutância do sódio, o que leva, por sua vez, à depressão na velocidade de despolarização elétrica, o que leva a não obtenção do nível do potencial limiar juntamente com a inexistência de potenciais de ação propagados, o que é chamado de bloqueio da condutância.
- E) As fibras desmielinizadas transmitem o impulso nervoso mais lentamente do que as mielinizadas; a ação dos anestésicos se dá deslocando íons cálcio do receptor do canal de cloro, o que leva o anestésico a se ligar a este receptor, levando ao bloqueio do canal de sódio, o que, por sua vez, leva à redução na condutância do cálcio, o que leva à depressão na velocidade de despolarização elétrica, causando a não obtenção do nível do potencial limiar juntamente com a inexistência de potenciais de ação propagados, o que é chamado de bloqueio da condutância.

Questão 33

São consideradas lesões malignas de glândulas salivares:

- A) sialometaplasia necrosante, oncocitoma, carcinoma mucoepidermóide, carcinoma adenóide cístico, adenocarcinoma polimorfo de baixo grau.
- B) oncocitoma, carcinoma mucoepidermóide, carcinoma adenóide cístico, adenocarcinoma polimorfo de baixo grau.
- C) carcinoma mucoepidermóide, carcinoma adenóide cístico, adenocarcinoma polimorfo de baixo grau, adenoma de células basais.
- D) carcinoma mucoepidermóide, carcinoma adenóide cístico, adenocarcinoma polimorfo de baixo grau, carcinosarcoma.
- E) carcinoma adenóide cístico, adenocarcinoma polimorfo de baixo grau, carcinosarcoma e oncocitoma

Questão 34

Levando em consideração às classificações referentes à angulação e a de Pell e Gregory do posicionamento dos terceiros molares inferiores, a alternativa que corresponde à posição mais difícil para remoção destes dentes é a seguinte:

- A) horizontal, 3C.
- B) disto angulado, 3C.
- C) horizontal, 1B.
- D) disto angulado, 1B.
- E) meso angulado, 3C.

Questão 35

Quando da prescrição de antimicrobianos para um paciente que realizou procedimento cirúrgico, deve-se tomar cuidado na escolha correta da droga. Assinale a alternativa CORRETA em relação à classificação e ao espectro de ação de alguns antimicrobianos.

- A) Cefoxitina é uma cefalosporina de 3ª geração indicada para infecções de vias urinárias por microrganismos anaeróbios, que pode causar sangramento.
- B) Ceftriaxona e Cefotaxima são cefalosporinas de 3ª geração anti-pseudomonas.
- C) Cefazolina e cefalotina são cefalosporinas de 2ª geração não indicadas para estreptococos e estafilococos, por resistência bacteriana.
- D) Oxacilina é uma cefalosporina semi-sintética de espectro de ação amplo, indicada para infecções severas.
- E) Sulbactam é uma cefalosporina de 3ª geração.

Questão 36

Com relação ao Diabete Melito é CORRETO afirmar o seguinte:

- A) as principais complicações neurológicas em diabéticos são: neuropatia periférica, neuropatia autônoma e alterações na mobilidade gastrointestinal.
- B) não se observa em diabéticos, modificação no risco de infecção na pele, trato urinário e bucal.
- C) há indicação absoluta de antibioticoterapia pré-operatória para cirurgia oral em pacientes diabéticos.
- D) os diabéticos controlados não apresentam uma grande incidência e gravidade da doença periodontal.
- E) o padrão de erupção dentária de crianças diabéticas é normal.

Questão 37

Com relação à tuberculose é INCORRETO afirmar que

- A) o teste cutâneo positivo indica infecção ativa ou que houve infecção.
- B) o diagnóstico definitivo requer cultura de microrganismos positiva.
- C) no tratamento dos pacientes com doença ativa é necessária uma quimioterapia combinada de INH e etambutol por 18 a 24 meses.
- D) a tuberculose pulmonar primária, desde que tratada, é uma doença sem gravidade, manifestando-se com febre, calafrios, tosse e produção de escarro.
- E) pacientes com manifestações bucais se enquadram na categoria de baixo risco.

Questão 38

Na avaliação primária do paciente traumatizado é INCORRETO afirmar que

- A) no exame do terço médio da face verifica-se inicialmente a mobilidade da maxila isoladamente ou em combinação com os ossos zigomáticos ou nasais.
- B) equimose periorbitária, especialmente associada à hemorragia subconjuntival, geralmente é indicativa de fratura orbitaria ou do complexo zigomático.
- C) alterações pupilares ou de acuidade visual podem sugerir traumatismo nos pares III, IV e VIII de nervos cranianos.
- D) o primeiro passo é o exame da estabilidade cardiopulmonar, garantindo que esteja com as vias aéreas desobstruídas e adequadamente ventiladas.
- E) o pescoço deve ser imobilizado temporariamente até que as lesões nessa região tenham sido descartadas.

Questão 39

O tratamento de lesões sabidamente agressivas é realizado por meio de ressecção marginal ou parcial. Em relação a esta técnica, pode-se afirmar que

- A) uma cureta afiada ou uma broca com irrigação de solução estéril deve ser usada para remover uma camada de 1 a 2 mm de osso ao redor de toda a periferia da lesão.
- B) ocorre ressecção do tumor com osso, tecidos moles e cadeias de linfonodos.
- C) deve ser seguida de radioterapia pós-cirúrgica, para controle da lesão.
- D) o espécime removido deve incluir a lesão e 1 cm de margem óssea além do limite radiográfico da lesão.
- E) o espécime removido deve incluir a lesão e 5 cm de margem óssea além do limite radiográfico da lesão.

Questão 40

A porcentagem da participação da glândula parótida na produção diária de saliva é de

- A) 60%.
- B) 50%.
- C) 40%.
- D) 30 %.
- E) 25%.