

CONCURSO PÚBLICO

**038. PROVA OBJETIVA**

ESPECIALISTA EM SAÚDE I – MÉDICO ORTOPEDISTA SOCORRISTA

- ♦ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- ♦ Confira seu nome e número de inscrição impressos na capa deste caderno.
- ♦ Leia cuidadosamente as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ♦ Responda a todas as questões.
- ♦ Marque, na folha intermediária de respostas, localizada no verso desta página, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ♦ Transcreva para a folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, todas as respostas anotadas na folha intermediária de respostas.
- ♦ A duração da prova é de 3 horas.
- ♦ A saída do candidato da sala será permitida após transcorrida a metade do tempo de duração da prova.
- ♦ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo destacar esta capa para futura conferência com o gabarito a ser divulgado.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

## FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

QUESTÃO	RESPOSTA				
01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

06	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

QUESTÃO	RESPOSTA				
26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

41	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## CONHECIMENTOS GERAIS

### LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir para responder às questões de números 01 a 06.

#### *Recorde de impostos*

A parcela da renda nacional repassada ao setor público na forma de tributos foi, no ano passado, a maior da história. Embora as estatísticas completas da arrecadação da União, dos estados e municípios apenas venham a ser conhecidas em meados do ano, é razoável estimar que a carga tributária terá subido de 33,56% do PIB, em 2010, para mais de 35%, em 2011. Isto é, seguidos os critérios oficiais de cálculo, as receitas federais terão crescido a um ritmo quatro vezes maior que o do PIB.

A arrecadação federal representa cerca de 70% da carga tributária, cujo aumento em 2011 foi carregado quase integralmente para a União. A carga era de 26,6% do PIB em 1995, primeiro ano do governo de Fernando Henrique Cardoso. Estava em 31,4% no primeiro ano de Luiz Inácio Lula da Silva. Aumentou, portanto, ao menos 30%, desde a estabilização econômica, como proporção do PIB.

O governo pode argumentar que a escalada não se deveu à imposição de mais tributos ou a incrementos de alíquotas, afora o caso de alguns impostos regulatórios. Poderá também dizer que ocorreram reduções de impostos para alguns setores. Ou que parte da receita extra veio de renegociações de débitos. Por fim, lembrar que a formalização de negócios e empregos destinou mais recursos para as arcas do fisco. Embora esses argumentos correspondam à realidade, não se pode deduzir que seja apropriada a elevação da carga. O aumento é ainda mais impróprio se considerados os usos da receita extra.

O governo federal, sem dúvida, poupou mais, aumentando o superávit primário. A dívida pública também diminuiu em 2011. Mas esse resultado se deveu em grande parte ao aumento da receita e à redução da despesa em itens essenciais, como o investimento público. A União evita a elevação de seu endividamento ao custo de extrair mais recursos da sociedade e de reduzir sua contribuição ao aumento da produtividade, por conter gastos com melhoria da infraestrutura. Além do emprego sofrível do aumento de receita, ressalte-se que o presente nível da carga tributária prejudica o bem-estar da população e a competitividade das empresas no mercado mundial, pois encarece produtos e serviços do país. Resumindo: o vórtice voraz do fisco tem de parar de girar.

(Folha de S.Paulo, 07.01.2012. Adaptado)

01. De acordo com o texto, o governo pode argumentar que

- (A) a carga tributária brasileira está descendente desde o governo Lula.
- (B) no primeiro ano de governo de Fernando Henrique Cardoso, a carga tributária era maior que a atual.
- (C) 30% da arrecadação são destinados aos gastos com infraestrutura e aumento do superávit.
- (D) a carga tributária brasileira não cresceu nas últimas décadas. Houve apenas supressão da arrecadação.
- (E) a elevação da carga tem como um dos fatores o aumento nos postos de trabalho.

02. No trecho – **Embora** as estatísticas completas da arrecadação de União, estados e municípios apenas venham a ser conhecidas em meados do ano, é razoável estimar (...), – o termo em destaque pode ser substituído, sem acarretar alteração de sentido, por

- (A) Entretanto.
- (B) Contudo.
- (C) Conquanto.
- (D) Todavia.
- (E) No entanto.

03. Após uma leitura atenta dos dados fornecidos no texto, é possível afirmar que

- (A) as receitas do governo federal retraíram se comparadas à criação de empregos.
- (B) a arrecadação federal representa mais de dois terços da carga tributária brasileira.
- (C) a constante ampliação da carga tributária impulsiona a competitividade da atividade produtiva.
- (D) a economia cresceu quatro vezes se comparada aos governos anteriores.
- (E) as receitas dos estados compõem mais da metade da carga tributária da arrecadação federal.

04. Em – ... o **vórtice** voraz do fisco tem de parar de girar. – o termo em destaque pode ser substituído, sem alteração de sentido, por

- (A) imposto.
- (B) sistema.
- (C) maquinário.
- (D) turbilhão.
- (E) princípio.

05. Assinale a alternativa que apresenta o trecho – Poderá também dizer que ocorreram reduções de impostos para alguns setores. – reescrito de acordo com a norma-padrão e sem alteração de sentido.

- (A) Poderá também dizer que houve reduções de impostos para alguns setores.
- (B) Poderá também dizer que ocorrera reduções de impostos para alguns setores.
- (C) Poderá também dizer que houveram reduções de impostos para alguns setores.
- (D) Poderá também dizer que ocorrerão reduções de impostos para alguns setores.
- (E) Poderá também dizer que haveria reduções de impostos para alguns setores.

06. Assinale a alternativa que apresenta o trecho – A parcela da renda nacional repassada ao setor público na forma de tributos foi, no ano passado, a maior da história. – reescrito e pontuado de acordo com a norma-padrão e sem alteração de sentido.

- (A) No ano passado: a parcela da renda nacional repassada ao setor público na forma de tributos foi, a maior da história.
- (B) A parcela da renda nacional repassada ao setor público; na forma de tributos foi: no ano passado, a maior da história.
- (C) No ano passado, a parcela da renda nacional repassada ao setor público na forma de tributos foi, a maior da história.
- (D) No ano passado, a parcela da renda nacional, repassada ao setor público na forma de tributos, foi a maior da história.
- (E) A parcela da renda nacional, foi a maior da história, repassada no ano passado, ao setor público: na forma de tributos?

Leia a tira a seguir para responder às questões de números 07 e 08.



(<http://tiras-snoopy.blogspot.com>. Adaptado)

07. De acordo com o quadrinho, é possível afirmar que

- (A) a coleção de Charlie Brown não segue uma linha temática específica, pois não há relação entre os títulos.
- (B) o amigo de Charlie Brown fica aturdido com os títulos cômicos dos quadrinhos da coleção.
- (C) o amigo de Charlie Brown fica preocupado com a possibilidade de haver uma próxima edição fantástica.
- (D) o amigo de Charlie Brown tece comentário aviltante diante da qualidade da coleção de quadrinhos.
- (E) Charlie Brown preocupa-se com uma próxima eventual guerra que possa vir a ocorrer.

08. Assinale a alternativa correta para a fala do último quadrinho que mantenha a norma-padrão e não acarrete mudança de sentido.

- (A) Preocupe-me, realmente, a próxima edição.
- (B) Realmente, preocupa-te a próxima edição.
- (C) Preocupa-me, realmente, a próxima edição.
- (D) Me preocupa, realmente, a próxima edição.
- (E) Realmente, a próxima edição preocupara a mim.

Leia o poema a seguir para responder às questões de números 09 e 10.

### Imagem

Uma pobre velhinha franzida e amarela  
sentou-se num **banco**, em Paris.

A tarde cinzenta andava atrás dela  
como um triste gato de feltro e flanela,  
igualmente exausta e infeliz.

Entretanto, aquela cidade, aquela  
é a maior do mundo, segundo se diz.

E não só maior – mas alegre e bela:  
é a cidade chamada Paris.

(...)

Nas mãos, uma **chave** – de que bairro, **viela**,

Porta, **corredor**, mansarda, **cancela**? –

Com um desenho de flor-de-lis.

(Cecília Meireles, *Poesias Completas* – Viagem, 1939)

09. De acordo com o poema, é possível afirmar que

- (A) a velhinha e o clima vespertino não combinavam com a imagem que se faz da cidade de Paris.
- (B) a riqueza da cidade é evidente por meio da descrição que é feita da velhinha no banco.
- (C) havia, na cidade de Paris, uma velhinha que aparentava jovialidade e ter saúde.
- (D) a cidade de Paris não é apenas maior que as outras mas é também a mais soberba e mais ilustrada.
- (E) havia um gato próximo a uma senhora que estava sentada num banco em uma praça na cidade de Paris.

10. Assinale a alternativa que apresenta o termo em destaque com o mesmo sentido atribuído na poesia.

- (A) Se a apólice não for paga, a empresa **cancela** o seguro.
- (B) A **viela** mais charmosa de Paris é a Chevalier de la Barre.
- (C) Aquele não era o mesmo **corredor** que havia vencido a maratona do ano anterior.
- (D) Cada time de nossa cidade ficou em uma **chave** diferente.
- (E) O **banco** quebrou por ingerência e todos do mercado financeiro ficaram preocupadíssimos.

11. Assinale a alternativa correta.

- (A) Um dos objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) é a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- (B) No âmbito do SUS, as ações em saúde do trabalhador estão focadas nos procedimentos de vacinação, particularmente a antitetânica.
- (C) A vigilância epidemiológica, sob a tutela do SUS, compreende o conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (D) Conforme consta dos Princípios e Diretrizes do SUS, a universalidade de acesso aos serviços de saúde ocorre essencialmente na atenção básica, preservando os outros níveis de atenção do uso abusivo e desnecessário.
- (E) Está restrita ao âmbito do SUS a organização das ações e serviços de saúde de forma regionalizada e hierarquizada, em níveis de complexidade crescente, dispensando-se dessa obrigação a iniciativa privada cuja participação é complementar.

12. Uma combinação de critérios define o repasse regular e automático de recursos para a cobertura de ações de serviços de saúde nos municípios. Dois deles são

- (A) o perfil epidemiológico da população e a taxa de mortalidade nos últimos 2 anos.
- (B) o perfil demográfico da região e o número de afastamentos previdenciários.
- (C) o perfil demográfico da região e o perfil epidemiológico da população a ser coberta.
- (D) o número de nascidos vivos e a constituição do conselho de saúde local.
- (E) a constituição do conselho e da conferência de saúde, com participação de representantes da câmara municipal, hospitais, entidades religiosas e filantrópicas.

13. Segundo a Constituição Federal do Brasil,

- (A) a assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- (B) as instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
- (C) o auxílio ou subvenção de recursos públicos para as instituições privadas com fins lucrativos só podem ser repassados mediante licitação pública.
- (D) as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos não podem realizar convênio ou contrato direto com o SUS, sendo necessária a intermediação da Previdência Social.
- (E) cabe ao Ministério do Trabalho e Emprego regulamentar a assistência à saúde do trabalhador.

14. A atenção básica no SUS, em relação à saúde, é caracterizada pelo desenvolvimento de um conjunto de ações, no âmbito individual e coletivo, de

- I. promoção;
- II. proteção;
- III. prevenção de agravos;
- IV. diagnóstico;
- V. tratamento;
- VI. reabilitação.

Está correto o contido em

- (A) I e II, apenas.
- (B) I, II e VI, apenas.
- (C) III, IV e V, apenas.
- (D) IV, V e VI, apenas.
- (E) I, II, III, IV, V e VI.

15. O Conselho de Saúde, um instrumento de participação popular e controle social na gestão dos recursos municipais de saúde,

- (A) resultou de reivindicação dos movimentos médicos da década de 1950.
- (B) tem sua origem ligada ao movimento de reforma sanitária e à VIII Conferência Nacional de Saúde.
- (C) foi implantado no Estado Novo na década de 1940.
- (D) foi imposto, por negociação coletiva, pelo movimento sindical na década de 1970.
- (E) foi criado em 1990 para controlar as despesas hospitalares dos governos municipais.

16. Entre os sistemas e bases de dados do Ministério da Saúde que devem incorporar informações de interesse da Saúde do Trabalhador estão:

- I. Sistema de Informações de Mortalidade (SIM);
- II. Sistema de Informações Geográficas (SIG);
- III. Sistema de Informações de Atenção Básica (SIAB);
- IV. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS);
- V. Sistema de Registros de Planos ou Seguros de Saúde (RPS).

Está correto apenas o contido em

- (A) I e II.
- (B) III e IV.
- (C) IV e V.
- (D) I, III e IV.
- (E) II, III e V.

17. São indicadores de saúde:

- I. aqueles que tentam traduzir a saúde ou sua falta em um grupo populacional. Exemplo: a razão de mortalidade proporcional;
- II. aqueles que se referem às condições do meio e que têm influência sobre a saúde. Exemplo: saneamento básico;
- III. aqueles que procuram medir os recursos materiais e humanos relacionados às atividades de saúde. Exemplo: número de unidades básicas de saúde.

Está correto o contido em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

18. A Atenção Básica

- (A) não tem definidas áreas estratégicas de atuação em razão de sua disseminação por todo o território nacional.
- (B) não se integra com os instrumentos de vigilância à saúde por sua característica de microcapilaridade funcional.
- (C) tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização, de acordo com os preceitos do SUS.
- (D) foi idealizada exclusivamente para reduzir a demanda para o nível terciário de atendimento, correspondente ao de alta complexidade.
- (E) por sua universalidade, deve ter o planejamento e a programação centralizados, sem vínculos com bases territoriais.

19. No preenchimento da Declaração de Óbito,

- (A) não é obrigatório o registro da causa do óbito para os casos de crianças menores de 6 meses.
- (B) as circunstâncias do acidente ou violência que produziram a lesão fatal não podem ser consideradas como causa básica.
- (C) a causa básica não precisa ser, necessariamente, associada diretamente à morte.
- (D) a causa básica é a doença ou lesão que iniciou a cadeia de acontecimentos patológicos que conduziram diretamente à morte.
- (E) para óbitos naturais ocorridos em estabelecimentos de saúde, a 1.<sup>a</sup> das quatro vias obrigatórias é entregue aos familiares para a obtenção da certidão de óbito.

20. A notificação compulsória de doenças, segundo o Ministério da Saúde, é obrigatória

- (A) apenas para os médicos.
- (B) apenas para os médicos de qualquer serviço público de saúde.
- (C) apenas para os funcionários de unidades de vigilância epidemiológica.
- (D) para qualquer cidadão comum.
- (E) para todos os profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros, odontólogos, médicos veterinários, biólogos, biomédicos e farmacêuticos.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Paciente masculino, 12 anos, com hipotireoidismo, internado na urgência com diagnóstico de epifisiólise proximal do fêmur direito. Radiografia contralateral do fêmur esquerdo é normal. Assinale a melhor conduta para este caso atualmente.

- (A) Gesso inguinopodálico lado D, conduta expectante lado E.
- (B) Conduta expectante bilateral.
- (C) Fixação com parafuso canulado bilateral.
- (D) Fixação com parafuso canulado no lado D e expectante no lado E.
- (E) Redução aberta e fixação com parafuso canulado bilateral.

22. Sobre a paralisia obstétrica, assinale a alternativa correta.

- (A) Sua forma mais comum é a paralisia baixa.
- (B) Sinal de Claude Bernard-Horner corresponde a miose, exoftalmia, palidez facial e indica mau prognóstico.
- (C) Sinal de Claude Bernard-Horner está associado a lesão de raízes baixas.
- (D) Na paralisia obstétrica alta, o paciente apresenta uma sobreposição muscular dos rotadores externos do ombro em relação aos rotadores internos.
- (E) O tratamento cirúrgico está indicado tão logo seja diagnosticada a lesão.

23. Em relação à osteomielite aguda, assinale a alternativa correta.

- (A) Ocorre mais frequentemente em adolescentes e adultos jovens.
- (B) Disseminação por contiguidade é a forma mais comum.
- (C) Radiografia é inútil para diagnóstico.
- (D) O agente infeccioso mais comum são as bactérias gram-negativas.
- (E) A metáfise proximal dos ossos longos é área de acometimento mais comum.

24. Sobre a pioartrite, assinale a alternativa correta.

- (A) Crianças mais velhas têm melhor prognóstico que lactentes.
- (B) Via de contaminação mais comum é a hematogênica.
- (C) No exame físico de uma pioartrite de quadril, encontra-se o membro em extensão e adução.
- (D) Na drenagem cirúrgica do joelho, a melhor via de acesso é a posterior.
- (E) A bactéria mais comum é *Escheria Coli*.

25. Motociclista, 21 anos, masculino, vítima de acidente moto x carro, chega ao pronto-socorro instável hemodinamicamente e com evidentes fraturas de membro superior e inferior. Considerando o politraumatizado, assinale a alternativa correta.
- (A) A principal causa de morbimortalidade nos politraumatizados por fratura é a embolia gordurosa.
  - (B) Neste caso, a fixação e estabilização das fraturas são prioritárias ao suporte circulatório.
  - (C) No tratamento definitivo das fraturas, a melhor sequência é: coluna, membros superiores, tibia e fêmur.
  - (D) A trombose venosa profunda é pouco frequente nesses casos.
  - (E) Conversão de fixador externo para haste intramedular é melhor após a segunda semana.

26. Paciente feminino, 25 anos, vítima de acidente motociclístico apresenta a seguinte radiografia no pronto-socorro.



Assinale a melhor conduta para esse caso.

- (A) Redução fechada e gesso axilo-palmar por 06 semanas.
  - (B) Redução fechada e fixação percutânea da fratura com fios de Kirschner.
  - (C) Redução aberta e fixação intramedular com fios de Kirschner.
  - (D) Fixador externo.
  - (E) Redução aberta e fixação interna com placa e parafuso no rádio e estabilização da articulação rádio-ulnar distal.
27. Os critérios aceitáveis para tratamento conservador de diáfise do úmero são:
- (A) 20 graus de angulação anterior, 30 graus de angulação em valgo e até 3 cm de aposição em baioneta.
  - (B) 40 graus de angulação anterior, 20 graus de angulação em varo e até 3 cm de aposição em baioneta.
  - (C) 20 graus de angulação posterior, 30 graus de angulação em varo e até 3 cm de aposição em baioneta.
  - (D) 20 graus de angulação anterior, 30 graus de angulação em valgo e até 2 cm de aposição em baioneta.
  - (E) 20 graus de angulação anterior, 30 graus de angulação em varo e até 3 cm de aposição em baioneta.

28. Dentre os critérios relacionados a seguir, assinale o que tem maior importância para o prognóstico de uma fratura exposta.
- (A) Tempo de exposição.
  - (B) Grau de contaminação.
  - (C) Lesão de partes moles.
  - (D) Antibioticoterapia imediata.
  - (E) Traumatismo cranioencefálico associado.

29. Analise a fratura seguinte.




Considerando essa fratura, assinale a melhor opção radiográfica a ser pedida.

- (A) AP verdadeiro, perfil axilar, perfil de West-Point.
  - (B) AP oblíquo, perfil escapular, incidência de Zanca.
  - (C) AP normal, perfil escapular, incidência de Stryker.
  - (D) AP verdadeiro, perfil axilar, perfil escapular.
  - (E) AP oblíquo, incidência de Hill-Sachs, perfil escapular.
30. Em um paciente com halo craniano, o(s) sinal(is) de tração excessiva que deve(m) ser observado(s) é(são):
- (A) dor nos pontos de tração.
  - (B) paralisia do nervo abducente e nistagmo.
  - (C) ausência de movimentos voluntários nos membros inferiores.
  - (D) paralisia dos músculos intercostais.
  - (E) movimentos oculares rápidos.
31. Paciente vítima de acidente automobilístico evoluindo com hemorragia retroperitoneal significativa, com alterações hemodinâmicas, sem lesões intra-abdominais, pélvicas ou torácicas. Ao RX de bacia, evidencia-se lesão do tipo APC III. Assinale a conduta inicial de eleição.
- (A) Fixação externa imediata.
  - (B) Redução cruenta + fixação interna retardada.
  - (C) Tração esquelética no fêmur distal.
  - (D) Repouso no leito.
  - (E) Redução cruenta + fixação interna via anterior.

32. Assinale a alternativa que contenha indicações clássicas para sutura meniscal.
- (A) Lesão horizontal, zona branca.
  - (B) Lesão crônica, zona vermelha.
  - (C) Paciente idoso, lesão horizontal.
  - (D) Lesão aguda, lesão entre 1-2 cm.
  - (E) Zona vermelha, lesão em “alça de balde”.
33. São critérios para tratamento conservador de fratura de patela:
- (A) degrau articular de 2 mm, fratura do polo distal cominuta.
  - (B) fratura transversa com “gap” de 4 mm, mecanismo extensor preservado.
  - (C) mecanismo extensor preservado, degrau articular de 3 mm.
  - (D) degrau articular de 2 mm, fratura transversa com “gap” de 3 mm.
  - (E) fratura do polo distal cominutiva, mecanismo extensor preservado.
34. Paciente de 22 anos com 04 meses de tratamento com haste intramedular travada para fratura transversa do terço proximal da diáfise do fêmur não apresenta sinais de consolidação. Assinale a melhor conduta.
- (A) Retirada do pino e estabilização com placa DCP com 10 parafusos.
  - (B) Dinamização, retirando os parafusos distais.
  - (C) Troca da haste por uma com diâmetro maior.
  - (D) Enxertia óssea simples.
  - (E) Dinamização, retirando os parafusos proximais.
35. No diagnóstico da síndrome compartimental, o sinal clínico mais importante é:
- (A) diminuição da sensibilidade.
  - (B) diminuição do pulso.
  - (C) hipotermia.
  - (D) cianose.
  - (E) dor.
36. Criança de 06 anos com fratura supracondiliana do úmero, inicialmente sem déficit neurológico. Realizadas redução incruenta e fixação percutânea dessa fratura. No primeiro pós-operatório, com déficit de flexão da interfalangeana do polegar e da interfalangeana distal do indicador, sem déficit sensitivo. Ocorreu lesão do nervo
- (A) interósseo anterior.
  - (B) radial.
  - (C) ulnar.
  - (D) mediano.
  - (E) interósseo posterior.
37. Um paciente de 68 anos chega ao pronto-atendimento com dor e parestesia na face lateral da perna e dorso do pé, déficit motor do glúteo médio, sem alteração de reflexos; apresenta à ressonância magnética hérnia discal. Assinale a localização mais provável.
- (A) L3-L4.
  - (B) L4-L5.
  - (C) L5-S1.
  - (D) S1-S2.
  - (E) L2-L3.
38. Paciente com 27 anos sofreu entorse de tornozelo direito há 1 hora, evoluindo com dor e edema local. Ao exame radiográfico, observam-se: fratura-avulsão do maléolo medial, fratura oblíqua da fíbula ao nível da sindesmose, subluxação lateral do tálus. Assinale, segundo Lauge-Hansen, o mecanismo de lesão.
- (A) Supinação-flexão plantar.
  - (B) Supinação-adução.
  - (C) Pronação-abdução.
  - (D) Pronação-rotação externa.
  - (E) Supinação-rotação externa.
39. Fratura do colo do tálus com desvio associada com luxação da articulação subtalar e tibiotársica pode ser classificada como
- (A) Hawkins I.
  - (B) Hawkins II.
  - (C) Hawkins III.
  - (D) Hawkins IV.
  - (E) Hawkins IB.
40. Paciente do sexo feminino, 63 anos, com queda sobre ombro esquerdo há 03 dias com luxação glenoumeral anterior reduzida e imobilizada em outro serviço. Chega ao pronto-socorro com queixa de dor e sensação de “ombro ter saído do lugar” novamente ao se levantar da cama. Ao exame físico: luxação glenoumeral anterior, sensibilidade aparentemente normal (paciente é má informante), trofismo muscular diminuído bilateralmente. RX: luxação glenoumeral anterior sem fraturas. Diante desse quadro, assinale a principal hipótese para a recorrência da luxação.
- (A) Lesão do plexo braquial.
  - (B) Lesão do nervo axilar.
  - (C) Lesão do manguito rotador.
  - (D) Avulsão do músculo deltoide.
  - (E) Oligofrenia.



41. Analise a lesão seguinte.



Assinale o melhor tratamento para essa lesão.

- (A) Tipoia por 1 ou 2 semanas, gelo local e analgesia.
  - (B) Redução aberta e amarrilho subcoracoide com fios inabsorvíveis.
  - (C) Repouso somente.
  - (D) Tratamento cirúrgico com parafuso fixando clavícula ao processo coracoide (técnica de Bosworth).
  - (E) Fixação percutânea da articulação acrômio-clavicular com fios de Kirschner.
42. Sobre as fraturas de Galeazzi em adultos, assinale a alternativa correta.
- (A) São três vezes menos frequentes que as fraturas de Monteggia.
  - (B) São fraturas da diáfise da ulna com luxação da cabeça do rádio.
  - (C) A via dorsal de Thompson entre o músculo braquirradial e o músculo supinador é a melhor via quando se opta por cirurgia.
  - (D) O tratamento de escolha é a redução aberta e fixação interna com placa e parafuso.
  - (E) Mobilidade precoce deve ser evitada mesmo nos casos de estabilidade da articulação rádio-ulnar distal.
43. Em uma fratura da diáfise do úmero, abaixo da inserção do músculo deltoide, como se espera que esteja o posicionamento do fragmento distal?
- (A) Abduzido, pela ação do deltoide.
  - (B) Medial e proximal, pela ação do tríceps e bíceps.
  - (C) Abduzido e em rotação externa, pela ação do manguito rotador.
  - (D) Lateral e proximal, pela ação do músculo deltoide.
  - (E) Medial e proximal, pela ação do deltoide e peitoral maior.

44. Em relação às fraturas de cotovelo em adulto, assinale a alternativa correta.

- (A) Fraturas intercondilares em geral são fraturas raras e sem desvio.
  - (B) Na via posterior, o principal nervo em risco é o radial.
  - (C) As fraturas condilares são raras em adultos e são muito mais comuns no grupo pediátrico.
  - (D) As fraturas do epicôndilo lateral são muito mais frequentes que as fraturas do epicôndilo medial.
  - (E) Nas fraturas intercondilares tratadas cirurgicamente com placas, a mobilidade da articulação é iniciada somente após consolidação radiográfica.
45. Sobre as fraturas da extremidade distal do rádio, assinale a alternativa correta.
- (A) O nervo mais acometido é o nervo ulnar, no trajeto do canal de Guyon.
  - (B) São fatores de risco para tais fraturas: idade, sexo feminino, osteoporose, raça branca e menopausa precoce.
  - (C) São critérios para tratamento conservador: degrau articular até 3 mm e inclinação radial com perda de até 10 graus.
  - (D) O desvio volar é mais prevalente que o dorsal.
  - (E) No tratamento com gesso, o desvio ulnar e a extrema flexão do punho são preconizados para melhor consolidação da fratura.
46. Sobre fraturas do escafoide em adultos, assinale a alternativa correta.
- (A) O exame radiográfico simples é suficiente para diagnóstico imediato.
  - (B) O mecanismo de trauma mais comum é o trauma indireto.
  - (C) São critérios para tratamento cirúrgico: desvio maior que 1 mm, angulação rádio-semilunar maior que 15 graus, angulação escafo-semilunar maior que 60 graus.
  - (D) Osteonecrose pode ocorrer principalmente nas fraturas do polo distal.
  - (E) O tempo de consolidação independe da localização da fratura.
47. Sobre as luxações do quadril, assinale a alternativa correta.
- (A) As luxações anteriores são bem mais comuns que as posteriores.
  - (B) Na luxação posterior, o indivíduo encontra-se com o quadril em flexão, abdução e rotação externa.
  - (C) Nas luxações anteriores, o tratamento cirúrgico é a única opção.
  - (D) 48 horas é o tempo limite para redução do quadril.
  - (E) Lesão do nervo ciático é mais comum nas luxações posteriores.

48. Paciente masculino, 74 anos, portador de hipertensão arterial sistêmica e doença de Parkinson, sofre queda e apresenta a seguinte radiografia na unidade de urgência.



A melhor opção de tratamento é:

- (A) hemiartroplastia.
  - (B) fixação com três parafusos canulados.
  - (C) tração esquelética do fêmur.
  - (D) fixação com haste tipo DHS.
  - (E) fixação com 04 parafusos canulados pelo grau de desvio.
49. Segundo Rockwood, assinale a alternativa correta sobre a fratura supracondiliana do úmero em crianças, tipo extensão.
- (A) Nervo ulnar é o mais lesado.
  - (B) Desvio pósterolateral é o mais comum.
  - (C) Nas fraturas tipo II de Gartland, a cortical posterior está rompida.
  - (D) Nos casos cirúrgicos, a melhor opção é fixação com fios de Kirschner com redução fechada ou, se necessário, aberta.
  - (E) Síndrome compartimental é rara nestes tipos de fratura.

50. Paciente masculino, 33 anos, vítima de acidente automobilístico, sofre fratura transversa fechada de diáfise do fêmur direito.

Assinale a melhor opção terapêutica.

- (A) Gesso inguinopodálico.
- (B) Placa e parafuso.
- (C) Haste intramedular.
- (D) Fixador externo.
- (E) Placa e parafuso + enxerto.



