

Cargo: Médico Pediatra

Língua Portuguesa

Leia o poema e responda o que se pede.

“Último fantasma”

(Castro Alves)

Quem és tu, quem és tu, vulto gracioso,
Que te elevas da noite na orvalhada?
Tens a face nas sombras mergulhada...
Sobre as névoas te libras vaporoso...

Baixas do céu num voo harmonioso!
Quem és tu, bela e branca desposada?
Da laranjeira em flor a flor nevada
Cerca-te a frente, ó ser misterioso!...

Onde nos vimos nós?... És doutra esfera?
És o ser que eu busquei do sul ao norte...
Por quem meu peito em sonhos desespera?...

Quem és tu? Quem és tu? – És minha sorte?
És talvez o ideal que est'alma espera!
És a glória talvez! Talvez a morte!...

01. De acordo com o texto, no último verso da 1ª estrofe, “névoa” significa:

- a) neve.
- b) vapor.
- c) orvalho.
- d) neblina.

02. As palavras “gracioso”, “mergulhada” e “branca”, são, respectivamente:

- a) adjetivo, substantivo e adjetivo.
- b) substantivo, verbo e substantivo.
- c) todas são adjetivos.
- d) todas são substantivos.

03. Um sinônimo para a palavra ideal encontra-se na alternativa:

- a) leve.
- b) perfeição.
- c) morte.
- d) vida.

04. Na 4ª estrofe, pode-se afirmar que há verbos, a saber:

- a) 2 verbos.
- b) 1 verbo repetido muitas vezes.
- c) 3 verbos.
- d) 7 verbos.

05. Temos um discurso direto na alternativa:

- a) “Confessou-se absurdamente cansado e incapaz de formular resposta adequada.”
- b) “Virão buscar-te ainda hoje.”
- c) “Disse-me, entredentes, que não me preocupasse consigo.”
- d) “Ela disse, maliciosamente, que não era moça casadoira.”

06. Todas as palavras abaixo estão grafadas corretamente, exceto uma. Assinale a alternativa em que se encontra essa palavra:

- a) ablução, pitonisa, regurgitar, transatlântico.
- b) abscissa, hóstia, flecha, sequela.
- c) obcecado, umedecer, metástase, vazante.
- d) ablasão, inigualável, mexerico, vaivém.

07. Assinale a frase incorreta quanto à regência verbal.

- a) Aspirava o aroma das flores como um afogado aspira o ar na superfície.

- b) Ele expirou ali, bem diante de todos, deixando uma pergunta no ar.
- c) A testemunha não soube precisar do local do acidente.
- d) Tenho aversão a tudo que diz respeito à morte.

08. Quanto à ocorrência da crase, ela está incorreta apenas na alternativa:

- a) Os navegantes portugueses cruzavam os mares em barcos à vela.
- b) Tenho sempre um bom livro à mão.
- c) O avião partirá às 17h.
- d) Esquece a dor à medida que trabalha.

09. Temos uma separação de sílabas incorreta apenas em uma alternativa. Assinale-a:

- a) psi-co-lo-gi-a.
- b) abs-or-ver.
- c) pers-pi-caz.
- d) fric-ci-o-nar.

10. A pontuação encontra-se correta apenas em uma frase. Assinale-a:

- a) “Não lhe posso dizer com certeza, respondi eu.” (MA)
- b) “De todas as revoluções para o homem a morte é a maior e a derradeira.” (MM)
- c) “Explico-me o diploma era uma carta de alforria.” (MA)
- d) “Ao cabo de alguns anos de peregrinação atendi às súplicas de meu pai.” (MA)

11. Temos um diminutivo na alternativa:

- a) corneta.
- b) aldeota.
- c) basquete.
- d) cartola.

12. O numeral em questão é classificado como:

- a) cardinal.
- b) ordinal.
- c) multiplicativo.
- d) fracionário.

13. Em “Ele dissera aquelas mesmas palavras repetidas vezes”, o verbo encontra-se no:

- a) pretérito perfeito do subjuntivo.
- b) pretérito imperfeito do subjuntivo.
- c) imperativo afirmativo.
- d) pretérito mais-que-perfeito do indicativo.

14. Temos na voz passiva a frase:

- a) Receberam um merecido castigo.
- b) Ela se enfeitava para seu homem todas as noites.
- c) A carta foi escrita por mim.
- d) Visitaste o gerente do banco recentemente.

15. A concordância verbal está correta em:

- a) Participaram da cerimônia civil todos os convidados.
- b) Havia sempre flores onde hoje há cinzas.
- c) Sempre fizeram invernos rigorosos naquela parte do país.
- d) Precisavam-se de mão de obra naqueles canteiros da cidade.

16. Em “Todos te ouvirão cantar”, a forma verbal grifada encontra-se:

- a) no infinitivo pessoal.
- b) no infinitivo impessoal.
- c) no futuro do pretérito do indicativo.
- d) no futuro do presente do indicativo.

Conhecimentos Específicos

17. Mariana foi submetida a parto cesárea por evoluir com sofrimento fetal durante o trabalho de parto. Apresenta 38

semanas de gestação, líquido amniótico claro e com grumos e o recém-nascido apresentou-se com 3700g. O pediatra notou, após realizar os passos iniciais do recém-nascido, uma FC = 60bpm, cianose central e apneia. A melhor conduta dentre as abaixo seria:

- a) Intubação traqueal e ventilação com pressão positiva com balão e cânula.
- b) Iniciar massagem cardíaca e proceder a intubação traqueal.
- c) Ventilação com pressão positiva com balão e máscara.
- d) Iniciar massagem cardíaca e providenciar ventilação com balão e máscara sob pressão positiva.

18. Alguns testes de triagem realizados no período neonatal tem contribuído para a redução da morbi-mortalidade de diversas doenças no Brasil. Sobre eles, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) O Programa Nacional de Triagem Neonatal prevê o diagnóstico precoce de 4 doenças: hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria, hemoglobinopatias e fibrose cística.
- b) Os exames só devem ser colhidos após 48h de iniciada a alimentação enteral. Antes disso, a avaliação de hipotireoidismo neonatal fica prejudicada.
- c) A prematuridade é fator restritivo na triagem da anemia falciforme e outras hemoglobinopatias no teste do pezinho.
- d) A dosagem de tripsina imunorreativa (TIR) avalia a ocorrência de fibrose cística. Quando alterado, confirma o diagnóstico da patologia.

19. Sobre a icterícia do recém-nascido, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A icterícia própria do recém-nascido evolui após as primeiras 48h de vida, com pico máximo em torno do 5º dia de vida.
- b) Bilirrubina direta superior a 1mg/dl no 3º dia de vida deve ser sempre investigada como patológica.
- c) A icterícia própria do recém-nascido não dura mais que 10 dias.
- d) Icterícia prolongada por 2 semanas ou mais deve ser investigada como sendo patológica.

20. Qual medicação é utilizada para reverter os efeitos opióides em caso de overdose no recém-nascido na sala de parto:

- a) Naloxone.
- b) Dobutamina.
- c) Milrinone.
- d) Atropina.

21. Assinale a alternativa que engloba três medicamentos contra-indicados para lactantes:

- a) Isotretinoína, carbamazepina, aciclovir.
- b) Fenciclidina, bromocriptina, tamoxifeno.
- c) Amiodarona, codeína, haloperidol.
- d) Metrotexato, verapamil, sertralina.

22. Em relação às anemias, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Recém-nascidos normais tem níveis de hemoglobina e hematócrito mais elevados com hemáceas menores em relação às crianças mais velhas e adultos.
- b) O ferro está presente em concentrações semelhantes no leite humano e no da vaca, porém apresenta melhor biodisponibilidade no primeiro.
- c) A lactoferrina, proteína que se liga ao ferro no leite humano, reduz a quantidade de ferro livre, inibindo a multiplicação bacteriana e permitindo melhor absorção.
- d) A reticulose é resposta típica das anemias hemofílicas e não se relaciona com anemia carencial.

23. A Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza amamentação materna exclusiva até os 6 meses de vida. Para tanto, a técnica da amamentação deve ser sempre avaliada pelo pediatra. Assinale a alternativa que corresponda a uma má posição e/ou pega durante a amamentação:

- a) Todo o corpo do bebê deve estar junto ao corpo da mãe.

- b) A boca do bebê deve estar bem aberta e não se consegue ver praticamente a aréola.

- c) O bebê mama sem fazer barulhos e a mãe não sente dor nas mamas.

- d) As bochechas do bebê devem estar encovadas a cada sucção.

24. Assinale a alternativa INCORRETA sobre a alimentação dos lactentes:

- a) Recomenda-se a introdução de alimentos sólidos após o 6º mês de vida.

- b) O suco de frutas não é essencial na dieta de um lactente.

- c) Os lactentes que não são alimentados ao seio materno podem receber leite de vaca integral após o 6º mês de vida.

- d) Recomenda-se que o aleitamento materno seja oferecido no mínimo até os 12 meses e, depois disso, pelo tempo desejado mutuamente.

25. Uma lactente de 5 meses, em aleitamento materno exclusivo, apresenta evacuações líquidas e esverdeadas após as mamadas, porém mantém bom estado geral e nutricional. Qual a melhor conduta frente ao caso:

- a) Substituir o leite materno por fórmulas lácteas indicadas para a idade.

- b) Manter o aleitamento materno exclusivo.

- c) Suspender temporariamente o leite materno.

- d) Substituí o leite materno por leite de vaca.

26. No desenvolvimento neuropsicomotor de um lactente na 28ª semana, espera-se encontrar a aquisição de importante marco no seu desenvolvimento:

- a) Ficar sentado com o apoio das mãos.

- b) Engatinhar.

- c) Pinça superior.

- d) Sustentação cefálica.

27. A orientação correta em relação ao calendário brasileiro de imunizações é:

- a) A vacina contra a febre amarela deve ser realizada a cada 10 anos em todos os idosos.

- b) Crianças com menos de 2 meses de vida não podem receber a vacina oral de rotavírus humano.

- c) A 1ª dose da vacina contra hepatite B deve ser realizada ao nascer e a 3ª dose 180 dias depois.

- d) Todos os adulto a partir de 20 anos, devem receber a vacina contra sarampo, caxumba e rubéola.

28. Em relação às imunizações, está INCORRETO o que se afirma em:

- a) A vacina BCG é realizada ao nascimento.

- b) A vacina contra a poliomielite é realizada aos 2, 4 e 6 meses.

- c) Contra o rotavírus são realizadas duas doses VO.

- d) A vacina tríplice viral é realizada aos 9 meses e entre 4 e 6 anos.

29. Quais as manifestações clínicas mais comuns na deficiência de vitamina A:

- a) Beri-béri, fadiga e irritabilidade.

- b) Pelara e demência.

- c) Raquitismo e osteomalácea.

- d) Fotofobia, xerofthalmia e retardo do crescimento.

30. Em crianças sob tratamento para anemia ferropriva através de sulfato ferroso VO, é comum a queixa de intolerância medicamentosa em função de dores abdominais. A conduta inicial para minimizar o desconforto é de:

- a) Uso regular de dimeticona.

- b) Aumentar a ingestão de fibras e água.

- c) Administrar o medicamento junto com as refeições.

- d) Ingestão de sulfato ferroso junto com vitamina C.

31. Joel, 1 ano, apresenta febre alta (39°C) contínua, de início súbito, irritabilidade e anorexia. Em 3 dias a febre cessou e surgiram lesões máculo-papulares rosadas, iniciadas em tronco e irradiação para a face e extremidades. O diagnóstico mais provável dentre os abaixo é:

- a) Eritema infeccioso.
- b) Exantema súbito.
- c) Mononucleose infecciosa.
- d) Rubéola.

32. A dermatite atópica afeta 10 a 20% das crianças. Sobre o tema, é correto afirmar que:

- a) Crianças com dermatite atópica são mais predispostas a desenvolver asma ou rinite alérgica.
- b) O processo agudo não é pruriginoso apesar do aspecto inflamatório.
- c) O processo alérgico não é mediado por IgE.
- d) O mecanismo fisiopatológico justifica a ausência de eosinofilia.

33. Nas meningites bacterianas nas crianças, o exame do líquido cefalorraquidiano apresenta as seguintes características:

- a) Pressão normal, leucocitose e glicose superior a 40mg%.
- b) Pressão normal, leucócitos normais e glicose inferior a 40mg%.
- c) Pressão elevada, leucocitose maior que 500 células/mm³ e glicose inferior a 40mg%.
- d) Pressão pouco aumentada, leucócitos normais e glicose superior a 40mg%.

34. Criança de 7 anos, queixa-se de surgimento de "caroço" no pescoço há 3 dias. Nega quaisquer outros sintomas associados. Ao exame físico: adenomegalia de 2,5 x 2,0cm em nível cervical II à esquerda, móvel, algo doloroso à palpação, com discreto rubor e calor. A melhor conduta dentre as abaixo, baseando-se no diagnóstico mais provável seria:

- a) Anti-inflamatórios.
- b) Biópsia do gânglio.
- c) Calor local.
- d) Antibioticoterapia.

35. O principal agente etiológico de sinusite bacteriana aguda em crianças e adolescentes é:

- a) Staphylococcus aureus.
- b) Streptococcus pneumoniae.
- c) Haemophilus influenzae.
- d) Moraxella catarrhalis.

36. Sobre as pneumonias na faixa etária pediátrica, assinale a alternativa CORRETA:

- a) A taquipnéia é a manifestação clínica mais consistente da pneumonia.
- b) A aparência radiológica é diagnóstica na diferenciação entre pneumonia viral e bacteriana.
- c) As complicações comuns da pneumonia são a meningite e a artrite supurativa.
- d) O trato respiratório inferior normalmente não é estéril.

37. Em relação ao sopros cardíacos inocentes, é CORRETO afirmar que:

- a) O sopro de Still é o mais comum quando o paciente é auscultado em decúbito dorsal e algumas manobras podem ser utilizada durante o exame físico como auxílio para o diagnóstico clínico.
- b) O sopro venoso só é audível quando a criança está deitada.
- c) O sopro da estenose pulmonar periférica funcional é muito frequente nas crianças com mais de 2 anos de idade.
- d) Todos os sopros inocentes podem apresentar frêmito.

38. Marcela, 3 anos, recebeu tratamento antimicrobiano para infecção urinária por 10 dias. Logo após o término do tratamento, voltou a apresentar quadro clínico e laboratorial de infecção

urinária. Considerando que o tratamento realizado foi o mais indicado, a conduta correta a ser tomada neste momento seria:

- a) Iniciar quimioprofilaxia e solicitar uretrocistografia miccional.
- b) Iniciar quimioprofilaxia, solicitar ultrassonografia renal e uretrocistografia miccional.
- c) Manter sem quimioprofilaxia e solicitar ultrassonografia renal e urografia excretora.
- d) Repetir o tratamento por tempo mais prolongado e com outro tipo de antibiótico.

39. Em relação à crise convulsiva febril, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A idade de ocorrência é de 3 meses a 5 anos.
- b) Está associada a febre, sem lesão do SNC.
- c) O tratamento deverá constar, invariavelmente, de medicação anticonvulsivante, para evitar novas crises.
- d) Trata-se de condição benigna, que cursa com bom desenvolvimento neuropsicomotor.

40. Um menino recebe o diagnóstico de fimose. Assinale a alternativa correta:

- a) A fimose verdadeira é comum e associa-se a anel cicatricial fibroso esbranquiçado e não retrátil.
- b) A postectomia deve ser realizada após os 5 anos.
- c) O prepúcio pode permanecer aderido à glande até por volta dos 6 meses.
- d) A retração prepucial forçada está contra-indicada, pois pode levar a fimose adquirida.