

**Cargo: Médico Plantonista**

**Língua Portuguesa**

Leia o poema e responda o que se pede.

“Último fantasma”

(Castro Alves)

Quem és tu, quem és tu, vulto gracioso,  
Que te elevas da noite na orvalhada?  
Tens a face nas sombras mergulhada...  
Sobre as névoas te libras vaporoso...

Baixas do céu num voo harmonioso!  
Quem és tu, bela e branca desposada?  
Da laranjeira em flor a flor nevada  
Cerca-te a frente, ó ser misterioso!...

Onde nos vimos nós?... És doutra esfera?  
És o ser que eu busquei do sul ao norte...  
Por quem meu peito em sonhos desespera?...

Quem és tu? Quem és tu? – És minha sorte?  
És talvez o ideal que est'alma espera!  
És a glória talvez! Talvez a morte!...

01. De acordo com o texto, no último verso da 1ª estrofe, “névoa” significa:

- a) neve.
- b) vapor.
- c) orvalho.
- d) neblina.

02. As palavras “gracioso”, “mergulhada” e “branca”, são, respectivamente:

- a) adjetivo, substantivo e adjetivo.
- b) substantivo, verbo e substantivo.
- c) todas são adjetivos.
- d) todas são substantivos.

03. Um sinônimo para a palavra ideal encontra-se na alternativa:

- a) leve.
- b) perfeição.
- c) morte.
- d) vida.

04. Na 4ª estrofe, pode-se afirmar que há verbos, a saber:

- a) 2 verbos.
- b) 1 verbo repetido muitas vezes.
- c) 3 verbos.
- d) 7 verbos.

05. Temos um discurso direto na alternativa:

- a) “Confessou-se absurdamente cansado e incapaz de formular resposta adequada.”
- b) “Virão buscar-te ainda hoje.”
- c) “Disse-me, entredentes, que não me preocupasse consigo.”
- d) “Ela disse, maliciosamente, que não era moça casadoira.”

06. Todas as palavras abaixo estão grafadas corretamente, exceto uma. Assinale a alternativa em que se encontra essa palavra:

- a) ablução, pitonisa, regurgitar, transatlântico.
- b) abscissa, hóstia, flecha, seqüela.
- c) obcecado, umedecer, metástase, vazante.
- d) ablasão, inigualável, mexerico, vaivém.

07. Assinale a frase incorreta quanto à regência verbal.

- a) Aspirava o aroma das flores como um afogado aspira o ar na superfície.
- b) Ele expirou ali, bem diante de todos, deixando uma pergunta no ar.

- c) A testemunha não soube precisar do local do acidente.
- d) Tenho aversão a tudo que diz respeito à morte.

08. Quanto à ocorrência da crase, ela está incorreta apenas na alternativa:

- a) Os navegantes portugueses cruzavam os mares em barcos à vela.
- b) Tenho sempre um bom livro à mão.
- c) O avião partirá às 17h.
- d) Esquece a dor à medida que trabalha.

09. Temos uma separação de sílabas incorreta apenas em uma alternativa. Assinale-a:

- a) psi-co-lo-gi-a.
- b) abs-or-ver.
- c) pers-pi-caz.
- d) fric-ci-o-nar.

10. A pontuação encontra-se correta apenas em uma frase. Assinale-a:

- a) “Não lhe posso dizer com certeza, respondi eu.” (MA)
- b) “De todas as revoluções para o homem a morte é a maior e a derradeira.” (MM)
- c) “Explico-me o diploma era uma carta de alforria.” (MA)
- d) “Ao cabo de alguns anos de peregrinação atendi às súplicas de meu pai.” (MA)

11. Temos um diminutivo na alternativa:

- a) corneta.
- b) aldeota.
- c) basquete.
- d) cartola.

12. O numeral em questão é classificado como: “Era o septuagésimo quinto da lista; não tinha, pois, esperanças.”

- a) cardinal.
- b) ordinal.
- c) multiplicativo.
- d) fracionário.

13. Em “Ele dissera aquelas mesmas palavras repetidas vezes”, o verbo encontra-se no:

- a) pretérito perfeito do subjuntivo.
- b) pretérito imperfeito do subjuntivo.
- c) imperativo afirmativo.
- d) pretérito mais-que-perfeito do indicativo.

14. Temos na voz passiva a frase:

- a) Receberam um merecido castigo.
- b) Ela se enfeitava para seu homem todas as noites.
- c) A carta foi escrita por mim.
- d) Visitaste o gerente do banco recentemente.

15. A concordância verbal está correta em:

- a) Participaram da cerimônia civil todos os convidados.
- b) Haviam sempre flores onde hoje há cinzas.
- c) Sempre fizeram invernos rigorosos naquela parte do país.
- d) Precisavam-se de mão de obra naqueles canteiros da cidade.

16. Em “Todos te ouvirão cantar”, a forma verbal grifada encontra-se:

- a) no infinitivo pessoal.
- b) no infinitivo impessoal.
- c) no futuro do pretérito do indicativo.
- d) no futuro do presente do indicativo.

**Conhecimentos Específicos**

17. A respeito dos indicadores de saúde, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A probabilidade de deixar sequelas é medido pela morbidade.

- b) A probabilidade de adoecer é o risco absoluto de doença na população.
- c) A letalidade é o indicador que expressa o número de mortes na população.
- d) A taxa de mortalidade expressa o número de mortes na população em determinado período.

18. A prevalência equivale ao risco de adoecimento por determinada doença na população. Todos os itens abaixo reduzem a prevalência, EXCETO:

- a) Cura de casos.
- b) Óbitos.
- c) Imigração de indivíduos saudáveis.
- d) Surgimento de casos e persistência de casos antigos.

19. Sobre as várias conceituações de saúde, assinale a alternativa correta:

- a) "Saúde é o completo bem-estar psicossocial"; é a conceituação mais recente na saúde pública contemporânea.
- b) O conceito ampliado de saúde a vê como dependente de condições sociais, econômicas, políticas, de lazer, meio ambiente, trabalho, educação, etc. Tal conceito foi incorporado à Constituição Brasileira de 1988.
- b) A determinação biológica do processo saúde-doença foi defendido pelo movimento de medicina social europeu do século XIX.
- d) O conceito que expressa que saúde é a ausência de doença, de Christopher Boorse é mais aceito pelo ideário de promoção da saúde contemporânea.

20. A medicina comunitária tem como um de seus objetivos oferecer diagnósticos mais precoces, assim como instituir o tratamento ideal o mais precocemente possível, levando a um aumento da sobrevida nas doenças crônicas, como a hipertensão arterial sistêmica. Dessa forma, esta medida resulta em:

- a) Aumento da prevalência da doença.
- b) Redução da incidência da doença.
- c) Manutenção de incidência e prevalência da doença inalterados.
- d) Aumento da incidência e redução da prevalência da doença.

21. Desde 2003, o número de testes PSA (antígeno prostático específico) realizados pelo SUS praticamente triplicaram, mostrando um perfil de homens mais prevenidos. Este tipo de ação enquadra-se em qual tipo de prevenção:

- a) Primária.
- b) Secundária.
- c) Terciária.
- d) Quaternária.

22. A integralidade, como princípio constitucional, implica em:

- a) Oferta de um conjunto articulado de serviços preventivos e curativos.
- b) Igualdade na assistência à saúde, sem preconceitos nem privilégios.
- c) Substituição do modelo contributivo de seguro social.
- d) Garantia de acesso às práticas ligadas à medicina alternativa.

23. Uma das diretrizes do SUS é a hierarquização das ações de saúde, com ênfase no papel das Unidades Básicas de Saúde (UBS). Pode-se afirmar que a UBS deve:

- a) Ofertar grande variedade de consultas especializadas e exames complementares.
- b) Desenvolver ações que prescindam de exames complementares.
- c) Ser a porta de entrada para os serviços de saúde, não se ocupando de ações curativas.
- d) Implementar ações básicas de saúde de natureza preventiva e curativa.

24. São considerados princípios organizacionais do SUS, EXCETO:

- a) Resolubilidade.
- b) Descentralização.
- c) Centralização.
- d) Regionalização e hierarquização.

25. Um paciente de 92 anos, portador de insuficiência cardíaca grave secundária a cardiopatia isquêmica, acompanhado por você há 5 anos, falece em domicílio. Os familiares telefonaram para seu consultório informando o ocorrido e solicitando a Declaração de Óbito (DO). Em relação à emissão da DO e à causa básica do óbito, assinale a alternativa correta:

- a) Constatar o óbito em domicílio; parada cardiorrespiratória.
- b) Constatar o óbito em domicílio; miocardiopatia isquêmica.
- c) Buscar a DO em seu consultório; infarto agudo do miocárdio.
- d) Encaminhar o corpo ao Serviço de Verificação de Óbitos (SVO); parada cardiorrespiratória.

26. No primeiro semestre de 2009, no Brasil, dos 550 pacientes com gripe A H1N1 confirmada e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), 60 evoluíram para pneumonia, insuficiência respiratória e óbito. No atestado de óbito, deve constar como causa básica da morte:

- a) Influenza A H1N1.
- b) Síndrome Respiratória Aguda Grave.
- c) Insuficiência respiratória.
- d) Pneumonia de origem infecciosa.

27. Em relação ao preenchimento de atestados médicos para fins previdenciários, assinale a alternativa correta:

- a) A observância do diagnóstico deve ser feita independente da autorização do paciente ou representante legal.
- b) É vetado ao médico emitir juízo de valor a cerca do tempo de repouso necessário para a recuperação do doente.
- c) Há que acrescentar ao atestado laudos de exames complementares e o prognóstico, a fim de melhor fundamentar o parecer do médico perito.
- d) Cabe ao médico assistente indicar qual tipo de benefício previdenciário é cabível ao paciente.

28. A bioética é uma disciplina nova que pode ser definida como o estudo:

- a) Do código de ética das profissões.
- b) Dos casos graves em medicina.
- c) Científico do prolongamento da vida.
- d) Sistemático das conduta moral nas ciências da vida.

29. Um senhor de 61 anos, hipertenso, não aderente ao tratamento, apresentou quadro súbito de cefaleia intensa e desorientação, com PA = 210 x 130 mmHg. Seu estado de saúde rapidamente se agravou e uma tomografia computadorizada do crânio evidenciou hemorragia intraparenquimatosa. Sabendo-se que o evento hemorrágico teve relação com a crise hipertensiva, qual o provável sítio do sangramento:

- a) Mesencéfalo.
- b) Intra-ventricular.
- c) Giro pré-central esquerdo.
- d) Núcleos da base.

30. Em relação a síncope, é correto o que se afirma em:

- a) Em pacientes jovens, é comum encontrar como causa a síndrome do seio carotídeo.
- b) A epilepsia contribui em 20% das causas de síncope.
- c) Torsades de pointes é uma causa de síncope em pacientes alcoólatras e desnutridos.
- d) A síncope neuromediada é diagnosticada após exames como EEG e Ressonância Magnética cerebral.

31. Um paciente de 35 anos chega à emergência com história de palpitações e sensação que "o coração quer sair pela boca". Sua PA é estável, o ritmo é regular e sua FC é de 150 bpm. O ECG mostra uma taquiarritmia de complexo QRS estreito. Qual

o diagnóstico mais provável e qual a conduta imediata de escolha:

- a) Fibrilação atrial; fazer cardioversão com 300J.
- b) Taquicardia supraventricular; administrar adenosina endovenosa.
- c) Taquicardia ventricular; fazer adenosina endovenosa.
- d) Fibrilação atrial; fazer cedilanide endovenoso.

32. Ao examinar um carpinteiro de 68 anos, que procurou atendimento hospitalar devido a dispneia, você observa uma queda de 18mmHg na pressão arterial sistêmica durante a inspiração profunda. A partir deste dado semiótico, você deve incluir, entre os diagnósticos diferenciais:

- a) Hipovolemia e broncoespasmo grave.
- b) DPOC agudizada e insuficiência renal aguda.
- c) IAM anterior extenso e tromboembolismo pulmonar.
- d) Tamponamento cardíaco e hipertensão arterial acelerada.

33. Uma criança de 5 anos apresenta um corpo estranho intrabronquico. A radiografia simples de tórax pode revelar:

- a) Pneumotórax e desvio mediastinal contralateral.
- b) Atelectasia pulmonar e desvio mediastinal contralateral.
- c) Atelectasia pulmonar e desvio mediastinal ipsilateral.
- d) Pneumotórax e derrame pleural.

34. Assinale a alternativa correta em relação a cefaleia na sala de emergência:

- a) Deve receber exames de imagem simples, raios X ou Tomografia, visto que a Ressonância não altera os achados agudos.
- b) Se ocorrer em idosos, e repentinamente, pode traduzir hemorragia subaracnoídea.
- c) Se acompanhada de congestão nasal, rinorreia e lacrimejamento, é sugestiva de sinusite.
- d) Pode ser classificada como hipófica sempre que ocorre ao acordar, em idosos, e tem resolutividade espontânea em até 1 hora.

35. No atendimento de um paciente com acidente vascular isquêmico na fase aguda, pode-se afirmar que:

- a) A antibioticoprofilaxia é recomendada devido ao alto risco de broncoaspiração.
- b) A hipotensão arterial é rara, porém deve ser prontamente revertida.
- c) A temperatura corporal elevada não é fator associado a pior prognóstico.
- d) O decúbito do paciente deve ser mantido a 90° para evitar o risco de edema cerebral precoce.

36. Um chileno de 41 anos, trabalhador em mineração, é soterrado por uma parede, onde permaneceu por 6 horas até ser retirado. A melhor abordagem terapêutica para prevenir lesão renal aguda é:

- a) Soro fisiológico endovenoso 1l/h.
- b) Bicarbonato de sódio endovenoso diluído com soro glicosado em matinal 10% a 125ml/h.
- c) N-acetilcisteína via oral e NaCl 0,45% endovenoso a 1ml/Kg/h.
- d) Dopamina endovenosa na dose que não exceda 1,5µg/kg/min.

37. Um idoso de 65 anos foi submetido a correção cirúrgica de aneurisma de aorta abdominal. A partir do 3º dia do pós-operatório, apresentou oligúria progressiva e elevação dos níveis de uréia e creatinina, sem resposta ao tratamento clínico. Qual a indicação de tratamento dialítico de urgência:

- a) Edema agudo pulmonar na fase oligúrica de insuficiência renal.
- b) Elevação de ureia sanguínea para níveis superiores a 150mg/dl.

- c) Elevação da creatinina sanguínea para níveis superiores a 7,0mg/dl.
- d) Acidose metabólica com HCO<sub>3</sub> de 12mEq/l e potássio sérico de 5,5mEq/l.

38. As causas mais frequentes de Síndrome da Angústia Respiratória Aguda (SARA) são:

- a) Apneia do sono e doença coronariana.
- b) Sepses, pneumonia e aspiração de conteúdo gástrico.
- c) Edema pulmonar cardiogênico.
- d) Sarcoidose e pneumotórax espontâneo.

39. Uma senhora de 55 anos, no 3º pós-operatório de câncer do colo do útero, durante esforço para tossir, apresentou dor súbita no hemitórax direito, dispneia, sibilos e escarro hemoptico. Qual a melhor hipótese diagnóstica dentre as abaixo:

- a) Edema agudo de pulmão.
- b) Crise de broncoespasmo.
- c) Tromboembolismo pulmonar.
- d) Broncopneumonia.

40. Um paciente de 30 anos, é admitido no setor de emergência do hospital após trauma raquimedular com fratura da 5ª vértebra cervical. A história e o exame físico afastam outras lesões. O paciente encontra-se chocado, com PA máxima de 50mmHg. Neste caso, não devemos encontrar a seguinte condição:

- a) Extremidades quentes.
- b) Queda da resistência vascular periférica.
- c) Hipoestesia na face lateral do braço.
- d) Taquicardia.