





**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS NA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA/PR**

---

**ANTES DE INICIAR A PROVA, LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:**

1. Aguarde a orientação do aplicador da UniuV para iniciar a prova.
2. Leia, atentamente, as questões, e atenha-se a elas, pois nenhum esclarecimento a mais poderá ser dado, e o sucesso de um concurso está na compreensão do que é solicitado.
3. Utilize somente caneta esferográfica preta ou azul para assinalar a folha de respostas. Utilize lápis e borracha apenas para suas anotações no caderno de provas.
4. Para assinalar as respostas na folha correspondente basta preencher todo o círculo que contém a letra escolhida da questão pertinente da seguinte forma: ●
5. Será nula a prova, se forem assinaladas todas as questões com uma única alternativa de respostas.
6. Serão nulas as respostas rasuradas ou múltiplas para uma mesma questão.
7. Não se atenha às questões que julgar difíceis, volte a elas, se lhe sobrar tempo.
8. Ao início da prova, o aplicador comunicará o período de tempo concedido para a realização dela.
9. Ao término da prova, entregue **TODO O MATERIAL** recebido.
10. Preencha claramente os dados na folha de respostas. Assine e marque seu número de inscrição.
11. Não é permitido, em hipótese alguma, o empréstimo de qualquer objeto.
12. Somente poderá ausentar-se da sala da prova, acompanhado do fiscal volante.
13. Permaneça no local da prova pelo prazo mínimo de uma hora, a contar do início da prova.
14. Guarde todo tipo de equipamento de comunicação eletrônico e relógio, durante a execução da prova.
15. Use o espaço na capa do caderno de prova para copiar as suas respostas, para posterior conferência, se quiser.
16. O resultado do concurso não será divulgado por telefone.
17. Após a realização das provas, os gabaritos e o conteúdo das provas objetivas serão divulgados, via internet, no site [concursopublico.uniuv.edu.br](http://concursopublico.uniuv.edu.br) a partir das 17h do dia 21 de maio de 2012.



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS NA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA/PR**

---

1. Mediante a Portaria do Ministério da Saúde: GM nº 154, de 24 de janeiro de 2008, republicada em 4 de março de 2008, sobre os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Nasf), está incorreto o que se afirma:
- A ( ) A Atenção Primária à Saúde (APS) é o conjunto de ações em saúde, desempenhadas pela Saúde da Família, é algo complexo e que demanda intervenções amplas em múltiplas facetas da realidade, para que se possa obter efeito positivo sobre a saúde e a qualidade de vida da população, o que é comprovado por meio de evidências em diversos países do mundo.
- B ( ) Na Atenção Primária à Saúde (APS) recomenda-se a utilização de saberes de variadas origens para que a APS possa ser mais eficaz e resolutiva, saberes tanto específicos da saúde como de outros campos de conhecimento, como cultura, assistência social, gestão, esporte, lazer etc., compreendendo um exercício permanente de interdisciplinaridade e de intersetorialidade.
- C ( ) A Atenção Primária à Saúde é definida como o primeiro contato na rede assistencial dentro do sistema de saúde, caracterizando-se, principalmente, pela continuidade e integralidade da atenção, além de representar a coordenação da assistência dentro do próprio sistema, da atenção centrada na família, da orientação e participação comunitária e da competência cultural.
- D ( ) A Atenção Primária à Saúde possui duas características, chamadas de atributos derivados, as quais qualificam ações na APS: a atenção à saúde centrada na família (orientação familiar) e a orientação comunitária.
- E ( ) A Atenção Primária à Saúde compreende quatro atributos essenciais: o acesso (primeiro contato do indivíduo com o sistema de saúde), a continuidade do cuidado, a integralidade da atenção e a coordenação do cuidado dentro do sistema.
2. No que diz respeito à integração entre a Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva e às atribuições das equipes NASF expressas na Portaria MS 154 (2008), o Fonoaudiólogo e demais profissionais que atuam no NASF organizam suas ações a partir do reconhecimento do território no qual a equipe de saúde que apoia atua, tipos de habitação, tipos de instituições públicas), representação da sociedade civil e presença de organizações não governamentais para realizar seu trabalho. Assinale a alternativa correta:
- A ( ) Orientação às Equipes da Saúde da Família para ações de promoção à saúde auditiva;
- B ( ) Orientação aos outros profissionais integrantes do NASF sobre a importância da audição e conservação auditiva;
- C ( ) Participação em Grupo de Gestantes, orientando sobre amamentação, imunização, desenvolvimento auditivo e de linguagem da criança;
- D ( ) Atuação junto a Sindicatos dos Trabalhadores, para orientação de Conservação Auditiva;
- E ( ) Todas as alternativas estão corretas.



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS NA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA/PR**

---

3. “É uma desordem de linguagem que impede a aquisição de sentido através das palavras escritas, por causa de um déficit na habilidade de simbolização. Pode ser endógena ou exógena, congênita ou adquirida. As limitações na linguagem escrita são demonstradas por uma discrepância entre a aquisição real e a esperada. Estas limitações derivam-se de disfunções cerebrais, manifestadas por perturbações na cognição. Não atribuídas a impedimentos motores, sensoriais, intelectuais ou emocionais, nem ensino inadequado ou falta de oportunidade”. (MIKLEBUST, 1971). Segundo a classificação de Elena Boorder e Micklebust em 1971, sobre as Dislexias Dissidéticas, é correto o que se afirma:
- A ( ) Geralmente estão associadas ao lobo occipital, são dislexias com comprometimento predominantemente visual;
- B ( ) Geralmente estão associadas ao lobo temporal, são dislexias com comprometimento predominantemente visual;
- C ( ) Geralmente estão associadas ao lobo temporal, são dislexias com comprometimento predominantemente auditivo;
- D ( ) Geralmente estão associadas ao lobo occipital, são dislexias com comprometimento predominantemente auditivo;
- E ( ) Geralmente estão associadas ao lobo frontal, são dislexias com comprometimento predominantemente visual.
4. A doença de Menière é o acúmulo excessivo de endolinfa no interior do labirinto membranoso ou do sistema linfático. Seu diagnóstico é realizado pela história do paciente, pelos exames audiológicos e exames da função vestibular. São achados audiológicos ou de função vestibular da doença de menière, exceto:
- A ( ) Perda auditiva Neurosensorial unilateral Flutuante;
- B ( ) Curva timpanométrica tipo A;
- C ( ) Nos casos mais avançados, perda auditiva Neurosensorial bilateral;
- D ( ) Reflexos estapedianos ausentes podendo ter recrutamento;
- E ( ) A audiometria de tronco cerebral mostra que diferença das ondas I e V é semelhante ao BERA normal, isto é, menor que 4,5msg.
5. A otosclerose é o endurecimento do ouvido e é manifestada pelo acúmulo de osso esponjoso no labirinto ósseo, afeta mais o sexo feminino do que o masculino. Os sintomas dependem da localização e da progressão do foco otosclerótico. Entre os sinais principais apresentados em quadros de otosclerose observamos, exceto:
- A ( ) Sinal de Schwartz;
- B ( ) Entalhe de Cahart;
- C ( ) Sinal de Hennebert;
- D ( ) Paracusia de Willis;
- E ( ) Reflexo ON-OFF.



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS NA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA/PR**

---

6. O Teste de Glicerol com audiometria é um procedimento subjetivo, deve ser realizada inicialmente uma audiometria, ainda com o paciente em jejum de 10 ou 12 horas e, em seguida, administra-se o glicerol, logo após a ingestão realiza-se mais 4 medidas em intervalos de 30 minutos cada. São considerados positivos os testes que apresentarem melhora de 10db no limiar em 3 frequências adjacentes, ganho de no mínimo de 15db na inteligibilidade ou melhora na % de discriminação de monossílabos de pelo menos 10%. Assinale a alternativa que corresponde à doença pela qual o exame é indicado:

- A ( ) Schawanoma Vestibular;
- B ( ) Paralisia Facial;
- C ( ) Otosclerose;
- D ( ) Neurinoma do Acústico;
- E ( ) Doença de Menière.

7. A timpanometria é a medida dinâmica da imitância acústica, que verifica a mudança na complacência, decorrente da variação de pressão do ar no conduto auditivo externo. (RUSSO & SANTOS, 1993). Assinale a alternativa que contém a curva audiométrica na qual não existe pico de máxima complacência:

- A ( ) Curva A;
- B ( ) Curva D;
- C ( ) Curva As;
- D ( ) Curva B;
- E ( ) Curva C.

8. Sobre as emissões otoacústicas é incorreto:

- A ( ) São sons de baixa intensidade gerados pela cóclea e transmitidos para orelha média e canal auditivo;
- B ( ) Oferece informações sobre o funcionamento do órgão de Corti e do sistema eferente auditivo;
- C ( ) As emissões otoacústicas são influenciadas pela neuromaturação do sistema nervoso auditivo central;
- D ( ) As emissões otoacústicas podem ser classificadas em: evocadas e espontâneas;
- E ( ) A avaliação nas crianças identificam se o(s) ouvido(s) tem função coclear normal.

9. A Audiometria de Observação Comportamental é realizada nos primeiros meses de vida do neonato (0-4 meses). Ela envolve a eliciação de respostas reflexas para estímulos auditivos relativamente intensos. Os sons de Ling & Ling (1985) permitem o examinador avaliar a audição em função dos sons da fala. Assinale a alternativa que não corresponde esses sons:



- A ( ) /a/;
- B ( ) /e/;
- C ( ) /i/;
- D ( ) /u/;
- E ( ) /s/.



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS NA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA/PR**

10. T.M, 31 anos, do sexo feminino, relata que há 5 anos vem perdendo a audição em ambas as orelhas. Sentiu que após a gravidez sua audição piorou. T.M referiu que ouve melhor em ambiente ruidoso. Sua mãe e sua irmã também têm perda auditiva e apresentam sintomatologia semelhante. Há uma semana a paciente referiu apresentar plenitude auricular na orelha direita, acompanhado de quadro infeccioso, com otalgia e zumbido pulsátil, piorando a audição deste lado. Otoscopia: Membrana timpânica apresenta-se normal à esquerda e opacificada à direita.

**AUDIOMETRIA**



SRT	
OD	60 dB
OE	30 dB

IPRF			
OD	100 dB	100%	Monossílabos
			Dissílabos
OE	70 dB	100%	Monossílabos
			Dissílabos

COMPLACÊNCIA	OD	OE
PRESSÃO O.M	-	0
MAX. RELAXAMENTO	-	0,7
+ 200 DA Pa	0,8	0,5
COMPL. ESTÁTICA	-	0,2

REFLEXO ACÚSTICO										
FREQ Hz	LIMIAR OD	CONTRA OD	IPSI OD	DIF	DECAY	LIMIAR OE	CONTRA OE	IPSI OE	DIF	DECAY
500	60	↓	↓	-		40	↓	↓	-	
1000	60	↓	↓	-		30	↓	↓	-	
2000	50	↓	↓	-		25	↓	↓	-	
4000	50			-		20			-	

**Mascaramento:** OD – não foi realizado

OE – VA: 45-70 dB - VO: 35-70 dB - LOGO: 45-85 dB.

OBS: Não foi possível realizar o mascaramento de VO em 500 e 1000K na orelha esquerda devido ao supermascaramento.

**Parecer Audiológico: Perda auditiva Condutiva Bilateral**

De acordo com a anamnese e com os dados audiológicos, assinale a alternativa que apresenta as patologias que T. M. apresenta:

- A ( ) Presbiacusia + Otosclerose à esquerda;
- B ( ) Otite + Otosclerose à direita;
- C ( ) Otosclerose somente Bilateral;
- D ( ) Presbiacusia + Otite Média Bilateral;
- E ( ) Somente Otite à direita.



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS NA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA/PR**

---

11. A Audiometria de tronco encefálico não pode ser considerada um teste auditivo e existem razões anatômicas e clínicas que justificam esta afirmação. Sobre a audiometria de tronco encefálico, assinale a alternativa incorreta:
- A ( ) A ABR é captada em resposta à ativação parcial da cóclea;
  - B ( ) Não informa a integridade dos centros auditivos corticais e subcorticais;
  - C ( ) Limiares auditivos normais na ABR podem ocultar uma perda auditiva em frequências graves;
  - D ( ) Pacientes com doenças neurológicas degenerativas apresentam audição normal e a ABR presente;
  - E ( ) ABR não apresenta dimensões audiológicas como a discriminação, o recrutamento e a adaptação.
12. A inicialização da vocalização no início das palavras é conhecida como:
- A ( ) Ataque vocal;
  - B ( ) Hiperfuncionamento vocal;
  - C ( ) Ataque vocal Brusco;
  - D ( ) Vocalize;
  - E ( ) Fonação inspiratória.
13. As fissuras palatinas são as deformidades congênicas crânio-faciais mais comuns. Segundo SPINA, 1979, as fissuras pós-forame incisivo têm sua incidência em:
- A ( ) Lábios;
  - B ( ) Palato duro e mole;
  - C ( ) Lábios e arcada alveolar;
  - D ( ) Lábios, palato duro e mole;
  - E ( ) Lábios e arcada alveolar, palato duro e mole.
14. A estreita faixa de tecido que une as duas vertentes do lábio fissurado é chamado de:
- A ( ) Sequência de Pierre Robin;
  - B ( ) Banda de Apert;
  - C ( ) Sequência de Fraser;
  - D ( ) Banda de Simonart;
  - E ( ) Banda de Stickler.
15. Sobre a deglutição normal, está incorreto o que se afirma:
- A ( ) O objetivo da deglutição é o transporte do bolo alimentar e a limpeza do trato respiratório;
  - B ( ) O processo da deglutição está dividido em 3 fases;
  - C ( ) Os músculos da respiração e do trato gastrointestinal estão envolvidos na deglutição;
  - D ( ) A partir da oitava semana de gestação a deglutição já está presente;
  - E ( ) Os adultos deglutem mais que as crianças.



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS NA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA/PR**

---

16. A deglutição atípica ocorre quando o mecanismo sinérgico da deglutição é rompido. Segundo a classificação da Angle, podemos descrever a protusão transitória como:

- A ( ) É causada por rinite alérgica, asma, adenoides, resfriados, etc;
- B ( ) Dificuldade de colocar a língua para trás e para cima, para uma deglutição normal;
- C ( ) A língua apresenta-se em posição baixa na boca e promove a protusão na deglutição;
- D ( ) A língua apresenta-se na posição alta na boca e promove a protusão na deglutição;
- E ( ) A língua apresenta-se na posição alta e descolada para frente, na posição de repouso.

17. São músculos que participam no processo da deglutição, exceto:

- A ( ) Trigêmeo;
- B ( ) Facial;
- C ( ) Glossofaríngeo;
- D ( ) Vago;
- E ( ) Masseter.

18. A disfagia é a dificuldade de coordenação dos movimentos de deglutição, que afeta crianças e adultos, podendo ser congênita ou adquirida. (IRENE QUEIROZ MARCHESAN, 1998). Sobre a reabilitação fonoaudiológica está correto o que se afirma, exceto:

- A ( ) É uma reeducação funcional;
- B ( ) Visa ao restabelecimento da função normal ou compensatória;
- C ( ) Em pacientes com rebaixamento cognitivo utilizam-se técnicas ativas;
- D ( ) Nos pacientes glossectomizados trabalham-se posturas compensatórias;
- E ( ) Técnicas de treino de deglutição com saliva e alimentos com diferentes consistências são trabalhados em pacientes com perdas estruturais ou funcionais.

19. Sobre a acústica da voz, numere a coluna da direita, de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda:

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| (I) Espectro da fonte glótica | ( ) É a percepção de amplitude.   |
| (II) Gama Tonal               | ( ) É a percepção de frequência.  |
| (III) Pitch                   | ( ) É o nº de notas da mais grave à mais aguda que o indivíduo pode produzir. |
| (IV) Loudness                 | ( ) É a representação gráfica da frequência fundamental e seus harmônicos.    |
| (V) Faixa de extensão vocal   | ( ) São inflexões vocais utilizadas durante a conversação, leitura, etc.      |

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo:

- A ( ) IV, III, V, I, II;
- B ( ) III, IV, I, II, V;
- C ( ) IV, V, I, III, II;
- D ( ) V, IV, II, III, I;
- E ( ) III, IV, II, I, V.





**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS NA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA/PR**

---

20. Os distúrbios da muda vocal podem ser de ordem orgânica ou funcional. A persistência do pitch agudo na infância, o qual raramente é resultado de distúrbios hormonais, que causam desordens no desenvolvimento da laringe, são características de qual alternativa:
- A ( ) Muda vocal incompleta;  
B ( ) Muda vocal atrasada;  
C ( ) Muda vocal sobrepassada;  
D ( ) Falsete mutacional;  
E ( ) Muda vocal pervertida.
21. Assinale a alternativa abaixo que corresponde à técnica que é contraindicada nas disfonias hipercinéticas:
- A ( ) Exercícios de pushing;  
B ( ) Vibração Sonorizada de língua e lábios;  
C ( ) Fry relaxado;  
D ( ) Exercícios vocais com inclinação anterior da cabeça;  
E ( ) Exercícios respiratórios.
22. Sobre a disfonia e ou fonação ventricular é correto o que se afirma:
- A ( ) As pregas ventriculares são essenciais para a produção da voz;  
B ( ) É possível emitir a disfonia/fonação ventricular intencionalmente;  
C ( ) A disfonia/fonação ventricular ocorre quando as pregas vocais se afastam;  
D ( ) A disfonia/fonação ventricular apresenta pitch agudo e loudness aumentado;  
E ( ) É um mecanismo automático e não compensatório.
23. Correspondem às perdas ou alterações de funções linguísticas já constituídas em razão de lesão ou dano cerebral. Assinale a alternativa correta:
- A ( ) Disfagias;  
B ( ) Atraso no desenvolvimento da linguagem;  
C ( ) Retardo de aquisição de linguagem;  
D ( ) Afasias;  
E ( ) Autismo infantil.
24. São alterações das Funções Orais, exceto:
- A ( ) Mastigação ineficiente;  
B ( ) Fala imprecisa;  
C ( ) Hipotrofia, hipotonia e hipofunção dos músculos da mandíbula;  
D ( ) Deglutição Atípica;  
E ( ) Voz com hiper ou hiponasalidade e/ou rouca.



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS NA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA/PR**

---

25. A avaliação miofuncional engloba a avaliação da oclusão dental. Segundo os padrões de oclusão propostos por VIGORITO (1984) e HANSON (1988), está incorreto o que se afirma:
- A ( ) Oclusão normal é quando os dentes incisivos superiores encobrem os dentes incisivos inferiores em 1/3;
  - B ( ) A mordida aberta anterior é quando há um distanciamento entre as bordas dos incisivos;
  - C ( ) A sobremordida é quando os incisivos superiores encobrem os inferiores além de 1/3;
  - D ( ) A mordida cruzada anterior é quando há uma inversão da oclusão dos dentes superiores no sentido vestibulo-lingual;
  - E ( ) A mordida em topo é quando os incisivos superiores se encontram de topo com os incisivos inferiores.
26. Na fase da dentição permanente observamos algumas anomalias no sentido anterior. Segundo a Classificação de Angle (BIANCHINI, 1994), nos casos onde o paciente apresenta “overjet”, ou seja, quando os quatro incisivos superiores encontram-se à frente dos inferiores. Assinale a alternativa correspondente ao enunciado:
- A ( ) Classe I;
  - B ( ) Classe II;
  - C ( ) Classe II divisão primeira;
  - D ( ) Classe II divisão segunda;
  - E ( ) Classe III.
27. São músculos dos lábios, exceto:
- A ( ) Músculo Genioide;
  - B ( ) Músculo Risório;
  - C ( ) Músculo Borla da Barra;
  - D ( ) Músculo Canino;
  - E ( ) Músculo Quadrado do Mento.
28. É caracterizado(a) por alterações que ocorrem na fala da criança, em que esta realizará uma produção inadequada dos fonemas. Essas alterações na produção da fala ocorrem sem que existam problemas de ordem motora, intelectual ou emocional. Assinale a alternativa correta:
- A ( ) Disfalias;
  - B ( ) Desvios Fonológicos;
  - C ( ) Disgrafia;
  - D ( ) Desvio Fonético;
  - E ( ) Retardo de Aquisição de Linguagem.
29. O conhecimento é fruto da atividade intersubjetiva, a criança tem um papel ativo, apesar de inconsciente.. Sua atividade é suporte empírico para a atividade interpretativa do outro, que a ela confere forma e sentido. (LIER-DE VITO, 1992). Assinale a teoria correta:
- A ( ) Inatista;
  - B ( ) Interacionista;
  - C ( ) Cognitivista;
  - D ( ) Comportamentalismo;
  - E ( ) Construtivista.
-



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS NA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA/PR**

---

30. A linguagem é um saber inato, uma gramática universal inscrita na mente-cérebro do indivíduo. (DE LEMOS, 1986). Esta é uma proposta de aquisição de linguagem apresentada por:

- A ( ) Piaget;
- B ( ) Vygotsky;
- C ( ) Luria;
- D ( ) Chomsky;
- E ( ) Skinner.

31. Segundo BRIL, 1977, os primeiros anos de vida são fundamentais para o aprendizado da linguagem e da comunicação. Por isso ele propõe a utilização de alguns recursos. Assinale a alternativa correta:

- A ( ) Aparelho de Amplificação Sonora Individual;
- B ( ) Leitura Labial;
- C ( ) Oralização;
- D ( ) Estimulação Auditiva;
- E ( ) Todas as alternativas estão corretas.

32. Sobre a apraxia é incorreto afirmar:

- A ( ) A apraxia é uma desordem neurológica congênita;
- B ( ) Provoca a perda da habilidade em executar movimentos e gestos precisos, apesar de o paciente ter vontade e a habilidade física para executá-los;
- C ( ) É o acometimento dos hemisférios cerebrais, no lobo frontal;
- D ( ) É uma incapacidade na programação dos movimentos musculares, necessários para a produção e sequência de fonemas;
- E ( ) É um transtorno de articulação.

33. São áreas envolvidas na deglutição exceto:

- A ( ) Cavidade Oral;
- B ( ) Faringe;
- C ( ) Laringe;
- D ( ) Esôfago;
- E ( ) Estômago.

34. Para que os aparelhos auditivos funcionem, é necessária a utilização de pilhas auditivas, as quais devem ser de boa qualidade. Assinale a alternativa correta:

- A ( ) As pilhas auditivas atualmente são fabricadas de zinco-ar;
- B ( ) Quanto maior o ganho e amplificação, maior será o consumo de pilhas;
- C ( ) Atualmente aparelhos auditivos retroauriculares também utilizam pilha 10;
- D ( ) Uma vez retirado o lacre da pilha ela tem seu funcionamento iniciado;
- E ( ) Todas as alternativas estão corretas.



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS NA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA/PR**

---

35. M.L, sexo masculino, 8 anos, cursando a 3.<sup>a</sup> série da escola regular, foi encaminhado para atendimento fonoaudiológico pela escola, porque não compreende tudo o que lê, sua leitura é lenta e, ao ler, não considera a pontuação. Nas avaliações com neurologista, psicóloga e de audição, apresentou resultados dentro dos padrões da normalidade. De acordo com a descrição acima, qual é a principal proposta de terapia fonoaudiológica para M. L:

- A ( ) Trabalhos de leitura e escrita de textos;
- B ( ) Desenvolvimento de habilidades de percepção auditiva;
- C ( ) Trabalhos com leitura e compreensão de textos com diversos gêneros discursivos;
- D ( ) Trabalho lúdicos para desenvolvimento da memória;
- E ( ) Desenvolvimento de transcrição dos fonemas e grafemas, facilitando assim a leitura.

36. As funções estomatognáticas são funções vitais no ser humano. Assinale a alternativa incorreta sobre essas funções:

- A ( ) O reflexo de sucção inicia-se no 6.<sup>o</sup> mês de vida;
- B ( ) A deglutição no padrão infantil amadurece com a mudança das consistências alimentares;
- C ( ) A mastigação é considerada a função mais importante do sistema estomatognático;
- D ( ) A boca tem função primordial na articulação dos sons;
- E ( ) A respiração pulmonar ocorre logo após o nascimento e tem função vital.

37. São crescimentos verrugosos de origem viral que ocorrem nas cavidades escuras e úmidas da via aérea, frequentemente, na laringe de crianças jovens, normalmente abaixo dos 6 anos. Respiração curta e rouquidão são os sintomas mais frequentes. Assinale a alternativa correspondente ao enunciado:

- A ( ) Edema de Reinke;
- B ( ) Papiloma;
- C ( ) Granuloma;
- D ( ) Pólipos;
- E ( ) Leucoplasias.



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS NA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA/PR**

---

38. Segundo a Classificação Brasileira de Procedimentos em Fonoaudiologia, de janeiro de 2010, correlacione as colunas abaixo:

- I. Terapia fonoaudiológica em disartria/disartrofonía
- II. Terapia fonoaudiológica em afasia
- III. Terapia fonoaudiológica em Laringetomizados
- IV. Terapia fonoaudiológica em apraxia
- V. Terapia fonoaudiológica em comunicação alternativa

- ( ) Habilidade e reabilitação dos aspectos de linguagem (oral e escrita/leitura) nos distúrbios adquiridos de linguagem decorrentes de lesão no sistema nervoso.
- ( ) Habilidade e reabilitação dos aspectos de qualidade vocal, ressonância, articulação, prosódia, coordenação pneumofonoarticulatória nos distúrbios de execução da fala e fonação decorrentes de lesão no sistema nervoso.
- ( ) Habilidade e reabilitação da programação motora da fala.
- ( ) Desenvolvimento de produção de voz laríngea, por meio de voz esofágica ou traqueoesofágica e aperfeiçoamento da comunicação oral nas novas condições anatômicas.
- ( ) Habilidade e reabilitação nos aspectos de linguagem, utilizando os sistemas de comunicação suplementar, aumentativa e/ou alternativa e outros recursos tecnológicos.

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta:

- A ( ) I, III, IV, V e II;
- B ( ) II, I, IV, III e V;
- C ( ) II, V, III, IV e I;
- D ( ) II, IV, I, III e V;
- E ( ) I, II, IV, III e V.

39. De acordo com o manual **Caracterização das Ações inerentes ao Exercício Profissional do Fonoaudiólogo que faz** referência oficial do fonoaudiólogo em relação a suas atividades, de acordo com a Lei nº 6965/1981, encontrado no site do Conselho Federal de Fonoaudiologia, está incorreto o que se afirma:

- A ( ) É de competência do fonoaudiólogo a verificação de riscos e danos das funções auditiva e vocal, assim como das condições ambientais para melhor desempenho do paciente/cliente.
- B ( ) Cabe ao fonoaudiólogo analisar e interpretar os dados provenientes dos procedimentos de avaliação por ele realizados, exceto exames audiológicos de alta complexidade, os quais devem ser analisados pelos otorrinolaringologistas.
- C ( ) O exame clínico fonoaudiológico compreende, entre outras ações, a realização de provas, testes, exames específicos, análises e pesquisas minuciosas, assim como a descrição de parâmetros e comportamentos, objeto da avaliação fonoaudiológica.
- D ( ) Ao fonoaudiólogo cabe, portanto, a seleção à adaptação de órteses, próteses e tecnologia assistiva em audição, em comunicação humana e deglutição, além de introduzir formas alternativas de comunicação.
- E ( ) É de competência do fonoaudiólogo desenvolver programas de aperfeiçoamento e aprimoramento da linguagem oral e escrita, das funções cognitivas e dos aspectos miofuncionais orofaciais e cervicais.



**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS NA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITÓRIA/PR**

---

40. Sobre a disfagia é correto o que se afirma:

- A ( ) Na disfagia o alimento ou a saliva são desviados, obstruindo parcial ou completamente as vias respiratórias;
- B ( ) A disfagia pode surgir devido a próteses dentárias mal adaptadas, refluxo gastroesofágico grave e após longos períodos de entubação;
- C ( ) A disfagia pode provocar problemas emocionais e isolamento social;
- D ( ) A disfagia causa problemas sérios como desidratação, desnutrição e pneumonia, além do risco de morte por asfixia;
- E ( ) Todas as alternativas estão corretas.