

CADERNO DE PROVA

MÉDICO CLÍNIC GERAL - ESF

Nº. DE INSCRIÇÃO DO(A) CANDIDATO(A)



Domingo, 03 de junho de 2012.

| | .º DE (A) C | | _ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



ANTES DE INICIAR A PROVA, LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

- 1. Aguarde a orientação do aplicador da Uniuv para iniciar a prova.
- 2. Leia, atentamente, as questões, e atenha-se a elas, pois nenhum esclarecimento a mais poderá ser dado, e o sucesso de um concurso está na compreensão do que é solicitado.
- 3. Utilize somente caneta esferográfica preta ou azul para assinalar a folha de respostas. Utilize lápis e borracha apenas para suas anotações no caderno de provas.
- 4. Para assinalar as respostas na folha correspondente basta preencher todo o círculo que contém a letra escolhida da questão pertinente da seguinte forma:
- 5. Será nula a prova, se forem assinaladas todas as questões com uma única alternativa de respostas.
- 6. Serão nulas as respostas rasuradas ou múltiplas para uma mesma questão.
- 7. Não se atenha às questões que julgar difíceis, volte a elas, se lhe sobrar tempo.
- 8. Ao início da prova, o aplicador comunicará o período de tempo concedido para a realização dela.
- 9. Ao término da prova, entregue TODO O MATERIAL recebido.
- 10. Preencha claramente os dados na folha de respostas. Assine e marque seu número de inscrição.
- 11. Não é permitido, em hipótese alguma, o empréstimo de qualquer objeto.
- 12. Somente poderá ausentar-se da sala da prova, acompanhado do fiscal volante.
- 13. Permaneça no local da prova pelo prazo mínimo de uma hora, a contar do início da prova.
- 14. Guarde todo tipo de equipamento de comunicação eletrônico e relógio, durante a execução da prova.
- 15. Use o espaço na capa do caderno de prova para copiar as suas respostas, para posterior conferência, se quiser. Somente destaque depois de entregar a folha de respostas ao fiscal.
- 16. O resultado do concurso não será divulgado por telefone.
- 17. Após a realização das provas, os gabaritos e o conteúdo das provas objetivas serão divulgados, via internet, no site concursopublico.uniuv.edu.br a partir das 17h do dia 04 de junho de 2012.



| 1. | | Cólera é uma infecção intestinal que apresenta incubação de um a quatro dias, com os seguintes atomas, exceto: |
|---------------------------------|------------|---|
| B (C (D (|) | Náuseas e vômitos; Hipertensão e colapso pulmonar; Cólicas abdominais e diarreia profusa; Desidratação e hipotermia; Fezes com aspecto de água de arroz. |
| 2. | - | ual a enfermidade infecciosa aguda que tem por agente etiológico a Salmonella typhi? Assinale a rreta: |
| C (D (|) | Sífilis; Enfermidade de Lyme; Difteria; Febre tifoide; Febre amarela. |
| 3. | | om base na leitura dos itens abaixo, considerando as afirmativas V (verdadeira) e F (falsa), sinale a alternativa correta: |
| I | II. II. | A Influenza é doença aguda febril, causada por três principais vírus: vírus A, B, e C. Os vírus da Influenza são também chamados de Orthomyxovirus. O agente etiológico da Poliomielite pertence aos vírus Coxsackie apenas. O agente responsável pela Dengue pertence à família Togaviridae. |
| B (C (D (|) | V, V, F, V; V, F, V, F; F, F, V, V; V, V, V, F; F, F, F, V. |
| 4. | | om base na leitura dos itens abaixo, considerando as afirmativas V (verdadeira) e F (falsa), sinale a alternativa correta: |
| I | II. II. | Amebíase é uma doença causada por um protozoário. A transmissão da amebíase se faz por meio da via oral-fecal. Em portadores de amebíase, o tratamento se faz por meio de metronidazol. A E. histolytica pode ser assintomática. |
| B (C (D (|) | V, V, F, F; V, F, V, F; V, V, V, V; V, V, V, F; F, F, F, V. |
| 5. | A | ssinale a incorreta, em relação ao o Diabete tipo 1: |
| A (B (C (D (E (|) | Ocorre em indivíduos magros; Em indivíduos com idade inferior a 35; Ocorre particularmente entre 10 e 14 anos de idade; Há tendência para o desenvolvimento de cetoacidose; O tratamento se faz apenas com dieta e metformina. |



| 6. | As | ssinale a resposta correta: |
|-------------------|-------------|--|
| D (|))) | 1 1 0 |
| 7. | As | ssinale a incorreta: |
| B (C (|) | Tireotoxicose é um estado clínico resultante do aumento da oferta dos hormônios tireoidianos; A Doença de Graves é a causa mais rara nos caso de hipertireoidismo; Os bócios nodulares tóxicos (adenoma e multinodular) são mais comuns em idosos; O hipotireoidismo subclínico é uma condição patológica em que o TSH está elevado, porém os níveis de T4L estão normais; O hipotireoidismo central pode ser Hipotalâmico ou Hipofisário. |
| 8. | As | ssinale a incorreta: |
| B (C (D (|) | A causa mais comum do hipotireoidismo é uma inflamação crônica da tireoide; A doença de Graves é uma doença autoimune; A ablação cirúrgica da tireoide é causa frequente de hipotireoidismo; Tristeza, desânimo e indisposição, acompanhados de tonturas e zumbidos é comum no hipertireoidismo; O tratamento do hipotireoidismo se faz, preferencialmente, com L-tiroxina. |
| 9. | | s mecanismos específicos de defesa são também conhecidos como imunidade. Assinale a orreta: |
| |) | Imunidade ativa: quando o próprio organismo produz anticorpos; Imunidade naturalmente adquirida: através da vacinação; Imunidade passiva: quando o organismo entra em contato com micro-organismos de forma espontânea: infecção; Imunidade artificialmente adquirida: quando os anticorpos são produzidos em um individuo e transferidos para outro; Imunidade naturalmente adquirida: aplicação de soros hiperimunes. |
| 10. | | aciente que se apresenta em consulta, relata que pretende deixar de fumar, e para isso necessita de axílio médico. Qual a conduta mais eficaz nesse caso? Assinale a alternativa correta: |
| B (C (|) | Estabelecer programa de modificação comportamental; Prescrever goma de mascar; Prescrever adesivo de nicotina; Encorajar o paciente a simplesmente deixar de fumar; As alternativas A, B e C estão corretas. |
| 11. | То | odas as seguintes patologias citadas são causadas pelo HPV, exceto: |
| , |) | Papulose bowenoide do pênis; Condiloma acuminado; Molusco contagioso; Verrugas plantares; Verruga plana. |



| 12. Todo | os os seguintes achados mucocutâneos abaixo citados podem ser associados ao HIV, exceto: |
|--------------------------------------|---|
| B() Do C() Lo D() Do | xantema morbiliforme; ermatite herpetiforme; eucoplasia pilosa oral; ermatite seborreica grave; ngiomatose epitelioide. |
| 13. Selec | cione a doença que está mais estreitamente ligada ao antígeno HLA-DR4: |
| B() Es C() Re D() LI | rtrite reumatoide; sclerose múltipla; eumatismo palindrômico; ES; spondilite ancilosante. |
| | base na leitura dos itens abaixo, considerando as afirmativas V (verdadeira) e F (falsa) diderando Ritmo cardíaco, assinale a alternativa correta: |
| II. Ri III. A | rritmia significa uma interrupção do ritmo normal. itmo sinusal é na realidade um impulso originado no nódulo SA. través dos impulsos do nódulo SA, as aurículas se contraem. onda de estimulação a partir do Nódulo SA chama-se despolarização. |
| A() V, B() F, C() V, D() V, E() V, | V, V, V; , V, F, V; , F, V, F; |
| 15. No b | oloqueio cardíaco AV de 2º grau, encontramos: |
| B() A ₁ C() A D() O | ois ou mais impulsos auriculares para estimular a resposta ventricular; penas uma onda P aparece no traçado ECG antes de cada QRS; segunda bulha se desdobra na expiração; fenômeno de Wenckenbach ocorre quando o intervalo P-R se torna menor; enomina-se Mobitz II ao fenômeno de Wenckenbach. |
| | s a leitura, assinale a correta. Segunda bulha cardíaca é largamente desdobrada, com intervalo entre os sons e não relacionada com a inspiração nos casos de: |
| B() Iso C() Es D() D | aciente normal; quemia ventricular esquerda; stenose aórtica; efeito septal atrial; loqueio de ramo esquerdo. |



| 17. | Com base na leitura dos itens abaixo, assinale a alternativa incorreta: |
|---------------------------------|--|
| B (C (D (| Na hipopotassemia temos ondas U proeminentes; Na hipocalcemia encontramos intervalo QT prolongado; Na hiperpotassemia encontramos complexo QRS encurtado; N Hipopotassemia encontramos achatamento das ondas T; Hipocalcemia produz baixa contratilidade miocárdica. |
| 18. | Leia atentamente e assinale a correta. Das declarações abaixo, qual descreve de modo correto mais comum dos tumores cardíacos: |
| B (C (D (| Na maioria das vezes está localizado no VE; A apresentação clínica usualmente simula valvulopatia mitral; Ocorre mais comumente no sexo masculino; É histologicamente maligno; A incidência máxima ocorre na segunda década de vida. |
| 19. | As condições cardíacas abaixo citadas estão todas relacionadas com um risco relativamente alto dendocardite infecciosa, exceto: |
| B (C (D (|) Síndrome de Marfan;) Marca passos cardíacos;) Coarctação da aorta;) Defeito septal ventricular;) Canal arterial persistente. |
| 20. | Paciente na 5ª década de vida, apresenta-se com dores em punhos. Portador de DPOC de long duração, na radiografia simples de punhos o diagnóstico é de: "espessamento de periósteo provável osteomielite", o passo seguinte seria: |
| B (C (D (|) Radiografia de tórax;) Iniciar esquema duplo para TB;) Aspiração de ambos os punhos;) Iniciar antibioticoterapia de 3ª geração;) Começar terapia com ouro. |
| 21. | Com relação aos mesoteliomas, assinale a correta: |
| A (B (C (D (E (|) Produzem derrame de aspecto leitoso;) Produzem derrames exsudativos;) Produzem derrames com concentrações altas de glicose;) Produzem derrames muito sanguíneos;) Produzem derrames apenas do lado direito. |
| 22. | Assinale a incorreta: |
| Α (|) A artéria coronária circunflexa esquerda dá origem a ramos marginais obtusos; |



| 23. | co | om base na leitura dos itens abaixo, considerando as afirmativas V (verdadeira) e F (falsa) e onsiderando transtornos pulmonares e doenças do tecido conjuntivo, assinale a alternativa orreta: |
|-------------------|-------------|---|
| Ι | II. II. | A hipertensão pulmonar está mais relacionada aos casos S. de Jögren. Nódulos pulmonares são achados na Artrite reumatoide e são assintomáticos. Fibrose intersticial é a complicação mais comum nos casos de esclerodermia. Pleurite e pericardite são mais comuns em pacientes portadores de LES. |
| B (C (D (|) | V, V, V, F; F, V, V, V; V, V, F, V; V, F, V, F; V, V, V, V. |
| 24. | _ | uais medicamentos dos abaixo citados correspondem a corticosteroides inalatórios. Assinale a orreta: |
| B (C (|) | Amilorida, Metolazone, Triantereno; Pirbuterol, Formoterol, Salmeterol; Fluticasona, Budesonida, Triancinolona; Albuterol, Terbutalina, Metaproterenol; Clonidina, Metildopa, Guanfacina. |
| 25. | _ | uais medicamentos dos abaixo citados correspondem a diuréticos poupadores de potássio? ssinale a correta: |
| B (C (D (|) | Espironolactona, Triantereno, Amilorida; Hidralazina, Minoxidil; Ibersartan, Valsartan, Candersatan; Prazosina, Terazosina; Amlodipina, Isradipina, Verapamil. |
| 26. | Α | s alterações retinianas e xantomas eruptivos estão mais estreitamente associados a: |
| В (|))) | Hipoalfalipoproteinemias; Doença de Wilson; Cirrose biliar primaria; Hipertrigliceridemias; Hemocromatose. |
| 27. | O | s xantomas tuberosos tendíneos e arco corneal estão mais estreitamente associados a: |
| |) | Hipoalfalipoproteinemias; Fish Eye Disease; Doença de Tangier; Hipertrigliceridemias; Hipercolesterolemia. |
| ப் (|) | rapercolesarolenia. |



28. Paciente jovem apresenta crise hipertensiva; a pressão arterial se mantém lábil e responde mal à terapia anti-hipertensiva, queixas de palpitações. Os exames acusam cálcio plasmático 11mg/dl (n 9-10,5) glicose plasmática 160 mg/dl; Hct 49% e leucócitos 11000; historia médica anterior

| | demonstra que teve hipotensão durante cirurgia de apendicectomia. Assinale o diagnóstico mai provável: |
|-------------------|---|
| B (C (D (| Diabetes melito 1; Feocromocitoma; Doença de rins policísticos; Necrose tubular aguda; Estenose da artéria renal. |
| 29. | O transtorno do pânico se caracteriza por ataques súbitos de terror, acompanhado de taquicardia sudorese, fraqueza e sensação de desmaio, tontura. O tratamento eficaz incluiAssinale a alternativa que completa a lacuna: |
| B (C (D (|) Prevenção e redução do pânico;) Diminuição da ansiedade fóbica;) Os benzodiazepínicos são medicamentos altamente eficazes para o tratamento do TP;) Alternativas A e C estão corretas;) Alternativas A, B e C estão corretas. |
| 30. | O tratamento da Acne está baseado em: |
| B (C (D (|) Tratamento dos fatores hormonais;) Uso de agentes queratolíticos e antibióticos;) Uso de retinoides;) Todas as anteriores;) Alternativas A e B estão corretas. |
| 31. | Todas as drogas abaixo citadas têm um efeito bronco dilatador, exceto: |
| В (|) Dornase alfa;) Alupent;) Serevent;) Atrovent;) Proventil. |
| 32. | Leia atentamente, e assinale a alternativa correta em relação aos princípios que norteiam o SUS: |
| A (B (C (|) Centralização dos serviços de saúde no Estado; |
| D (|) Capacidade de resolução dos serviços de saúde apenas na atenção básica; |

E () Não reconhece a prevalência do meio ambiente com os fatores determinantes da saúde pública.



| 33. | | ssinale nas alternativas abaixo, a entidade de controle social do SUS, nas esferas: Municipal, stadual e Federal: |
|---------------------|------------|--|
| B (C (D (|) | Seminários de Saúde; Conselhos de Saúde; Congressos de Saúde; Unidades de Saúde; Conferências sobre a Saúde. |
| 34. | a | om base na leitura do texto, considerando as afirmativas V (verdadeira) e F (falsa) e considerando criação do modelo único de Saúde (SUS), baseado nas normas criadas para tal fim, assinale a ernativa correta: |
| Ι | II. II. | NOB – 91 Descentralização da Saúde. NOB - 93 Municipalização da Saúde. NOB – 96 Mudanças dos modelos de assistência à Saúde. NOB - 98 Repasse de recursos. |
| B (C (D (|) | V, V, V, F; F, V, V, V; V, V, F, V; V, F, V, F; V, V, V, V. |
| 35. | | ordeduras de cães e gatos são problemas de Saúde Pública; para tanto existem procedimentos a rem seguidos no atendimento aos pacientes nessas situações. Assinale a alternativa correta: |
| B (|) | Se o animal estiver saudável, é viável a sua observação por 10 dias; tratar se houver manifestação de raiva no animal nesse período; Se o animal estiver com raiva, a vacina antirrábica e a imunoglobulina antirrábica devem ser administradas de imediato; Após a mordedura sempre deve ser administrada a vacina diploide antirrábica; Apenas A e B estão corretas; Alternativas A, B e C estão corretas. |
| 36. | | biópsia renal é solicitada com frequência, para diferenciar algumas colagenoses. Em qual das tologias abaixo citadas, a sua indicação é justificada? Assinale a alternativa correta: |
| A (B (C (D (E (|) | Dermatomiosite; Esclerodermia; Artrite reumatoide soro negativa; Artrite reumatoide juvenil; Lupus eritematoso sistêmico. |



| 37. | Em pacientes portadores de febre reumática, a etiologia da doença está intimamente ligada a uma sensibilização prévia por: |
|-------------------|--|
| B (C (D (|) Infecção por campilobacter;) Fatores hereditários e ambientais;) Infecção por estafilococos aureus;) Alergenos alimentares;) Infecção por estreptococos Beta hemolítico. |
| 38. | A queixa de geofagia, nos mais idosos, indica frequentemente Assinale a alternativa que completa a lacuna: |
| B (C (D (|) Parasitose intestinal por ancilostomideo;) Úlcera gástrica;) Quadro psicopatológico;) Não há relação entre os fatos;) Parasitose intestinal por oxiuríase. |
| 39. | .A tríade: hemeralopia, xeroftalmia e dermatose é encontrada em: |
| В (С (D (| Avitaminose D; Avitaminose C; Avitaminose A; Avitaminose B; Avitaminose E. |
| 40. | Os casos de anemia perniciosa, periarterite nodosa, processos alérgicos, pênfigo e radioterapia estão relacionados ao aparecimento, no hemograma, de: |
| В (С (D (|) Monocitose;) Neutrofilia;) Linfocitose;) Eosinofilia;) As alternativas A, B e C estão corretas. |