



P.M. Itaquaquecetuba
Concurso Público 01/2012

INSTITUIÇÃO
SOLER
DE ENSINO

CARGO:
TÉCNICO EM ENFERMAGEM

INSCRIÇÃO Nº: _____

ASSINATURA DO CANDIDATO:

Cargo: Técnico em Enfermagem

Língua Portuguesa

Leia o texto abaixo para responder às questões de 01 a 05.

Um asno, vítima da fome e da sede, depois de longa caminhada, encontrou um campo de viçoso feno ao lado do qual corria um regato de límpidas águas. Consumido pela fome e pela sede, começou a hesitar, não sabendo se antes comia do feno e depois bebia da água ou se antes saciava a sede e depois aplacava a fome. Assim, perdido na indecisão, morreu de fome e de sede. Fábula de Buridan – Filósofo da Idade Média.

01. De acordo com o texto é correto afirmar que:

- a) Tanto o ser humano, quanto o ser animal são indecisos no momento da escolha e acabam perdendo a ambos os objetos desejados.
- b) O ser humano é muito egoísta para abrir mão de qualquer um de seus desejos.
- c) O ser humano não pode ser comparado ao animal, de forma que o homem sempre saberá escolher o que é bom para ele.
- d) O animal é simbólico, não se comparando ao ser humano cuja sabedoria é muito superior.

02. Em “vítima da fome” o termo em destaque assinala:

- a) Adjunto adnominal.
- b) Aposto.
- c) Complemento nominal.
- d) Complemento verbal.

03. Em “viçoso feno” temos respectivamente:

- a) Substantivo e adjetivo.
- b) Adjetivo e substantivo.
- c) Substantivo e advérbio.
- d) Adjetivo e adjetivo.

04. Os verbos “começou” e “bebia” estão respectivamente no:

- a) Pretérito imperfeito do indicativo e futuro do subjuntivo.
- b) Pretérito mais que perfeito do indicativo e imperativo afirmativo.
- c) Presente do indicativo e pretérito perfeito do indicativo.
- d) Pretérito perfeito do indicativo e pretérito imperfeito do indicativo.

05. São todas acentuadas pela mesma regra de límpidas em:

- a) Átono, cérebro, tédio, sífilis.
- b) Melancólica, cefálica, símbolo, endócrino.
- c) Célula, séquito, tênis, físico.
- d) Lógica, fálico, útero, célio.

06. Leia as frases abaixo:

I - Você assiste _____ filmes de terror?

II - Fui _____ sebo que você me indicou.

III - Quando chegou _____ cabana, deitou e dormiu profundamente.

IV - Suelen foi _____ feira hippie e comprou vários artesanatos.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

- a) a – àquele – à – à.
- b) à – àquele – à – a.
- c) a – àquele – a – à.
- d) à – aquele – à – à.

07. Assinale a alternativa em que há voz passiva sintética:

- a) Necessita-se de limpador de janela.
- b) Flávio sentou-se ao lado de Júlia.
- c) Ensina-se inglês.
- d) Precisa-se de auxiliar de padeiro.

08. Em “É justo que eles ganhem os créditos” temos na oração destacada:

- a) Oração subordinada substantiva objetiva direta.
- b) Oração subordinada substantiva objetiva indireta.

c) Oração subordinada substantiva completiva nominal.

d) Oração subordinada substantiva subjetiva.

09. O verbo em destaque em “que eles ganhem os créditos” está no:

- a) Presente do indicativo.
- b) Presente do subjuntivo.
- c) Futuro do subjuntivo.
- d) Imperativo afirmativo.

10. Assinale a alternativa em que o processo de formação da palavra em destaque seja por derivação prefixal e sufixal:

- a) Marcelo enriqueceu por meios ilícitos.
- b) A violência contra a mulher é algo inaceitável.
- c) Você se antepôs aos fatos, e se deu mal.
- d) Aquela parte da fazenda é bem arborizada.

11. Há oração coordenada sindética aditiva em:

- a) Guardei minhas moedas nesta lata, e elas sumiram.
- b) Vou à cidade, porque preciso comprar aviamentos.
- c) Ana quer ir à festa, mas está impossibilitada.
- d) Junior comprou um lindo colar, e deu-o à esposa.

12. Assinale a alternativa em que a concordância nominal está correta:

- a) Andréia estava meia preocupada.
- b) Débora fala a língua inglesa e francesa.
- c) Não gosto de meias palavras.
- d) Os meninos trabalharam bastantes nas férias passadas.

Leia a tirinha abaixo para responder às questões de 13 a 16.



(<http://www.releituras.com.br/ratodesebo01.asp>)

13. De acordo com o texto:

- a) Literatura vagabunda é muito ofensiva, agressiva.
- b) Literatura vagabunda também é encontrada em sebo, servindo apenas para matar ratos.
- c) Livros, inclusive obras primas da literatura, servem para atrair ratos aos sebos.
- d) Os livros não vendidos acumulam poeira e ratos e peçonhas a lugares públicos.

14. Em “É bom ser um rato de sebo” temos:

- a) Oração subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitivo.
- b) Oração subordinada substantiva objetiva direta reduzida de infinitivo.
- c) Oração subordinada substantiva objetiva indireta reduzida de infinitivo.
- d) Oração subordinada substantiva apositiva reduzida de infinitivo.

15. De acordo com o contexto do texto no trecho "claro que jogam uma literatura [...]" o sujeito é:

- a) Oculto.
- b) Indeterminado.
- c) Simples.
- d) Composto.

16. Assinale a alternativa em que há complemento verbal.

- a) "Claro que jogam".
- b) "Uma literatura".
- c) "Vagabunda".
- d) "De vez em quando".

Conhecimentos Específicos

17. J.A.B., 33 anos, adquiriu imunidade ativa contra varicela. Assinale a alternativa que contenha a forma correta de indução da imunidade ativa da varicela.

- a) Paciente foi acometida pela varicela.
- b) Recebeu anticorpos contra varicela por via transplacentária.
- c) Tomou vacina contra varicela.
- d) recebeu anticorpos contra varicela por meio de soro.

18. Reação transfusional é toda e qualquer intercorrência que ocorra como consequência da transfusão sanguínea, durante ou após a sua administração. Assinale a alternativa Incorreta em relação a sintomatologia das reações:

- a) Calafrios, hipertermia, tremores; Sobrecarga respiratória: dispnéia, tosse, taquicardia.
- b) Embolia gasosa: cianose, hipotensão, convulsão, inconsciência.
- c) Sangue incompatível ABO ou Subgrupos: calafrios, hipertemia, cefaléia, oligúria, anúria, icterícia, convulsão, coma, óbito.
- d) Reação por antígenos leucocitários humano: pode ocorrer com transfusão de qualquer hemocomponente, no entanto, é mais comum com compostos ricos em leucócitos (plasma, crío, plaquetas, sangue total), as reações são mais graves e não predominam a urticária, calafrios, náuseas, queixa de mal estar.

19. De acordo com (ANVISA RDC 306/2004), que aborda sobre identificação e quantificação dos resíduos nos ambulatórios, o código E dos resíduos é descrito como:

- a) Resíduo Químico.
- b) Resíduo comum.
- c) Materiais perfuro- cortantes.
- d) Resíduo Infectante.

20. Assinale a alternativa Incorreta, em relação aos cuidados que devem ser observados na administração dos anticonvulsivantes.

- a) O hidantal por via EV deve ser aplicado ligeiramente.
- b) O hidantal não deve ser diluído em soro glicosado porque precipita.
- c) Administrar sempre com prescrição médica.
- d) Orientar o paciente para não ingerir bebida alcoólica durante o tratamento, porque o álcool pode potencializar a ação da droga.

21. H.O.B. 45, do sexo masculino, procurou a Unidade de Saúde do seu bairro para uma consulta médica, na ficha de avaliação foi registrado pelo profissional de saúde queixa principal de: Cistalgia. Assinale a alternativa que contenha o significado de cistalgia.

- a) Dor abdominal.
- b) Cisto doloroso.
- c) Cisto.
- d) Dor na bexiga.

22. S.O.V, técnica de enfermagem, foi advertida pela enfermeira após realização de punção venosa, sem utilização de luvas, violando a regra da utilização de Equipamentos de Proteção Individual. A falta cometida pela técnica é classificado como:

- a) Negligência.

- b) Imprudência.
- c) Imperícia.
- d) Negligência.

23. Em relação ao dreno de tórax, assinale a alternativa Incorreta:

- a) Preencher o selo d'água com 300 ml de soro fisiológico 0,9%, ou 500 ml da mesma solução. (ou seguir protocolo da sua instituição).
- b) Após-instalação do dreno, a mensuração dos débitos dos drenos deverá ser feita a cada 6 hora ou intervalos menores caso haja registros de débitos superiores a 100 ml/hora. (casos de conteúdo líquido).
- c) A mensuração deverá ser feita colocando uma fita adesiva ao lado da graduação do frasco, onde o técnico de enfermagem deverá marcar com uma caneta o volume drenado marcando também a hora da conferência.
- d) A troca do selo d'água deverá ser feita a cada 48h.

24. A.F.N, sexo masculino, 40 anos, foi levado até o Pronto Socorro de sua cidade, pós Acidente botrópico. Assinale a alternativa correta em relação ao acidente botrópico.

- a) (causado por serpentes do grupo das jararacas): dor e inchaço no local da picada, às vezes com manchas arroxeadas e sangramento pelos orifícios da picada; sangramentos em gengivas, pele e urina. Pode evoluir com complicações como infecção e necrose na região da picada e insuficiência renal.
- b) (causado por surucucu): quadro semelhante ao acidente botrópico, acompanhado de vômitos, diarreia e queda da pressão arterial.
- c) (causado por cascavel): no local sensação de formigamento, sem lesão evidente; dificuldade de manter os olhos abertos, com aspecto sonolento, visão turva ou dupla, dores musculares generalizadas e urina escura.
- d) (causado por coral verdadeira): no local da picada não se observa alteração importante; as manifestações do envenenamento caracterizam-se por visão borrada ou dupla, pálpebras caídas e aspecto sonolento.

25. Acidentes por aranhas, são de grande importância na área da enfermagem. São três os gêneros de aranhas de importância médica no Brasil: Loxosceles, Phoneutria, Latrodectus. A Laxosceles, é mais conhecida como:

- a) "viúva-negra".
- b) "armadeira".
- c) "aranha-marrom".
- d) "aranha-macaca".

26. NOTA TÉCNICA Nº 002/2011 - UINFS/GGTES/ANVISA de 12 de abril de 2011, aborda sobre Tratamento de resíduos resultantes de atividades de vacinação com microorganismos vivos ou atenuados. Assinale a alternativa Incorreta:

- a) O descarte de vacinas com presença de micro-organismos vivos ou atenuados deve seguir o que está definido na Resolução ANVISA, RDC n. 306/2004, sendo o resíduo submetido a tratamento prévio à disposição final.
- b) Os resíduos resultantes de atividades de vacinação com micro-organismos vivos ou atenuados, incluindo frascos de vacinas com expiração do prazo de validade, com conteúdo inutilizado, vazios ou com restos do produto, não precisam ser submetidos a tratamento antes da disposição final.
- c) As agulhas devem ser segregadas e seguir as determinações estabelecidas para o Grupo E, perfurocortantes.
- d) A autoclave a ser utilizada para este procedimento deve ser exclusiva.

27. O pombo comum, cujo nome científico é Columba livia doméstica, é uma ave exótica, que se originou da pomba das rochas, de origem européia, e foi introduzida no Brasil no século XVI. São aves mansas, que se encontram em grande número nos centros urbanos, onde se adaptaram muito bem, devido a vários fatores, dentre eles a facilidade de encontrar alimento e abrigo. Não é uma doença transmitida por pombos:

- a) Salmonelose.

- b) Histoplasmose.
- c) Ornitose.
- d) Onicodistrofia.

28. Apesar de parecerem inofensivos, os pombos podem ser uma ameaça à saúde humana. Pelo menos 50 doenças podem ser transmitidas pelas fezes do animal. Criptococose é uma doença transmitida pelo pombo, assinale a alternativa correta em relação à esta afirmação.

- a) Micose profunda, cujo agente etiológico, *Cryptococcus neoformans*, tem afinidade pelo sistema nervoso central. Os sintomas são: febre, tosse, dor torácica, podendo ocorrer também cefaléia, sonolência, rigidez da nuca, acuidade visual diminuída, agitação, confusão mental. São transmitidas através da inalação de poeira contendo fezes de pombos contaminadas pelos agentes etiológicos.
- b) Micose profunda, cujo agente etiológico, *Histoplasma capsulatum*, tem afinidade pelo sistema respiratório. Os sintomas que podem ocorrer variam desde uma infecção assintomática até febre, dor torácica, tosse, mal estar geral, debilidade, anemia, etc. São doenças oportunistas: o indivíduo pode ou não desenvolver a doença, dependendo de seu estado de saúde.
- c) Doença infecciosa aguda, cujo agente etiológico, *Chlamydia psittaci*, tem afinidade pelo sistema respiratório superior e inferior. Os sintomas são: febre, cefaléia, mialgia, calafrios, tosse.
- d) Doença infecciosa aguda, cujo agente etiológico, *Salmonella typhimurium*, tem afinidade pelo sistema digestivo. Alguns dos sintomas são: febre, diarreia, vômitos, dor abdominal. É transmitida através da ingestão de alimentos contaminados com fezes de pombos contendo o agente etiológico.

29. As sondas de Levine são rígidas, desconfortáveis, podem provocar irritação e inflamação da mucosa da nasofaringe e esôfago, além de lesões nasais. Por terem diâmetro externo maior, elas prejudicam ainda a competência do esfíncter esofágico, aumentando o risco de refluxo e aspiração. Assinale a alternativa que seja uma exceção em relação a verificação da posição da sonda.

- a) Verificar a posição da sonda por aspiração de líquido gástrico/duodenal.
- b) Verificar a posição da sonda por ausculta de borborismo na região epigástrica.
- c) Verificar a posição da sonda por ausculta de borborismo no quadrante abdominal superior esquerdo.
- d) Verificar a posição da sonda por ausculta de borborismo na região da fossa ilíaca esquerda.

30. A doença pulmonar obstrutiva crônica é uma doença crônica dos pulmões que diminui a capacidade para a respiração. A maioria das pessoas com esta doença apresentam tanto as características da bronquite crônica quanto as do enfisema pulmonar. Nestes casos, chamamos a doença de DPOC. Em relação a DPOC, assinale a alternativa incorreta:

- a) Quando usamos o termo DPOC de forma genérica, não estamos nos referindo a todas as doenças pulmonares obstrutivas crônicas mais comuns: bronquite crônica, enfisema pulmonar, asma brônquica e bronquiectasias, mas nos referindo a Tuberculose Pulmonar.
- b) O DPOC se desenvolve após vários anos de tabagismo ou exposição à poeira (em torno de 30 anos), levando a danos em todas as vias respiratórias, incluindo os pulmões. Estes danos podem ser permanentes. O fumo contém irritantes que inflamam as vias respiratórias e causam alterações que podem levar à doença obstrutiva crônica.
- c) Os sintomas típicos de DPOC são: tosse, produção de catarro e encurtamento da respiração. Algumas pessoas desenvolvem uma limitação gradual aos exercícios, mas a tosse somente aparece eventualmente.
- d) Outras, costumam ter tosse com expectoração (catarro) durante o dia, principalmente pela manhã, e tem maior facilidade de contrair infecções respiratórias. Neste caso, a

tosse piora, o escarro (catarro) torna-se esverdeado ou amarelado, e a falta de ar poderá piorar, surgindo, às vezes, chiado no peito (sibilância).

31. RESOLUÇÃO COFEN Nº 429/2012, dispõe sobre o registro das ações profissionais no prontuário do paciente, e em outros documentos próprios da enfermagem, independente do meio de suporte - tradicional ou eletrônico. Assinale a alternativa incorreta em relação a esta resolução.

- a) Art. 1º É responsabilidade e dever dos profissionais da Enfermagem registrar, no prontuário do paciente e em outros documentos próprios da área, seja em meio de suporte tradicional (papel) ou eletrônico, as informações inerentes ao processo de cuidar e ao gerenciamento dos processos de trabalho, necessárias para assegurar a continuidade e a qualidade da assistência, assim como, registrar na capa do prontuário se o paciente é portador de alguma doença infecto contagiosa como HIV por exemplo.
- b) Art. 4º Caso a instituição ou serviço de saúde adote o sistema de registro eletrônico, mas não tenha providenciado, em atenção às normas de segurança, a assinatura digital dos profissionais, deve-se fazer a impressão dos documentos a que se refere esta Resolução, para guarda e manuseio por quem de direito.
- c) Art. 2º Relativo ao processo de cuidar, e em atenção ao disposto na Resolução nº 358/2009, deve ser registrado no prontuário do paciente: "um resumo dos dados coletados sobre a pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença".
- d) Art. 2º Relativo ao processo de cuidar, e em atenção ao disposto na Resolução nº 358/2009, deve ser registrado no prontuário do paciente: as ações ou intervenções de enfermagem realizadas face aos diagnósticos de enfermagem identificados.

32. Doença crônica granulomatosa, proveniente de infecção causada pelo *Mycobacterium leprae*. Esta doença é conhecida como:

- a) Hanseníase.
- b) Tuberculose.
- c) Toxoplasmose.
- d) Criptococose.

33. Os pênfigos são doenças que causam o aparecimento de bolhas na pele e, algumas vezes, nas mucosas. Eles têm, como característica comum, a localização das bolhas na camada mais superficial da pele, a epiderme. Existem diferentes tipos de pênfigos. Os 2 principais são o **Pênfigo Vulgar** e o **Pênfigo Foliáceo**. O Pênfigo Foliáceo tem uma variedade que ocorre no Brasil, na região centro-oeste e nos estados de Minas Gerais, Paraná e São Paulo, conhecida como:

- a) Passamento.
- b) Antojó.
- c) Fogo Selvagem.
- d) Curuba.

34. A doença, **Molusco contagioso** pode ser transmitida sexualmente, é causada pelo vírus do molusco contagioso e se caracteriza por pequenas lesões pouco elevadas, amareladas ou da cor da pele, que apresentam uma depressão central. É muito comum na infância, pois as crianças ainda não são imunocompetentes. Quando aparece em adultos pode ser indicação de:

- a) Problemas renais e hepáticos.
- b) Problemas gástricos e hepáticos.
- c) Imunodeficiência, a não ser que tenha sido transmitida por contato sexual.
- d) Transmissão por contato sexual, problemas pancreáticos.

35. Na hanseníase, problemas na face são muito frequentes, principalmente nas pessoas que são multibacilares. Assim, qualquer esforço para prevenir e tratar as incapacidades e deformidades físicas precisa ser valorizado, pois ajuda a pessoa a

se manter inserida na família, no trabalho e na comunidade. Alguns pacientes portadores de hanseníase apresentam, lagoftalmo (Os olhos do cliente ficam abertos, enquanto dorme). É preciso lubrificar o olho, o técnico de enfermagem orienta fazer essa lubrificação seguindo algumas regras, com exceção de:

- a) Afastar a pálpebra inferior na porção temporal.
- b) aplicar uma gota, sem encostar o frasco no olho, pálpebra ou cílios.
- c) paciente fecha os olhos sem forçar e permanece assim por 30 segundos.
- d) Lave as mãos antes da aplicação do colírio e tocar a ponta do frasco com o dedo indicador, para retirar possíveis sujidades.

36. Entende-se por evento adverso pós-vacinação (EAPV) qualquer ocorrência clínica indesejável em indivíduo que tenha recebido algum imunobiológico. Um evento que está temporariamente associado ao uso de uma vacina nem sempre tem relação causal com a vacina administrada. Esses eventos podem ser relacionados à composição da vacina, aos indivíduos vacinados, à técnica usada em sua administração ou a coincidências com outros agravos. A partir da sua localização, os eventos adversos podem ser locais ou sistêmicos e, de acordo com sua intensidade, podem ser leves, moderados ou severos (graves). De acordo com o Manual de Vigilância Epidemiológica de Eventos Adversos Pós-Vacinação, é considerado uma exceção de evento adverso grave aquele que:

- a) Necessite de utilização de antitérmicos por 8 horas pós vacinação.
- b) Gere incapacidade significativa ou persistente (sequela).
- c) Resulte em anomalias congênitas.
- d) Cause ameaça à vida (necessidade de intervenção imediata para evitar o óbito), ou Leve ao óbito.

37. Varicela ou catapora é uma doença aguda altamente contagiosa caracterizada por exantema vesicular generalizado da pele e mucosa. O herpes Zoster, ocasionado pela reativação do vírus varicelazoster, é uma erupção cutânea que acomete os dermatômos. Assinale a alternativa incorreta:

- a) O vírus varicela-zoster é transmitido pelas secreções respiratórias e pelo líquido das lesões cutâneas, tanto pela disseminação através do ar como por contato direto.
- b) A varicela é contagiosa somente quando se inicia as vesículas até quando elas se tornam crostosas, o que ocorre, 5 a 7 dias após o início da erupção.
- c) Os adultos com herpes zoster que são hospitalizados tem menos chance de provocar casos secundários de varicela do que as crianças.
- d) O rígido isolamento é recomendado para pacientes hospitalizados com varicela e para as crianças e adultos imunocomprometidos com herpes-zoster.

38. Em relação às medidas de precaução padrão para Varicela e Herpes Zoster, assinale a alternativa Incorreta:

- a) Para varicela precaução de contato.
- b) Para suscetíveis expostos (qualquer paciente, profissional, visitante que tenha entrado em contato com o paciente índice em período de transmissibilidade por mais de 01 hora em ambiente fechado e que nunca teve a doença e nunca foi vacinado): precaução de contato e aérea do 8º ao 21º dia após o último dia de exposição ao paciente índice ou até 28º dia no caso de ter sido administrado imunoglobulina para varicela-zoster (VZIG).
- c) Para pacientes com Herpes Zoster, imunocomprometidos (HIV/AIDS, fibrose cística, neoplasias, diabetes mellitus, uso de corticosteróides em doses plenas por mais de 2 semanas) com herpes-zoster localizado ou disseminado e para imunocompetentes com herpes-zoster disseminado: Precaução de contato e aérea (até todas as lesões se tornarem crostosas).
- d) Para neonatos (nascido de mães com varicela): Precaução de contato e aérea até 21º dia de vida, caso permaneçam internados ou até 28º dia de vida, caso tenham recebido VZIG.

39. Assinale a alternativa correta em relação a precaução respiratória para aerossóis.

- a) Está indicada para situações em que exista possibilidade de transmissão de agentes infecciosos por contato direto ou indireto. Isto é, contato entre pacientes, contato através do profissional de saúde (mãos) ou contato por meio de artigos.
- b) É obrigatório o uso de máscara específica (PFF2 ou tipo N95) com capacidade de filtrar partículas <0,3 mm de diâmetro, por todo o profissional que prestar assistência ou realizar procedimento a pacientes com suspeita ou confirmação das doenças: tuberculose pulmonar ou laringea, sarampo, varicela e herpes zoster disseminado ou em imunossuprimido.
- c) ocorre através do contato próximo com o paciente. Gotículas de tamanho considerado grande (>5m) são eliminadas durante a fala, respiração, tosse, e procedimentos como aspiração.
- d) Exemplos de doenças transmitidas por gotículas: Doença Meningocócica e Rubéola.

40. Em relação à utilização da precaução de contato, assinale a alternativa Correta.

- a) Diarréia aguda e provavelmente infecciosa em paciente incontinente ou em uso de fralda.
- b) Exantema petequial e febre.
- c) Tosse, febre, infiltrado pulmonar em paciente infectado pelo HIV.
- d) Exantema maculopapular com febre e coriza.