

## LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno com o enunciado das 40 (quarenta) questões objetivas divididas nas seguintes sessões:

LÍNGUA PORTUGUESA		CONHECIMENTOS DE SUS		CONHECIMENTOS GERAIS DE MEDICINA		CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS	
Questões	Pontos	Questões	Pontos	Questões	Pontos	Questões	Pontos
1 a 10	2	11 a 20	2	21 a 30	3	31 a 40	3

b) Uma (1) Folha de Respostas, destinada às respostas das questões objetivas formuladas nas provas, a ser entregue ao fiscal no final.

- 02- Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem na confirmação de inscrição. Caso contrário, notifique **IMEDIATAMENTE** o fiscal.
- 03- Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio da Folha de Respostas, preferivelmente à caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul.
- 04- Tenha muito cuidado com a Folha de Respostas para não a **DOBRAR, AMASSAR** ou **MANCHAR**. A folha somente poderá ser substituída caso esteja danificada em suas margens superior ou inferior – **BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA**.
- 05- Na prova, as questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima do enunciado.
- 06- Na folha de respostas, as mesmas estão identificadas pelo mesmo número e as alternativas estão identificadas acima da questão de cada bloco de respostas.
- 07- Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 5 alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar **UMA RESPOSTA**. A marcação de nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a questão, **MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA**.
- 08- Na **Folha de Respostas**, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo **TODO O ESPAÇO** compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando **caneta esferográfica de tinta preta ou azul**, de forma contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcação completamente, procurando deixar menos “espaços em branco” possível dentro do retângulo, sem invadir os limites dos retângulos ao lado.
- 09- **SERÁ ELIMINADO** do Concurso o candidato que:
- a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelhos de calcular, bem como rádios gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;
- b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o **Caderno de Questões e/ou a Folha de Respostas**.
- 10- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua **Folha de Respostas**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no Caderno de Questões **NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA**.
- 11- Quando terminar, entregue ao fiscal o Caderno de Questões e a Folha de Respostas, e **ASSINE A LISTA DE PRESENÇA**.



◆ Língua Portuguesa ◆

Questão 01

Assinale a alternativa que contém uma frase em que há uma palavra formada por derivação parassintética.

- A) A presença da nobreza conferiu à vida carioca caráter modelar.
- B) A vinda da Corte fez surgir uma classe social, a bem dizer repatriada.
- C) Esta é, hoje, a Biblioteca Nacional, símbolo do poder das letras.
- D) Quando família real portuguesa chegou o Rio, o Português já era uma língua vitoriosa.
- E) Vale considerarmos que a linguagem é a expressão do pensamento.

Questão 02

O seguinte fragmento foi retirado de uma notícia publicada na imprensa nacional:

“Ao ficar sozinho no quarto do hospital, protegido pela tenda de oxigênio e pelas paredes do aposento, deu-se conta, afinal, da gravidade da sua situação. Os médicos estavam lutando por prolongar a vida de um homem \_\_\_\_\_ coração trabalhara bem mais que o seu próprio dono.”

A alternativa que contém o termo que preenche corretamente a lacuna no fragmento acima é

- A) do qual.
- B) cujo.
- C) que.
- D) o qual.
- E) de cujo.

Questão 03

A palavra “efêmero” pode significar, conforme se lê no dicionário do Aurélio, aquilo que é “pouco duradouro”, “passageiro”. Assinale a alternativa abaixo que contém a palavra com sentido contrário ao do termo destacado.

- A) mutante.
- B) permanente.
- C) provisório.
- D) temporário.
- E) transitório.

Questão 04

Assinale a alternativa em que a forma verbal presente no fragmento selecionado apresenta idéia de hipótese ou possibilidade:

- A) A evolução dos falares medievos resultou nas línguas nacionais existentes hoje.
- B) A maioria dos estudiosos contesta a noção dicotômica de certo e errado em língua.
- C) É bem provável que a primeira palavra proferida na Lua tenha sido “OK”.
- D) Pesquisas linguísticas garantem que a capacidade da fala é inerente à natureza humana.
- E) Sobre a fala das gentes das cavernas não há registro confiável, só existem indícios.

Questão 05

Sabendo-se que a figura de **personificação** ou **prosopopéia** consiste em atribuir características humanas a seres inanimados ou irracionais, reconhece-se que esse recurso expressivo está presente na frase:

- A) Constatamos que o tempo se escoara: já era quase noite.
- B) Disfarçando o olhar, o aluno espiou as horas.
- C) Passara se voando o último ônibus que o transportaria à praia.
- D) Um chuvisco ralo brincava no ar da tarde.
- E) Urgia que se protegessem as árvores centenárias.

**Questão 06**

Marque a alternativa em que a frase está construída de forma escoreta, de acordo com todos os níveis da língua padrão escrita:

- A) A história foi repetida bastantes vezes.
- B) Amo ela com toda força do meu coração juvenil.
- C) Ela estava toda encabulada com a proposta.
- D) Mudei-me para o interior há muitos anos atrás.
- E) O navio naufragou rapidamente, emergindo no mar encapelado.

**Questão 07**

Para pontuar períodos compostos em que surgem orações subordinadas substantivas, basta considerar as funções sintáticas por elas exercidas. Não se separam, por exemplo, com vírgula, a oração principal das orações subjetivas, objetivas diretas, objetivas indiretas, completivas nominais e predicativas – afinal, sujeitos, complementos verbais e nominais não se separam, por vírgulas, dos termos a que se ligam; o mesmo se pode dizer do predicativo nos predicados nominais.

Por esse entendimento, marque a alternativa que contém um período pontuado indevidamente.

- A) Algumas pessoas vivem presas unicamente às suas profissões, aos seus interesses pessoais.
- B) É surpreendente constatar que, apesar de tudo, muitos ainda acreditam em resolver nossos problemas com promessas demagógicas.
- C) Não se confia mais em que tudo possa ser resolvido apenas por palavras, por intenções.
- D) Peço-lhe compreender nossos problemas com moradia, com emprego fixo, com salários baixos.
- E) Vive-me pedindo, que o ajude, que interfira em seu favor, que realize as suas obrigações.

**Questão 08**

Indique a alternativa que contém erro na separação de silábica.

- A) cul-tua-va; di-á-lo-go.
- B) en-toa-ção; ab-rup-to.
- C) pers-pi-caz; obs-curo.
- D) pneu; subs-cre-ver.
- E) trans-atlân-ti-co, i-guais.

**Questão 09**

Das seguintes alternativas, marque aquela que apresenta a frase em que o adjetivo sublinhado não corresponde ao sentido indicado à direita.

- A) A verdade é formarmos uma sociedade **fendida**. (dividida, desunida).
- B) Era um homem **inepto** para realizar aquela tarefa. (tolo, idiota).
- C) Este desnível **clamoroso** nos confere o título de campeões da injustiça social. (gritante, muito evidente).
- D) O fato, por ser **contemporâneo**, foi devidamente divulgado na imprensa. (coevo, coetâneo).
- E) Todo esse mar de **alienados** compõe a periferia dos patrícios desvalidos. (ansioso, ávido).

**Questão 10**

Marque a alternativa que apresenta uso indevido do sinal indicativo de crase.

- A) Dirigi-se àquele lugar sagrado para todos.
- B) Esta é a questão a que fizemos referência na assembleia.
- C) Lá vai a pessoa à quem deste a notícia alarmante.
- D) O assaltante foi morto a tiro.
- E) O Curso funciona de segunda a sexta-feira.

◆ **Conhecimentos de SUS** ◆

**Questão 11**

Nos casos em que o Sistema Único de Saúde for insuficiente para garantir a cobertura assistencial à população de uma área, poderá ser formalizada, por contrato ou por convênio, a participação complementar de serviços privados. Nesta situação terão preferência:

- A) Os hospitais sob gestão dos seguro-saúde.
- B) Os hospitais gerais de nível terciário.
- C) As entidades filantrópicas.
- D) Os serviços de diagnóstico complementar.
- E) Os hospitais com serviço de urgência.

**Questão 12**

O programa de Atenção Básica nos municípios e no Distrito Federal exige a criação de Unidades Básicas de Saúde (UBS), acopladas ou não ao Programa de Saúde da Família, que devem estar inscritas no cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde. Para as UBS com programa de Saúde da Família em grandes centros urbanos recomenda-se:

- A) 1 UBS para até 12 mil habitantes.
- B) 1 UBS para até 10 mil habitantes.
- C) 1 UBS para até 8 mil habitantes.
- D) 1 UBS para até 15 mil habitantes.
- E) 1 UBS para até 20 mil habitantes.

**Questão 13**

Na organização de redes loco regionais de atenção integral às urgências os serviços de terapia intensiva fazem parte do componente:

- A) Pré hospitalar móvel.
- B) Pré hospitalar fixo.
- C) Pós hospitalar.
- D) Hospitalar dia.
- E) Hospitalar.

**Questão 14**

A participação popular no SUS é feita através das Conferências de Saúde e dos Conselhos de Saúde. Os Conselhos de Saúde são órgãos deliberativos permanentes compostos por:

- A) 20% de usuários e 80% do governo, trabalhadores de saúde e prestadores privados.
- B) 90% de usuários e 10% do governo, trabalhadores de saúde e prestadores privados.
- C) 10% de usuários e 90% do governo, trabalhadores de saúde e prestadores privados.
- D) 50% de usuários e 50% do governo, trabalhadores de saúde e prestadores privados.
- E) 70% de usuários e 30% do governo, trabalhadores de saúde e prestadores privados.

**Questão 15**

A Política Nacional de Atenção Básica, pela portaria nº 648/GM, de 28 de março de 2006, estabelece que cada Agente Comunitário de Saúde deve atender uma população de no máximo:

- A) 750 habitantes.
- B) 550 habitantes.
- C) 650 habitantes.
- D) 450 habitantes.
- E) 850 habitantes.

**Questão 16**

Comissões Intersetoriais de âmbito nacional subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde devem articular políticas e programas de interesse para a saúde cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do SUS. Exemplo de atividade cuja articulação cabe as Comissões Intersetoriais é:

- A) Educação básica.
- B) Saneamento e meio ambiente.
- C) Educação profissionalizante.
- D) Saúde do adolescente.
- E) Transporte urbano.

**Questão 17**

No âmbito do SUS, na esfera federal, os recursos financeiros originários do orçamento da Seguridade Social, de outros orçamentos da união, e de outras fontes, serão administrados pelo Ministério da Saúde através do Fundo:

- A) Nacional de Saúde.
- B) Orçamentário Federal.
- C) Nacional do Bem Estar Social.
- D) Nacional de Seguridade Social.
- E) Orçamentário de Seguridade Social.

**Questão 18**

Exemplo de prioridade do Pacto de Gestão do SUS, de acordo com a portaria GM/MS 399, de 22 de fevereiro de 2006, é:

- A) Implementar um projeto permanente de mobilização social.
- B) Elaborar e divulgar a carta dos direitos dos usuários do SUS.
- C) Definir inequivocamente a responsabilidade sanitária de cada instância do SUS.
- D) Implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa.
- E) Elaborar e implantar a Política Nacional de Promoção da Saúde.

**Questão 19**

Considerar que todos têm direito aos serviços de saúde, diminuir desigualdades tratando desigualmente os desiguais e investir mais onde a carência é maior caracteriza um princípio de justiça social do SUS definido como:

- A) Integralidade.
- B) Universalização.
- C) Hierarquização.
- D) Descentralização.
- E) Equidade.

**Questão 20**

O bloco de financiamento para a Assistência Farmacêutica inclui os componentes ditos Básico, Estratégico e de Medicamentos de Dispensação Excepcional. Exemplo de medicamento que poderá ser fornecido por financiamento para Programa Estratégico inclui aqueles usados no tratamento da:

- A) Dengue.
- B) Influenza.
- C) Doença de Chagas.
- D) Leptospirose.
- E) Hipertensão arterial.

◆ **Conhecimentos Gerais de Medicina** ◆

**Questão 21**

Um obeso, com 64 anos, inicia quadro de febre com calafrios, dor em quadrante inferior esquerdo do abdome e fezes amolecidas. O exame demonstra sensibilidade discreta na região dolorosa, sem irritação peritoneal, sendo indolor a punho percussão lombar bilateral. Em relação à investigação e ao tratamento você optaria por:

- A) Colonoscopia e Prednisona + metronidazol.
- B) USG abdominal e Cipro.
- C) Rectossigmoidoscopia e Vancomicina oral.
- D) Cultura de fezes e Tetraciclina.
- E) TC de abdome e Cipro + metronidazol.

**Questão 22**

Queimadura acometendo face dorsal do tronco e ambas as regiões glúteas indica comprometimento de área corporal estimada em:

- A) 5%.
- B) 18%.
- C) 13%.
- D) 26%.
- E) 8%.

**Questão 23**

Durante tratamento clássico para tuberculose pulmonar um paciente relata queixas visuais compatíveis com o diagnóstico de neurite óptica. Nesta situação a droga mais provavelmente envolvida é:

- A) Pirazinamida.
- B) Rifampicina.
- C) Isoniazida.
- D) Etambutol.
- E) Rifabutina.

**Questão 24**

O padrão ouro no diagnóstico das bronquiectasias é:

- A) Tomografia computadorizada de alta resolução.
- B) Prova da função pulmonar.
- C) Broncografia.
- D) Raios X de tórax.
- E) Tomografia por emissão de pósitrons.

**Questão 25**

Percentualmente, a causa mais prevalente de sangramento agudo do trato gastrointestinal inferior dentre as citadas é:

- A) Tumor.
- B) Colite isquêmica.
- C) Doença de Chron.
- D) Doença diverticular.
- E) Colite inespecífica.

**Questão 26**

Infarto agudo do miocárdio acometendo região septal determina alterações eletrocardiográficas em:

- A) DII, DIII e AVF.
- B) VI e V2.
- C) DI e AVL.
- D) DI, AVL, V1 e V6.
- E) V3 e V4.

**Questão 27**

No hipotireoidismo subclínico a presença de indicadores de falência tireoidiana progressiva tem sido encarada, por alguns, como argumento favorável ao tratamento com tiroxina. Exemplo de um desses indicadores é:

- A) Colesterol elevado.
- B) Macrocitose.
- C) Reflexo aquileu lentificado.
- D) TSH maior que 10.
- E) Hiponatremia.

**Questão 28**

Um paciente de 45 anos é atendido devido a dor epigástrica. Após obter história cuidadosa e realizar exame físico apurado o médico assistente considera improváveis as hipóteses de refluxo gastroesofágico, de síndrome do intestino irritável ou de aerofagia. Da mesma forma, a anamnese dirigida não apurou emagrecimento, hemorragia, disfagia, vômitos ou outros sinais de alerta. Teste respiratório solicitado para investigar *H. pylori* tem resultado negativo. Selecione a conduta mais adequada para o caso.

- A) Seriografia do esôfago, estômago e duodeno.
- B) Cápsula endoscópica.
- C) Colangiopancreatografia endoscópica.
- D) Tomografia computadorizada do abdome.
- E) Tratamento empírico com omeprazol.

**Questão 29**

O sistema de Child-Pugh-Turcotte é comumente usado na avaliação da cirrose hepática. São parâmetros utilizados nesta classificação todos os citados abaixo, EXCETO:

- A) Transaminases.
- B) Ascite.
- C) Albumina.
- D) Tempo de protrombina.
- E) Bilirrubinas.

**Questão 30**

Dentre as doenças citadas e que entram no diagnóstico diferencial com a artrite reumatóide, assinale a que cursa com fator reumatóide frequentemente positivo.

- A) Artrite reativa.
- B) Artrite psoriática.
- C) Sarcoidose.
- D) Gota tofácea crônica.
- E) Polimialgia reumática.



◆ **Conhecimentos Específicos** ◆

Questão 31

Das citocquinas abaixo, assinale aquela que está diretamente associada à SRIS (síndrome da resposta inflamatória sistêmica):

- A) IL-3
- B) IL-4
- C) IL-5
- D) IL-10
- E) TNF

Questão 32

Analise as afirmativas abaixo e responda

- I) Durante os primeiros 2 meses de vida as bactérias que causam meningite em lactentes normais refletem a flora bacteriana da mãe.
- II) Antes do uso difundido das vacinas anti-*Haemophilus influenza* tipo b, cerca de 25% das meningites eram causadas por estas bactérias.
- III) Crianças imunodeprimidas ou que apresentam malformações anatômicas apresentam maior risco de infecções por germes menos comuns como o *Pseudomonas aeruginosa* e *Staphylococcus aureus*.
- IV) Crianças com imunodeficiência congênita ou adquirida não devem ser vacinadas com vacinas anti-*Haemophilus influenza*.

- A) Se as afirmativas I, II e III forem corretas.
- B) Se as afirmativas II, III e IV forem corretas.
- C) Se as afirmativas I e III forem corretas.
- D) Se as afirmativas I e IV forem corretas.
- E) Se as afirmativas II e IV forem corretas.

Questão 33

Um recém-nascido apresentou quadro de febre baixa, icterícia, elevação das enzimas hepáticas e recusa alimentar. A ultrassonografia do fígado e das vias biliares mostrou o aumento difuso do fígado, mas sem alterações anatômicas das vias biliares extra-hepáticas. Com base nos dados apresentados acima podemos afirmar:

- A) Trata-se de um caso icterícia neonatal. As bilirrubinas devem ser monitoradas e o tratamento feito com banhos de luz ultravioleta.
- B) No caso apresentado todos os vírus hepatotrópicos devem ser considerados, especialmente o HAV, o HDV e HEV.
- C) Caso se confirme a infecção pelo HCV na criança, a infecção pelo HIV deve ser fortemente considerada na mãe.
- D) As infecções por CMV e pelo EBV são muito raras em recém-nascidos, por isso mesmo devem ser descartadas neste caso.
- E) Deve-se instituir imediatamente o tratamento com antibióticos, já que as sépsis por Gram-positivos são especialmente importantes em recém-nascidos.

Questão 34

A droga de escolha indicada inicialmente para o tratamento da otite média aguda é:

- A) Amoxicilina – clavulanato (80-90 mg/kg/24 h de amoxicilina, 6,4 mg/kg/24 h de clavulanato).
- B) Amoxicilina (80-90 mg/kg/24 h).
- C) Axetil cefuroxima(30 mg/kg/24 h).
- D) Ceftriaxona (50 mg/kg via intramuscular em uma injeção única).
- E) Azitromicina (10 mg/kg VO uma vez ao dia por quatro dias).

**Questão 35**

Uma criança branca de 3 anos é levada ao ambulatório por seus pais com história de tosse produtiva permanente, rinorréia catarral constante e episódios recorrentes de diarreia. Durante a conversa com o pediatra, os pais informaram que o irmão mais velho da criança apresentou um quadro respiratório semelhante nos dois primeiros anos de vida, porém sem manifestações intestinais. Ao exame físico o menor apresentava roncosp e sibilos expiratórios difusos, mucosa nasal brancacenta e edemaciada, além de distensão abdominal e atraso no crescimento. Com base no relato acima, podemos afirmar:

- A) Um teste do suor quantitativo com Cloro = 60 mEq/l não invalida a hipótese de fibrose cística.
- B) A hipótese de fibrose cística deverá ser descartada já que o irmão mais velho se encontrava bem no momento.
- C) A criança acima não apresenta critérios para o diagnóstico de fibrose cística.
- D) Com um teste do suor quantitativo apresentando Cloro = 60 mEq/l, a hipótese de fibrose cística só poderá ser considerada se a dosagem de glicosaminoglicam urinária for normal.
- E) Um teste do suor quantitativo dentro dos limites da normalidade invalida completamente o diagnóstico de fibrose cística para a criança acima.

**Questão 36**

Um menino de 5 anos residente numa área rural foi levado ao ambulatório de pediatria da sua cidade apresentando febre baixa, tosse paroxística e discreta dispnéia. O Rx do tórax evidenciou áreas de condensações pulmonares difusas, sem formação de coleções líquidas nos recessos pleurais. Um exame de sangue feito de emergência mostrou: Basófilos 0%, Eosinófilos 38%, Mielócitos e metamielócitos 0%, Neutrófilos 32%, Bastões 5%, Linfócitos 13%, Monócitos 12%, VHS 30 mm/1ª hora, PCR 1,5.

O quadro clínico e laboratorial da criança acima é mais compatível o diagnóstico de:

- A) Pneumonia estafilócócica.
- B) Pneumonia viral.
- C) Pneumonia pneumocócica.
- D) Tuberculose pulmonar.
- E) Síndrome de Loeffler.

**Questão 37**

Considere as afirmativas abaixo e responda

- I) Os anticorpos de classe M (IgM) constituem as únicas imunoglobulinas que ultrapassam a barreira placentária.
- II) Durante uma infecção os anticorpos de classe G (IgG) se elevam após os anticorpos de classe M (IgM).
- III) Na dermatite atópica da criança sempre se observa a elevação de anticorpos específicos de classe E(IgE) para o leite de vaca.

- A) Se todas as afirmativas forem verdadeiras.
- B) Se todas as afirmativas forem falsas.
- C) Se somente as afirmativas I e III forem verdadeiras.
- D) Se somente as afirmativas I e II forem verdadeiras.
- E) Se somente as afirmativas II e III forem verdadeiras.

**Questão 38**

Uma criança de 3 anos foi levada ao pediatra apresentando história de febre baixa (máximo 38°C), queda discreta do estado geral e exantema que iniciou pela face e depois se estendeu por todo o corpo, principalmente nas superfícies extensoras, mas poupando as palmas e plantas. Após alguns dias, já com a criança sem febre e com as lesões exantemáticas quase imperceptíveis, a criança apresentou equimoses acometendo sobretudo o tronco, a parte proximal dos braços e as regiões infraorbitárias o qual persistiu por 2 semanas e desapareceu sem tratamento. O exame físico da criança evidenciou uma discreta hiperemia da orofaringe e aumento de alguns linfonodos das cadeias cervicais laterais bilaterais. O pediatra pediu então um exame de sangue que não evidenciou qualquer alteração da série vermelha, o leucograma mostrava: leucócitos totais de 12.700, basófilos 0%, eosinófilo 2%, mielócitos e metamielócitos 0%, bastões 3%, neutrófilos 25%, linfócitos 60% e monócitos 10%, com 1% de linfócitos atípicos. Plaquetas 25.000. VHS 20 mm/1ª hora e PCR 0,6. A eletroforese das proteínas séricas demonstrou apenas um discreto aumento da fração gama, enquanto as bilirrubinas, a ureia, a creatinina e as enzimas hepáticas estavam todas dentro dos limites da normalidade.

Com relação ao descrito acima, assinale a opção cuja enfermidade foge ao diagnóstico diferencial da criança:

- A) Rubéola.
- B) Infecção pelo EBV.
- C) Púrpura alérgica de Henoch Shonlein.
- D) Parvovirose B19.
- E) Exantema súbito.

**Questão 39**

Uma criança de 11 meses, previamente sadia, apresentou quadro súbito de dor abdominal paroxística, que o levava a chorar alto e forte, demonstrando estar sentindo dores muito fortes. Nos intervalos de recorrência das dores a criança ainda brincava, mas logo ela tornou-se letárgica, apresentou febre alta (40°C), evacuou uma vez com sangue e em seguida não evacuou mais. A palpação abdominal mostrava sinais de irritação peritoneal e a presença de massa na região mesogástrica e fossa ilíaca esquerda que mudava de forma quando sobrevinham os paroxismos de dor. O toque retal veio com a luva suja de sangue e um pouco de fezes. O hemograma mostrou leucocitose intensa com desvio para a esquerda. O diagnóstico de intussuscepção foi feito, a criança foi submetida à laparotomia exploradora e ficou muito bem. Com base no relato acima e nos seus conhecimentos sobre este tipo de problema **Não** podemos afirmar:

- A) A intussuscepção é a causa mais comum de obstrução intestinal em crianças de 3 a 6 meses.
- B) Noventa por cento das crianças com intussuscepção intestinal são portadoras de uma doença de base como tumores do tubo digestivo.
- C) Embora a intussuscepção possa desaparecer espontaneamente, a enfermidade é aguda e grave e o tratamento cirúrgico nunca deve deixar de ser considerado.
- D) A doença é de causa desconhecida.
- E) A intussuscepção não tratada em lactentes é quase sempre fatal e as chances de recuperação da criança estão diretamente associadas ao tempo de intussuscepção.

**Questão 40**

Uma criança de 6 anos é levada por seus pais ao seu consultório com história de coriza, congestão nasal, crises de espirros matinais, prurido e vermelhidão nos olhos. A mãe informa que o pai apresenta sintomas semelhantes. O diagnóstico mais provável para esta criança e um exame que ajudará a estabelecer esse diagnóstico é:

- A) Rinossinusite e conjuntivite alérgicas - dosagem de IgG específica para antígenos inalatórios.
- B) Rinite e conjuntivite alérgicas – dosagem de IgE específica para antígenos inalatórios (poeira domiciliar, *Blomia tropicalis*, *dermatophagoides farinae* e *pteronyssinus*, e fungos do ar dos gêneros *Aspergillus*, *Penicillium*, *Helminthosporium* e *Cladosporium*).
- C) Rinite vasomotora e conjuntivite alérgica – dosagem de IgE total para um painel de antígenos inalatórios e alimentares.
- D) Rinite e conjuntivite alérgicas – hemograma completo, VHS, PCR e cultura da secreção conjuntival.
- E) Rinossinusite eosinofílica não alérgica e conjuntivite bacteriana – dosagem de IgM específica para poeira domiciliar, *Blomia tropicalis* e fungos do dos gêneros *Aspergillus*, *Penicillium*, *Helminthosporium*.