

1. O objetivo da administração de insulina exógena é o de manter o controle metabólico dos carboidratos e nível glicêmico adequado, evitar complicações agudas como hiperglicemia, cetoacidose e coma diabético, bem como evitar ou diminuir complicações crônicas a longo prazo. As insulinas podem ser de ação ultrarrápida, rápida, intermediária, ultralenta e pré-misturas. Assinale a alternativa correta sobre as características das insulinas listadas:
- Insulina de ação intermediária tem início em 2 à 8h, com duração de 20 a 24h e de administração exclusivamente SC.
 - Insulina de ação ultrarrápida tem início de ação em 5 a 15 min, com duração de 3 à 4h e podem ser administradas via SC ou endovenosamente.
 - Insulina de ação rápida tem início de ação em 5 a 15 min, com duração de 6 a 7h e de administração exclusivamente SC.
 - Insulina de ação intermediária tem início de ação 2 a 3h com duração de 20 a 24h e podem ser administradas via SC ou endovenosamente.
2. A cirurgia é uma especialidade médica que tem o objetivo de tratar um desvio de saúde no corpo do cliente quando esta não responde a tratamentos clínicos. Os fenômenos identificados necessitam, então, de intervenção cirúrgica, que pode ter os mais variados fins, dentre eles: restauração de tecidos e de ossos, aberturas de orifícios, drenagens, retiradas de tumores e órgãos, transplantes e com finalidade estética, inclusive. As cirurgias podem ser de emergência ou eletivas. As de emergência são realizadas imediatamente, sem programação, é quando a vida do cliente se encontra em risco e não pode esperar para receber intervenção. A eletiva, por sua vez, é planejada com antecedência. Estas, ainda são classificadas em: curativa, paliativa ou de reconstrução. A classificação das cirurgias também pode ser quanto à infecção ou contaminação, deste modo, assinale a alternativa correta:
- Cirurgia limpa: isentas de infecção; cirurgia com contaminação em potencial: trata-se de cirurgia que mesmo sem contaminação local, há tecidos com flora bacteriana residente em média quantidade; cirurgia com contaminação: corpo ou local da cirurgia contaminado, flora bacteriana significativamente presente, porém de fácil descontaminação; e cirurgia com infecção: já existe supuração.
 - Cirurgia limpa: são aquelas isentas de infecção e fácil descontaminação; cirurgias com contaminação em potencial: cirurgia onde há tecido com flora bacteriana residente em média quantidade; cirurgia com infecção: em que já existe supuração.
 - Cirurgia limpa: nas quais os tecidos estão isentos de infecção e de fácil descontaminação; cirurgias com contaminação em potencial: mesmo em ausência de contaminação, há tecido com flora residente pouco numerosa, cirurgia com contaminação: local da cirurgia encontra-se contaminado, existe flora bacteriana significativamente presente e cirurgia com infecção: as que já existem supuração do tecido.
 - Cirurgia limpa: nas quais os tecidos estão isentos de infecção e de média descontaminação; cirurgia com contaminação em potencial: sem contaminação local e sem flora bacteriana residente, cirurgia com contaminação/infecção: o corpo ou local encontra-se contaminado, com pus, e existe flora bacteriana significativamente presente, de difícil descontaminação.
3. Quanto à administração de medicamentos, é incorreto afirmar que:
- Que não se deve administrar digitálicos em pacientes com frequência menor que 60bpm.
 - Deve se estar atento ao prazo de validade antes da administração.
 - É obrigatória a prescrição médica para a administração de qualquer medicamento
 - Associar três ou mais medicamentos no soro fisiológico não trás prejuízo ao paciente nem altera a formulação da droga.
4. A gestão de risco ou gerenciamento de riscos é a prática de identificar e analisar os riscos e tornar as medidas necessárias para minimizar as perdas potenciais ou reais. A avaliação de risco constitui a primeira etapa da gestão de riscos propriamente dita. Consiste em: identificação de perigo, avaliação da relação dose-resposta, avaliação de exposição e caracterização de riscos, a partir da qual as decisões para redução dos riscos e estratégias para a gestão são estabelecidas. Qual a alternativa abaixo lista corretamente regulamentação sobre gestão de riscos?
- Portaria nº 21 de 4 de setembro de 2008: dispõe sobre o regulamento técnico par o funcionamento de bancos de leite humano.
 - Portaria nº 485, de 11 de novembro de 2005: aprova a norma regulamentada nº 32 (segurança e saúde no trabalho em estabelecimento de saúde).
 - Resolução 485, de 13 de outubro de 2005: aprova a norma regulamentada nº 32 (segurança e saúde no trabalho em estabelecimento de saúde).
 - Resolução RDC nº 171, 14 de outubro de 2005: aprova o regulamento técnico do funcionamento dos serviços de terapia antineoplásica.
5. A terapia intravenosa evoluiu de uma medida extrema, usada apenas como último recurso para os doentes mais criticamente enfermos, para uma forma altamente científica e especializada de tratamento utilizada para mais de 90% dos pacientes internados. Seguindo essa tendência de evolução, desenvolvimento e aprimoramento do conhecimento na sociedade moderna, torna-se extremamente difícil um acompanhamento atualizado dos resultados de pesquisas, diminuindo a distância entre os avanços científicos e a prática assistencial, em especial nas ciências da área da saúde. Assim, surgiu inicialmente, no campo da Medicina e, posteriormente, na Enfermagem, a Prática Baseada em Evidência (PBE). Segundo o Nursing Best Practice/Assesmentand Device Selection for Vascular Access RAO (2008), as recomendações práticas corretas de acordo com o nível da evidência estão corretas na alternativa:
- Histórico de saúde/ anamnese (nível da evidência Ib) e preferência do cliente (nível da evidência V).
 - Sistema de apoio e recursos disponíveis (nível da evidência IV) e terapia prescrita (nível da evidência Ib).
 - Exame físico (nível da evidência IV) e disponibilidade dos dispositivos (nível da evidência IV).
 - Duração da terapia (nível da evidência Ib) e exame físico (nível da evidência V).

6. O cateter central de inserção periférica (CCIP) é fino, longo e flexível, confeccionado de material biocompatível, como por exemplo, o elastômetro de silicone ou o poliuretano, introduzido por punção periférica – em geral as veias da fossa antecubital – que progride seguindo trajeto venoso até atingir a porção média da veia cava superior, o que lhe confere característica de cateter central. Sendo assim, é indicação para uso de cateter central de inserção periférica:
- Infusão de drogas neoplásicas e administração de drogas que não apresentem extremos de pH.
 - Prematuro extremo com peso inferior a 1.000g e pacientes em atendimento domiciliar (home care).
 - Pacientes com restrições hídricas, que necessitam de acesso contínuo e infusão de drogas antineoplásicas.
 - Necessidade de terapia intravenosa superior a 7 dias desde que não sejam neoplásicas.
-
7. O cateter central de inserção periférica (CCIP) tem suas capacidades e limitações, portanto só deve ser manuseado por alguém que tenha recebido treinamento em seu cuidado e manutenção. O CCIP requer treinamento especial para sua inserção e manutenção, e recomendando que qualquer profissional clínico (enfermeiro ou médico) deva receber treinamento específico. O sucesso da terapia intravenosa através do CCIP depende, além da observação, os cuidados essenciais na manutenção do cateter. No que se refere ao uso do CCIP, a coleta/administração de sangue, hemoderivados e hemocomponentes é segura através de cateteres desde que:
- Em cateteres de poliuretano: acima de 4.0 Fr.
 - Em cateteres de silicone com ponta distal aberta: acima de 3.0 Fr.
 - Em cateteres de poliuretano: acima de 5.0 Fr.
 - Em cateteres de silicone com ponta distal aberta: acima de 4.0 Fr.
-
8. Os sistemas de urgência devem ser implementados em torno de cinco eixos. I. Adoção de uma estratégia de “promoção da qualidade de vida e saúde” para combater as causas de urgência; II. Organização de redes regionais de atenção integral às urgências, como elos da cadeia de manutenção da vida, da atenção básica à unidade hospitalar; III. Operacionalidade do complexo de regulação do SUS (como “central de leitos, Central de Regulação Médica de Atenção às Urgências”); IV. Qualificação e educação permanente dos profissionais de saúde de todos os níveis de atenção (promoção, atenção básica, assistência pré-hospitalar e assistência hospitalar) e V. Estratégias de atenção orientadas segundo princípios de humanização. No Brasil, as diretrizes e princípios norteadores do Atendimento Pré Hospitalar (APH) estão assentadas na alternativa:
- Portaria GM/MS n.3.089, de 8 de setembro de 2001.
 - Portaria GM/MS n.2.048, de 5 de novembro de 2002.
 - Portaria GM/MS n. 1.075, de 13 de outubro de 2002.
 - Portaria GM/MS n. 2.508, de 17 de novembro de 2001.
-
9. As puérperas atravessam três fases distintas de ajustes no período do pós-parto, que são:
- Assimilação, manutenção e liberação.
 - Convenção, liberação e manutenção.
 - Assimilação, sensação de bem-estar e independência.
 - Adaptação, manutenção, assimilação.
-
10. A Organização Mundial de Saúde (OMS) conceituou a assistência domiciliar como a provisão de serviços de saúde prestada em domicílio por agentes formais e informais com o objetivo de promover, restaurar e manter o conforto, função e saúde de pessoas num nível máximo, incluindo cuidados para uma morte digna e a classificou em serviços:
- Preventivos, terapêuticos, reabilitadores e cuidados paliativos apenas.
 - Terapêuticos, reabilitadores, acompanhamento por longo prazo, sem cuidados paliativos.
 - Preventivos, terapêuticos, reabilitadores, acompanhamento por longo prazo e cuidados paliativos.
 - Terapêuticos, reabilitadores, acompanhamento por longo prazo, sem cuidados paliativos.
-
11. A Resolução do COFEN 168/1993 baixa normas sobre:
- Registro do título de especialista que é concedido aos Enfermeiros quando titulado por cursos legalmente constituídos na área de especialidade, que atenda as exigências do MEC/CFE.
 - O Enfermeiro que deixar de responder pela Chefia do Serviço de Enfermagem obrigatoriamente comunicará de imediato ao COREN para o cancelamento da mesma.
 - Estabelece parâmetros para Dimensionamento do Quadro de Profissionais de Enfermagem nas instituições de Saúde.
 - Dispõe sobre a administração de nutrição parenteral e enteral.
-
12. Em 1985, com a criação do Centro de Vigilância Epidemiológica para coordenar o Sistema de Vigilância Epidemiológica, anteriormente alocado no Centro de Informação de Saúde – CIS, a coordenação técnica do Programa Estadual de Imunização ficou sob a responsabilidade da Divisão de Imunização estendendo-se até os dias atuais (decreto 24.565 de 27-12-1985). Os aspectos técnico-científicos das imunizações no estado de São Paulo têm o apoio relevante da Comissão Permanente de Assessoramento em Imunizações – CPAI, criada em 1987, consolidada no âmbito da Secretaria de Saúde pela Resolução SS-56 de 23-05-2006. A CPAI tem como atribuições:
- Deliberar sobre assuntos pertinentes à utilização de imunobiológicos; assessorar na formulação de estratégias e na coordenação das ações e atividades envolvendo imunizações.
 - Avaliar o Programa de Imunizações – doses aplicadas; Estocar e distribuir Imunobiológicos; cuidar dos prontuários dos centros de referência de Imunobiológicos especiais.
 - Cuidar dos prontuários dos centros de referência de Imunobiológicos especiais; avaliar imunobiológicos utilizados; avaliar o Programa de Imunizações.
 - Avaliar supervisão de salas de vacinas; assessorar na formulação de estratégias e na coordenação das ações e atividades envolvendo imunizações.
-
13. No alojamento conjunto, podemos ter como clientes os recém-nascidos que tenham, além de boa vitalidade, apgar maior do que:
- Oito no quinto minuto.
 - Sete no quinto minuto.
 - Seis no quinto minuto.
 - Cinco no quinto minuto.

- 14.** O Pacto pela Redução da Mortalidade Infantil é um compromisso do governo federal para acelerar a redução das desigualdades no Nordeste e na Amazônia Legal. A proposta era de reduzir a mortalidade infantil (crianças menores de um ano de idade), especialmente o componente neonatal (até 27 dias de nascido), nos anos de 2009 e 2010. Com o pacto, a Amazônia Legal e o Nordeste devem receber: equipes da Saúde da Família, Núcleos de Apoio à Saúde da Família, leitos de UTI, leitos de UCI, bancos de leite, Hospitais Amigo da Criança, Maternidades com equipes capacitadas para Método Canguru e equipes de Saúde da Família capacitadas. Com isso esperava-se, no mínimo, diminuir:
- 3% ao ano a mortalidade infantil.
 - 4% ao ano a mortalidade infantil.
 - 5% ao ano a mortalidade infantil.
 - 6% ao ano a mortalidade infantil.
-
- 15.** É sabido que a Assistência de Enfermagem à saúde da Criança requer propriedades características e particularidades em sua atividade diária. Dentre elas, a aplicação de Brinquedo Terapêutico, que é uma técnica baseada nos princípios da ludoterapia, adaptado para aliviar ou diminuir a ansiedade na criança, que esteja ou não hospitalizada, gerada por experiências atípicas para sua idade e que podem ser ameaçadoras, requerendo mais do que o brinquedo recreativo. A utilização do Brinquedo Terapêutico é corretamente regulamentada:
- Pela Resolução do COREN, n° 375/2003.
 - Pela Resolução do COFEN, n° 476/2004.
 - Pela Resolução do COFEN, n° 295/2004.
 - Pela Resolução do COREN, n° 476/2003.
-
- 16.** O programa de controle de tuberculose é uma das divisões que compõe o Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado de Saúde do Estado de São Paulo, funcionando como tal desde 1975. É responsável pela coordenação das atividades de controle da tuberculose no estado tais como: monitoramento e avaliação dos indicadores epidemiológicos e operacionais gerados por um sistema de notificação e acompanhamento de casos (EPI-TB), previsão de medicamentos e outros insumos, treinamentos e assessoria aos municípios. O programa atua junto aos municípios que são responsáveis, pela assistência ao paciente, distribuição de medicamentos, descoberta de casos, garantia do tratamento supervisionado, relação direta com população e as organizações da sociedade civil, além das ações de vigilância epidemiológica. Um dos testes auxiliares no diagnóstico da tuberculose é o PPD:
- Também conhecido como teste de *Bovis*, no qual se injeta 0,1mℓ de Rt23, via ID, e os resultados podem ser lidos entre 36 a 72h.
 - Também conhecido como teste Tuberculínico, no qual se injeta 0,1mℓ de Rt23, via SC, e os resultados podem ser lidos idealmente em 72h.
 - Também conhecido como Teste de Mantoux, no qual se injeta 0,1mℓ de Rt23, via ID, e os resultados podem ser lidos idealmente em 72h.
 - Também conhecido como teste Tuberculínico, no qual se injeta 0,1mℓ de Rt23, via ID e os resultados podem ser lidos idealmente em 96h.
-
- 17.** Sobre a vacina contra a rubéola, é correto afirmar:
- É de uso IM ou SC, não deve ser tomada durante a gestação e é contraindicado às pessoas alérgicas à proteína de ovo.
 - É de uso SC, não imuniza pessoas que tiveram contato com pacientes com rubéola alguns dias antes da vacinação e S/N utilizar acetaminofeno.
 - É de uso SC, não deve ser tomado durante gestação e não deve ser utilizado acetaminofeno após administração da vacina.
 - É de uso IM, não deve ser tomado durante a gestação e é contraindicado às pessoas alérgicas à proteína de ovo.
-
- 18.** No plano de cuidados, existem dois objetivos profissionais: administrativos e clínicos. Do primeiro destaca-se definir o foco do cuidado de Enfermagem para o cliente ou o grupo. Dos objetivos clínicos, faz parte proporcionar critérios de resultados e metas de Enfermagem para a revisão e a avaliação do cuidado. O cliente com problemas ortopédicos pode desenvolver lesões em virtude da mobilidade física prejudicada. Assinale a alternativa correta do diagnóstico de enfermagem com os respectivos fatores relacionados, de acordo com Carpenito (2005):
- Mobilidade física prejudicada – posicionamento impróprio.
 - Dor – local para invasão dos organismos secundários a trauma, cirurgia ou enxerto.
 - Integridade da pele prejudicada – trauma tecidual e espasmos musculares secundários a cirurgias.
 - Mobilidade física prejudicada – fragilidade muscular ou diminuição da agilidade motora (idoso).
-
- 19.** A terapia nutricional parenteral total (NPT) é adotada quando o paciente se encontra impossibilitado de receber a NE por apresentar distúrbios fisiológicos ou anatômicos em seu trato gastrointestinal. O cuidado de enfermagem na administração da solução é:
- Controle de glicemia capilar periódica.
 - Aumentar o gotejamento da infusão para compensar os volumes que não foram infundidos.
 - Pesar o paciente antes e após a infusão da dieta.
 - Trocar o equipa na dieta a cada 48-72 horas para reduzir o índice de infecção.
-
- 20.** Considerada um problema de saúde pública mundial, a úlcera por compressão é uma iatrogenia multifatorial de difícil controle, com elevada incidência e prevalência, que acomete pacientes nos diversos cenários do cuidado. A enfermagem, em sua prática assistencial, tem contato direto com o corpo do paciente hospitalizado, sendo o Enfermeiro o profissional responsável em dedicar cuidados que venham trazer bem-estar físico e conforto à pessoa que passa por um momento de recuperação e tratamento. Este cuidado de Enfermagem tem por aliados várias escalas de avaliação de risco, assinale quais critérios são corretos na escolha de uma delas:
- Condição física, condição mental, nível de atividade, mobilidade no leito e percepção sensorial.
 - Adequação à assistência da unidade, confiabilidade interobservadores, alta sensibilidade, alta especificidade e pesquisa em diversos grupos étnicos.
 - Adequação à percepção sensorial, umidade, mobilidade, condição física, condição mental.
 - Mobilidade, adequação à percepção sensorial, alta especificidade, condição mental e pesquisa em diversos grupos étnicos.

- 21.** Um cateter de Swan-Ganz é um cateter de fluxo dirigido por um balão situado em sua porção terminal, que possibilita a medida simultânea das pressões intracardiacas – átrio e ventrículo direito, artéria pulmonar. Trata-se de um cateter que normalmente pode se apresentar com quatro vias: distal, proximal, do sensor de temperatura e a via para inflar e esvaziar o balonete. Assinale as corretas complicações do uso deste cateter:
- Hipovolemia, embolia pulmonar, septicemia, insuficiência vascular.
 - Infarto pulmonar, perfuração do ventrículo direito, peritonite ruptura do septo intraventricular.
 - Infarto pulmonar, ruptura da artéria pulmonar, infecções, lesão da valva tricúspide.
 - Enfermidade da valva cardíaca, embolia pulmonar, infecções, pancreatite aguda.
-
- 22.** A infecção hospitalar é a infecção adquirida após admissão do cliente na unidade hospitalar. Ela se manifesta durante a internação ou após a alta e esta sempre relacionada à internação ou a procedimentos hospitalares. Atualmente é um problema de saúde pública. O controle das infecções hospitalares é feito através da Vigilância Epidemiológica, controle e notificação de infecção, controle de emprego dos antimicrobianos entre outros. Para a Vigilância Epidemiológica são indicados três métodos de infecções Hospitalares, assinale a alternativa correta:
- Prospectivo, retrospectivo e de prevalência.
 - Prospectivo, incidência e investigativo.
 - Incidência, prevalência e investigativo.
 - Prevalência, investigativo e retrospectivo.
-
- 23.** A Febre Amarela é uma doença infecciosa aguda, febril, de natureza viral, curta duração, gravidade variável, causada por vírus e transmitida por mosquitos-fêmea infectados. Manifesta-se por insuficiência hepática e renal, podendo causar óbito. A transmissão da febre amarela é feita por um mosquito que exibe marcas prateadas no fundo negro das patas, no abdome e nos plaplos. Quanto ao quadro clínico, quais são os sintomas corretos de uma pessoa com febre amarela?
- Diarreia, náuseas, vômitos e hemorragia.
 - Hemorragia, febre, náusea e vômitos.
 - Dor nas articulações, calafrios, febre e vômitos.
 - Prostração, náuseas, vômitos e febre.
-
- 24.** O Estado deve tomar medidas apropriadas para a saúde e bem estar social. A saúde é assunto de política nacional e internacional, sendo pré-requisito para obtenção de paz e da segurança. De acordo com o Artigo Primeiro da Organização Mundial da Saúde, “o objetivo da organização será a consecução por parte de todos os povos mais elevada nível de saúde”. A Declaração dos Direitos da Criança (Organização das Nações Unidas, 20/11/1959) afirma, corretamente no seu Princípio 4º:
- A criança deve beneficiar-se da seguridade social, desde que não possa crescer de modo sadio.
 - A criança tem direito à alimentação, moradia, lazer e assistência adequada.
 - São garantidos a ela e somente ela, assistência médica e ajuda social adequadas.
 - A criança deve poder crescer e se desenvolver de modo que lhe seja assegurada moradia e lazer.
-
- 25.** Basicamente as vias de administração de fármacos no organismo são: oral, sublingual, intramuscular, subcutânea e intradérmica. O sucesso da terapêutica das doenças humanas depende, em grande parte, da capacidade do médico em escolher o medicamento apropriado para cada caso, bem como sua dose, a via a ser administrada e o tempo de duração do tratamento com o fármaco de escolha. O profissional de Enfermagem assume a administração de medicamentos como sendo uma de suas atividades no dia a dia de suas práticas de cuidar. Nesse sentido, para que possa prestar seus cuidados livre dos riscos de iatrogenias, cabe a ele estar atento a alguns fatores intervenientes e no efeito farmacológico no organismo. Dentre os fatores que podem interferir na ação do fármaco está correto afirmar que são de maior relevância:
- Dose do fármaco, variação individual, via de administração, condições patológicas e tolerância e intolerância do organismo ao fármaco.
 - Biodisponibilidade, bioequivalência, modo de excreção, condições patológicas, idiosincrasia.
 - Efeito colateral, bioequivalência, modo de excreção, idiosincrasia, dose do fármaco.
 - Dose do fármaco, modo de excreção, variação individual, metabolização, condições patológicas.
-
- 26.** Quanto à tipologia dos indicadores de qualidade é correto afirmar que:
- Avaliação estrutural é também designada como avaliação de desempenho e se refere à avaliação de ações e decisões de profissionais de saúde e usuários.
 - Avaliação processual ou de desempenho monitora indicadores de eficiência e eficácia em termos de limite máximo e mínimo aceitáveis da zona de normalidade.
 - Avaliação estrutural refere-se às características dos recursos requeridos de um dado serviço de saúde, como profissionais, sistemas e organizações.
 - Avaliação de resultado pode monitorar indicadores de eficiência apenas, em termos de limites máximos e mínimos aceitáveis.
-
- 27.** O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) e os seus respectivos Conselhos Regionais (CORENS) foram criados em 12 de julho de 1973, por meio da Lei 5.905. Juntos, eles formam o Sistema COFEN/CORENS. Estão subordinados ao Conselho Federal todos os 27 conselhos regionais localizados em cada estado brasileiro. Quais são as principais atividades do COFEN? Assinale a alternativa correta:
- Normatizar e expedir instruções para uniformidade de procedimentos e bom funcionamento dos Conselhos Regionais; apreciar em grau de recurso as decisões dos CORENS; exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pela Lei 5.905/73.
 - Aprovar anualmente as contas e a proposta orçamentária da autarquia, remetendo-as aos órgãos competentes; disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, observadas as diretrizes gerais do COFEN.
 - Expedir a carteira de identidade profissional, indispensável ao exercício da profissão e válida em todo o território nacional; fiscalizar o exercício profissional e decidir os assuntos atinentes à Ética Profissional, impondo as penalidades cabíveis.
 - Apreciar em grau de recurso as decisões dos CORENS; aprovar anualmente as contas e a proposta orçamentária da autarquia, remetendo-as aos órgãos competentes e promover estudos e campanhas para aperfeiçoamento profissional.

28. O controle da ventilação é feito pelo centro respiratório, localizado no bulbo. O centro respiratório não possui um marca-passo simples, como o presente no músculo cardíaco. A função primordial do sistema respiratório é a de garantir as trocas gasosas. Durante o sono o centro respiratório é comandado exclusivamente pelos quimiorreceptores. Eles são responsáveis por monitorar:

- Taxa arterial de oxigênio e pH.
- pH e taxa de gás carbônico.
- Taxa arterial de oxigênio e gás carbônico.
- Taxa de pH apenas.

29. Os principais conceitos-chave, segundo a Classificação Internacional para a Segurança do paciente (ICPS), da Organização Mundial da Saúde estão descritos no documento *The conceptual framework for the international classification for patients safety – version 1.1 – Final technical report*. No ICPS conceitos e termos foram extraídos depois de muitos refinamentos de outros já publicados e utilizados em diferentes países e agrupados, atualmente em 10 classes (grupos ou categorias). Assinale a alternativa que corresponde corretamente a algumas das classes da ICPS:

- Resultado do paciente, fatores contribuintes/perigos, fatores mitigantes.
- Adaptação estrutural do paciente, detecção, gerenciamento compativo.
- Resultados organizacionais, detecção e cooperação técnica.
- Distinção e ordenação, detecção e cooperação técnica.

30. Os transtornos de personalidade têm como característica:

- Comportamento antissocial denominado “borderline” ou “limítrofe”. Não apresenta sentimento de culpa ou remorso. Pode ser observado em usuários de drogas.
- Alteração do comportamento apresenta desorientação no tempo e espaço e sobre se mesmo.
- Apresenta desorientação no tempo e espaço, está sempre choroso e depressão do sistema nervoso central.
- Alteração do comportamento, letargia, alucinação, sudorese e depressão do sistema nervoso central.

Analise um fragmento da entrevista do Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ao jornalista Otávio Cabral:

(...)

Pesquisas mostram que o brasileiro considera a saúde o pior serviço prestado pelo governo. O que está sendo feito para mudar essa percepção? Nosso maior desafio é melhorar o atendimento à população. O SUS precisa ter obsessão pela qualidade. O Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que resolveu ter um sistema nacional público e gratuito. A Índia, a China, o Paquistão, a Indonésia e os Estados Unidos não fizeram isso. O sistema brasileiro tem 1 milhão de internações por mês, mais de 3,5 bilhões de procedimentos ambulatoriais. Mas essa dimensão não pode impedir que o SUS se preocupe com a qualidade.

Sim, mas como melhorar o atendimento?

Há duas linhas principais: a melhoria dos gastos e o combate aos desvios de recursos. Já começamos a criar políticas de incentivo financeiro pela qualidade. As equipes de saúde que prestarem um serviço melhor à população poderão ter o repasse de recursos federais dobrados. Já lançamos esse programa nos postos de saúde dos bairros. As equipes são cadastradas, acompanhadas por um painel de indicadores de qualidade e pesquisas de avaliação do usuário. Quem

reduzir o tempo de espera e melhorar a qualidade do atendimento vai receber mais.

(...)

Fonte: *Revista Veja*, 16/11/2011, adaptado.

31. Na primeira pergunta, o Ministro:

- Apoia o brasileiro que considera a saúde o pior serviço prestado pelo governo.
- Utiliza argumento para explicar o descontentamento dos brasileiros, mas fala da importância da preocupação com a qualidade.
- Compara o sistema de saúde do Brasil com o dos outros países, tratando da similaridade dos sistemas.
- Critica a visão do brasileiro.

32. Sobre a segunda pergunta, assinale a alternativa correta:

- De acordo com o Ministro, o mau atendimento se deve ao investimento em áreas da saúde que não são importantes.
- Políticas de incentivo financeiro não fazem parte da conduta deste ministério.
- O desvio de recursos é um problema que atenta contra o devido atendimento.
- Não fará diferença no repasse dos recursos federais a avaliação do usuário.

33. Assinale a alternativa em que há separação silábica incorreta:

- Trans-a-tlân-ti-co.
- Boi-a-da.
- Tec-no-lo-gi-a.
- E-pis-co-pa-do.

34. Complete as lacunas, de acordo com a norma culta, e aponte a alternativa correta:

No jantar reunindo os parlamentares, a _____ agiu com tamanha perspicácia.

- Malicioza – condesa.
- Maliciosa – condessa.
- Malicioza – condessa.
- Maliciosa – condesa.

35. Em relação à concordância nominal, analise as sentenças abaixo:

- A viagem foi sensacional, pois nadamos em rios e lagoas calmos e fizemos caminhadas na mata.**
- Elas próprias resolveram as equações matemáticas.**
- Precisamos correr para o refeitório, pois já é meio-dia e meio.**
- Durante a excursão, conheci pessoas o mais interessantes possível.**

- Apenas II e IV estão corretas.
- Apenas I, III e IV estão corretas.
- Apenas I, II e IV estão corretas.
- Apenas II e III estão corretas.

36. Acerca da concordância verbal, assinale a alternativa incorreta:

- Uma manada de elefantes correu em direção aos tigres.
- Ribeirão Pires qualifica, cada vez mais, os professores da rede municipal de ensino.
- A maior parte dos hóspedes daquele hotel é estrangeira.
- Vossa Excelência queres uma ajuda para carregar as malas?

37. Analise, acerca da regência dos termos, as afirmativas abaixo:

- I. **Agradeci-lhes, com os olhos marejados, a surpresa.**
 - II. **Como é exagerada, nós aspiramos todas as manhãs ao perfume dela.**
- a) Apenas I está correta.
 - b) Apenas II está correta.
 - c) I e II estão corretas.
 - d) I e II estão incorretas.

38. Indique a lacuna que completa, de acordo com a devida regência, as lacunas abaixo:

Eu sou residente ___ rua das Laranjeiras.

É preferível comer vegetais e legumes ___ frituras.

- a) À – a.
- b) Na – à.
- c) Na – a.
- d) À – do que.

39. Analise as sentenças abaixo:

I. **Nada me preocupa tanto quanto a sua felicidade.**

II. **Quero-lhe muito bem!**

- a) Apenas em I o pronome foi empregado corretamente.
- b) Apenas em II o pronome foi empregado corretamente.
- c) Em I e em II os pronomes foram empregados corretamente.
- d) Em I e em II os pronomes foram empregados incorretamente.

40. Há termo empregado incorretamente em:

- a) Por que você não para de falar nesse assunto?
- b) Quero saber o porquê dessa discussão.
- c) Aonde você vai?
- d) Apesar de terem ganhado o jogo, os argentinos jogaram mau.

41. Assinale a alternativa que exprime a mesma ideia da frase abaixo:

A sua aparição na festa de inauguração da revista era indubitável.

- a) Havia dúvidas se apareceria na festa.
- b) Foi indescritível a sua aparição na festa.
- c) Seria imperdoável se não comparecesse à festa.
- d) Era evidente que compareceria à festa.

42. A Cúpula América do Sul e Países Árabes, realizada em Brasília em 2005, promove um novo momento nas relações diplomáticas entre as nações participantes. Sobre os interesses geopolíticos de algumas dessas nações, marque V (verdadeiro) ou F (falso), respectivamente, nas afirmações abaixo e aponte a alternativa correta:

(...) A Colômbia luta contra guerrilhas terroristas, narcotráfico e grupos paramilitares, sendo aliada dos Estados Unidos.

(...) A Líbia busca transformar a imagem negativa de pátria do terrorismo.

(...) A Síria é aliada dos Estados Unidos no Oriente Médio e tornou-se a principal mediadora do conflito Israel-Palestina.

(...) A Arábia Saudita busca equilibrar seus preços internacionalmente. Como aliado dos norte-americanos, media os conflitos entre os países árabes e os EUA.

- a) F, V, V, V.
- b) V, V, F, F.
- c) V, V, F, V.
- d) F, F, V, V.

43. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o continente europeu precisou de auxílio para a sua reestruturação econômica. Desta forma os Estados Unidos da América criaram um projeto de reconstrução para os países europeus, conhecido como:

- a) COMECON.
- b) APEC.
- c) Plano Marshall.
- d) Tratado de Versalhes.

44. Em uma P.G. crescente, a soma do 2º termo com o 3º termo é 60 e a soma do 4º com o 5º termo é 540, então a razão é:

- a) 2.
- b) 3.
- c) 5.
- d) 8.

45. Dividiu-se um número sucessivamente por 3 e 5 e a soma dos dois quocientes é igual a 48. Sabendo-se que as divisões foram exatas, qual é esse número?

- a) 105.
- b) 60.
- c) 75.
- d) 90.

46. Comprei uma casa por R\$ 72.500,00. Algum tempo depois a vendi por R\$ 82.650,00. Qual foi a porcentagem do meu lucro?

- a) 16%.
- b) 1,8%.
- c) 14%.
- d) 2,1%.

47. O quadrado da idade de Malu é igual ao quádruplo da sua idade mais 21 unidades. Qual é a idade de Malu?

- a) 12.
- b) 14.
- c) 7.
- d) 8.

48. Qual a taxa mensal que foi aplicada à R\$ 5.450,00 por 8 meses, sendo que rendeu R\$ 654,00 de juros?

- a) 0,0018%.
- b) 0,025%.
- c) 0,12%.
- d) 1,5%.

49. Um avô deixa em testamento R\$ 100.000,00 que deve ser dividido em partes proporcionais às idades de seus 2 únicos netos. Sabendo que seus netos Lucas e Jonas têm respectivamente 21 anos e 29 anos, qual a diferença entre as duas quantias recebidas?

- a) R\$ 22.000,00.
- b) R\$ 15.000,00.
- c) R\$ 16.000,00.
- d) R\$ 8.000,00.

50. Se 3 pedreiros constroem um muro de 45 m de extensão em 6 dias, em quantos dias 10 pedreiros construirão um muro de 500 m de extensão e de mesma altura que o outro, trabalhando no mesmo ritmo?

- a) 20.
- b) 6.
- c) 18.
- d) 12.