

PORTUGUÊS

QUESTÃO 01

Observe o poema:

Cidade grande

Que beleza, Montes Claros.
 Como cresceu Montes Claros.
 Que indústria em Montes Claros.
 Montes Claros cresce tanto,
 ficou urbe tão notória,
 prima-rica do Rio de Janeiro,
 que já tem cinco favelas
 por enquanto, e mais promete.

Carlos Drummond de Andrade

Assinale a opção em que a palavra destacada do texto, não está analisada corretamente quanto à classe gramatical:

- A) Ficou **urbe** tão notória – substantivo;
- B) **Que** já tem cinco favelas – pronome relativo;
- C) Por enquanto, **e** mais promete – conjunção;
- D) **Que** beleza, Montes Claros – pronome indefinido;
- E) Ficou urbe tão **notória** – adjetivo.

QUESTÃO 02

Leia a tirinha de Laerte e considere as proposições abaixo:



- I. O verbo pôr aparece no primeiro quadrinho conjugado no presente do indicativo;
- II. O verbo esperar no segundo quadrinho está conjugado no presente do subjuntivo;
- III. A vírgula usada no último quadrinho serve para isolar o vocativo na oração;
- IV. A palavra EUREKA funciona no texto como uma interjeição.

São verdadeiras as afirmações:

- A) I e IV;
- B) I, II e III;
- C) I, III e IV;
- D) II, III e IV;
- E) Todas.

QUESTÃO 03

Marque a opção em que há desvio da norma padrão:

- A) Vossa Excelência chegou. Traga-lhe os documentos para que ele os assine;
- B) Sou eu quem pede para que nós sejamos unidos;
- C) Prefiro uma vida de sacrifício a uma morte gloriosa;
- D) Informaram aos associados o saldo da conta;
- E) Inscreva-se e participe do Concurso de Redação do Senado.

QUESTÃO 04

Marque a opção em que há erro de ortografia:

- A) Calabouço, sucessão, excessão e explícito;
- B) Pechincha, enxovalhar, gueixa e lambujem;
- C) Caçula, ascensão, assessoria, mexilhão e mexido;
- D) Hindu, beneficência, cercear e êxito;
- E) Frouxo, excêntrico, quis (querer), concessão e impigem (verbo).

QUESTÃO 05

Observe algumas informações a respeito da Redação Oficial:

- I. (____) serve para solicitar autoridade pública algo que, ao menos supostamente, tenha amparo legal;
- II. (____) serve para informar a ocorrência de um fato ou a existência de uma situação, é fornecido somente se alguém pedir;
- III. (____) é usado para comunicação entre órgãos ou departamentos. Também é chamado de Correspondência Interna (CI);
- IV. (____) é uma correspondência oficial e externa, enviada normalmente a funcionários ou autoridades públicas, sendo o tipo mais comum de correspondência oficial expedido por órgãos públicos, em objeto de serviço. Deve conter um único assunto, a numeração recomeça a cada ano.

Marque a opção que completa, respectivamente os espaços em branco:

- A) Ofício, certidão, memorando e requerimento;
- B) Requerimento, certidão, ofício e memorando;
- C) Certidão, atestado, memorando e ofício;
- D) Requerimento, certidão, memorando e ofício;
- E) Requerimento, atestado, ata e ofício.

RACIOCÍNIO LÓGICO**QUESTÃO 06**

Para abrir o portão de sua casa seu Marcos precisa digitar uma senha com quatro algarismos distintos e duas vogais. O número de senhas diferentes que ele pode criar é:

- A) 1800
- B) 2250
- C) 2500
- D) 2750
- E) 3550

QUESTÃO 07

Um retângulo ABCD está no plano cartesiano. AC é a diagonal do retângulo, A (-2,1) e B(3,-2). Podemos afirmar:

- A) As coordenadas de B e D são (-2,3) e A (1,-2);
- B) O perímetro de ABCD é 8 unidades de comprimento;
- C) A área de ABCD é 15 unidades de área;
- D) A medida de AC é 7 unidades de comprimento;
- E) $AB + AD = 10$ unidades de comprimento.

QUESTÃO 08

Dona Maria deseja fazer um plano de saúde. Ela deve escolher entre dois planos:

Plano A: R\$ 60,00 por mês durante um ano, após esse período a mensalidade terá um acréscimo de R\$ 6,00.

Plano B: R\$ 40,00 no primeiro mês e um acréscimo de R\$ 2,00 a cada mensalidade.

No período de dois anos ela chegou a seguinte conclusão sobre os dois planos:

- A) Pagará o mesmo valor nos planos A e B;
- B) A diferença entre os dois é de R\$ 20,00;
- C) A diferença entre os dois é de R\$ 24,00;
- D) Pagará mais de R\$ 3.000,00 se escolher o plano A;
- E) Pagará mais de R\$ 2.500,00 se escolher o plano B.

QUESTÃO 09

Uma cesta possui 8 frutas em que 3 três estragadas. Se retirarmos 2 frutas dessa cesta a probabilidade delas não estarem estragadas é:

- A) $5/28$;
- B) $23/28$;
- C) $5/23$;
- D) $18/23$;
- E) $3/8$.

QUESTÃO 10

Em um clube dos 80 frequentadores, 50 praticam natação, 35 praticam vôlei, 20 praticam natação e vôlei. É correto dizer que:

- A) 20 frequentadores não praticam nenhum esporte;
- B) 30 frequentadores praticam somente vôlei;
- C) 20 frequentadores praticam somente natação;
- D) 45 frequentadores praticam apenas um esporte;
- E) 60 frequentadores praticam pelo menos um esporte.

ATUALIDADES**QUESTÃO 11**

Sobre o julgamento do esquema de corrupção e de desvio de dinheiro público ocorrido no Brasil, conhecido como "Mensalão", assinale a alternativa correta:

- A) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como "processo do mensalão" será realizado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no mês de novembro de 2012;
- B) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como "processo do mensalão" teve início no mês de julho de 2012 e será realizado pelo Supremo Tribunal Federal – STF;
- C) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como "processo do mensalão" teve início no mês de agosto de 2012, no Superior Tribunal de Justiça – STJ;
- D) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como "processo do mensalão" será realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral – TSE, no mês de outubro de 2012;
- E) O julgamento da Ação Penal (AP) 470, mais conhecida como "processo do mensalão" teve início no mês de agosto de 2012, no Supremo Tribunal Federal – STF.

QUESTÃO 12

A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, no ano de 2012, foi realizada no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Acerca da referida Conferência, assinale a alternativa incorreta:

- A) A Conferência ficou conhecida como Rio+20 porque marcou os vinte anos de realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92) e contribuiu para definir a agenda do desenvolvimento sustentável para as próximas décadas;
- B) A proposta brasileira de sediar a Rio+20 foi aprovada pela Assembleia-Geral das Nações Unidas;
- C) A Rio+20 teve como temas principais: a economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza; e a estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável;
- D) A Conferência aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, no mês de abril de 2012, contando com a participação de Chefes de Estado, de Governo e de representantes de mais de 150 países;
- E) O objetivo da Rio+20 foi a renovação do compromisso político com o desenvolvimento sustentável, por meio da avaliação do progresso e das lacunas na implementação das decisões adotadas pelas principais cúpulas sobre o assunto e do tratamento de temas novos e emergentes.

QUESTÃO 13

Este ano, a partir de meados de julho, as atenções se voltaram para os Jogos Olímpicos de 2012, sediados em Londres. Evento mundialmente importante, que influencia no cenário político-econômico local e mundial. O Secretário-Geral da ONU participou da corrida da tocha para os Jogos Olímpicos de Verão de 2012. A convite do Comitê Olímpico Organizador de Londres e do Comitê Olímpico Internacional (COI), ele transportou a tocha olímpica no percurso final da sua jornada no Reino Unido e participou, também, da cerimônia de abertura dos Jogos. Assinale a alternativa que indica corretamente o nome do atual Secretário Geral da ONU:

- A) David Cameron;
- B) Ban Ki-moon;
- C) Barack Obama;
- D) Kofi Annan;
- E) Al Gore.

QUESTÃO 14

Recentemente o governo de Bashar al-Assad, na Síria, declarou vitória após uma feroz batalha pela capital, com ataques de forças militares a rebeldes que controlam grande parte do maior centro urbano do país. Indique a alternativa que contém corretamente o nome da Capital e do maior centro urbano da Síria, respectivamente.

- A) Damasco e Aleppo;
- B) Sirte e Damasco;
- C) Turquia e Aleppo;
- D) Latakia e Turquia;
- E) Jordânia e Argélia.

QUESTÃO 15

Algumas empresas de telefonia móvel foram proibidas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) de comercializar linhas de celular e internet em função da má qualidade dos serviços prestados. Depois que a Anatel aprovar o plano de ação apresentado das empresas, com medidas capazes de garantir a qualidade do serviço, as vendas poderão ser retomadas. Indique corretamente o nome do atual Ministro das Comunicações:

- A) José Eduardo Cardoso;
- B) Marco Antonio Raupp;
- C) Celso Amorim;
- D) Mendes Ribeiro;
- E) Paulo Bernardo Silva.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 16**

A sepse ou sépsis é uma síndrome que acomete os pacientes com infecções severas. Assinale a alternativa incorreta no que se refere às manifestações da sepse:

- A) Temperatura acima de 38°C ou abaixo de 36°C;
- B) Vômitos incoercíveis;
- C) Frequência Cardíaca acima de 90 batimentos por minuto;
- D) Frequência respiratória acima de 20 por minuto ou PaCO₂ abaixo de 32 mmHg;
- E) Leucócitos maior que 12.000 ou abaixo de 4.000.

QUESTÃO 17

A cicatrização das feridas é tema de fundamental importância para o cirurgião. São fases do processo de cicatrização de feridas, EXCETO:

- A) Hemostasia;
- B) Inflamação;
- C) Migração celular e proliferação;
- D) Síntese proteica, contração da ferida e remodelagem;
- E) Angiogênese retardada.

QUESTÃO 18

São características de um antisséptico ideal, EXCETO:

- A) Ação bactericida e bacteriostática;
- B) Persistência da ação durante várias horas;
- C) Persistência de ação curta para não provocar queimaduras;
- D) Ausência de causticidade e baixo índice de reações de hipersensibilidade;
- E) Baixo custo.

QUESTÃO 19

Assinale V para verdadeiro e F para falso em relação à Trombose venosa profunda (TVP) :

- I. Acomete mais pacientes submetidos à cirurgia por câncer ginecológico;
- II. É frequente em portadores de policitemia;
- III. Não acomete pacientes acima de 40 anos.

Assinale a sequencia correta de cima para baixo:

- A) V, V, V;
- B) V, V, F;
- C) F, F, V;
- D) V, F, V;
- E) F, F, F.

QUESTÃO 20

O pneumotórax hipertensivo desenvolve-se quando o ar proveniente do(s) pulmão(ões) ou do meio ambiente (pneumotórax traumático) passa para a cavidade pleural, com a possibilidade de que este possa ser comprimido devido a um mecanismo valvular. Das alternativas abaixo assinale a que não se evidencia no pneumotórax hipertensivo:

- A) Taquipneia;
- B) Bradpnéia;
- C) Colapso completo no pulmão comprometido;
- D) Compressão do pulmão contra lateral;
- E) Obstrução ao fluxo sanguíneo nas grandes veias e vasos pulmonares.

QUESTÃO 21

Em relação aos sinais e sintomas do Trauma Abdominal, assinale a afirmativa FALSA:

- A) Na avaliação do paciente com suspeita de trauma abdominal, todos os esforços concentram-se em se fazer o diagnóstico da presença de lesão abdominal, sendo de menor importância o diagnóstico topográfico específico da lesão;
- B) O quadro clínico mais frequente é a presença de choque hemorrágico sem causa aparente;
- C) Na investigação do paciente com suspeita de trauma abdominal, os sinais no exame físico podem não ser aparentes na admissão;
- D) O abdome deve ser completamente inspecionado nas suas faces anterior e posterior como também as nádegas e a região perineal;
- E) A ausculta do abdome não permite confirmar a presença ou ausência de ruídos hidroaéreos.

QUESTÃO 22

Em relação ao Câncer de esôfago assinale a alternativa FALSA:

- A) A disfagia está sempre presente;
- B) A odinofagia nunca está presente;
- C) Em fases tardias da doença a perda de peso é acentuada;
- D) Alguns pacientes apresentam rouquidão;
- E) A endoscopia é o exame mais acurado para selar o diagnóstico.

QUESTÃO 23

São características da colelitíase, EXCETO:

- A) Incide mais em mulheres acima da quarta década;
- B) Tem relação com obesidade e gestação;
- C) Incide mais em homens acima da quinta década;
- D) Pode evoluir para quadros agudos;
- E) Pode evoluir para câncer após longos anos da doença.

QUESTÃO 24

É de fundamental importância para o diagnóstico de Pancreatite Crônica, investigar:

- A) Ausência de diabetes;
- B) Paciente grande bebedor que começa a referir frequentes dores abdominais;
- C) Dores em epigástrio que se irradiam para o hipocôndrios e dorso;
- D) Elevação de amilase e lipase sérica ou urinária;
- E) Presença da tríade clássica perda de peso, diabetes e esteatorréia.

QUESTÃO 25

Em relação ao tratamento inicial da diverticulite não complicada de sigmóide, assinale a assertiva Correta:

- A) Restrição para alimentos gordurosos;
- B) Antiespasmódicos e antiinflamatórios;
- C) Antibióticos quando existe leucocitose;
- D) Cirurgia apenas, quando existe sinais de perfuração ou formação de abscesso;
- E) Cirurgia realizando-se logo hemicolectomia.

QUESTÃO 26

Video laparoscopia é uma técnica cirúrgica minimamente invasiva realizada por auxílio de uma endocâmera no abdômen. Para criar o espaço necessário as manobras cirúrgicas e adequada visualização das vísceras abdominais a cavidade peritoneal é insuflada com gás carbônico. Esse procedimento pode ter como contra-indicação:

- A) Asma brônquica;
- B) Apendicite aguda;
- C) Obesidade mórbida;
- D) Operação abdominal prévia;
- E) Distúrbio cardiovascular grave.

QUESTÃO 27

Em relação à rotina do abdome agudo, pode-se ter como achado radiológico:

- A) Aerobilia;
- B) Pneumoperitônio;
- C) Alça sentinela;
- D) Gás na parede da vesícula;
- E) Hipermeteorismo.

QUESTÃO 28

Pode inibir os eventos iniciais da cicatrização das feridas o uso de:

- A) Ácido fólico;
- B) Corticosteróides;
- C) Vitamina B12;
- D) Vitaminas A e C;
- E) Zinco e cobre.

QUESTÃO 29

O diagnóstico da hérnia inguinal por deslizamento é realizado quando, no saco herniário, uma víscera intra-abdominal está:

- A) Obstruída;
- B) Na parede;
- C) Necrosada;
- D) Encarcerada;
- E) Estrangulada.

QUESTÃO 30

A obstrução intestinal é uma síndrome em que o conteúdo, tanto do intestino delgado quanto do grosso, não pode progredir até o reto, impossibilitando sua eliminação do organismo. Assinale entre as alternativas abaixo uma possível etiologia da obstrução do intestino delgado:

- A) Válvulas retais;
- B) Prolapsos de reto;
- C) Hérnias de hiato;
- D) As aderências e as hérnias externas;
- E) Abscessos retais.

QUESTÃO 31

Ao examinar um paciente com queixa de dor abdominal, nota-se a presença do sinal de Rovsing. Este sinal sugere:

- A) Diverticulite perforada;
- B) Apendicite aguda;
- C) Colecistite aguda;
- D) Úlcera perforada;
- E) Abscesso hepático piogênico.

QUESTÃO 32

Assinale a afirmativa correta em relação aos direitos do médico conforme o Código de Ética Médica:

- A) Cabe ao médico apontar falhas nos regulamentos e normas das instituições em que trabalha quando as julgar indignas do exercício da profissão ou prejudiciais ao paciente, devendo dirigir-se, nesses casos, aos órgãos competentes e, obrigatoriamente, à Comissão de Ética e ao Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição;
- B) Mesmo quando as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar o paciente, o profissional médico não pode se recusar a exercer sua profissão em instituição pública;
- C) O profissional médico não pode se recusar a realizar atos médicos em hospital público, os quais, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência;
- D) Em sua relação de trabalho, o médico deve dedicar ao paciente o tempo que sua experiência e capacidade profissional recomendarem para o desempenho de sua função, evitando, dessa maneira, que o acúmulo de encargos ou de consultas prejudique o paciente – salvo quando esta sobrecarga tenha sido a agendada e determinada por superior;
- E) O médico deve requerer desagravo público ao Conselho Regional de Medicina quando atingido no exercício de sua profissão, exceto quando isso ocorrer em instituições públicas.

QUESTÃO 33

Com relação ao Código de Ética Médica, especificamente sobre a relação com pacientes e familiares, assinale V para afirmativa verdadeira e F para Falsa:

- I. O médico assistente não pode deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento, mesmo quando a comunicação direta possa provocar nesse paciente algum dano; em todos os casos, a comunicação deve ser feita ao seu responsável legal e, se for empregado, ao seu empregador;
- II. O médico não tem o direito de renunciar ao atendimento, apesar da ocorrência de fatos que, a seu critério, prejudiquem o bom relacionamento com o paciente ou o pleno desempenho profissional; antes, deve comunicar previamente ao paciente ou seu responsável legal, assegurando-se da continuidade dos cuidados e fornecendo-lhe todas as informações necessárias;
- III. O médico não pode abandonar o paciente, ainda que por justa causa comunicada ao paciente ou a seus familiares. No entanto, há exceção: o médico pode abandonar o paciente caso este seja portador de moléstia crônica ou incurável;
- IV. O profissional médico está impedido de desrespeitar o direito do paciente de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente perigo de vida.

Assinale a sequência correta de cima para baixo:

- A) V, V, F, V;
- B) F, F, V, V;
- C) F, F, F, V;
- D) V, V, F, F;
- E) F, F, F, F.

QUESTÃO 34

Paciente sexo feminino, 81 anos, é levada ao hospital às 16 h com queixa de dor abdominal iniciada pela manhã. Ao questionar o sítio da dor, ela aponta com o dedo o quadrante inferior esquerdo do abdômen.

Ao exame: EGR, febril (T=38,4o C), hipocorada e desidratada, pesa 85kg e tem 1,65m de altura.

Quanto ao hábito intestinal, o acompanhante relata que ela sempre foi obstipada, mas que evacuou na véspera sem sangue muco ou pus. Relata ainda que a paciente não almoçou e apresentou dois episódios de vômitos.

De acordo com esse quadro clínico, assinale a alternativa que indica a patologia mais provável:

- A) Tumor de cólon perfurado;
- B) Diverticulite aguda;
- C) Apendicite aguda;
- D) Hemorragia diverticular;
- E) Cistite.

QUESTÃO 35

S.G., 75 anos, chega ao hospital com quadro de distensão e dor abdominal intensa em cólica iniciada há 4 horas. Paciente cardiopata, portador de fibrilação atrial, com várias passagens pelo pronto-socorro, sempre bem humorado.

Ele apresenta fâscies de dor, sudorese, mal consegue se comunicar e sofre com dor em todo o abdômen. Apresenta FC=115 bpm e PA=80/55 mmHg.

Ao exame físico, apresenta abdômen distendido, dor abdominal difusa sem sinais de irritação peritoneal. Para esse quadro clínico, o diagnóstico mais provável é:

- A) Isquemia mesentérica;
- B) Diverticulite aguda;
- C) Tumor de cólon perfurado;
- D) Úlcera gástrica perfurada;
- E) Apendicite aguda.

QUESTÃO 36

Assinale a afirmativa incorreta em relação às indicações da Antibioticoprofilaxia:

- A) As indicações para o uso de antibióticos profiláticos baseiam-se na eficácia da profilaxia, no risco e gravidade da infecção pós-operatória;
- B) A profilaxia antimicrobiana não está indicada em todos os procedimentos cirúrgicos;
- C) As indicações se restringem às cirurgias contaminadas ou infectadas;
- D) Em algumas cirurgias limpas, como cirurgias cardíacas, neurocirurgias ou cirurgias de colocação de próteses aplica-se a antibioticoprofilaxia;
- E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

QUESTÃO 37

Em relação às formas generalizadas do tétano, incluem-se os seguintes diagnósticos diferenciais, EXCETO:

- A) Intoxicação pela estricnina;
- B) Meningites;
- C) Raiva;
- D) Histeria;
- E) Apendicite Aguda.

QUESTÃO 38

Correlacione a Coluna I com a Coluna II no que se refere a classificação das Queimaduras quanto à profundidade:

- 1. Queimadura de 1º grau;
- 2. Queimadura de 2º grau;
- 3. Queimadura de 3º grau.

- a. Atingem as camadas superficiais da pele. Apresentam vermelhidão, inchaço e dor local suportável, sem a formação de bolhas;
- b. Atingem todas as camadas da pele e podem chegar aos ossos. Apresentam pouca ou nenhuma dor e a pele branca ou carbonizada;
- c. Atingem as camadas mais profundas da pele. Apresentam bolhas, pele avermelhada, manchada ou com coloração variável, dor, inchaço, desprendimento de camadas da pele e possível estado de choque.

- A) 1-a, 2-c, 3-b;
- B) 1-b, 2-a, 3-c;
- C) 1-c, 2-b, 3-a;
- D) 1-a, 2-b, 3-c;
- E) 1-b, 2-c, 3-a.

QUESTÃO 39

J.S.C, sexo masculino, 33 anos, dá entrada na emergência vítima de trauma por projétil de arma de fogo no hemitórax direito. É diagnosticado hemotórax de grande volume, sendo realizada a drenagem do tórax, com saída de 900ml de sangue. Em duas horas a perda sanguínea total é de 1900ml. A reposição volêmica é realizada utilizando-se grandes volumes de solução salina de cloreto de sódio isotônico. Este paciente poderá desenvolver a seguinte complicação decorrente do tipo de solução utilizada na reposição volêmica:

- A) Hipernatremia metabólica hipertônica dilucional;
- B) Acidemia hiperclorêmica metabólica dilucional;
- C) Alcalemia metabólica hipoclorêmica hipertônica;
- D) Alcalose metabólica láctica hipoclorêmica dilucional;
- E) Hipernatremia hipoclorêmica dilucional.

QUESTÃO 40

Assinale a afirmativa que indica a realização de toracotomia de emergência depois de um trauma torácico:

- A) Ferimentos toracoabdominais;
- B) Instabilidade do gradil costal associada a pneumotórax;
- C) Ferimentos fechados do tórax associados à pneumotórax hipertensivo;
- D) Hemotórax maciço com perda de sangue maior que 80ml/hora depois da drenagem inicial;
- E) Hemotórax maciço com perda maior que 1500ml de sangue agudamente pelo dreno torácico.

QUESTÃO 41

F.C.S, sexo masculino, 27 anos, procura o serviço de emergência apresentando quadro de dor abdominal aguda de início súbito. Os estudos radiológicos demonstram pneumoperitônio. O paciente então é levado ao centro cirúrgico e submetido à laparotomia exploradora. O cirurgião assistente descreve uma úlcera gástrica do tipo III perfurada, sem presença de peritonite. Em relação a este caso, assinale a alternativa Correta:

- A) Este tipo de úlcera não está relacionado com hipercloridria e deve ser considerada a hipótese de câncer gástrico;
- B) A úlcera gástrica tipo III apresenta localização pré-pilórica e deve ser tratada como uma úlcera duodenal;
- C) A vagotomia está contraindicada neste caso, e o câncer gástrico é raro na localização deste tipo de úlcera;
- D) A úlcera gástrica tipo III apresenta localização próxima à junção esofagogástrica e está associada com as úlceras gástricas tipo I;
- E) A úlcera gástrica tipo III está relacionada ao uso de anti-inflamatórios orais, não tendo relação com a presença do *H. pylori*.

QUESTÃO 42

Na rotina do cirurgião, o estudo das hemorragias digestivas implica em conhecimento anatômico, fisiológico, epidemiológico e de diagnóstico. Com base nesses aspectos, assinale V para a afirmativa Verdadeira e F para Falsa:

- I. As hemorragias consideradas altas que se exteriorizam por hematêmese ou melena têm como causa principal varizes esofágicas;
- II. As hemorragias baixas se exteriorizam por enterorragia e as neoplasias malignas são as causas mais frequentes, sobretudo os tumores do colo esquerdo;
- III. As hemorragias digestivas consideradas altas são dependentes da irrigação da artéria mesentérica superior e as baixas, das artérias mesentérica inferior e retais;
- IV. Portadores de hipertensão portal por cirrose e com varizes esofágicas podem apresentar hematêmese e melena por úlcera gástrica causada por hipercloridria devida ao shunt de gastrina, associada a alteração tecidual e coagulação sanguínea, próprias da doença hepática.

Assinale a sequencia correta de cima para baixo:

- A) F, F, V, V;
- B) V, V, F, F;
- C) F, F, F, V;
- D) F, V, F, V;
- E) V, F, F, V.

QUESTÃO 43

Paciente, 43anos, sexo masculino, diabético e hipertenso apresenta quadro clínico de colecistite aguda há 24 horas. A ultrassonografia mostra vesícula distendida, paredes espessadas, cálculo no infundíbulo e líquido perivesicular. Fígado de aspecto esteatótico e sem dilatação das vias biliares. Neste caso a melhor conduta consiste em:

- A) Tratamento clínico com poliantibioticoterapia e tratamento cirúrgico após melhora do quadro clínico na mesma internação;
- B) Tratamento clínico com poliantibioticoterapia e tratamento cirúrgico após seis semanas, que é o tempo necessário para “esfriar” o processo inflamatório;
- C) Tratamento clínico com poliantibioticoterapia e tratamento cirúrgico se houver piora do quadro clínico, sobretudo do quadro hematológico com acentuação da leucocitose e desvio à esquerda;
- D) Colecistectomia laparoscópica ou laparotômica de urgência;
- E) Iniciar o tratamento clínico com poliantibioticoterapia, puncionar e drenar a vesícula por via transparietal e efetuar colecistectomia após a melhora do quadro infeccioso.

QUESTÃO 44

B.F.S 32 anos sexo masculino deu entrada no pronto-socorro com diagnóstico de abdome agudo. O RX simples de abdome em três posições estaria indicado seletivamente:

- A) Nos casos suspeitos de abdome agudo perfurativo ou obstrutivo, pois o pneumoperitônio pode ser evidenciado quando houver perfuração de víscera oca ou distribuição anormal dos gases abdominais em caso de obstrução intestinal;
- B) Em todos os casos suspeitos de abdome agudo associado com a dosagem de amilase plasmática;
- C) Na suspeita de pancreatite aguda biliar, pois pode evidenciar cálculos biliares radiopacos, ou mesmo calcificações pancreáticas;
- D) No abdome agudo traumático, pois tem maior acurácia do que a tomografia computadorizada com contraste em casos de perfuração de víscera oca;
- E) Na impossibilidade de US FAST, que evidencia líquido abdominal na lesão de víscera oca ou parenquimatosa.

QUESTÃO 45

Paciente idoso, 76 anos de idade, foi submetido a hernioplastia inguinal direita eletiva. No primeiro dia de pós-operatório, refere dor e inchaço no testículo direito. O ultrassom doppler mostra ausência de fluxo sanguíneo no testículo direito, sugerindo orquite isquêmica. A provável causa dessa complicação é:

- A) Ligadura da artéria cremastérica;
- B) Ligadura da artéria diferencial;
- C) Ligadura da veia testicular;
- D) Ligadura da artéria testicular;
- E) Trombose do plexo pampiniforme.

QUESTÃO 46

Num paciente com quadro sugestivo de choque, cuja principal hipótese é uma origem infecciosa, a conduta inicial correta e prioritária na unidade de emergência é:

- A) Colher culturas, procurar o foco e iniciar antibiótico conforme o resultado das culturas;
- B) Descartar outras causas de choque, passar acesso central e prescrever dopamina;
- C) Prescrever antibiótico o mais rápido possível e a ressuscitação volêmica;
- D) Prescrever corticoide, proteína C ativada e controle glicêmico intensivo;
- E) Solicitar exames de imagem, prescrever antibióticos e noradrenalina.

QUESTÃO 47

Paciente, sexo masculino, 46 anos, da entrada no pronto socorro vítima de agressão por arma de fogo, apresenta lesão penetrante em flanco D, sem orifício de saída. Ao exame físico: Estado geral regular e estável hemodinamicamente. Neste caso a melhor conduta é:

- A) Lavado peritoneal;
- B) Punção abdominal;
- C) Ultrassonografia abdominal;
- D) Laparotomia exploradora;
- E) Tomografia computadorizada de abdome.

QUESTÃO 48

Chega ao Pronto Socorro criança com quadro sugestivo de trauma abdominal fechado, em relação a este tipo de trauma, assinale a afirmativa Correta:

- A) O lavado peritoneal é o que define indicação cirúrgica;
- B) O método de imagem de maior sensibilidade para definir a presença de pneumo-peritônio é a ultrassonografia;
- C) A esplenectomia por trauma, quando realizada em crianças com mais de 12 anos, não aumenta o risco de sépsis pós esplenectomia;
- D) Apenas 30% das lesões traumáticas esplênicas na criança podem ser tratadas sem cirurgia;
- E) Nas lesões hepáticas, o tratamento da hemobilidade pós-traumática pode ser feito pela embolização com a finalidade de controlar o sangramento.

QUESTÃO 49

Paciente com tumoração cervical nodular, medindo cerca de 1 cm em linha média e cística ao ultrassom tem como conduta mais apropriada:

- A) Ressecção pela técnica de Sistrunk;
- B) Tratamento cirúrgico com ressecção da tumoração incluindo a porção central da cricoide;
- C) Punção e esvaziamento da lesão;
- D) Drenagem com pen-rose;
- E) Tratamento cirúrgico com ressecção da tumoração.

QUESTÃO 50

J.F.C, 48anos, sexo masculino é internado para investigar quadro de ascite. Foi realizada uma paracentese, e o gradiente de albumina entre o soro e o líquido ascítico ("GASA") é de 1,3 g/dL. Das opções abaixo, a causa mais provável para o quadro clínico é:

- A) Carcinomatose;
- B) Tuberculose;
- C) Peritonite secundária;
- D) Peritonite bacteriana espontânea;
- E) Cirrose hepática.