



P.M. Barueri
Concurso Público 01/2012

INSTITUIÇÃO
SOLER
DE ENSINO

CARGO:
MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA

INSCRIÇÃO Nº: _____

ASSINATURA DO CANDIDATO:

Cargo: Médico Ginecologista/Obstetra

Língua Portuguesa

Leia o texto a seguir e responda às questões de 01 à 05:

O sertanejo (III) – Os sertões

O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral.

A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas.

É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules-Quasímodo, reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. O andar sem firmeza, sem aprumo, quase gingante e sinuoso, aparenta a translação de membros desarticulados. Agrava-o a postura normalmente abatida, num manifestar de displicência que lhe dá um caráter de humildade deprimente. A pé, quando parado, recosta-se invariavelmente ao primeiro umbral ou parede que encontra; a cavalo, se sofreia o animal para trocar duas palavras com um conhecido, cai logo sobre um dos estribos, descansando sobre a espenda da sela. Caminhando, mesmo a passo rápido, não traça trajetória retilínea e firme. Avança celeremente, num bambolear característico, de que parecem ser o traço geométrico os meandros das trilhas sertanejas. E se na marcha estaca pelo motivo mais vulgar, para enrolar um cigarro, bater o isqueiro, ou travar ligeira conversa com um amigo, cai logo — cai é o termo — de cócoras, atravessando largo tempo numa posição de equilíbrio instável, em que todo o seu corpo fica suspenso pelos dedos grandes dos pés, sentado sobre os calcanhares, com uma simplicidade a um tempo ridícula e adorável.

É o homem permanentemente fatigado.

Reflete a preguiça invencível, a atonia muscular perene, em tudo: na palavra remorada, no gesto contrafeito, no andar desaprumado, na cadência langorosa das modinhas, na tendência constante à imobilidade e à quietude.

Entretanto, toda esta aparência de cansaço ilude. Nada é mais surpreendedor do que vê-la desaparecer de improviso. Naquela organização combalida operam-se, em segundos, transmutações completas. Basta o aparecimento de qualquer incidente exigindo-lhe o desencadear das energias adormecidas. O homem transfigura-se. Empertiga-se, estadeando novos relevos, novas linhas na estatura e no gesto; e a cabeça firma-se-lhe, alta, sobre os ombros possantes aclarada pelo olhar desassombrado e forte; e corrigem-se-lhe, prestes, numa descarga nervosa instantânea, todos os efeitos do relaxamento habitual dos órgãos; e da figura vulgar do tabaréu canhestro reponta, inesperadamente, o aspecto dominador de um titã acobreado e potente, num desdobramento surpreendente de força e agilidade extraordinárias.

Euclides da Cunha

01. Assinale a alternativa correta que indica uma contradição à expressão inicial do autor “O sertanejo é, antes de tudo, um forte.”:

- a) Indica uma pessoa acomodada, reafirmando a expressão inicial do autor.
- b) Indica uma pessoa trabalhadora, afirmando a expressão inicial do autor.
- c) Indica uma pessoa preguiçosa, contrariando a ideia de que ele é um forte.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

02. Identifique a alternativa correta quanto a situação em que a força do sertanejo se revela:

- a) Quando precisa, embora raramente aconteça.
- b) Quando aparece um incidente que exigisse dele algum tipo de reação e mudança de gestos, tornando-se um gigante ágil e determinado na realização de seus intentos.
- c) A força do sertanejo nunca se revela, tamanha a preguiça do sertanejo.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

03. Assinale a alternativa correta quanto as expressões utilizadas pelo autor para comparar o sertanejo a Hércules:

- a) Ombros possantes, olhar desassombrado, aspecto dominador de um titã.
- b) Ombros possantes, olhar desassombrado, aspecto submisso.
- c) Ombros possantes, olhar assombrado, aspecto dominador de um titã.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

04. Identifique a alternativa correta quanto as expressões utilizadas pelo autor para comparar o sertanejo a Quasímodo:

- a) Desgracioso, desengonçado, reto, andar sem firmeza.
- b) Desgracioso, desengonçado, torto, andar com firmeza.
- c) Desgracioso, desengonçado, torto, andar sem firmeza.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

05. Assinale a alternativa correta quanto ao tipo de preconceito que pode ser percebido no discurso do autor:

- a) Preconceitos relacionados ao aspecto social.
- b) Preconceitos relacionados ao aspecto físico.
- c) Preconceitos relacionados ao aspecto intelectual.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

06. Identifique a alternativa correta em que todas as palavras são formadas por derivação parassintética:

- a) Emudecer; subterrâneo; empalidecer; envergonhar.
- b) Alistar; dentista; jogador; refresco.
- c) Realizar; esfarelar; incapaz; felizmente.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

07. Assinale a alternativa correta em que todas as palavras são formadas de composição por justaposição:

- a) Vaivém, pnalta; cor-de-rosa; televisão.
- b) Planalto; vaivém, embora; girassol.
- c) Micróbio; sempre-viva; vaivém; passatempo.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

08. Identifique a alternativa correta quanto a Oração Subordinada Adverbial Temporal:

- a) Quanto maior for a altura, maior será o tombo.
- b) “Nem bem sentou-se no banco, o moço ergueu-se rápido.” (J. Fonseca Fernandes).
- c) “Fiz-lhe sinal que se calasse.” (Machado de Assis).
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

09. Assinale a alternativa correta quanto a Oração Coordenada Sindética Adversativa:

- a) Tens razão, contudo não te exaltes.
- b) A doença vem a cavalo e volta a pé.
- c) Venha agora ou perderá a vez.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

10. Identifique a alternativa correta quanto a concordância verbal:

- a) Um bloco de foliões animavam o centro da cidade.
- b) O exército dos aliados desembarcaram na Itália.
- c) A multidão vociferava ameaças.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

11. Assinale a alternativa correta quanto a regência do verbo agradecer:

- a) José era chefe do departamento pessoal e vários funcionários sentiam prazer em agradecer-lhe.
- b) José era chefe do departamento pessoal e vários funcionários sentiam prazer em agradá-lo.
- c) José era chefe do departamento pessoal e vários funcionários sentiam prazer em agradecer.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

12. Assinale a alternativa correta quanto a regência nominal da palavra amor:

- a) Maria morria de amor pelo Xavier.
- b) Maria morria de amar pelo Xavier.
- c) Maria morria de amores pelo Xavier.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

13. Identifique a alternativa correta quanto ao emprego adequado da vírgula:

- a) O dinheiro, Jaime o trazia escondido nas mangas do paletó.
- b) O dinheiro Jaime o trazia, escondido nas mangas do paletó.
- c) O dinheiro Jaime o trazia escondido, nas mangas do paletó.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

Leia o texto a seguir e responda às questões de 14 à 16.

Ai, dona fea! Fostes-vos queixar
 porque vos nunca louv'en em meu trobar
 mais ora quero fazer un cantar
 en que vos loarei toda via;
 e vedes como vos quero loar:
 dona fea, velha e sandia!

Dona fea, se Deus mi pardon,
 pois avedes (a) tan gran coraçõ
 que vos eu loe, en esta razon
 vos quero já loar toda via;
 e vedes qual será a loaçõ:
 dona fea, velha e sandia!

Dona fea, nunca vos eu loei
 en meu trobar, pero muito trobei;
 mais ora já un bon cantar farei,
 en que vos loarei toda via;
 e direi-vos como vos loarei:
 dona fea, velha e sandia!

Joan Garcia de Guilhade

14. Assinale a alternativa correta quanto ao modo com o qual o eu lírico se refere a mulher para quem canta:

- a) Como vos quero loar.
- b) Tan gran coraçõ.
- c) Dona fea.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

15. Identifique a alternativa correta quanto a resposta da queixa feita pela mulher:

- a) Devido ao eu lírico ter feito uma cantiga para louvá-la que não foi de seu agrado.
- b) Devido ao eu lírico nunca ter feito uma cantiga para louvá-la, para declarar-lhe sua admiração.
- c) Devido ao eu lírico nunca ter feito uma cantiga para louvá-la, por falta de admiração.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

16. Assinale a alternativa correta quanto a mulher ao qual o eu lírico se refere:

- a) É possível saber sua identidade, visto que ela é mencionada a todo momento.
- b) É possível saber sua identidade, embora seu nome não seja mencionado.
- c) Não é possível saber sua identidade, pois seu nome não é mencionado.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

Conhecimentos Específicos

17. As veias que drenam o ovário se iniciam num plexo que se comunica com o plexo venoso uterino. Deste plexo, originam-se veias que formam um único vaso para cada ovário, a veia ovárica. As veias ováricas direita e esquerda desembocam, respectivamente, na:

- a) Veia obturatória direita e veia uterina esquerda.
- b) Veia pudenda direita e veia obturatória esquerda.
- c) Veia ilíaca interna direita e veia uterina esquerda.
- d) Veia cava inferior e veia renal esquerda.

18. Quando uma criança do sexo feminino nasce, ela possui óvulos que se caracterizam por conter:

- a) Uma única camada de células foliculares circundando um ovócito secundário estacionado na metáfase 2 da meiose 2, constituindo um folículo primordial.

- b) Uma única camada de células foliculares circundando um ovócito primário estacionado na anáfase 1 da meiose 1, constituindo um folículo primário.
- c) Uma única camada de células foliculares circundando um ovócito primário estacionado na prófase 1 da meiose 1, constituindo um folículo primário.
- d) Camadas concêntricas de células foliculares circundando um ovócito primário estacionado na metáfase 1 da meiose 1, constituindo um folículo primário.

19. No ciclo menstrual, o momento em que alto nível de estradiol exerce feedback positivo no eixo hipotalâmico-hipofisário-ovariano se processa na:

- a) Fase lútea, estimulando o corpo lúteo a sintetizar altos níveis de progesterona.
- b) Fase pré-ovulatória, desencadeando aumento nos pulsos de GnRh que determinam altos níveis de LH.
- c) Fase pós menstrual, estimulando síntese/liberação de LH/FSH pela hipófise posterior.
- d) Fase folicular, estimulando a hipófise anterior a liberar altos níveis de GnRh.

20. Durante a fase menstrual do ciclo menstrual, a camadas funcionais do endométrio que se desprendem na menstruação são:

- a) Camada basal, camada compacta e camada esponjosa.
- b) Camada basal, camada serosa e camada compacta.
- c) Camada compacta e camada esponjosa.
- d) Somente a camada esponjosa.

21. O método palpatório do útero que visa o reconhecimento do feto nele contido, sua apresentação e posição, cuja técnica é sistematizada em diversas fases ou tempos consiste na:

- a) Manobra de Leopold-Zweifel.
- b) Manobra de Carnett.
- c) Manobra de Rovsing.
- d) Manobra de Glenard.

22. A lesão mais característica, quase patognomônica da toxemia gravídica é:

- a) Endotelite hiperproliferativa.
- b) Endoteliosclerose aguda difusa.
- c) Aterose crônica.
- d) Endoteliose capilar glomerular.

23. Sabe-se que os subtipos 16 e 18 do Vírus do Papiloma Humano(HPV) têm relação comprovada com o desenvolvimento de neoplasias cervicais. Correlacionando a agressividade do HPV 16 em relação ao HPV 18 e o mecanismo de virulência do HPV 16, assinale a alternativa correta:

- a) O HPV 16 é mais agressivo, tendo como mecanismo de virulência a produção da proteína E9 que ativa p53, descontrola o ciclo celular, aumenta as concentrações de p21, complexo CDK2/ciclinaE inativo, complexo pRb/E2F defosforilado, a célula com DNA danificado passa da fase G1 para a fase S.
- b) O HPV 16 é mais agressivo, tendo como mecanismo de virulência a produção da proteína E7 que inativa pRb impedindo ela de se complexar com o complexo E2F, E2F permanece ativo, a célula com DNA danificado passa da fase G1 para a fase S.
- c) O HPV 16 é mais agressivo, tendo como mecanismo de virulência a produção da proteína E6 que inativa p53, diminuindo as concentrações de p21, complexo CDK2/ciclinaE ativo que fosforila pRb/E2F, E2F é liberado, a célula com DNA danificado passa da fase G1 para S.
- d) O HPV 16 é menos agressivo, tendo como mecanismo de virulência a produção da proteína E10 que inativa p53, aumentando as concentrações de p21, complexo CDK2/ciclinaE ativo que fosforila pRb/E2F, E2F liberado, a célula com DNA danificado passa da fase G1 para S.

24. Dizemos que uma gestante encontra-se aloimunizada quando a mesma for:

- a) Rh negativa e possuir anticorpos anti fator Rh.
- b) Rh positiva e possuir anticorpos anti fator Rh.

- c) Rh negativa e não possuir anticorpos anti fator Rh.
d) Rh positiva e não possuir auto anticorpos anti fator Rh.

25. Complicação grave em gestantes que cursam com Síndrome HELLP e que contra-indica o parto por via vaginal (assinale a alternativa correta):

- a) Plaquetopenia severa.
b) Hematoma hepático.
c) Crise hipertensiva.
d) Hematoma na escavação retouterina.

26. Gestantes que no transcorrer da gravidez apresentem diagnóstico de Trombose Venosa Profunda confirmado por ultrassom Doppler, devem ser tratadas na fase aguda com:

- a) Varfarina.
b) Heparina de baixo peso molecular subcutânea.
c) Heparina endovenosa.
d) Cumarínicos.

27. Quadro de apoplexia uteroplacentária ou útero de *Couvelaire* ocorre em 10 a 20 % dos casos de:

- a) Placenta Prévia marginal.
b) Acretismo placentário.
c) Deslocamento prematuro da placenta.
d) Rotura prematura de membranas.

28. A Doença Inflamatória Pélvica (DIP) acomete a maioria das estruturas do sistema genital feminino resultando em dor pélvica, sensibilidade dos anexos, febre e secreção vaginal. A causa mais comum de DIP é:

- a) Infecção por *Ureaplasma urealyticum*.
b) Infecção por gonococos.
c) Infecção por estafilococos e estreptococos.
d) Infecção por *Mycoplasma hominis*.

29. Em relação ao Adenossarcoma do endométrio, assinale a alternativa correta:

- a) Consiste em um estroma neoplásico do endométrio com infiltração difusa dos feixes musculares do miométrio e nos canais linfáticos paraórticos.
b) São tumores benignos do endométrio, circunscrito, arredondado, firme, de cor cinza esbranquiçada, com variação de tamanho, ocorrendo em mulheres entre a terceira e sexta décadas de vida.
c) Surge a partir do miométrio ou de células precursoras endometriais, apresenta cariótipo complexo que incluem frequentemente deleções.
d) Se apresenta mais comumente como crescimentos polipóides endometriais de base larga e ampla acometendo predominantemente mulheres na quarta e quinta décadas de vida.

30. Nas mamas, a ocorrência de uma área localizada de inflamação aguda que pode progredir e formar único ou múltiplos abscessos se relaciona com:

- a) Infecção estafilocócica.
b) Infecção por *Streptococcus pyogenes*.
c) Infecção por *Pseudomonas aeruginosa*.
d) Infecção por *Clostridium perfringens*.

31. Um exame anátomo patológico revelou tumores fibrinóides ovarianos mesclados com células produtoras de muco e células em "anel de grau" sendo que a paciente relatava história progressiva de tumoração no íleo. A patologia é:

- a) Tumor de Brenner.
b) Cistadenoma mucinoso.
c) Tumor de krukenberg.
d) Síndrome de Lynch.

32. Comedocarcinoma, histologicamente, é um subtipo arquitetural de:

- a) Carcinoma ductal in situ.
b) Carcinoma lobular in situ.
c) Carcinoma lobular invasivo.
d) Carcinoma papilar invasivo.

33. No carcinoma micro invasivo do colo uterino estágio IA1 a frequência de comprometimento de linfonodos é de:

- a) 1%, podendo o tratamento padrão incluir a histerectomia simples.
b) 2%, podendo o tratamento padrão incluir a histerectomia simples e linfadenectomia.
c) 3%, podendo o tratamento padrão incluir histerectomia simples e linfadenectomia.
d) 5%, podendo o tratamento padrão incluir histerectomia simples.

34. Fator que pode desencadear assim como complicar quadro de Síndrome dos Ovários Policísticos (assinale a alternativa correta):

- a) Doença cardiovascular.
b) Diabetes Mellitus tipo 2.
c) Hipoandrogenismo.
d) Obesidade.

35. A conização é indicada para diagnóstico em mulheres com lesões intra-epiteliais de alto grau (HSIL) de acordo com o exame de papanicolau nas seguintes condições, EXCETO:

- a) Quando não é observado JEC à colposcopia.
b) Quando os achados histológicos de curetagem endocervical são negativos ou indeterminados para NIC 2 e NIC 3.
c) Quando não há correlação entre os resultados de citologia, biópsia e colposcopia.
d) Quando os limites da lesão não podem ser visualizados por colposcopia;

36. Mulher de 29 anos, em junho de 2009 realizou ultrassonografia pélvica tendo como achados uma massa complexa em ovário esquerdo de 4 cm. No mês seguinte realizado salpingooforectomia unilateral esquerda. O anátomo patológico da peça cirúrgica constatou tumor seroso borderline com padrão micropapilar com área papilífera intracística. A conduta pós cirúrgica seria:

- a) Reoperar novamente para estadiamento.
b) Radioterapia e quimioterapia com cisplatina e paclitaxel por 6 meses.
c) Quimioterapia baseada em platina por 3 ciclos.
d) Quimioterapia baseada em platina por 6 ciclos.

37. Após o desenvolvimento das características sexuais secundárias, uma das causas de insuficiência ovariana seria:

- a) Síndrome de Turner.
b) Síndrome de Kallmann
c) Síndrome de Savage.
d) Nenhuma das alternativas.

38. Mulher de 30 anos é atendida no Pronto Socorro com hemorragia vaginal. Na ultrassonografia é constatado imagem nodular hipocogênica na parede posterior uterina medindo 4,5cm por 5,3 cm. Possui história de fluxo menstrual aumentado nos últimos meses. A conduta seria:

- a) Indicar miomectomia.
b) Indicar histerectomia simples.
c) Prescrever análogo de GnRH por 8 meses.
d) Prescrever doses elevadas de estrogênios.

39. No tratamento de gestante com sífilis secundária ou latente precoce, o esquema terapêutico recomendado é:

- a) Penicilina G benzatina(inibidor de síntese de parede bacteriana), dose total de 4.800.000 UI via IM, dividida em duas doses de 2.400.000 UI aplicados com intervalo de 7 dias entre as doses.
b) Penicilina G benzatina (desestabilizador de parede bacteriana), dose total de 7.200.000 UI via IM dividido em três séries com intervalo de 7 dias entre as doses.
c) Penicilina G benzatina (inibidor de parede bacteriana), dose total de 4.800.000 UI via IM dividido em duas vezes com intervalo de 10 dias entre as doses.
d) Penicilina G benzatina (beta-lactâmico resistente a betactamase bacteriana), dose total de 7.200.000 UI via IM, dividido em três séries de 2.400.000 UI aplicados com intervalo de 7 dias entre as doses.

40. Dismenorréia primária tem como causa:

- a) Aumento de vasopressinas circulantes.
- b) Aumento da produção de prostaglandinas pelo endométrio.
- c) Diminuição da expressão gênica de fosfolipase A2 em células endometriais.
- d) Aumento da expressão gênica de lipocortinas em células endometriais.