



P.M. Barueri
Concurso Público 01/2012

INSTITUIÇÃO
SOLER
DE ENSINO

CARGO:
MÉDICO PEDIATRA

INSCRIÇÃO Nº: _____

ASSINATURA DO CANDIDATO:

Cargo: Médico Pediatra

Língua Portuguesa

Leia o texto a seguir e responda às questões de 01 à 05:

O sertanejo (III) – Os sertões

O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral.

A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas.

É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules-Quasímodo, reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. O andar sem firmeza, sem aprumo, quase gigante e sinuoso, aparenta a translação de membros desarticulados. Agrava-o a postura normalmente abatida, num manifestar de displicência que lhe dá um caráter de humildade deprimente. A pé, quando parado, recosta-se invariavelmente ao primeiro umbral ou parede que encontra; a cavalo, se sofreia o animal para trocar duas palavras com um conhecido, cai logo sobre um dos estribos, descansando sobre a espenda da sela. Caminhando, mesmo a passo rápido, não traça trajetória retilínea e firme. Avança celeremente, num bambolear característico, de que parecem ser o traço geométrico os meandros das trilhas sertanejas. E se na marcha estaca pelo motivo mais vulgar, para enrolar um cigarro, bater o isqueiro, ou travar ligeira conversa com um amigo, cai logo — cai é o termo — de cócoras, atravessando largo tempo numa posição de equilíbrio instável, em que todo o seu corpo fica suspenso pelos dedos grandes dos pés, sentado sobre os calcanhares, com uma simplicidade a um tempo ridícula e adorável.

É o homem permanentemente fatigado.

Reflete a preguiça invencível, a atonia muscular perene, em tudo: na palavra remorada, no gesto contrafeito, no andar desaprumado, na cadência langorosa das modinhas, na tendência constante à imobilidade e à quietude.

Entretanto, toda esta aparência de cansaço ilude. Nada é mais surpreendedor do que vê-la desaparecer de improviso. Naquela organização combalida operam-se, em segundos, transmutações completas. Basta o aparecimento de qualquer incidente exigindo-lhe o desencadear das energias adormecidas. O homem transfigura-se. Empertiga-se, estadeando novos relevos, novas linhas na estatura e no gesto; e a cabeça firma-se-lhe, alta, sobre os ombros possantes aclarada pelo olhar desassombrado e forte; e corrigem-se-lhe, prestes, numa descarga nervosa instantânea, todos os efeitos do relaxamento habitual dos órgãos; e da figura vulgar do tabaréu canhestro reponta, inesperadamente, o aspecto dominador de um titã acobreado e potente, num desdobramento surpreendente de força e agilidade extraordinárias.

Euclides da Cunha

01. Assinale a alternativa correta que indica uma contradição à expressão inicial do autor “O sertanejo é, antes de tudo, um forte.”:

- a) Indica uma pessoa acomodada, reafirmando a expressão inicial do autor.
- b) Indica uma pessoa trabalhadora, afirmando a expressão inicial do autor.
- c) Indica uma pessoa preguiçosa, contrariando a ideia de que ele é um forte.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

02. Identifique a alternativa correta quanto a situação em que a força do sertanejo se revela:

- a) Quando precisa, embora raramente aconteça.
- b) Quando aparece um incidente que exigisse dele algum tipo de reação e mudança de gestos, tornando-se um gigante ágil e determinado na realização de seus intentos.
- c) A força do sertanejo nunca se revela, tamanha a preguiça do sertanejo.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

03. Assinale a alternativa correta quanto as expressões utilizadas pelo autor para comparar o sertanejo a Hércules:

- a) Ombros possantes, olhar desassombrado, aspecto dominador de um titã.
- b) Ombros possantes, olhar desassombrado, aspecto submisso.
- c) Ombros possantes, olhar assombrado, aspecto dominador de um titã.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

04. Identifique a alternativa correta quanto as expressões utilizadas pelo autor para comparar o sertanejo a Quasímodo:

- a) Desgracioso, desengonçado, reto, andar sem firmeza.
- b) Desgracioso, desengonçado, torto, andar com firmeza.
- c) Desgracioso, desengonçado, torto, andar sem firmeza.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

05. Assinale a alternativa correta quanto ao tipo de preconceito que pode ser percebido no discurso do autor:

- a) Preconceitos relacionados ao aspecto social.
- b) Preconceitos relacionados ao aspecto físico.
- c) Preconceitos relacionados ao aspecto intelectual.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

06. Identifique a alternativa correta em que todas as palavras são formadas por derivação parassintética:

- a) Emudecer; subterrâneo; empalidecer; envergonhar.
- b) Alistar; dentista; jogador; refresco.
- c) Realizar; esfarelar; incapaz; felizmente.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

07. Assinale a alternativa correta em que todas as palavras são formadas de composição por justaposição:

- a) Vaivém, pnalta; cor-de-rosa; televisão.
- b) Planalto; vaivém, embora; girassol.
- c) Micróbio; sempre-viva; vaivém; passatempo.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

08. Identifique a alternativa correta quanto a Oração Subordinada Adverbial Temporal:

- a) Quanto maior for a altura, maior será o tombo.
- b) “Nem bem sentou-se no banco, o moço ergueu-se rápido.” (J. Fonseca Fernandes).
- c) “Fiz-lhe sinal que se calasse.” (Machado de Assis).
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

09. Assinale a alternativa correta quanto a Oração Coordenada Sindética Adversativa:

- a) Tens razão, contudo não te exaltes.
- b) A doença vem a cavalo e volta a pé.
- c) Venha agora ou perderá a vez.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

10. Identifique a alternativa correta quanto a concordância verbal:

- a) Um bloco de foliões animavam o centro da cidade.
- b) O exército dos aliados desembarcaram na Itália.
- c) A multidão vociferava ameaças.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

11. Assinale a alternativa correta quanto a regência do verbo agradecer:

- a) José era chefe do departamento pessoal e vários funcionários sentiam prazer em agradecer-lhe.
- b) José era chefe do departamento pessoal e vários funcionários sentiam prazer em agradá-lo.
- c) José era chefe do departamento pessoal e vários funcionários sentiam prazer em agradecer.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

12. Assinale a alternativa correta quanto a regência nominal da palavra amor:

- a) Maria morria de amor pelo Xavier.
- b) Maria morria de amar pelo Xavier.
- c) Maria morria de amores pelo Xavier.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

13. Identifique a alternativa correta quanto ao emprego adequado da vírgula:

- a) O dinheiro, Jaime o trazia escondido nas mangas do paletó.
- b) O dinheiro Jaime o trazia, escondido nas mangas do paletó.
- c) O dinheiro Jaime o trazia escondido, nas mangas do paletó.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

Leia o texto a seguir e responda às questões de 14 à 16.

Ai, dona fea! Fostes-vos queixar
porque vos nunca louv'en em meu trobar
mais ora quero fazer un cantar
en que vos loarei toda via;
e vedes como vos quero loar:
dona fea, velha e sandia!

Dona fea, se Deus mi pardon,
pois avedes (a) tan gran coraçõ
que vos eu loe, en esta razon
vos quero já loar toda via;
e vedes qual será a loaçõ:
dona fea, velha e sandia!

Dona fea, nunca vos eu loei
en meu trobar, pero muito trobei;
mais ora já un bon cantar farei,
en que vos loarei toda via;
e direi-vos como vos loarei:
dona fea, velha e sandia!

Joan Garcia de Guilhade

14. Assinale a alternativa correta quanto ao modo com o qual o eu lírico se refere a mulher para quem canta:

- a) Como vos quero loar.
- b) Tan gran coraçõ.
- c) Dona fea.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

15. Identifique a alternativa correta quanto a resposta da queixa feita pela mulher:

- a) Devido ao eu lírico ter feito uma cantiga para louvá-la que não foi de seu agrado.
- b) Devido ao eu lírico nunca ter feito uma cantiga para louvá-la, para declarar-lhe sua admiração.
- c) Devido ao eu lírico nunca ter feito uma cantiga para louvá-la, por falta de admiração.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

16. Assinale a alternativa correta quanto a mulher ao qual o eu lírico se refere:

- a) É possível saber sua identidade, visto que ela é mencionada a todo momento.
- b) É possível saber sua identidade, embora seu nome não seja mencionado.
- c) Não é possível saber sua identidade, pois seu nome não é mencionado.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

Conhecimentos Específicos

17. Considere as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta:

- I – O crescimento linear da criança é resultado da ação conjunta dos hormônios GH e IGF-1 secretados pela hipófise anterior.
- II – O hipotireoidismo é a principal causa de baixa estatura de etiologia endócrina na criança.
- III – Para a criança, são nove os aminoácidos essenciais: leucina, isoleucina, lisina, fenilalanina, metionina, treonina, triptofano, arginina e prolina.
- IV – A primeira fase rápida de crescimento somático do ser humano se estende do período intra-uterino até o primeiro ano de vida e depende da nutrição materna.
- V – O ácido linoléico (ácido graxo essencial não sintetizado pelo organismo) é fundamental para o crescimento da criança

podendo ser obtido através da ingestão de carnes, ovos e óleos vegetais.

- a) I, II e III estão corretas.
- b) II e V estão corretas.
- c) I, III, IV e V estão corretas.
- d) Todas estão corretas, com exceção da afirmação II.

18. Considerando uma gestante com tuberculose pulmonar, assinale a alternativa correta com relação à conduta recomendada após o parto:

- a) Nas nutrizes bacilíferas e não bacilíferas recomenda-se liberar o aleitamento utilizando máscara de proteção na mãe para proteção do RN, administrar medicação profilática primária ao RN com isoniazida(20 a 30mg/Kg/dia) e vacinar o RN com vacina BCG conforme rotina.
- b) Em mães bacilíferas recomenda-se suspender o aleitamento ao RN, utilizar medicação profilática primária ao RN com isoniazida(10 a 20mg/Kg/dia) e vacinar o RN com BCG conforme rotina.
- c) Em nutrizes bacilíferas recomenda-se liberar o aleitamento utilizando máscara de proteção na mãe para proteção do RN, administrar medicação profilática primária ao RN com isoniazida(10 a 20mg/Kg/dia), não vacinar o RN com BCG inicialmente, acompanhar clinicamente o RN e realizar teste PPD no terceiro mês de vida para estadiamento.
- d) Em nutrizes bacilíferas recomenda-se suspender o aleitamento ao RN, utilizar medicação profilática primária ao RN com isoniazida(20 a 30mg/Kg/dia) e vacinar o RN com BCG somente após avaliação clínica e não-reatividade do PPD (a ser realizado no terceiro mês de vida).

19. Qual das seguintes infecções abaixo não tem sua incidência significativamente diminuída após vacinação contra Haemophilus influenzae tipo B?

- a) Otite.
- b) Artrite séptica.
- c) Epiglotite.
- d) Celulite.

20. Parasitose comum em crianças, principalmente aquelas que convivem em creches e orfanatos, na qual a principal característica é o prurido anal noturno:

- a) Estrongiloidíase.
- b) Ascariíase.
- c) Enterobiíase.
- d) Larva Migrans Cutânea.

21. Protozoário responsável por parasitar o intestino delgado de seres humanos desencadeando a Síndrome da Má Absorção, podendo provocar grave distúrbio no desenvolvimento físico e mental de crianças parasitadas:

- a) Entamoeba histolytica.
- b) Balantidium coli.
- c) Entamoeba coli.
- d) Giardia lamblia.

22. A coqueluche, principalmente em crianças, pode evoluir para quadros graves com complicações pulmonares, neurológicas, hemorrágicas e desidratação. Considere as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta:

- I – O estágio paroxístico da coqueluche se caracteriza por sintomas semelhantes ao de um resfriado comum.
 - II – O estágio catarral da coqueluche se caracteriza por tosse repetida (40-50 acessos/dia) seguido de vômitos e exaustão.
 - III – Dentre os fatores de virulência associados à Bordetella pertussis, as toxinas liberadas incluem: toxina pertussis, hemaglutina filamentosa, beta-hemolisina e citotoxina traqueal.
 - IV – A bordetella pertussis é um cocobacilo gram negativo, aeróbio estrito.
- a) Somente IV está correta.
 - b) I, II e IV estão corretas.
 - c) III e IV estão incorretas.
 - d) Todas estão corretas.

23. Uma criança de 10 anos de idade sofre queda de bicicleta e lacera superficialmente o antebraço direito. A ferida é limpa e suturada. Nos 3 meses seguintes, a ferida evolui com melhora produzindo um cicatriz linear. Qual dos seguintes fatores nutricionais é necessário para a organização adequada de colágeno no tecido cicatricial nesse caso?

- a) Vitaminas do complexo B e ácido fólico.
- b) Vitamina C.
- c) Vitamina A.
- d) Vitamina E.

24. Crianças menores de 5 anos são consideradas grupo de risco para a infecção humana pelo vírus Influenza A (H1N1). Em relação ao tratamento, crianças a partir dos 12 meses com doença respiratória aguda grave associada a Influenza A, têm indicação para o uso do fosfato de Oseltamivir, fármaco cujo mecanismo de ação se deve a:

- a) Interação com o sítio ativo da transcriptase reversa viral, alterando o seu estado conformacional, impedindo a síntese de RNA viral e conseqüente replicação viral.
- b) Bloqueio estérico do canal iônico bloqueando a proteína ligante viral hemaglutinina, impedindo a desnudação da partícula viral no citoplasma da célula infectada.
- c) Inibição competitiva da RNA polimerase viral após ser trifosfatado na célula infectada por quinases virais e celulares, impedindo a replicação viral.
- d) Interação com o sítio ativo da enzima neuraminidase do vírus impedindo que a mesma se complexa com o ácido siálico da membrana hospedeira.

25. Em relação ao Neuroblastoma, neoplasia maligna comum na infância, assinale a alternativa incorreta:

- a) Origina-se embriologicamente a partir de células primordiais do tecido ectodérmico da crista neural.
- b) A idade média de diagnóstico ocorre por volta dos 5 anos, sendo mais prevalente em crianças brancas do sexo feminino.
- c) Raramente se origina no tecido cerebral.
- d) 90% dos neuroblastomas, independentemente de sua localização, produzem catecolaminas.

26. O "Teste do Pezinho" faz parte do Programa Nacional de Triagem Neonatal, programa que rastreia crianças portadoras de doenças congênitas no período neonatal. Em relação à Fenilcetonúria (PKU), considere as afirmações e assinale a alternativa correta:

I – A PKU é uma condição autossômica recessiva causada na maioria das vezes por mutações bialélicas no gene que codifica a enzima fenilalanina descarboxilase.

II – A anormalidade bioquímica da PKU é uma incapacidade de converter fenilalanina em tirosina.

III – Os lactentes afetados e não diagnosticados precocemente somente apresentam retardo mental evidente após o primeiro ano de vida.

IV – Muitos pacientes com PKU clinicamente normais que foram tratados com dieta desde o início da vida acabam por alcançar a idade fértil.

- a) I e III estão incorretas.
- b) I, II e IV estão corretas.
- c) I e IV estão incorretas.
- d) Todas estão corretas.

27. As manifestações tardias da sífilis congênita incluem uma tríade característica que envolve as seguintes condições:

- a) Roséola sífilítica, endarterite mioproliferativa e surdez do oitavo nervo.
- b) Goma sífilítica, neurosífilis e surdez do oitavo nervo.
- c) Ceratite intersticial, dentes de Hutchinson e surdez do oitavo nervo.
- d) Neurosífilis, exantema sífilítico e surdez do oitavo nervo.

28. A síndrome Hemolítico-Urêmica constitui uma das principais causas de insuficiência renal aguda em crianças. Grande parte dos casos estão associados a um microorganismo produtor de

toxinas SLT-1 e SLT-2 semelhantes a Shiga. O patógeno em questão é:

- a) Escherichia coli enterohemorrágica.
- b) Escherichia coli enterotoxigênica.
- c) Escherichia coli uropatogênica.
- d) Escherichia coli enteroinvasiva.

29. A principal manifestação neurológica da Febre Reumática (FR), sendo considerada critério maior para o diagnóstico de FR, e que acomete crianças entre 5 e 15 anos de idade é a:

- a) Coreia de Sydenham.
- b) Coreia de Kwell.
- c) Coreia de Kawasaki.
- d) Coreia de Lyme.

30. No tratamento da criança com diagnóstico de hipertensão grave sem causa identificada, a melhor escolha inicial farmacológica seria o uso de:

- a) Diuréticos.
- b) Metoprolol.
- c) Nifedipina.
- d) Bloqueador alfa-1 adrenérgico.

31. Em crianças menores de 3 anos de idade, 90% das amigdalites ocorrem devido a:

- a) Streptococcus pyogenes beta hemolítico do grupo A.
- b) Streptococcus pneumoniae.
- c) Moraxella catarrhalis.
- d) Vírus.

32. O diagnóstico radiológico de hipovitaminose D tem como características, exceto:

- a) Desmineralização de aspecto grosseiro e generalizado.
- b) Distância aumentada entre a metáfise e a epífise pela deposição de osteóide calcificado.
- c) Arqueamento dos ossos que sustentam peso.
- d) Alargamento da epífise, podendo adotar o aspecto em taça.

33. A principal manifestação clínica da Toxoplasmose Congênita, que pode se manifestar em até 90% dos infectados até a adolescência é:

- a) Necrose de liquefação cerebral.
- b) Calcificação cerebral e hepática.
- c) Retinocoroidite.
- d) Encefalite hiperproliferativa.

34. Considere as afirmações em relação à Icterícia Neonatal e assinale a alternativa correta:

I – A maioria dos casos de icterícia neonatal se deve a hiperbilirrubinemia direta e as causas mais comuns são a icterícia fisiológica do recém nascido e as incompatibilidades sanguíneas Rh e ABO.

II – A icterícia fisiológica do RN ocorre na primeira semana de vida em cerca de 60% dos nascidos a termo e em 80% dos prematuros.

III – Kernicterus é uma encefalopatia grave que pode ocorrer nos casos de hiperbilirrubinemia indireta muito grave.

IV – A fototerapia é um tratamento simples e eficiente no tratamento da hiperbilirrubinemia neonatal e se baseia na utilização de energia luminosa para transformar a bilirrubina em produtos mais lipossolúveis, adequados para a excreção.

- a) II e III estão corretas.
- b) I e IV estão corretas.
- c) Somente III e IV estão corretas.
- d) III é incorreta.

35. São características da Síndrome de Kwashiorkor, exceto:

- a) Pode haver alteração segmentar (em faixas) da cor dos cabelos caracterizando o "sinal da bandeira".
- b) Anemia está presente na maioria dos casos.
- c) Geralmente as crianças apresentam hepatomegalia (esteatose).
- d) Diferente da criança marasmática, a criança com Kwashiorkor possui baixo grau tecido celular subcutâneo.

36. Na assistência respiratória ao recém nascido, o uso da pressão positiva contínua em vias aéreas(CPAP) está indicado principalmente na:

- a) Desmame de ventilação mecânica.
- b) Síndrome de membrana meconial.
- c) Doença das membranas hialinas.
- d) Cardiopatia congênita com hipofluxo pulmonar.

37. Em relação à desidratação em crianças, é correto afirmar, EXCETO:

- a) Na desidratação hipernatrêmica há risco de colapso vascular periférico precoce.
- b) É difícil a avaliação do grau de desidratação na desnutrição.
- c) A oligúria é mais acentuada nos casos de desidratação hipotônica.
- d) Aproximadamente 85% dos casos de desidratação ocorrem sem alterações da pressão osmótica.

38. Considerando as Pneumonias no Período Neonatal, assinale a alternativa correta:

I – Entre os agentes bacterianos mais frequentes que podem contaminar o recém nascido por ocasião do parto destacam-se bactérias gram negativas e positivas, tendo sido frequentemente citado na literatura mundial o *Streptococcus agalactiae*.

II – A pneumonia adquirida após o nascimento tem como microorganismos frequentemente associados o vírus sincicial respiratório, adenovírus e bactérias gram positivas (*S. aureus*, *S.pneumoniae*, *Pneumocystis carini*).

III – Derrame pleural pode ocorrer em geral associado a pneumonia por estafilococo do grupo A, estreptococo e *E.coli*.

IV - A pneumonia por estreptococo do grupo B, em geral, caracteriza-se radiologicamente por infiltrado pulmonar focal com broncograma aéreo unilateral.

V – Quando há suspeita de bactérias anaeróbias, as drogas de escolha são clindamicina, cefoxitina, metronidazol, imipenem ou a combinação de uma penicilina (ticarcilina) com um inibidor de betalactamase (ácido clavulônico).

- a) II, III, IV e V estão corretas.
- b) I, III, IV e V estão corretas.
- c) I, II, III e V estão corretas.
- d) I, II e IV estão corretas.

39. Lactente que na primeira semana de vida, alimentado somente com leite materno, apresenta 9 evacuações diárias líquidas e de caráter explosivo. O diagnóstico provável é:

- a) Síndrome de má absorção.
- b) Deficiência transitória no lactente da enzima que degrada lactose.
- c) Infecção intestinal.
- d) Reflexo gastrocólico aumentado.

40. A tríade clássica da Pelagra (deficiência de Niacina) é caracterizada por:

- a) Dermatite, diarreia e demência.
- b) Convulsão, dermatite e anemia.
- c) Dermatose, queilite e diarreia.
- d) Convulsão, diarreia e neurite periférica.