



**P.M. Barueri**  
**Concurso Público 01/2012**

INSTITUIÇÃO  
**SOLER**  
DE ENSINO

**CARGO:**  
**MÉDICO PROCTOLOGISTA**

**INSCRIÇÃO Nº:** \_\_\_\_\_

**ASSINATURA DO CANDIDATO:**

\_\_\_\_\_



## **Cargo: Médico Proctologista**

### **Língua Portuguesa**

Leia o texto a seguir e responda às questões de 01 à 05:

#### O sertanejo (III) – Os sertões

O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral.

A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas.

É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules-Quasímodo, reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. O andar sem firmeza, sem aprumo, quase gigante e sinuoso, aparenta a translação de membros desarticulados. Agrava-o a postura normalmente abatida, num manifestar de displicência que lhe dá um caráter de humildade deprimente. A pé, quando parado, recosta-se invariavelmente ao primeiro umbral ou parede que encontra; a cavalo, se sofreia o animal para trocar duas palavras com um conhecido, cai logo sobre um dos estribos, descansando sobre a espenda da sela. Caminhando, mesmo a passo rápido, não traça trajetória retilínea e firme. Avança celeremente, num bambolear característico, de que parecem ser o traço geométrico os meandros das trilhas sertanejas. E se na marcha estaca pelo motivo mais vulgar, para enrolar um cigarro, bater o isqueiro, ou travar ligeira conversa com um amigo, cai logo — cai é o termo — de cócoras, atravessando largo tempo numa posição de equilíbrio instável, em que todo o seu corpo fica suspenso pelos dedos grandes dos pés, sentado sobre os calcanhares, com uma simplicidade a um tempo ridícula e adorável.

É o homem permanentemente fatigado.

Reflete a preguiça invencível, a atonia muscular perene, em tudo: na palavra remorada, no gesto contrafeito, no andar desaprumado, na cadência langorosa das modinhas, na tendência constante à imobilidade e à quietude.

Entretanto, toda esta aparência de cansaço ilude. Nada é mais surpreendedor do que vê-la desaparecer de improviso. Naquela organização combalida operam-se, em segundos, transmutações completas. Basta o aparecimento de qualquer incidente exigindo-lhe o desencadear das energias adormecidas. O homem transfigura-se. Empertiga-se, estadeando novos relevos, novas linhas na estatura e no gesto; e a cabeça firma-se-lhe, alta, sobre os ombros possantes aclarada pelo olhar desassombrado e forte; e corrigem-se-lhe, prestes, numa descarga nervosa instantânea, todos os efeitos do relaxamento habitual dos órgãos; e da figura vulgar do tabaréu canhestro reponta, inesperadamente, o aspecto dominador de um titã acobreado e potente, num desdobramento surpreendente de força e agilidade extraordinárias.

*Euclides da Cunha*

**01.** Assinale a alternativa correta que indica uma contradição à expressão inicial do autor “O sertanejo é, antes de tudo, um forte.”:

- a) Indica uma pessoa acomodada, reafirmando a expressão inicial do autor.
- b) Indica uma pessoa trabalhadora, afirmando a expressão inicial do autor.
- c) Indica uma pessoa preguiçosa, contrariando a ideia de que ele é um forte.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

**02.** Identifique a alternativa correta quanto a situação em que a força do sertanejo se revela:

- a) Quando precisa, embora raramente aconteça.
- b) Quando aparece um incidente que exigisse dele algum tipo de reação e mudança de gestos, tornando-se um gigante ágil e determinado na realização de seus intentos.
- c) A força do sertanejo nunca se revela, tamanha a preguiça do sertanejo.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

**03.** Assinale a alternativa correta quanto as expressões utilizadas pelo autor para comparar o sertanejo a Hércules:

- a) Ombros possantes, olhar desassombrado, aspecto dominador de um titã.
- b) Ombros possantes, olhar desassombrado, aspecto submisso.
- c) Ombros possantes, olhar assombrado, aspecto dominador de um titã.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

**04.** Identifique a alternativa correta quanto as expressões utilizadas pelo autor para comparar o sertanejo a Quasímodo:

- a) Desgracioso, desengonçado, reto, andar sem firmeza.
- b) Desgracioso, desengonçado, torto, andar com firmeza.
- c) Desgracioso, desengonçado, torto, andar sem firmeza.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

**05.** Assinale a alternativa correta quanto ao tipo de preconceito que pode ser percebido no discurso do autor:

- a) Preconceitos relacionados ao aspecto social.
- b) Preconceitos relacionados ao aspecto físico.
- c) Preconceitos relacionados ao aspecto intelectual.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

**06.** Identifique a alternativa correta em que todas as palavras são formadas por derivação parassintética:

- a) Emudecer; subterrâneo; empalidecer; envergonhar.
- b) Alistar; dentista; jogador; refresco.
- c) Realizar; esfarelar; incapaz; felizmente.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

**07.** Assinale a alternativa correta em que todas as palavras são formadas de composição por justaposição:

- a) Vaivém, pnalta; cor-de-rosa; televisão.
- b) Planalto; vaivém, embora; girassol.
- c) Micróbio; sempre-viva; vaivém; passatempo.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

**08.** Identifique a alternativa correta quanto a Oração Subordinada Adverbial Temporal:

- a) Quanto maior for a altura, maior será o tombo.
- b) “Nem bem sentou-se no banco, o moço ergueu-se rápido.” (J. Fonseca Fernandes).
- c) “Fiz-lhe sinal que se calasse.” (Machado de Assis).
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

**09.** Assinale a alternativa correta quanto a Oração Coordenada Sindética Adversativa:

- a) Tens razão, contudo não te exaltes.
- b) A doença vem a cavalo e volta a pé.
- c) Venha agora ou perderá a vez.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

**10.** Identifique a alternativa correta quanto a concordância verbal:

- a) Um bloco de foliões animavam o centro da cidade.
- b) O exército dos aliados desembarcaram na Itália.
- c) A multidão vociferava ameaças.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

**11.** Assinale a alternativa correta quanto a regência do verbo agradecer:

- a) José era chefe do departamento pessoal e vários funcionários sentiam prazer em agradecer-lhe.
- b) José era chefe do departamento pessoal e vários funcionários sentiam prazer em agradá-lo.
- c) José era chefe do departamento pessoal e vários funcionários sentiam prazer em agradecer.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

**12.** Assinale a alternativa correta quanto a regência nominal da palavra amor:

- a) Maria morria de amor pelo Xavier.
- b) Maria morria de amar pelo Xavier.
- c) Maria morria de amores pelo Xavier.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

13. Identifique a alternativa correta quanto ao emprego adequado da vírgula:

- a) O dinheiro, Jaime o trazia escondido nas mangas do paletó.
- b) O dinheiro Jaime o trazia, escondido nas mangas do paletó.
- c) O dinheiro Jaime o trazia escondido, nas mangas do paletó.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

Leia o texto a seguir e responda às questões de 14 à 16.

Ai, dona fea! Fostes-vos queixar porque vos nunca louv'en em meu trobar mais ora quero fazer un cantar en que vos loarei toda via; e vedes como vos quero loar: dona fea, velha e sandia!

Dona fea, se Deus mi pardon, pois avedes (a) tan gran coraçõ que vos eu loe, en esta razon vos quero já loar toda via; e vedes qual será a loaçõ: dona fea, velha e sandia!

Dona fea, nunca vos eu loei en meu trobar, pero muito trobei; mais ora já un bon cantar farei, en que vos loarei toda via; e direi-vos como vos loarei: dona fea, velha e sandia!

*Joan Garcia de Guilhade*

14. Assinale a alternativa correta quanto ao modo com o qual o eu lírico se refere a mulher para quem canta:

- a) Como vos quero loar.
- b) Tan gran coraçõ.
- c) Dona fea.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

15. Identifique a alternativa correta quanto a resposta da queixa feita pela mulher:

- a) Devido ao eu lírico ter feito uma cantiga para louvá-la que não foi de seu agrado.
- b) Devido ao eu lírico nunca ter feito uma cantiga para louvá-la, para declarar-lhe sua admiração.
- c) Devido ao eu lírico nunca ter feito uma cantiga para louvá-la, por falta de admiração.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

16. Assinale a alternativa correta quanto a mulher ao qual o eu lírico se refere:

- a) É possível saber sua identidade, visto que ela é mencionada a todo momento.
- b) É possível saber sua identidade, embora seu nome não seja mencionado.
- c) Não é possível saber sua identidade, pois seu nome não é mencionado.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

### Conhecimentos Específicos

17. Considere as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta:

**I** – A artéria mesentérica inferior, após ter origem da artéria cólica esquerda, tem trajeto descendente verticalmente em situação retroperitoneal, cruzando a artéria e veia ilíaca esquerda, emitindo a artéria sacral média e artéria retal inferior.

**II** – A comunicação entre a artéria cólica média e artéria cólica esquerda recebe o nome de arcada de Riolan.

**III** – O reto é totalmente revestido de serosa no seu terço superior e no seu terço inferior é totalmente desprovido de serosa, bem como o canal anal.

**IV** – O sigmóide, último segmento do cólon, em geral mede 20 cm de extensão, é parcialmente revestido pelo peritônio, com um meso bastante longo, o que lhe confere mobilidade.

**V** – No cólon, o ponto crítico de Griffith e o ponto crítico de Sudeck correspondem a pontos de descontinuidade das artérias marginais que podem ser sede de isquemia.

- a) I, II e III estão corretas.
- b) II, III e V estão corretas.
- c) I, III, IV e V estão corretas.
- d) Todas estão corretas, com exceção da afirmação I.

18. Assinale a alternativa incorreta:

- a) O anoderma é revestido por tecido epitelial de revestimento pavimentoso estratificado não queratinizado e apresenta intensa sensibilidade servindo de transmissor de estímulos dolorosos até o sistema nervoso central.
- b) O esfíncter anal externo possuem fibras formadas por musculatura estriada, em continuação dos músculos elevadores do ânus e, morfológicamente, é constituído por 3 segmentos: profundo, superficial e subcutâneo.
- c) O músculo puborretal é formado por fibras de musculatura estriada, se fixa nos lados do púbis e segue em direção à ampola retal, envolvendo o reto em sua parte ântero-lateral, na altura da linha anorretal, formando angulação de 45°.
- d) A motilidade colônica adequada é controlada pelo sistema nervoso intrínseco e extrínseco e pela ação de vários hormônios estimuladores (gastrina, colecistoquinina, substância P, encefalinas) e inibidores (glucagon, peptídeo intestinal vasoativo e secretina).

19. Em relação à Diverticulite, considere as afirmações e assinale a alternativa correta:

- a) Na sua forma hipertônica, a população jovem é mais acometida, o cólon descendente e o sigmóide são as regiões de localização e a complicação mais freqüente é a hemorragia.
- b) Na sua forma hipotônica, a população afetada é acima de 50 anos, todo o cólon é acometido e a complicação mais freqüente é a inflamação.
- c) Quando a dor é o sintoma preponderante, ela costuma ser do tipo cólica, é referida no quadrante inferior e superior esquerdo do abdômen e o tratamento de escolha é o uso de tramadol, visto que diminui a pressão intraluminal.
- d) Em relação aos exames adicionais, o enema opaco deve ser evitado na fase aguda, bem como o estudo endoscópico do cólon, pelo risco de peritonite por bário no primeiro ou perfuração, no segundo.

20. A manifestação anorretal do secundarismo sífilítico se caracteriza por:

- a) Condiloma hiperplásico.
- b) Condiloma escamoso.
- c) Condiloma lata.
- d) Condiloma papulomatoso.

21. Os adenomas colorretais são neoplasias epiteliais benignas constituídas de epitélio glandular anormal do intestino grosso. Em relação a sua classificação, o adenoma tubular, correspondendo a 75% de todos os pólipos neoplásicos, é constituído por:

- a) 50% de tecido viloso.
- b) 0 a 25% de tecido viloso.
- c) 75 a 100% de tecido viloso.
- d) 25 a 75% de tecido viloso.

22. Considere as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta:

**I** – Os pólipos pediculados tem aspecto morfológico de cogumelo e frequentemente ultrapassam 4 cm de diâmetro.

**II** – Os pólipos sésseis crescem de forma plana na mucosa e podem ocupar até toda a circunferência do intestino grosso.

**III** – Os pólipos colorretais são classificados de acordo com o seu tipo histológico em: neoplásicos, hiperplásicos, inflamatórios e hamartomatosos.

**IV** – Os pólipos juvenis caracterizam-se morfológicamente pelo aspecto rosado, arredondado, de consistência dura e geralmente não pediculado.

- a) II e III estão corretas.
- b) Todas estão corretas.
- c) Todas estão corretas, exceto IV.
- d) Todas estão corretas, exceto I.

23. A Síndrome de Gardner se caracteriza por:

- a) Afecção autossômica recessiva devido a mutações no gene APC, bandas 7p22 e 3p21, cujo quadro clínico se caracteriza por adenomas no cólon que frequentemente se malignizam ao redor dos 30 anos.
- b) Afecção hereditária autossômica dominante causada por mutações na linhagem germinativa do gene supressor tumoral STK11, cujo quadro clínico se caracteriza por pólipos hamartomatosos intestinais associados a máculas melanocíticas cutâneo mucosas.
- c) Síndrome autossômica dominante causada por mutações no gene PTEN, cujo quadro clínico se caracteriza por pólipos hamartomatosos e hiperplásicos em todo o trato gastrointestinal principalmente entre 10 e 30 anos de idade.
- d) Síndrome causada por mutações da linhagem germinativa no gene APC, na banda 5q21-22, cujo quadro clínico se caracteriza pelo desenvolvimento de pólipos adenomatosos em todo o trato gastrointestinal com alto risco de malignidade.

24. Atualmente, admite-se uma associação do papilomavírus humano (HPV), especialmente o subtipo 16 e 18, no desenvolvimento do câncer do canal anal. Correlacionando a agressividade do HPV 16 em relação ao HPV 18 e o mecanismo de virulência do HPV 16, assinale a alternativa correta:

- a) O HPV 16 é mais agressivo, tendo como mecanismo de virulência a produção da proteína E9 que ativa p53, descontrola o ciclo celular, aumenta as concentrações de p21, complexo CDK2/ciclinaE inativo, complexo pRb/E2F defosforilado, a célula com DNA danificado passa da fase G1 para a fase S.
- b) O HPV 16 é mais agressivo, tendo como mecanismo de virulência a produção da proteína E7 que inativa pRb impedindo ela de se complexar com o complexo E2F, E2F permanece ativo, a célula com DNA danificado passa da fase G1 para a fase S.
- c) O HPV 16 é mais agressivo, tendo como mecanismo de virulência a produção da proteína E6 que inativa p53, diminuindo as concentrações de p21, complexo CDK2/ciclinaE ativo que fosforila pRb/E2F, E2F é liberado, a célula com DNA danificado passa da fase G1 para S.
- d) O HPV 16 é menos agressivo, tendo como mecanismo de virulência a produção da proteína E10 que inativa p53, aumentando as concentrações de p21, complexo CDK2/ciclinaE ativo que fosforila pRb/E2F, E2F liberado, a célula com DNA danificado passa da fase G1 para S.

25. Paciente do sexo feminino, 44 anos de idade, que se encontrava em pós-operatório tardio de transplante renal (10 anos), fazendo uso de medicações imunossupressoras. Apresenta quadro de dor abdominal, perda de peso e diarreia não sanguinolenta, necessitando de hospitalização, durante a qual desenvolveu severos quadros de hematoquezia e hipotensão. Submetida a colonoscopia que revelou mucosa de aspecto friável, com úlceras do tipo aftóides, fibrina e formação de pseudopólipos; a biópsia revelou tratar-se de citomegalovírus. Considerando o marcador microscópico da colite por citomegalovírus, assinale a alternativa incorreta em relação à característica histológica:

- a) Ulceração da mucosa.
- b) Hemorragia sub-epitelial.
- c) Intenso infiltrado neutrofílico e linfocítico.
- d) Inclusões virais Cowdry A.

26. Após os adenomas, a neoplasias benignas mais comumente encontradas no intestino grosso, em especial no ceco e sob a forma de lesões múltiplas solitárias, com incidência maior no sexo feminino, são:

- a) Lipomas.
- b) Tumores carcinóides.

- c) Fibromas.
- d) Papilomas.

27. Entre as desordens metabólicas que geram constipação intestinal podemos citar, exceto:

- a) Hipopotassemia.
- b) Hipercalemia.
- c) Uremia.
- d) Alcalose.

28. Paciente de 73 anos refere, há cerca de 40 horas, história de dor abdominal, parada de eliminação de gases e fezes, grande distensão abdominal e vômitos tardios. Dentre as hipóteses diagnósticas, aquelas compatíveis com o quadro clínico descrito são:

- a) Volvo de ceco, angiodisplasia, fecaloma.
- b) Câncer de sigmóide, diverticulite, angiodisplasia.
- c) Fecaloma, hérnia epigástrica encarcerada, distúrbio hidroeletrólítico.
- d) Câncer de sigmóide, volvo de ceco, pancreatite aguda.

29. Paciente apresentando, há 15 horas, volvo de cólon sigmóide com válvula ileocecal competente. O local onde frequentemente ocorrem perfurações é o:

- a) Cólon transverso.
- b) Ceco.
- c) Cólon ascendente.
- d) Ângulo hepático.

30. Num paciente idoso, hipertenso descontrolado e com cardiopatia isquêmica sintomática, que apresenta obstrução intestinal no nível do cólon sigmóide e acentuada distensão do ceco (>13cm), o cirurgião deve optar preferencialmente por:

- a) Colostomia proximal à lesão obstrutiva.
- b) Colectomia total.
- c) Colectomia esquerda com operação de Hartmann.
- d) Colectomia esquerda com anastomose primária.

31. Considere as afirmações e assinale a alternativa correta:

I - Lesões inerentes ao intestino posterior embrionário acometem o cólon esquerdo e o reto na fase adulta, raramente originando a síndrome carcinóide, por produzirem muita serotonina.

II - A maioria dos tumores carcinóides cólicos são encontrados no cólon esquerdo.

III - Aproximadamente 50% dos tumores carcinóides do reto provocam sintomas, principalmente sangramento, constipação, dor e prurido anal.

IV - Detectados pela colonoscopia, tumores com diâmetro inferior a 2 cm e pediculados podem ser removidos por polipectomia.

V - Os tumores carcinóides são neoplasias do sistema celular neuroendócrino difuso.

- a) Somente II está incorreta.
- b) Somente I está incorreta.
- c) Somente III, IV e V estão corretas.
- d) Todas estão corretas.

32. A isquemia intestinal crônica se apresenta por:

- a) Dores em "salva" na região alta do abdome irradiada para a fossa ilíaca direita e prisão de ventre.
- b) Dor abdominal pós-prandial, perda de peso e diarreia.
- c) Dor abdominal irradiada para a região genital, fezes escuras e úlceras intestinais.
- d) Dor abdominal contínua no hipocôndrio direito com fezes brancas e escuras, alternadamente.

33. O procedimento de escolha em um paciente portador de Síndrome de Ogilvie, sem perfuração intestinal, é:

- a) Cecostomia tubular.
- b) Transversostomia em alça.
- c) Retossigmoidoscopia descompressiva.
- d) Colonoscopia descompressiva.

34. Em relação à doença intestinal inflamatória, pode-se afirmar que:

- a) A histopatologia fornece diagnóstico de certeza do tipo de doença intestinal inflamatória.
- b) Perda de peso e anemia são mais comuns na retocolite ulcerativa de que na doença de Crohn.
- c) Primeira crise da doença de Crohn pode mimetizar apendicite aguda.
- d) Acometimento transmural de parede intestinal é uma das características da retocolite ulcerativa.

35. Dentre as indicações de cirurgia no manejo da doença de Crohn, estão incluídas, exceto:

- a) Fístula entero-vesical.
- b) Fístula íleo-ascendente.
- c) Fístula entero-vaginal.
- d) Obstrução intestinal.

36. Uma criança de 3 anos de idade está sendo investigada devido à síndrome de má absorção. O exame parasitológico de fezes foi positivo para uma determinada verminose. Este quadro pode ser devido a:

- a) Giardíase.
- b) Amebíase.
- c) Balantídiase.
- d) Ascaridíase.

37. Em relação à fissura anal, assinale a alternativa incorreta:

- a) No diagnóstico diferencial devem ser consideradas algumas patologias como a ulceração da sífilis primária, doença de Crohn e tuberculose do canal anal.
- b) Na fissura anal crônica há perpetuação da hipertonia do esfíncter anal externo.
- c) Lesão ulcerada posterior acompanhada por plicoma sentinela e papila hipertrófica (interna) caracteriza a tríade fissurária.
- d) A fissura anal pode infeccionar formando abscesso inter-esfíncteriano ou perianal. Se o abscesso drenar espontaneamente, produz uma fístula baixa.

38. O megacólon tóxico ocorre mais frequentemente associado a:

- a) Colite pseudomembranosa.
- b) Megacólon chagásico.
- c) Doença de Crohn.
- d) Retocolite ulcerativa.

39. Paciente feminina, 56 anos, hospitalizada com dor importante no quadrante inferior esquerdo do abdome. Ao exame físico apresenta-se hipertensa, taquicárdica, febril e com discreta distensão abdominal com reação peritoneal localizada. Assinale a alternativa que inclui o mais adequado exame complementar a ser solicitado, a provável hipótese diagnóstica e a melhor opção terapêutica inicial:

- a) Enema opaco; diverticulite; operação de Hartmann.
- b) Enema opaco; tumor de sigmóide perfurado; sigmoidectomia e anastomose primária.
- c) Colonoscopia ou enema opaco; tumor de sigmóide perfurado; retossigmoidectomia e anastomose primária com coloscopia em alça de transversa.
- d) Radiografia simples de abdome, ultra-som e/ou tomografia sem contraste; diverticulite; jejum, hidratação e antibioticoterapia sistêmica.

40. Infarto enteromesentérico resultante da obstrução da artéria mesentérica superior a nível de sua saída imediata da aorta, causa:

- a) Necrose que se estende do ângulo de Treitz até o cólon sigmóide.
- b) Necrose que se estende desde o jejuno proximal até a transição do reto com o canal anal.
- c) Necrose que se estende desde o jejuno proximal até a metade proximal do cólon transversa.
- d) Necrose que se estende desde a metade distal do cólon transversa até o reto, na sua porção intraperitoneal.