



**P.M. Barueri**  
**Concurso Público 01/2012**

INSTITUIÇÃO  
**SOLER**  
DE ENSINO

**CARGO:**  
**MÉDICO PSIQUIATRA**

**INSCRIÇÃO Nº:** \_\_\_\_\_

**ASSINATURA DO CANDIDATO:**

\_\_\_\_\_



## **Cargo: Médico Psiquiatra**

### **Língua Portuguesa**

Leia o texto a seguir e responda às questões de 01 à 05:

#### O sertanejo (III) – Os sertões

O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral.

A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas.

É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules-Quasímodo, reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. O andar sem firmeza, sem aprumo, quase gingante e sinuoso, aparenta a translação de membros desarticulados. Agrava-o a postura normalmente abatida, num manifestar de displicência que lhe dá um caráter de humildade deprimente. A pé, quando parado, recosta-se invariavelmente ao primeiro umbral ou parede que encontra; a cavalo, se sofria o animal para trocar duas palavras com um conhecido, cai logo sobre um dos estribos, descansando sobre a espenda da sela. Caminhando, mesmo a passo rápido, não traça trajetória retilínea e firme. Avança celeremente, num bambolear característico, de que parecem ser o traço geométrico os meandros das trilhas sertanejas. E se na marcha estaca pelo motivo mais vulgar, para enrolar um cigarro, bater o isqueiro, ou travar ligeira conversa com um amigo, cai logo — cai é o termo — de cócoras, atravessando largo tempo numa posição de equilíbrio instável, em que todo o seu corpo fica suspenso pelos dedos grandes dos pés, sentado sobre os calcanhares, com uma simplicidade a um tempo ridícula e adorável.

É o homem permanentemente fatigado.

Reflete a preguiça invencível, a atonia muscular perene, em tudo: na palavra remorada, no gesto contrafeito, no andar desaprumado, na cadência langorosa das modinhas, na tendência constante à imobilidade e à quietude.

Entretanto, toda esta aparência de cansaço ilude. Nada é mais surpreendedor do que vê-la desaparecer de improviso. Naquela organização combatida operam-se, em segundos, transmutações completas. Basta o aparecimento de qualquer incidente exigindo-lhe o desencadear das energias adormecidas. O homem transfigura-se. Empertiga-se, estadeando novos relevos, novas linhas na estatura e no gesto; e a cabeça firma-se-lhe, alta, sobre os ombros possantes aclarada pelo olhar desassombrado e forte; e corrigem-se-lhe, prestes, numa descarga nervosa instantânea, todos os efeitos do relaxamento habitual dos órgãos; e da figura vulgar do tabaréu canhestro reponta, inesperadamente, o aspecto dominador de um titã acobreado e potente, num desdobramento surpreendente de força e agilidade extraordinárias.

*Euclides da Cunha*

**01.** Assinale a alternativa correta que indica uma contradição à expressão inicial do autor “O sertanejo é, antes de tudo, um forte.”:

- a) Indica uma pessoa acomodada, reafirmando a expressão inicial do autor.
- b) Indica uma pessoa trabalhadora, afirmando a expressão inicial do autor.
- c) Indica uma pessoa preguiçosa, contrariando a ideia de que ele é um forte.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

**02.** Identifique a alternativa correta quanto a situação em que a força do sertanejo se revela:

- a) Quando precisa, embora raramente aconteça.
- b) Quando aparece um incidente que exigisse dele algum tipo de reação e mudança de gestos, tornando-se um gigante ágil e determinado na realização de seus intentos.
- c) A força do sertanejo nunca se revela, tamanha a preguiça do sertanejo.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

**03.** Assinale a alternativa correta quanto as expressões utilizadas pelo autor para comparar o sertanejo a Hércules:

- a) Ombros possantes, olhar desassombrado, aspecto dominador de um titã.
- b) Ombros possantes, olhar desassombrado, aspecto submisso.
- c) Ombros possantes, olhar assombrado, aspecto dominador de um titã.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

**04.** Identifique a alternativa correta quanto as expressões utilizadas pelo autor para comparar o sertanejo a Quasímodo:

- a) Desgracioso, desengonçado, reto, andar sem firmeza.
- b) Desgracioso, desengonçado, torto, andar com firmeza.
- c) Desgracioso, desengonçado, torto, andar sem firmeza.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

**05.** Assinale a alternativa correta quanto ao tipo de preconceito que pode ser percebido no discurso do autor:

- a) Preconceitos relacionados ao aspecto social.
- b) Preconceitos relacionados ao aspecto físico.
- c) Preconceitos relacionados ao aspecto intelectual.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

**06.** Identifique a alternativa correta em que todas as palavras são formadas por derivação parassintética:

- a) Emudecer; subterrâneo; empalidecer; envergonhar.
- b) Alistar; dentista; jogador; refresco.
- c) Realizar; esfarelar; incapaz; felizmente.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

**07.** Assinale a alternativa correta em que todas as palavras são formadas de composição por justaposição:

- a) Vaivém, pernalta; cor-de-rosa; televisão.
- b) Planalto; vaivém, embora; girassol.
- c) Micróbio; sempre-viva; vaivém; passatempo.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

**08.** Identifique a alternativa correta quanto a Oração Subordinada Adverbial Temporal:

- a) Quanto maior for a altura, maior será o tombo.
- b) “Nem bem sentou-se no banco, o moço ergueu-se rápido.” (J. Fonseca Fernandes).
- c) “Fiz-lhe sinal que se calasse.” (Machado de Assis).
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

**09.** Assinale a alternativa correta quanto a Oração Coordenada Sindética Adversativa:

- a) Tens razão, contudo não te exaltes.
- b) A doença vem a cavalo e volta a pé.
- c) Venha agora ou perderá a vez.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

**10.** Identifique a alternativa correta quanto a concordância verbal:

- a) Um bloco de foliões animavam o centro da cidade.
- b) O exército dos aliados desembarcaram na Itália.
- c) A multidão vociferava ameaças.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

**11.** Assinale a alternativa correta quanto a regência do verbo agradecer:

- a) José era chefe do departamento pessoal e vários funcionários sentiam prazer em agradecer-lhe.
- b) José era chefe do departamento pessoal e vários funcionários sentiam prazer em agradá-lo.
- c) José era chefe do departamento pessoal e vários funcionários sentiam prazer em agradecer.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

**12.** Assinale a alternativa correta quanto a regência nominal da palavra amor:

- a) Maria morria de amor pelo Xavier.
- b) Maria morria de amar pelo Xavier.
- c) Maria morria de amores pelo Xavier.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

13. Identifique a alternativa correta quanto ao emprego adequado da vírgula:

- a) O dinheiro, Jaime o trazia escondido nas mangas do paletó.
- b) O dinheiro Jaime o trazia, escondido nas mangas do paletó.
- c) O dinheiro Jaime o trazia escondido, nas mangas do paletó.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

Leia o texto a seguir e responda às questões de 14 à 16.

Ai, dona fea! Fostes-vos queixar  
porque vos nunca louv'en em meu trobar  
mais ora quero fazer un cantar  
en que vos loarei toda via;  
e vedes como vos quero loar:  
dona fea, velha e sandia!

Dona fea, se Deus mi pardon,  
pois avedes (a) tan gran coraçõn  
que vos eu loe, en esta razon  
vos quero já loar toda via;  
e vedes qual será a loaçõn:  
dona fea, velha e sandia!

Dona fea, nunca vos eu loei  
en meu trobar, pero muito robei;  
mais ora já un bon cantar farei,  
en que vos loarei toda via;  
e direi-vos como vos loarei:  
dona fea, velha e sandia!

*Joan Garcia de Guilhade*

14. Assinale a alternativa correta quanto ao modo com o qual o eu lírico se refere a mulher para quem canta:

- a) Como vos quero loar.
- b) Tan gran coraçõn.
- c) Dona fea.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

15. Identifique a alternativa correta quanto a resposta da queixa feita pela mulher:

- a) Devido ao eu lírico ter feito uma cantiga para louvá-la que não foi de seu agrado.
- b) Devido ao eu lírico nunca ter feito uma cantiga para louvá-la, para declarar-lhe sua admiração.
- c) Devido ao eu lírico nunca ter feito uma cantiga para louvá-la, por falta de admiração.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

16. Assinale a alternativa correta quanto a mulher ao qual o eu lírico se refere:

- a) É possível saber sua identidade, visto que ela é mencionada a todo momento.
- b) É possível saber sua identidade, embora seu nome não seja mencionado.
- c) Não é possível saber sua identidade, pois seu nome não é mencionado.
- d) Nenhuma das alternativas está correta.

### Conhecimentos Específicos

17. Um paciente de 35 anos de idade chega ao pronto-socorro com tremores e irritabilidade. A família diz que ele faz uso de álcool desde os 18 anos de idade, mas estava tentando parar, já que a esposa saiu de casa por conta do etilismo do marido. Repentinamente o paciente inicia quadro convulsivo. Qual o melhor tratamento indicado ao caso:

- a) Glicose hipertônica EV, hidratação e Diazepam 10 mg VO e observação hospitalar.
- b) Tiamina, Glicose hipertônica EV, Diazepam 20mg VO e alta hospitalar.
- c) Internação em unidade intensiva, tiamina e hidratação e Diazepam 20 mg VO.
- d) Internação em unidade intensiva, Glicose hipertônica EV e Diazepam 10 mgVO.

18. Com relação à Doença de Alzheimer, analise as afirmativas a seguir:

I. A doença de Alzheimer deve ser tratada com inibidores da colinesterase com boa resposta comportamental e no relacionamento paciente-familiares, podendo ser responsável pela cura da doença a longo prazo.

II. Nas fases mais avançadas o paciente evolui para um déficit cognitivo grave, apatia e incapacidade de deambulação.

III. Trata-se de uma demência do tipo cortical, especialmente dos lobos parietal e temporal, hipocampo e núcleo basal de Meynert.

Está correto o que se afirma em:

- a) I.
- b) I e II.
- c) II e III.
- d) I, II e III.

19. Paciente de 56 anos, dependente alcoólico, hepatopata grave, apresenta quadro de rebaixamento do nível de consciência, desorientação, alucinações táteis e visuais, tremores, taquicardia, elevação da pressão arterial e da temperatura corporal, iniciados hoje. Há 3 dias não usa bebida alcoólica. Qual a melhor conduta frente ao caso:

- a) Diazepam, 60mg/dia e haloperidol, 5mg/dia.
- b) Tioridazina, 25 a 50mg de 8/8horas.
- c) Lorazepam, até 12mg/dia e haloperidol, 5mg/dia.
- d) Naloxone, 1 ampola endovenoso.

20. Alterações quantitativas e qualitativas da sensopercepção ocorrem comumente na prática diária psiquiátrica. Sobre o tema, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Desrealização é a sensação do paciente que seu corpo não lhe pertence.
- b) Ilusão é a percepção deformada da realidade, de um objeto real e presente, uma interpretação errônea do que existe.
- c) Alucinoses são quadros alucinatórios sem perda da consciência da realidade, acontecendo em quadros de alcoolismo.
- d) Alucinação é a percepção real de um objeto inexistente, ou seja, sem um estímulo externo.

21. O *delirium* é um transtorno muito frequente, principalmente em pacientes internados. Sobre esta entidade, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Caracteriza-se por rebaixamento súbito do nível de consciência, comprometimento da atenção, distúrbios da percepção, com início abrupto dos sintomas e flutuação ao longo do dia, tendendo a piorar à noite.
- b) São causas extracranianas de *delirium*: deficiência de tiamina, hipoglicemia e infecções sistêmicas.
- c) O principal objetivo do tratamento do *delirium* é alcançado com neurolépticos de alta potencia e baixa interferência em parâmetros visuais (haloperidol).
- d) Um diagnóstico diferencial importante é mania, porém este não tem alteração da consciência.

22. Assinale a alternativa que contenha a associação correta entre o agente tóxico e seu antidoto específico:

- a) Atropina – flumazenil.
- b) Benzodiazepínicos – naloxone.
- c) Metanol – atropina.
- d) Cianeto – nitrito de sódio.

23. Em relação aos transtornos somatoformes, dissociativos e factícios, analise as afirmativas a seguir:

I. Na simulação, a produção de sintomas é voluntária e o ganho secundário está presente.

II. No transtorno factício, a produção de sintomas é involuntária e o ganho secundário está presente.

III. No transtorno somatoforme, a produção de sintomas é voluntária e o ganho secundário está ausente.

Está correto o que se afirma em:

- a) I.
- b) I e II.
- c) II e III.
- d) I, II e III.

**24.** Com relação à Doença de Alzheimer, analise as afirmativas a seguir:

I. O donepezil, por ter baixa toxicidade hepática e por ser administrado uma vez ao dia é muito utilizado no tratamento da doença de Alzheimer.

II. A tacrina é um anticolinesterásico periférico com menor taxa de hepatotoxicidade dentre este grupo de fármacos.

III. Os antioxidantes, como vitamina E e seleginina, não tiveram impacto significativo sobre a redução da institucionalização e aumento da sobrevida nos trabalhos duplo-cegos recentemente publicados.

Está correto o que se afirma em:

- a) I.
- b) I e II.
- c) II e III.
- d) I, II e III.

**25.** Em relação ao diagnóstico diferencial entre *delirium* e demência, assinale a alternativa que representa característica em comum das duas entidades:

- a) Consciência preservada.
- b) Pensamento desorganizado.
- c) Alucinações são comuns.
- d) Memória recente prejudicada.

**26.** O *delirium tremens* é uma forma mais intensa e complicada da abstinência alcoólica. Sobre esta entidade, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Um traço comum, mas nem sempre presente, no *delirium tremens* é a presença de alucinações táteis e visuais.
- b) É uma condição potencialmente fatal, especialmente em dias quentes e pacientes debilitados, sendo o óbito atribuído ao distúrbio hidroeletrólítico.
- c) Geralmente inicia-se entre 1 e 4 dias após a interrupção do uso do álcool, durando até 3 ou 4 dias.
- d) O tratamento inclui o uso de um benzodiazepínico (diazepam – 60mg/dia, se hepatopata grave) e haloperidol, 5mg/dia.

**27.** A síndrome de Wernicke-Korsakoff (síndrome amnésica) cursa com ataxia, confusão mental e anormalidade de movimentação ocular extrínseca. O tratamento desta síndrome deve ser feito com:

- a) Vitamina B6.
- b) Glicose hipertônica endovenosa.
- c) Vitamina B1.
- d) Dopamina.

**28.** A depressão é uma doença do “organismo inteiro” que compromete o físico, o humor e em consequência, o pensamento. Sobre a depressão, analise as afirmativas a seguir:

I. Aproximadamente a metade dos pacientes terá episódios repetitivos de crise e precisará de tratamento contínuo.

II. Cerca de 15 a 20% dos pacientes depressivos cometem tentativa de suicídio.

III. A taxa de recorrência para aqueles que se recuperam do primeiro episódio fica ao redor de 35% dentro de 2 anos, e cerca de 60% dentro de 12 anos.

Está correto o que se afirma em:

- a) I.
- b) I e II.
- c) II e III.
- d) I, II e III.

**29.** Estado depressivo leve e prolongado, com 2 anos de período contínuo predominantemente depressivo, em que o humor pode ser irritável em vez de depressivo, classifica-se como:

- a) Depressão atípica.
- b) Disforia.
- c) Ciclotimia.
- d) Distímia.

**30.** Em relação ao diagnóstico diferencial entre depressão e mania, assinale a alternativa que representa característica em comum das duas entidades:

- a) Atenção diminuída.
- b) Ideação suicida comum.

- c) Pensamento acelerado.
- d) Ideias de culpa ou ruína.

**31.** O transtorno obsessivo-compulsivo consiste na combinação de obsessões e compulsões. Sobre esta doença, analise as afirmativas a seguir:

I. Exibe 2 picos de incidência, o 1º na infância, e o 2º em torno dos 30 anos de idade.

II. O paciente exibe perda do juízo crítico, não percebendo o absurdo ou exagero do que está se passando.

III. O tratamento é realizado com antidepressivos, sendo a 1ª escolha a clomipramina. No início, deve-se evitar a associação com benzodiazepínicos, sob pena de piora dos sintomas.

Está correto o que se afirma em:

- a) I.
- b) I e II.
- c) II e III.
- d) I, II e III.

**32.** A demência é um síndrome progressiva que apresenta múltiplos comprometimentos da função cognitiva. As 3 características principais da demência são, EXCETO:

- a) Esquecimento ou problemas com a memória.
- b) Quadro insidioso, sendo os déficits de memória os últimos a surgirem.
- c) Problemas de comportamento (agitação, insônia, choro fácil, comportamentos inadequados).
- d) Perda das habilidades adquiridas durante a vida (dirigir, vestir a roupa, cozinhar, etc).

**33.** Em relação ao transtorno afetivo bipolar, analise as afirmativas a seguir:

I. A depressão do transtorno bipolar é igual a depressão comum, assim como o tratamento é realizado da mesma forma.

II. O tratamento da fase maníaca é realizado com estabilizadores do humor; na presença de agitação e psicose, deve-se associar um antipsicótico.

III. As principais características da fase maníaca são diminuição do sono, hiperatividade, ideias de grandiosidade e sintomas psicóticos.

Está correto o que se afirma em:

- a) I.
- b) I e II.
- c) II e III.
- d) I, II e III.

**34.** Em relação ao Transtorno de Pânico, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) As crises de ansiedade no pânico duram até 10 minutos e costumam ser inesperadas, podendo surpreender o paciente em ocasiões inesperadas.
- b) O tratamento deve ser realizado com antidepressivos, tricíclicos ou inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Deve-se evitar a associação com benzodiazepínicos de ação rápida sob o risco de piora das crises.
- c) Alguns desenvolvem o episódio de pânico diante de situações pré-conhecidas, como dentro de transportes públicos. Nestes casos, dizemos que o transtorno de pânico é acompanhado de agorafobia, sendo 2 vezes mais prevalente em mulheres.
- d) O transtorno de pânico habitualmente se inicia depois dos 20 anos de idade, acometendo igualmente homens e mulheres, na plenitude da vida profissional.

**35.** Em relação à anorexia nervosa, analise as afirmativas a seguir:

I. É marcante a perda de peso dos pacientes (ou a manutenção de um peso abaixo do normal), assim como acontece na bulimia nervosa.

II. Hábito comum entre os anoréxicos consiste em uma obsessão por estocar/guardar comida.

III. Mais de 90% dos casos de anorexia nervosa acontecem em mulheres.

Está correto o que se afirma em:

- a) I.
- b) I e II.

- c) II e III.
- d) I, II e III.

36. Paciente de 27 anos chega ao setor de emergência trazidas pelas colegas da igreja. Elas dizem que a paciente mudou muito, fica o tempo inteiro limpando o apartamento e o marido diz que ela dorme 2 horas por noite. Nos cultos, fala alto e quer chamar a atenção quando o pastor está falando. Sempre foi uma mulher tímida e que respeitava o marido, mas desde que isso ocorreu, há 3 semanas, convida colegas do culto para sair e está usando roupas muito decotadas. Contam, ainda, que há cerca de 2 anos, a paciente teve quadro depressivo, em que ficou 2 semanas sem sair de casa, o que melhorou espontaneamente. Qual o tratamento indicado ao caso:

- a) Antidepressivos associados com benzodiazepínicos.
- b) Benzodiazepínicos apenas.
- c) Antipsicóticos para conter a agitação e posteriormente um estabilizador de humor.
- d) Antidepressivos tricíclicos.

37. Paciente com quadro de excessiva devoção ao trabalho em detrimento da família e atividades de lazer, relutância em desfazer-se de objetos por achar que serão úteis algum dia, indecisão constante prejudicando seu próprio trabalho ou estudo, consciência e escrúpulo excessivos em relação às normas sociais, configura transtorno de personalidade do tipo:

- a) Antissocial.
- b) Esquizoide.
- c) Anancástico.
- d) Paranoide.

38. Em relação aos transtornos somatoformes, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) A característica principal é a presença de sintomas físicos que sugerem alguma doença orgânica ou física e que são produzidos intencionalmente.
- b) O ganho secundário geralmente está ausente.
- c) O transtorno é mais comum entre as mulheres e se inicia geralmente na vida adulta, após os 30 anos.
- d) Dependência e abuso de sedativos e analgésicos são bastante frequentes.

39. A agitação psicomotora é a emergência mais comum em psiquiatria, caracterizando-se por atividade motora excessiva, associada a um sentimento de tensão interna. Sobre o tema, analise as afirmativas a seguir:

I. Quando a etiologia está relacionada à psicose ou síndrome maníaca, ocorrem delírios, alucinações, discurso desconexo e incoerente, diminuição da atenção, irritabilidade e aumento da atividade motora.

II. A posição mais indicada para a contenção do paciente agitado é a lateral, com a cabeça levemente elevada.

III. Na maioria dos casos, a sedação é realizada com diazepam intramuscular.

Está correto o que se afirma em:

- a) I.
- b) I e II.
- c) II e III.
- d) I, II e III.

40. Em relação ao uso dos antidepressivos tricíclicos, assinale a alternativa correta:

- a) Pode ser usado em pacientes com bloqueio de ramo ventricular.
- b) A nortriptilina é mais indicada para idosos por ter menor efeito anticolinérgico.
- c) Podem ser usados no 1º trimestre da gestação.
- d) Deve-se sempre solicitar um hemograma pelo risco de anemia.