

LÍNGUA PORTUGUESA

Valor por questão:

Questão	V. Questão	Peso	V. Ponderado
Da questão 01 à questão 04	0,5	2,5	1,25
Da questão 05 à questão 08	1,0	2,5	2,5
Da questão 09 à questão 10	2,0	2,5	5,0

Texto I

A educação é uma arma

O brasileiro, principalmente o das grandes cidades, parece viver em pânico. O medo tornou banal desconfiar de crianças em semáforos ou de adultos maltrapilhos que andam pelas ruas.

A cada dia aumenta o número de crimes e criminosos. Aqueles que já estão cegos pelo pavor não têm dúvida ao enxergar quem os ameaça como inimigos a serem eliminados. Muitos defendem a pena de morte. Outros gostam de saber que os marginais estão em condições repugnantes nas prisões em que são lançados. Mas, os piores são os que acham impossível regenerar um homem.

Victor Hugo advertiu: "Quem abre uma escola fecha uma prisão". Muito antes, Pitágoras conclamou: "Educar crianças, para que não seja necessário castigar os adultos". Não é, portanto, nenhuma novidade, nem tampouco absurdo, exigir que se invista cada vez mais em educação. É ela que arrebenta grades, abre portas e liberta todos nós.

(Revista Educação, out. 1999. Adaptado)

01. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Com base no texto acima, o título do texto I "A educação é uma arma" apresenta-se em qual figura de linguagem?

- Metáfora.
- Catacrese.
- Metonímia.
- Onomatopeia.

02. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Assinale a alternativa em que todas as palavras ou expressões recuperam, por coesão textual, o fato da advertência do escritor Vitor Hugo no texto I.

- liberdade, impaciência.
- impossibilidade, interesse.
- vontade, liberdade.
- solidariedade, condenação.

03. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Segundo o Texto I, a pior forma de se observar os criminosos é:

- não tem como mudar a forma como eles levam a vida.
- são pessoas a serem dizimadas da sociedade.
- é muito melhor vê-los nas prisões.
- o pânico que acontece na sociedade é culpa deles.

04. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

A expressão "parece viver em pânico", na primeira e na segunda linha do texto significa que:

- As pessoas estão cada vez mais preocupadas com a criminalidade.
- Os grandes filósofos já alertavam para a teoria do pânico na vida das pessoas.
- Viver em grandes cidades transforma o cotidiano em um transtorno geral.
- Cada dia, mais e mais pessoas estão enfrentando problemas no cotidiano.

05. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Na oração "Aqueles que já estão cegos pelo pavor não têm dúvida ao enxergar" A partir dos estudos gramaticais podemos dizer que o termo destacado se refere a:

- Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta.
- Oração Subordinada Substantiva Subjetiva.
- Oração Coordenada Sindética Explicativa.
- Oração Subordinada Adjetiva Restritiva.

06. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Na oração: Dentre eles, 86% fazem isso, mesmo durante o período de pânico. Substituindo 86% por 1% e flexionando o verbo FAZER no pretérito imperfeito do indicativo, obter-se-á:

- 1% fará.
- 1% farão.
- 1% fazia.
- 1% faziam.

07. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Assinale a alternativa que apresenta palavra em sentido conotativo.

- Não será preciso castigar os adultos.
- Vários pensadores falaram sobre a criminalidade.
- É o ensino que arrebenta as grades.
- Muitos querem a pena de morte.

08. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Atribuir-se-á o emprego de dois-pontos, em "Um poeta é sempre irmão do vento e da água: deixa seu ritmo por onde passa." (Cecília Meireles). A intenção é de anunciar:

- uma explicação;
- um esclarecimento;
- um vocativo;
- uma citação.

09. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)

No fragmento de texto "Temos de cobrar dos deputados e senadores as leis necessárias para punir esses assassinos. Das autoridades do trânsito, fiscalização e multas vigorosas para quem desobedece às leis e à sinalização. E da justiça, rapidez e dureza com os infratores." (Nicole Puzzi, Veja 1280, ano 26, n° 12). Empregam-se as vírgulas para:

- a) separar termos coordenados;
- b) separar as orações adjetivas;
- c) isolar orações intercaladas;
- d) **indicar a supressão do verbo.**

10. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)

O segmento sublinhado pode-se substituir, sem prejuízo para a correção e o sentido do texto em:

- a) O grupo que abrange os seis países mais ricos por onde se abarcam.
- b) São carentes de propostas políticas por imunes a.
- c) Sob a direção de Capangas o movimento foi declaradamente ilegal por em cuja direção.
- d) **E sobra-me uma raiva que deve valer a dos mais radicais interesses por talvez equivalha à.**

CONHECIMENTO ESPECÍFICO DE MÉDICO PSF

Valor por questão:

Questão	V. Questão	Peso	V. Ponderado
Da questão 11 à questão 22	0,5	2,5	1,25
Da questão 23 à questão 34	1,0	2,5	2,5
Da questão 35 à questão 40	2,0	2,5	5,0

11. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Um homem de 24 anos apresenta úlcera genital da qual se isola *Hemophilus ducreyi*. O tratamento pode ser efetuado com os esquemas terapêuticos abaixo, EXCETO:

- a) Ceftriaxona 250 mg IM, dose única;
- b) Azitromicina 1 g VO, dose única;
- c) Ciprofloxacina 500 mg VO de 12/12h por 3 dias;
- d) **Clindamicina 600 mg VO de 6/6h por 7 dias.**

12. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

A reativação da infecção por *Toxoplasma gondi* em pacientes com SIDA afeta mais comumente:

- a) O sistema músculo-esquelético;
- b) **O sistema nervoso central;**
- c) Os olhos;
- d) Os pulmões.

13. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Diante de um caso de meningite meningocócica, recomenda-se aos contactantes adultos a administração de:

- a) Tetraciclina 500 mg, 2 vezes ao dia, por 3 dias;
- b) Vacina anti-meningocócica;
- c) Cloranfenicol 500 mg, dose única;
- d) **Rifampicina 600 mg, 2 vezes ao dia, por 2 dias.**

14. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

No tratamento do abscesso de pulmão adquirido na comunidade, é mandatória a cobertura antibiótica para:

- a) **Anaeróbios;**
- b) Pseudomonas;
- c) Enterococos;
- d) Estafilococos.

15. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Um paciente de 30 anos, com rins policísticos e insuficiência renal não-dialítica, é admitido no pronto-socorro com quadro clínico sugestivo de cólica renal à direita. O exame do sedimento urinário mostra hematúria e proteinúria leves. O exame indicado para o diagnóstico de nefrolitíase é:

- a) Urografia excretora;
- b) Ressonância nuclear magnética;
- c) **Tomografia computadorizada helicoidal sem contraste;**
- d) Tomografia computadorizada com contraste oral.

16. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

O fator reumatoide:

- a) Indica predisposição para doenças do colágeno, quando presente em pessoas normais;
- b) **Tem valor prognóstico na artrite reumatoide;**
- c) Tem alta especificidade para o diagnóstico de artrite reumatoide;
- d) É positivo na artrite reumatoide juvenil na maioria das vezes.

17. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Dentre os vários auto anticorpos presentes nas doenças do tecido conjuntivo, duas são altamente específicos para lúpus eritematoso sistêmico:

- a) Anti-histona e anti-Sm;
- b) Anti-DNA dupla hélice e anti-histona;
- c) **Anti-DNA dupla hélice e anti-Sm;**
- d) Anti-Ro/SSA e anti-DNA dupla hélice.

18. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Constitui achado eletrocardiográfico típico de portador de síndrome de Wolff- Parkinson-White:

- a) Intervalo PR curto, onda R proeminente nas derivações precordiais direitas e complexo QRS alargado;
- b) Intervalo PR curto, presença de onda delta e QRS estreito;
- c) **Intervalo PR curto, presença de onda delta e QRS alargado;**
- d) Intervalo PR normal, presença de onda delta e inversão de onda T.

19. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

O uso de bloqueadores beta em pacientes com insuficiência cardíaca baseia-se nas premissas abaixo, EXCETO uma. Assinale-a:

- a) Existem evidências científicas de que os beta bloqueadores reduzem a incidência de morte súbita nesses pacientes;
- b) Beta bloqueadores não seletivos devem ter indicação preferencial no tratamento da insuficiência cardíaca;
- c) **Ao se introduzir beta-bloqueador no tratamento da insuficiência cardíaca, deve-se retirar o digital do esquema terapêutico;**
- d) O ajuste da dose deve ser progressivo, pois alguns pacientes pioram o estado de insuficiência no início do tratamento.

20. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Recém-nascido de parto normal, a termo, pesando 3.300g ao nascer chega ao ambulatório com 8 dias de vida, pesando 3.350g, mamando exclusivamente, ao seio materno. A mãe refere 6 evacuações diárias de aspecto amarelado, com grumos, semilíquidas. Diante desse quadro, o pediatra deve informar que:

- a) Trata-se de diarreia aguda viral, autolimitada e orientar hidratação oral;
- b) **O quadro apresentado é normal, tranquilizando a mãe;**
- c) É necessário complementar o leite materno por causa do ganho de peso insuficiente;
- d) É preciso ficar alerta para sinais de desidratação e reavaliar após dois dias.

21. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Durante o período em que a mãe está amamentando, o leite materno estará formalmente contraindicado, enquanto ela fizer uso regular de:

- a) Cefazolina;
- b) Tramadol;
- c) Ivermectina;
- d) **Amiodarona.**

22. (Fundelta) (Valor da questão 0,5)

Destruição dos nervos cutâneos:

- a) Tuberculose;
- b) Esporotricose;
- c) **Hanseníase;**
- d) Histoplasmose.

23. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Considera-se sinal de alarme para propedêutica armada na dispepsia funcional:

- I - Anemia.
- II - Hematêmese.
- III - Massa abdominal palpável.

Está (ão) correta(s):

- a) apenas a I;
- b) apenas a II;
- c) apenas a III;
- d) **I, II e III.**

24. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Quanto à doença de Refluxo gastroesofágico, é possível afirmar que:

- a) Ausência de achados endoscópicos descarta a patologia;
- b) Sempre é indicada pHmetria ambulatorial de 24h;
- c) O teste de Bernstein confirma refluxo ácido patológico;
- d) **O exame radiológico é útil na identificação de estreitamento.**

25. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Num paciente com feocromocitoma, a manifestação clínica mais frequente é:

- a) Hipotensão ortostática;
- b) **Hipertensão arterial;**
- c) Sudorese excessiva;
- d) Desmaio.

26. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Os critérios para a seleção do tratamento inicial para o DM tipo 2 variam de acordo com o profissional. Mas a primeira opção para pacientes obesos seria:

- a) Repaglinida;
- b) Nateglinida;
- c) **Metformina;**
- d) Clorpropamida.

27. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Mulher de 30 anos deu entrada na emergência apresentando quadro de dismenorreia importante. Pelo seu relato, constatou-se que houve piora progressiva destes episódios álgicos num período de 3 anos, tendo necessitado de outros atendimentos emergenciais. Nega gestação prévia. A hipótese diagnóstica mais provável é:

- a) **Endometriose pélvica;**
- b) Miomatose uterina;
- c) Anexite crônica;
- d) Tuberculose genital.

28. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Paciente com queixa clínica de corrimento vaginal amarelado, de odor fétido e prurido vaginal. Referia ainda piora do odor após relações sexuais. O exame bacterioscópico do conteúdo vaginal revelou a presença de clue cells. Qual o provável agente etiológico?

- a) **Gardnerella vaginalis;**
- b) Trichomonas vaginalis;
- c) Candida albicans;
- d) HPV.

29. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Sobre os transtornos induzidos pelo álcool, podemos afirmar, EXCETO:

- a) O abuso de álcool reduz a expectativa de vida em cerca de 10 anos;
- b) O álcool está à frente de todas as outras substâncias em mortes relacionadas a substâncias;
- c) **Cerca de 75% de todos os acidentes automobilísticos envolvem um motorista embriagado;**
- d) As causas mais comuns de morte entre pessoas com transtornos relacionados ao álcool são suicídio, câncer, cardiopatias e doença hepática.

30. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

O melhor exame para estimar o ferro total do organismo, principalmente o de depósito, é:

- a) Dosagem de hemoglobina;
- b) Dosagem de ferro sérico;
- c) **Dosagem de ferritina;**
- d) Capacidade total de transporte de ferro.

31. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

A Dengue Hemorrágica apresenta as seguintes características, EXCETO.

- a) Sintomas iniciais se agravam na primeira semana;
- b) **Hemodiluição;**
- c) Prova do laço positiva;
- d) Trombocitopenia.

32. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Em relação ao trauma torácico, assinale a alternativa correta:

- a) **Doentes com hipotensão arterial devem receber solução cristalóide e transfusão de sangue por meio de acessos venosos calibrosos em membros inferiores;**
- b) Trauma penetrante em região cervicotorácica raramente dá origem a lesões mediastinais;
- c) No trauma contuso, a energia envolvida no evento tem importância relativa, isto é, pode não ser importante;
- d) As grandes reposições volêmicas são imprescindíveis, antes do ato operatório.

33. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Quanto à terapia para cessação do tabagismo, assinale a alternativa incorreta:

- a) Para gestantes, é preferível indicar a goma de mascar de nicotina a indicar adesivo de nicotina;
- b) Há contraindicação do uso de bupropiona para aqueles indivíduos que tiveram convulsão febril na infância;
- c) A bupropiona está contraindicada para indivíduos portadores de tumor de sistema nervoso central e doença cerebrovascular;
- d) **Pacientes que tiveram infarto agudo do miocárdio têm contraindicação absoluta para o uso de adesivo ou goma de mascar.**

34. (Fundelta) (Valor da questão 1,0)

Quanto ao carcinoma de pequenas células, não se pode afirmar que:

- a) A classificação se distribui em dois estádios: doença localizada (DL) e doença extensa (DE);
- b) Há indicação de radioterapia na DL;
- c) É o tipo histológico mais relacionado com o tabagismo;
- d) **Há indicação de radioterapia e quimioterapia nos casos de DE.**

35. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)

Pelas diretrizes do SUS, os serviços de saúde podem ser oferecidos à população tanto por agentes públicos, como privados. Em relação à articulação entre esses setores, pode-se afirmar que:

- a) O setor privado lucrativo é o que melhor se articula com o SUS por meio de contratos de prestação de serviços;
- b) O acesso aos serviços do SUS só pode ser garantido às parcelas de menor poder aquisitivo da população;
- c) Os setores públicos e privado não devem se articular, pois atendem a públicos distintos;
- d) **É recomendável que o setor privado, vinculado a entidades sem fins lucrativos, seja inserido no sistema de atendimento pelo SUS através de contratos de prestação de serviços.**

36. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)

Quando se divide o número de óbitos de uma determinada doença pelo número de casos da mesma doença, multiplicando-se o resultado por 100 ou 1.000, está se referindo ao coeficiente de:

- a) Mortalidade Infantil;
- b) Mortalidade Pós-Neonatal;
- c) Mortalidade Geral;
- d) **Letalidade.**

37. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)

Considera(m)-se negligência médica:

- a) Situação em que o médico deixa de empregar um cuidado necessário, produzindo dano à saúde do paciente;
- b) Situação em que o médico atua de maneira abusiva, não atendendo as normas de cautela de maneira intempestiva, precipitada, produzindo dano à saúde do paciente;
- c) Situação em que o médico atua, sem possuir o preparo técnico adequado, ou seja, com insuficiência técnica. É a incapacidade ou a inabilitação para exercer determinado ofício;
- d) As manobras audaciosas e as altas intempestivas.

38. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)

A Norma Operacional da Assistência à Saúde (NOAS-SUS 01/2002) NÃO tem entre seus objetivos:

- a) Centralizar as ações e serviços de saúde no nível federal;
- b) Ampliar as responsabilidades dos municípios na Atenção Básica;
- c) Buscar maior equidade em saúde;
- d) Estabelecer estratégia de hierarquização dos serviços de saúde.

39. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)

Segundo a Lei Federal 8.080, de 19 de Setembro de 1990, considere as seguintes ações:

- I - A União poderá executar ações de vigilância epidemiológica e sanitária em circunstâncias especiais, como na ocorrência de agravos inusitados à saúde, que possam escapar do controle da direção estadual do Sistema Único de Saúde - SUS ou que representam risco de disseminação nacional.
- II - À direção estadual do Sistema Único de Saúde- SUS compete formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
- III - À direção municipal do Sistema Único de Saúde-SUS compete executar serviços de vigilância epidemiológica, de vigilância sanitária de alimentação e nutrição de saneamento básico e de saúde do trabalhador.

São verdadeiras:

- a) Todas as afirmações;
- b) Apenas as afirmações I e II;
- c) Apenas as afirmações I e III;
- d) Apenas as afirmações II e III.

40. (Fundelta) (Valor da questão 2,0)

A Norma Operacional Básica 96 conceitua, como gestão, a atividade e responsabilidade de dirigir um sistema de saúde. Como exemplo de gestor do SUS, podemos citar:

- a) Auditor financeiro;
- b) Diretor de hospital;
- c) Ministro da Saúde;
- d) Chefe de ambulatórios.