



POCESSO SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRAS
CARGO: ENFERMEIRO COMUNITÁRIO



LÍNGUA PORTUGUESA

01- Dentre as palavras abaixo relacionadas uma apresenta ERRO na divisão silábica, que é:

- A) De-ce-pção
- B) Ist-mo
- C) Abs-tra-to
- D) Mag-nó-lia

02- Dentre as palavras relacionadas abaixo, indique a que esta escrita de forma INCORRETA:

- A) Exceção
- B) Excedente
- C) Excelsso
- D) Excesso

03- A classificação CORRETA para o substantivo coletivo de pessoas notáveis, de sábios, é:

- A) Tríade
- B) Miríade
- C) Plêiade
- D) Irmandade

04- Dentre as opções abaixo, referente ao uso da crase, assinale C para as alternativas corretas e E para as erradas:

- I () Fomos à cidade e assistimos às festas
- II () Chamou as filhas e entregou a chave à mais velha
- III () Isto cheira à vinho
- IV () Irei à cidade

Assinale a sequência CORRETA:

- A) E, E, C e E
- B) C, C, E e E
- C) E, E, C e C
- D) C, C, E e C

05- Assinale a alternativa em que NÃO haja nenhum erro de ortografia:

- A) A assensão nas pesquisas foi decisiva
- B) A ascensão nas pesquisas foi decisiva
- C) A ascenção nas pesquisas foi decisiva
- D) A ascensão nas pesquisas foi deciziva

MATEMÁTICA

06- Qual a 1.732ª letra da sequência: ABCDEABCDEABCDEABCD...

- A) A
- B) B
- C) C

D) E

07- O valor da operação de divisão entre $0,324 \div 15$ resulta em:

- A) 0,0116
- B) 0,00216
- C) 0,216
- D) 0,0216

08- Exprimir em segundos, o intervalo de tempo de 5 horas 20 minutos e 32 segundos:

- A) 19.232 segundos
- B) 19.632 segundos
- C) 18.632 segundos
- D) 18.232 segundos

09- O número cujo dobro somado com 5 é igual ao seu triplo menos 19 resulta em:

- A) 0
- B) 36
- C) 18
- D) 24

10- O peso total de três caixas cheias de certa mercadoria é 60 kg. As caixas vazias pesam: a primeira com a segunda 7 kg; a primeira com a terceira 10 kg; a segunda com a terceira 11 kg. Calcule o peso da mercadoria das três caixas:

- A) 53 kg
- B) 50 kg
- C) 46 kg
- D) 49 kg

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES

11- A cidade com maior população do Estado de Santa Catarina é:

- A) Florianópolis
- B) Blumenau
- C) Chapecó
- D) Joinville

12- A Assembléia legislativa do Estado de Santa Catarina tem:

- A) 36 deputados
- B) 40 deputados
- C) 56 deputados
- D) 50 deputados

13- Qual destes municípios NÃO faz divisa com o Município de Lontras:



POCESSO SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRAS
CARGO: ENFERMEIRO COMUNITÁRIO



- A) Rio do Sul
- B) Apiuna
- C) Ibirama
- D) Pouso Redondo

14- No início do ano a imprensa mundial divulgou a informação de que o Brasil passou a ser a 6ª maior economia do mundo, ultrapassando:

- A) A Alemanha
- B) A China
- C) A França
- D) A Inglaterra

15- O Presidente da República que substituiu Fernando Collor de Mello (cassado) foi:

- A) José Sarney
- B) Fernando Henrique Cardoso
- C) Itamar Franco
- D) Luiz Inácio Lula da Silva

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16- A vacina deve ser administrada o mais precoce possível, preferencialmente após o nascimento. Nos prematuros com menos de 36 semanas administrar a vacina após completar um mês de vida e atingir 2 Kg. Contatos intradomiciliares de portadores de hanseníase menores de um ano de idade, comprovadamente vacinados, não necessitam da administração de outra dose. Contatos de portadores de hanseníase com mais de um ano de idade, sem cicatriz - administrar uma dose. Contatos comprovadamente vacinados com a primeira dose - administrar outra dose. Manter o intervalo mínimo de seis meses entre as doses da vacina. Contatos com duas doses não administrar nenhuma dose adicional. Na incerteza da existência de cicatriz vacinal ao exame dos contatos intradomiciliares de portadores de hanseníase, aplicar uma dose, independentemente da idade. Para criança HIV positiva a vacina deve ser administrada ao nascimento ou o mais precocemente possível. Para as crianças que chegam aos serviços ainda não vacinados, a vacina está contra-indicada na existência de sinais e sintomas de imunodeficiência, não se indica a revacinação de rotina. Para os portadores de HIV (positivo) a vacina está contra indicada em qualquer situação. As peculiaridades citadas acima sobre o esquema de vacinação é referente à Vacina:

- A) Vacina da Hepatite B
- B) Vacina BCG
- C) Vacina Tretavalente
- D) Vacina Tríplice Viral

17- A raiva é uma zoonose viral, que se caracteriza como uma encefalite progressiva aguda e letal. Todos os mamíferos são suscetíveis ao vírus da raiva e, portanto, podem transmiti-la. A doença apresenta dois principais ciclos de transmissão: urbano e silvestre, sendo o urbano passível de eliminação, por se dispor de medidas eficientes de prevenção, tanto em relação ao ser humano, quanto à fonte de infecção. Sobre a Raiva é incorreto afirmar:

- A) A transmissão da raiva se dá pela penetração do vírus contido na saliva do animal infectado, principalmente pela mordedura e, mais raramente, pela arranhadura e lambedura de mucosas
- B) É extremamente variável, desde dias até anos, com uma média de 45 dias, no homem, e de 10 dias a 2 meses, no cão
- C) Todo caso humano suspeito de raiva não realiza a notificação individual
- D) Nos cães e gatos, a eliminação de vírus pela saliva ocorre de 2 a 5 dias antes do aparecimento dos sinais clínicos, persistindo durante toda a evolução da doença

18- A infecção pelo vírus causa uma doença de amplo espectro clínico, incluindo desde formas inaparentes ate quadros graves, podendo evoluir para o óbito. Dentre estes, destaca-se a ocorrência de febre hemorrágica, hepatite, insuficiência hepática, manifestações do sistema nervoso, miocardite, hemorragias graves e choque. As manifestações hemorrágicas como epistaxe, petequias, gengivorragia, metrorragia, hematemesa, melena, hematúria e outros, bem como a plaquetopenia podem ser observadas em todas as apresentações clínicas da doença. As características em relação ao espectro clínico acima citado correspondem à doença:

- A) Dengue
- B) Tuberculose
- C) Hanseníase
- D) Hepatite



POCESSO SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRAS
CARGO: ENFERMEIRO COMUNITÁRIO



19- A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, de evolução lenta, que se manifesta principalmente através de sinais e sintomas dermatoneurológicos: lesões na pele e nos nervos periféricos, principalmente nos olhos, mãos e pés. É fácil de diagnosticar, tratar e tem cura, no entanto, quando diagnosticada e tratada tardiamente pode trazer graves conseqüências para os portadores e seus familiares, pelas lesões que os incapacitam fisicamente. Sobre a Hanseníase é incorreto afirmar:

A) O tratamento específico da pessoa com hanseníase não depende da classificação operacional do doente em Pauci ou Multibacilar

B) A principal via de eliminação do bacilo pelo indivíduo doente de hanseníase e a mais provável porta de entrada no organismo passível de ser infectado são as vias aéreas superiores, o trato respiratório

C) Algumas pessoas apresentam resistência ao bacilo, constituindo os casos Paucibacilares da doença (PB), que abrigam um pequeno número de bacilos no organismo, insuficiente para infectar outras pessoas

D) Pessoas que não apresentam resistência ao bacilo, que se multiplica no seu organismo passando a ser eliminado para o meio exterior, podendo infectar outras pessoas constituem os casos Multibacilares da doença (MB)

20- O encerramento das investigações referentes aos casos notificados como suspeitos e/ou confirmados deve ocorrer até o prazo máximo de 60 dias da data de notificação, exceto:

A) Sarampo

B) Raiva

C) Dengue

D) Tétano

21- O encerramento das investigações referentes aos casos notificados como suspeitos e/ou confirmados de Hepatites Virais deve ocorrer até o prazo máximo de ___ dias da data de notificação.

A) 60 dias

B) 240 dias

C) 180 dias

D) 540 dias

22- No Pré-Natal a primeira consulta deve ser feita uma avaliação global da paciente. Devem ser objeto de especial atenção, nos antecedentes obstétricos, as complicações como insuficiência renal e hipertensão arterial, a dependência química, o

abuso de álcool ou de narcóticos e o tabagismo. Os exames que devem ser feitos nesta primeira consulta incluem: hemograma completo com contagem de reticulócitos; eletroforese de hemoglobina; exames para detectar lesão renal e acometimento hepático; determinação dos estoques de ferro; glicemia; ácido úrico; sorologia, entre outros. A solicitação da sorologia inclui as doenças:

A) Hepatite A, B e C; HIV I e II; HTLV I e II; Rubéola; Sífilis; Toxoplasmose; Citomegalovírus

B) Hepatite A, B e C; HIV I e II; HTLV I e II; Rubéola; Sífilis; Tuberculose; Dengue

C) Hepatite A, B e C; HIV I e II; HTLV I e II; Dengue; Hanseníase; Toxoplasmose; Sífilis

D) Hepatite A, B e C; HIV I e II; HTLV I e II; Sarampo; Citomegalovírus; Rubéola; Toxoplasmose

23- Na implantação das Equipes de Saúde da Família é necessária a existência de equipe multiprofissional composta por, no mínimo, médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem e Agentes Comunitários de Saúde, com jornada de trabalho de 40 horas semanais para todos os seus integrantes, e responsável por, no máximo, ___ habitantes, sendo a média recomendada de ___ habitantes, assinale a alternativa correta:

A) 2.500 habitantes, sendo a média recomendada de 1.500 habitantes

B) 4.000 habitantes, sendo a média recomendada de 3.000 habitantes

C) 4.500 habitantes, sendo a média recomendada de 3.500 habitantes

D) 6.000 habitantes, sendo a média recomendada de 5.000 habitantes

24- Para implantação da estratégia de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) nas Unidades Básicas de Saúde como uma possibilidade para a reorganização inicial da Atenção Básica. São itens necessários à organização da implantação dessa estratégia, exceto:

A) A existência de uma Unidade Básica de Saúde, inscrita no Cadastro Geral de estabelecimentos de saúde do Ministério da Saúde, de referência para os ACS e o enfermeiro supervisor

B) A existência de um enfermeiro para até 50 ACS, o que constitui uma equipe de ACS

C) O cumprimento da carga horária de 40 horas semanais dedicadas à equipe de ACS pelo enfermeiro supervisor e pelos ACS



POCESSO SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRAS
CARGO: ENFERMEIRO COMUNITÁRIO



D) Definição das microareas sob responsabilidade de cada ACS, cuja população não deve ser superior a 750 pessoas

25- A Atenção Básica considera o sujeito em sua singularidade, na complexidade, na integralidade e na inserção sócio-cultural e busca a promoção de sua saúde, a prevenção e tratamento de doenças e a redução de danos ou de sofrimentos que possam comprometer suas possibilidades de viver de modo saudável. Tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde. A Atenção Básica tem como fundamentos, exceto:

- A) Desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adstrita garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado
- B) Estimular a participação popular e o controle social
- C) Valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do acompanhamento constante de sua formação e capacitação
- D) Efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de ações programáticas e demanda espontânea; articulação das ações de promoção à saúde, prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento, reabilitação e emergências clínicas, trabalho de forma interdisciplinar e em equipe, e coordenação do cuidado na rede de serviços

26- Sobre a Ancilostomíase é correto afirmar, exceto:

- A) É uma infecção intestinal causada por Bacilo gram-negativo com flagelo polar
- B) O quadro clínico é representado por um quadro gastrointestinal agudo caracterizado por náuseas, vômitos, diarreia, dor abdominal e flatulência
- C) O reservatório da doença é apenas o homem
- D) A transmissão ocorre quando essas larvas infectantes penetram na pele, geralmente pelos pés

27- A cetoacidose é uma complicação potencialmente letal, ocorre particularmente em pacientes com Diabetes tipo I, sendo algumas vezes a primeira manifestação da doença. O diabetes tipo II, que mantém uma reserva pancreática de insulina, raramente desenvolve essa complicação, mas isso pode ocorrer em intercorrências em que há elevada produção de hormônios contra-reguladores. Sobre a Cetoacidose podemos afirmar, exceto:

- A) Os principais fatores precipitantes são: infecção, omissão da aplicação de insulina, abuso alimentar, uso de medicações hiperglicemiantes, entre outros
- B) O quadro clínico consiste em polidipsia, poliúria, enurese, hálito cetônico, fadiga, visão turva, náuseas e dor abdominal, além de vômitos, desidratação, hiperventilação e alterações do estado mental
- C) Intercorrências graves como: Acidente Vascular Cerebral, Infarto Agudo do Miocárdio ou traumas não interferem no aparecimento desta complicação
- D) Complicações como: Choque, Distúrbio Hidro-eletrolítico, Insuficiência renal, Pneumonia de aspiração, Síndrome de Angústia Respiratória e Edema Cerebral em crianças, ocorrem quando o seu quadro se agrava

28- Sobre a Síndrome Hiperosmolar Não-Cetótica, podemos afirmar, exceto:

- A) A síndrome hiperosmolar é um estado de hipoglicemia grave (< 60 a 70mg/dL), desidratação e alteração do estado mental, na ausência de cetose
- B) Os indivíduos de maior risco são os idosos (> 60 anos), cronicamente doentes, debilitados ou institucionalizados, com mecanismos de sede ou acesso à água prejudicada
- C) Fatores precipitantes são doenças agudas (acidente vascular cerebral, infarto do miocárdio ou infecções, particularmente pneumonia), uso de glicocorticóides ou diuréticos, cirurgias, entre outros
- D) Ocorre apenas no diabetes tipo II, porque um mínimo de ação insulínica preservada nesse tipo de diabetes pode prevenir a cetogênese

29- Neuropatia diabética é a complicação mais comum do diabetes, compreendendo um conjunto de síndromes clínicas que afetam o sistema nervoso periférico sensitivo, motor e autonômico, de forma isolada ou difusa, nos segmentos proximais ou distais, de instalação aguda ou crônica, de caráter reversível ou irreversível, manifestando-se silenciosamente ou com quadros sintomáticos dramáticos. Sobre a Neuropatia podemos afirmar, exceto:

- A) Nos casos de neuropatia simétrica sensitivomotora distal pode se manifestar por sensação de queimação, choques, agulhadas, formigamentos, dor a estímulos não-dolorosos, câimbras, fraqueza, sem alteração de percepção da temperatura
- B) Pacientes com diabetes devem ser avaliados,



POCESSO SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRAS
CARGO: ENFERMEIRO COMUNITÁRIO



anualmente, para presença de neuropatia periférica distal, usando testes de sensação dolorosa, tátil, térmica, vibratória, motora e limiar percepção cutânea

C) O diagnóstico da neuropatia autonômica cardiovascular é feito pela taquicardia em repouso ou por teste provocativo e por hipotensão postural medida por redução de pressão sistólica

D) O tratamento sintomático da neuropatia periférica e da neuropatia autonômica requer controle glicêmico e analgesia simples

30- Acidente causado por serpentes do gênero *Micrurus*, leva a quadro neuromuscular, como: paralisia neuromuscular (ptose palpebral, distúrbios de acomodação visual, de olfato e paladar, sialorréia, ptose mandibular) sem outros sinais e sintomas concomitantes. Este tipo de acidente é reconhecido como, assinale alternativa correta:

- A) Acidente laquético
- B) Acidente elapídico
- C) Acidente botrópico
- D) Acidente crotálico