



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO PARANÁ

EDITAL 030/2013 - GPQS/DGTES/AMS

**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE PROMOTOR PLANTONISTA
DE SAÚDE PÚBLICA – SERVIÇO DE MEDICINA GERAL PLANTONISTA**

PROVA OBJETIVA - Data 24/03/2013

Nome: _____ Inscrição: _____

- 1) **Você responde com dois outros socorristas o caso de um homem de 50 anos que se encontra inconsciente, sem pulso e sem respiração. Que tarefas você atribuiria aos outros socorristas enquanto prepara o DEA (Desfibrilador Externo Automático)?**
- a) Ambos socorristas devem ajudar a preparar o DEA e fornecer RCP.
 - b) Recrutar outros socorristas para ajudar.
 - c) Um socorrista deveria ligar para o número de serviço de emergência médica local e o outro deveria dar início à RCP.
 - d) Um socorrista deve iniciar respiração boca a boca e o segundo socorrista iniciar compressões torácicas.
 - e) Solicita que tragam material para passar um tubo traqueal.
- 2) **Você está tratando uma vítima de trauma que está em choque e em coma profundo. Qual das seguintes alternativas é adequada para dar apoio à oxigenação e a ventilação para este paciente?**
- a) Um tubo traqueal.
 - b) As vias aéreas do próprio paciente.
 - c) Uma cânula orofaríngea.
 - d) Uma cânula nasofaríngea.
 - e) Máscara de Venturi.
- 3) **Considerando que a Raiva Humana vem apresentando diminuição no coeficiente de morbimortalidade no Brasil, porém com letalidade mantendo-se próximo de 100% dos casos, assinale abaixo a alternativa correta.**
- a) Sempre que houver indicação de aplicação de soro heterólogo, fazer o teste de sensibilidade previamente.
 - b) Não há indicação de uso de soro antirrábico em pacientes com tratamento anterior completo, a não ser em caso de dúvidas ou em pacientes imunodeprimidos.
 - c) No Brasil a Raiva é uma doença epidêmica de notificação compulsória e imediata.
 - d) Está contra-indicada a profilaxia da Raiva em gestantes e recém-nascidos.
 - e) Um acidente por mordida de cão, com sinais sugestivos de ser portador de Raiva, em uma criança, na planta dos pés ou em polpas digitais é considerado acidente leve.

- 4) **Paciente do sexo masculino, 45 anos de idade, de 90 Kg, deu entrada no pronto socorro com episódios de cefaléia em salvas. Assinale a alternativa correta, quanto ao procedimento a ser adotado.**
- a) Administrar Cetoprofeno 100 mg + S.F 0,9% 100 ml E.V. em 30 minutos.
 - b) Administrar Dipirona E.V. e observar por 30 minutos.
 - c) Prescrever Morfina E.V. em doses compatíveis.
 - d) Administrar Oxigênio em máscara de Venturi a 100%,10 l/min. com a cabeça baixa.
 - e) Administrar Dexametasona 6 mg E.V.
- 5) **Pressão Arterial elevada persistente, que não responde às mudanças de estilo de vida, leva a uma questão clínica muito importante. Que classe de drogas deve ser usada como primeira linha (ou primeira escolha)?**
- a) Bloqueadores dos canais de cálcio.
 - b) Enzima conversora de angiotensina.
 - c) Bloqueadores dos receptores de angiotensina II.
 - d) Beta Bloqueadores.
 - e) Tiazidas.
- 6) **O diagnóstico de Síndrome Metabólica é mais frequente em pacientes que apresentem os seguintes sinais e sintomas. Assinale a alternativa correta.**
- a) Síndrome dos ovários policísticos, sedentarismo, diabetes gestacional e obesidade.
 - b) Doença hepática não alcoólica, hiperucemia, história de hipertensão familiar e microalbuminúria.
 - c) Doença cardiovascular, microalbuminúria, estados pró-trombóticos e tabagismo.
 - d) Glicemia de jejum alterada, obesidade, hipertensão e dislipidemia.
 - e) Teste de tolerância a glicose alterado, hiperucemia, sedentarismo e estados pró-trombóticos.
- 7) **Um paciente que chega ao setor de emergência com quadro clínico compatível com isquemia coronariana, deve ser feito o ECG em até dez minutos. Assinale a alternativa correta.**
- a) O uso de Tricíclicos e Fenotiazinas pode causar elevação do segmento ST.
 - b) ECG completamente normal descarta uma doença coronariana.
 - c) ECG com elevação do segmento ST maior que 1 mm em duas ou mais derivações contíguas, o diagnóstico provável é IAM.
 - d) ECG não mostra elevação do segmento ST maior que 1 mm em duas ou mais derivações contíguas, a indicação formal é o estudo hemodinâmico.
 - e) Todas acima estão corretas.
- 8) **Em pacientes com Acidente Vascular Cerebral (AVC), temos que ter cautela ao iniciar medicações anti-hipertensivas. Analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta:**
- I. O paciente com AVC que dá entrada no Pronto Socorro (PS) encontra-se ansioso, por isso não se deve valorizar somente a Pressão Arterial (PA) medida logo na entrada, sobretudo não iniciar intempestivamente medicação EV com apenas uma medida de PA.
 - II. Em pacientes com AVC agudo, a PA cai espontaneamente em alguns dias sem nenhuma intervenção específica, sendo que essa queda é maior nas primeiras 24 horas.
 - III. Durante o evento agudo, a hipertensão pode ter uma função protetora, no sentido de manter a perfusão cerebral para áreas de risco.
- a) I, II e III são falsas.
 - b) I e III são verdadeiras.
 - c) I, II e III são verdadeiras.
 - d) Somente a alternativa III é falsa.
 - e) Somente a alternativa I é verdadeira.

9) Assinale a alternativa que completa corretamente a assertiva a seguir.

Durante a vigência de uma epidemia de Dengue, em um município, ...

- a) a confirmação de Dengue Clássica pode ser feita pelos critérios clínicos-epidemiológicos.
- b) o diagnóstico é comprovado pela prova do laço positiva.
- c) todos os casos com história de febre recente de sete dias são considerados dengue.
- d) todos os pacientes com hematócrito abaixo de 20% sobre o basal da admissão, são considerados positivos.
- e) é considerada Dengue Hemorrágica grau I, caso que apresente colapso circulatório com pulso fraco e rápido.

10) Sobre a infecção por dengue, analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. A classificação da dengue, segundo a Organização Mundial da Saúde, é retrospectiva e depende de critérios clínicos e laboratoriais.
- II. A organização de serviços de saúde baseia-se na assistência médica, independente da área de vigilância epidemiológica.
- III. Concomitante com o período febril, podem surgir manifestações hemorrágicas.

- a) Todas as afirmações são corretas.
- b) Somente a I é correta.
- c) As alternativas I e II são corretas.
- d) Somente a III é correta.
- e) Todas são falsas.

11) Um homem de 75 anos procura o serviço de emergência, queixando-se de tonturas, palpitações há uma semana. Sua frequência cardíaca é de 160 bpm, pulso irregular, PA de 100/70 mm/hg, exame físico normal. O ECG mostra F.A rápida e o restante está normal. Qual(is) do(s) seguinte(s) procedimento(s) deve(m) ser incluído(s) nas condutas iniciais para este paciente?

- a) Imediata desfibrilação.
- b) Epinefrina 1 mg E.V a cada 3 minutos.
- c) Digoxina E.V.
- d) Não se indica nenhuma terapia.
- e) Oxigênio, acesso venoso e monitor cardíaco.

12) Mulher de 70 anos procura o serviço de emergência, apresentando dificuldades para falar e debilidade no braço e perna direita, há 15 minutos. Qual das seguintes sequências de avaliação neurológica deve ser executada para esta paciente?

- a) Obter uma Tomografia Computadorizada de Crânio (TCC) sem contraste, esperar até que os sintomas neurológicos comecem a melhorar e depois iniciar a terapêutica fibrinolítica.
- b) Obter uma TCC sem contraste e se o exame for positivo para AVC, começar a terapêutica fibrinolítica.
- c) Obter uma anamnese direcionada e realizar um exame físico e uma punção de liquor imediata para descartar meningite e solicitar uma TCC sem contraste.
- d) Obter a história da paciente, executar um exame físico e neurológico, obter uma TCC sem contraste e certificar-se de que estará interpretado em 45 minutos da chegada do paciente ao serviço de emergência.
- e) Administrar oxigênio, acesso venoso e chamar serviço de neurologia.

- 13) Aplicando para a avaliação da consciência a escala de coma de Glasgow, em um paciente que chega ao serviço de emergência, apresentando os seguintes resultados, é correto afirmar que:**
- a) Abertura ocular espontânea, resposta verbal confusa, resposta motora obedecendo a comandos verbais, a escala de Glasgow é 10.
 - b) Abertura ocular aos estímulos dolorosos, resposta verbal com sons ininteligíveis, resposta motora ausente, a escala de Glasgow é de 11.
 - c) Abertura ocular aos estímulos dolorosos, resposta verbal através de palavras inapropriadas, resposta motora com padrão flexor, a escala de Glasgow é de 8.
 - d) Abertura ocular ausente, resposta verbal ausente, resposta motora ausente, a escala de Glasgow é de 15.
 - e) Abertura ocular através de estímulos dolorosos, resposta verbal através de sons ininteligíveis, resposta motora com retirada inespecífica, a escala de Glasgow é de 12.
- 14) Nos pacientes que necessitam de intubação oro-traqueal (IOT) usando-se a técnica de rápida sequência, assinale a alternativa correta:**
- a) Pré oxigenar o paciente, durante toda a tentativa de sucesso do procedimento.
 - b) O uso de opióides na pré-indução aumenta as chances de insucesso na IOT.
 - c) Manter o paciente em decúbito lateral esquerdo, pelo risco de aspiração de conteúdo gástrico.
 - d) Estabelecer acesso venoso adequado após o sucesso do procedimento.
 - e) Todas as anteriores estão corretas.
- 15) A cadeia de sobrevivência foi descrita para ressaltar a importância de adoção hierarquizada das atividades terapêuticas frente à situação de Parada Cardio Respiratória (PCR), na qual a Fibrilação Ventricular está presente em mais de 40% dos casos. Assinale a sequência de atendimento correta.**
- a) Medidas de suporte avançado de vida, desfibrilação precoce, reconhecimento da PCR, desencadeamento do sistema de emergência.
 - b) Desfibrilação precoce, medidas de suporte avançado de vida, desencadeamento do sistema de emergência, reconhecimento da PCR.
 - c) Reconhecimento da PCR, medidas de suporte avançado de vida, desfibrilação precoce, desencadeamento do sistema de emergência.
 - d) Medidas de suporte avançado de vida, desencadeamento do sistema de emergência, reconhecimento da PCR, desfibrilação precoce.
 - e) Desencadeamento de sistema de emergência, reconhecimento da PCR, desfibrilação precoce, medidas de suporte avançado de vida.
- 16) Considerando o atendimento às vítimas de Parada Cardio Respiratória, quais das afirmações são verdadeiras:**
- I. O uso do desfibrilador elétrico automático, é importante para reverter Assistolias e Atividades Elétricas sem Pulso.
 - II. A manobra de elevação da mandíbula não deve ser realizada por socorristas leigos pelo elevado risco de mobilização da coluna cervical.
 - III. A principal e mais frequente causa de Atividade Elétrica sem Pulso é a Hipóxia.
- a) Todas são verdadeiras.
 - b) Somente a II é verdadeira.
 - c) I e III são verdadeiras.
 - d) Somente a III é verdadeira.
 - e) Todas são falsas.

17) As intoxicações agudas são frequentes nos serviços de emergência. É fundamentalmente o reconhecimento e manejo adequado das intoxicações em nosso meio, já que as ocorrências podem ser desde acidentes leves até eventos fatais. Assinale a alternativa incorreta:

- a) Estabilização hemodinâmica com uso de drogas vasopressoras, sendo que a escolha é a norepinefrina.
- b) Considerar o uso de antídotos específicos, por exemplo, na apnéia, a Naloxona.
- c) Paciente com alteração do nível de consciência, administrar empiricamente glicose 50% 50 ml E.V.
- d) Está indicado o emprego de substâncias levemente ácidas para neutralização de cáusticos e produtos alcalinos.
- e) Para indução de vômitos pode ser usado detergente fraco neutro diluído 1:5 V.O.

18) A importância da avaliação oferecida pelo check-up cardiológico se baseia na prevenção de eventos da saúde, como morte súbita e incidência de doenças cardíacas em indivíduos assintomáticos. Além da história clínica e exame físico, quais exames apresentam maior eficácia?

- a) Ecocardiograma e Lipidograma.
- b) Teste ergométrico e RX de tórax.
- c) ECG de 12 derivações e RX de tórax.
- d) ECG de 12 derivações e Ecocardiograma.
- e) Ecocardiograma com estresse.

19) O consumo de bebidas alcoólicas é considerado um dos maiores problemas de saúde pública no Brasil. Assinale a alternativa incorreta:

- a) Administrar Fenitoína E.V nos pacientes em crise convulsiva.
- b) Administrar Benzodiazepínicos E.V para tratar a Síndrome de Abstinência Alcoólica.
- c) Os critérios para diagnóstico da Síndrome de Abstinência Alcoólica dependem da identificação de evidências da utilização repetitiva de quantidades aumentadas de álcool por períodos prolongados e sua interrupção ou redução do seu consumo.
- d) Quando estiver na vigência da crise de Abstinência, pode-se prescrever repouso no leito com restrição, se necessário.
- e) Para tratar alucinações alcoólicas prescrever Haloperidol 5 mg de 12/12 horas V.O.

20) A dor é a queixa mais prevalente nos serviços de emergência. No entanto é tratada de maneira inadequada, na maioria das vezes. Após analisar as afirmações abaixo, assinale a alternativa correta.

- I. A Morfina deve ser prescrita de horário para evitar a recidiva.
- II. É um erro frequente na prescrição de analgésicos não obedecer à duração de ação da droga, por exemplo, Tramadol de 8/8 horas.
- III. Recomenda-se prescrever analgésicos se necessário, administrando assim que o paciente sentir dor.

- a) Todas as alternativas são corretas.
- b) I, II e III são incorretas.
- c) Somente a III é correta.
- d) Somente a II é correta.
- e) I e II são corretas.

21) Tradicionalmente a concentração de LDL colesterol é estimada através da equação de Friedewald, que permite determinar o valor de LDL colesterol a partir dos valores séricos do Colesterol Total, Triglicerídeos e HDL colesterol. Em um indivíduo que apresenta os valores séricos de *Colesterol total de 250 mg/dl, Triglicerídeos 200 mg/dl, HDL colesterol 50 mg/dl.*, qual o valor encontrado do LDL colesterol?

- a) 100 mg/dl.
- b) 160 mg/dl.
- c) 130 mg/dl.
- d) 120 mg/dl.
- e) 50 mg/dl.

22) Considerando os pacientes que apresentam Taquiarritmias, reconhecendo que é uma situação clínica que necessita de diagnóstico preciso para conduta terapêutica adequada, analise as afirmações e assinale a alternativa correta:

- I. A cardioversão tem contra-indicações em algumas circunstâncias, como intoxicação digitálica, taquicardia atrial multifocal, por exemplo.
- II. QRS largo indica Taquicardia Ventricular até prova em contrário.
- III. QRS estreito com intervalo RR irregular indica Flutter.
- IV. QRS estreito com intervalo RR regular indica Fibrilação Atrial.

- a) III e IV são verdadeiras.
- b) I, III, IV são falsas.
- c) I, II, III, IV são verdadeiras.
- d) II e IV são verdadeiras.
- e) I e II são verdadeiras.

23) Para um paciente que apresenta uma crise aguda de Gota, que medida terapêutica não seria adequado indicar? Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Os glicocorticóides podem ser usados quando houver contra indicação ao uso de Colchicina e Anti-inflamatórios.
- b) Evitar o uso de Colchicina em pacientes que já fazem uso da medicação, em idosos e indivíduos com diminuição da função renal.
- c) Os Anti-inflamatórios não hormonais constituem a terapêutica padrão para a artrite gotosa aguda.
- d) Alopurinol deve ser usado no tratamento da crise aguda associado ao Anti-inflamatório não hormonal.
- e) O tratamento da crise aguda de Gota baseia-se no repouso e Anti-inflamatório intra articular.

24) Com relação às características e condições clínicas da Dispnéia, relacione a 1ª coluna com a 2ª e assinale a alternativa que contenha a ordem numérica decrescente.

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| (I) Asma | () Estertores respiratórios |
| (II) DPOC | () Dispnéia súbita |
| (III) ICC | () Dispnéia aos esforços |
| (IV) Doença intersticial pulmonar | () Sibilos |
| (V) Embolia pulmonar | () Hiperressonância |

- a) IV, V, III, I, II.
- b) I, II, III, IV, V.
- c) III, II, IV, V, I.
- d) II, I, III, V, IV.
- e) V, III, I, II, IV.

25) O vírus H1N1 ressurgiu em 2009 por um triplo rearranjo de vírus influenza humano, suíno e aviário. Uma das suas principais características é a alta transmissibilidade, maior em comparação as já altas taxas de transmissibilidade de outros vírus influenza tipo A. Assinale a alternativa correta:

- a) Crianças e adultos jovens são acometidos com maior frequência.
- b) As manifestações são semelhantes às outras infecções por influenza, mas manifestações gastrointestinais são mais comuns.
- c) A pesquisa da infecção é feita através de swab nasal ou de aspirado de traquéia.
- d) O uso de antivirais é recomendado nesses pacientes, embora o benefício seja incerto.
- e) Todas as alternativas estão corretas.

26) Considerando a Portaria 2048/GM, de 05 de Novembro de 2002, analise as assertivas abaixo, referentes às Unidades Móveis para atendimento de urgências.

- I. Equipe Aeromédico: composta por no mínimo um médico e um auxiliar de enfermagem.
- II. Equipe do Veículo de Intervenção Rápida (VIR): composta por condutor, médico e enfermeiro.
- III. Equipe do Suporte Básico de Vida: composta por condutor e técnico ou auxiliar de enfermagem.

Assinale a alternativa correta.

- a) II e III são verdadeiras.
- b) Somente I é verdadeira.
- c) I e III são verdadeiras.
- d) III é falsa.
- e) Todas são verdadeiras.

27) Considerando a Portaria 2048/GM, de 05 de Novembro de 2002, a qual dispõe sobre as atribuições da Regulação Médica das Urgências e Emergências, assinale a alternativa correta.

- a) Ao analisar as informações comunicadas o médico regulador estabelece um diagnóstico preciso.
- b) A competência técnica do médico regulador se sintetiza em discernir o grau presumido de urgência.
- c) Após enviar os recursos necessários, o médico regulador define o encaminhamento do paciente ao serviço mais próximo da ocorrência.
- d) Cabe ao médico regulador julgar a necessidade ou não do envio de meios móveis de atenção, podendo esclarecer o demandante do socorro quanto a outras medidas a serem adotadas.
- e) As alternativas B e D estão corretas.

28) Em relação à Portaria nº 2048, de 05 de novembro de 2002, analise as afirmativas abaixo.

- I. Estabelece normas para o funcionamento do SAMU, exclusivamente.
- II. O setor privado que atua na área de Urgência e Emergência não está subordinado às normas da portaria.
- III. A abertura de qualquer serviço de atendimento às Urgências e Emergências deverá ser precedida de consulta ao Gestor do SUS.

Assinale a alternativa correta:

- a) Todas são verdadeiras.
- b) Todas são falsas.
- c) I e II são verdadeiras.
- d) Somente a III é verdadeira.
- e) Somente a I é verdadeira.

29) Considerando a Portaria nº 1010, de 21 de Maio de 2012, assinale a alternativa que aponte a função gestora de Regulação Médica de Urgência.

- a) Decidir os destinos hospitalares não aceitando a inexistência de leitos vagos.
- b) Deve considerar o acesso a leitos como uma segunda etapa que envolvera a regulação médica das transferências inter-hospitalares.
- c) As organizações de área de segurança pública deverão seguir os critérios e os fluxos definidos pela regulação médica das vigências do SUS.
- d) Exercer a autoridade de regulação pública das urgências sobre a atenção pré-hospitalar móvel privado, quando necessitar conduzir paciente ao setor público.
- e) Todas alternativas são corretas.

30) Considerando a Portaria nº 1010, de 21 de Maio de 2012, analise as alternativas abaixo.

- I. O SAMU 192 tem como objetivo chegar precocemente à vítima após agravo de natureza clínica exclusivamente.
- II. As centrais de Regulação das Urgências têm entre outras funções ordenar o fluxo efetivo das referências e contrarreferências dentro de uma rede de atuação.
- III. As bases descentralizadas serão sediadas em Municípios de grande extensão territorial definidas no plano de ação regional.

Assinale a alternativa correta:

- a) Todas são verdadeiras.
- b) I e II são verdadeiras.
- c) II e III são verdadeiras.
- d) Somente III é verdadeira.
- e) Todas são falsas.

31) A atenção à saúde no Brasil tem investido na formulação, implementação e concretização de políticas de promoção, proteção e recuperação da saúde. Há um grande esforço na construção de um modelo de atenção à saúde que priorize ações de melhoria da qualidade de vida dos sujeitos e coletivos. Em relação aos objetivos da Política Nacional de Promoção da Saúde assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Incorporar e implementar ações de promoção da saúde, com ênfase na atenção especializada e de média e alta complexidade.
- b) Ampliar a autonomia e a co-responsabilidade de sujeitos e coletividades, inclusive o poder público, no cuidado integral à saúde e minimizar e/ou extinguir as desigualdades de toda e qualquer ordem (étnica, racial, social, regional, de gênero, de orientação/opção sexual, entre outras).
- c) Contribuir para o aumento da resolubilidade do Sistema, garantindo qualidade, eficácia, eficiência e segurança das ações de promoção da saúde.
- d) Valorizar e otimizar o uso dos espaços públicos de convivência e de produção de saúde para o desenvolvimento das ações de promoção da saúde.
- e) Favorecer a preservação do meio ambiente e a promoção de ambientes mais seguros e saudáveis.

32) Humanizar é ofertar atendimento de qualidade, articulando os avanços tecnológicos com acolhimento, com melhoria dos ambientes de cuidado e das condições de trabalho dos profissionais. Com relação aos princípios norteadores da Política Nacional de Humanização (PNH), assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e gestão, fortalecendo e estimulando processos integradores e promotores de compromissos e responsabilização.
- b) Estímulo a processos fragmentados de produção de saúde e com a produção de sujeitos sem autonomia.
- c) Fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional, estimulando a transdisciplinaridade e a grupalidade.
- d) Atuação em rede com alta conectividade, de modo cooperativo e solidário, em conformidade com as diretrizes do SUS.
- e) Utilização da informação, da comunicação, da educação permanente e dos espaços da gestão na construção de autonomia e protagonismo de sujeitos e coletivos.

33) Analise as sentenças abaixo que se referem à Constituição Federal:

- I. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- II. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- III. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização, com direção única em cada esfera de governo; atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade.
- IV. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

Agora assinale a alternativa em que se indicam as sentenças corretas.

- a) Apenas I está correta.
- b) Apenas I e II estão corretas.
- c) Apenas I, II e III estão corretas.
- d) Apenas II, III e IV estão corretas.
- e) Todas estão corretas.

34) De acordo com a Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012, NÃO constituirão despesas com ações e serviços públicos de saúde, para fins de apuração dos percentuais mínimos aquelas decorrentes de:

- a) Vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária.
- b) Produção, aquisição e distribuição de insumos específicos dos serviços de saúde do SUS, tais como: imunobiológicos, sangue e hemoderivados, medicamentos e equipamentos médico-odontológicos.
- c) Saneamento básico, inclusive quanto às ações financiadas e mantidas com recursos provenientes de taxas, tarifas ou preços públicos instituídos para essa finalidade.
- d) Atenção integral e universal à saúde em todos os níveis de complexidade, incluindo assistência terapêutica e recuperação de deficiências nutricionais.
- e) Capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS).

35) A Portaria nº 4.279, de 30 de Dezembro de 2010, estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde (RAS) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Com relação a esta portaria assinale a alternativa correta:

- a) O modelo de atenção à saúde vigente fundamentado nas ações curativas, centrado no cuidado médico e estruturado com ações e serviços de saúde dimensionados a partir da oferta, tem se mostrado altamente eficiente para dar conta dos desafios sanitários atuais e sustentáveis para os enfrentamentos futuros.
- b) A Rede de Atenção à Saúde (RAS) fundamenta-se na compreensão da Atenção Primária à Saúde (APS) como primeiro nível de atenção, enfatizando a função resolutiva dos cuidados primários sobre os problemas mais comuns de saúde e a partir do qual se realiza e coordena o cuidado em todos os pontos de atenção.
- c) A Rede de Atenção à Saúde (RAS) não tem se mostrado como uma estratégia para superar a fragmentação da atenção e da gestão nas Regiões de Saúde.
- d) A Rede de Atenção à Saúde (RAS) caracteriza-se pela formação de relações hierárquicas entre os pontos de atenção com o centro de comunicação na Atenção Especializada, pela centralidade nas necessidades em saúde de uma população, pela responsabilização na atenção hospitalar.
- e) O objetivo da Rede de Atenção à Saúde (RAS) é promover a integração sistêmica, de ações e serviços de saúde com provisão de atenção cada vez mais especializada, centrada nos equipamentos de alta tecnologia.