



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
ESTADO DO PARANÁ

EDITAL 030/2013 - GPQS/DGTES/AMS

## CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE PROMOTOR DE SAÚDE PÚBLICA – SERVIÇO DE MEDICINA GERAL

PROVA OBJETIVA - Data 24/03/2013

Nome: \_\_\_\_\_ Inscrição: \_\_\_\_\_

**1) Em relação ao aspecto nutricional, assinale a alternativa CORRETA sobre a importância dos minerais:**

- a) Sódio para a coagulação do sangue.
- b) Cálcio para a contração muscular.
- c) Fósforo para a função renal.
- d) Cloro para formação óssea.
- e) Magnésio para equilíbrio da pressão osmótica.

**2) Para a avaliação de um paciente com dor abdominal, é CORRETO afirmar que:**

- a) Para um paciente com infecção do trato urinário, o principal exame é a cultura de urina.
- b) Se a causa da dor abdominal é uma hérnia de hiato, o principal exame é o ultrassom abdominal.
- c) Se a hipótese diagnóstica é de pancreatite, a melhor opção de exame é uma endoscopia digestiva alta.
- d) Se existe suspeita de colite ulcerativa, o principal exame é um RX não contrastado de abdome.
- e) Em um paciente com suspeita de Doença de Crohn, os exames mais adequados são as provas de função hepática.

**3) Na ausculta cardíaca, é CORRETO afirmar que:**

- a) A esclerose tricúspide produz um sopro sistólico.
- b) Na comunicação interventricular, quanto maior a diferença da pressão entre as câmaras menor é o sopro auscultado.
- c) A hipofonese da segunda bulha no foco aórtico é comumente encontrada nos pacientes com hipertensão arterial sistêmica.
- d) Em pacientes com fibrilação arterial, a presença concomitante da quarta bulha representa um pior prognóstico.
- e) A terceira bulha cardíaca (B3) é ouvida sempre durante a fase diastólica do ciclo cardíaco.

**4) No tratamento da hipertensão arterial sistêmica, é CORRETO afirmar que:**

- a) Nos pacientes com hipertensão arterial leve a primeira abordagem terapêutica farmacológica deve sempre ser feita com furosemida.
- b) O betabloqueador é a droga mais indicada para os pacientes com hipertensão arterial associada à insuficiência arterial periférica.
- c) Em pacientes hipertensos com diabetes melitus, o uso de inibidores da ECA é o mais indicado.
- d) A maior parte dos pacientes atingirá a meta da pressão arterial com o uso de monoterapia anti-hipertensiva.
- e) Em pacientes hipertensos com osteoporose está contra-indicado o uso de diuréticos tiazídicos.

**5) Em relação à doença isquêmica do coração, é CORRETO afirmar que:**

- a) Todo infarto agudo do miocárdio apresenta elevação do segmento ST no eletrocardiograma.
- b) A fibrilação ventricular é a principal causa de morte por infarto agudo do miocárdio.
- c) O sexo masculino não é um fator de risco para a arteriosclerose.
- d) O uso de qualquer tipo de bloqueadores de canal de cálcio está contra-indicado na angina pectoris.
- e) O uso de inibidores da ECA está contra-indicado durante a convalescença dos pacientes com infarto de miocárdio.

**6) Em relação às doenças endócrinas e metabólicas, é CORRETO afirmar que:**

- a) O hipopituitarismo não tem como agente causal a sarcoidose.
- b) Os bloqueadores de canal de cálcio utilizados no tratamento da hipertensão não estão listados como causa de hiperprolactinemia.
- c) O aumento na síntese de hormônio antidiurético (ADH) leva à poliúria.
- d) O hipotireoidismo pode ocorrer em qualquer idade, mas é mais comum em pacientes idosos.
- e) No hipertireoidismo não tratado, o nível plasmático de TSH está aumentado.

**7) Em relação ao diabetes melitus, é CORRETO afirmar que:**

- a) O diabetes tipo 2 está comumente associado à obesidade.
- b) A idade mais comum do início do diabetes tipo 1 é acima dos 30 anos de idade.
- c) O uso de insulina é necessário para todos os pacientes com diabetes melitus tipo 2.
- d) A insulina do tipo glargina tem uma duração de ação menor que a insulina tipo NPH.
- e) As biguanidas têm uma duração de ação maior que as sulfoniluréias.

**8) Com relação a problemas otorrinolaringológicos, é CORRETO afirmar que:**

- a) A miringite não apresenta qualquer relação com históricos de herpes nos pacientes.
- b) Em pacientes com idade acima de 14 anos, o agente causal mais comum da otite média aguda é *Escherichia coli*.
- c) O uso da eritromicina para o tratamento da otite média está contra-indicado pela sua ototoxicidade.
- d) A sialolitíase é mais comum em adultos que em crianças.
- e) A glossite atrófica é o principal achado na deficiência de frutose.

**9) Em relação às alterações oftalmológicas, é CORRETO afirmar que:**

- a) A causa mais comum de exoftalmia é a doença de Graves.
- b) No glaucoma é rara a queixa de escotomas.
- c) A anisocoria nunca é fisiológica, sempre é consequência de algum dano neurológico.
- d) Para o tratamento do lacrimejamento, a droga de escolha é epinefrina.
- e) A conjuntivite viral não é contagiosa.

**10) No caso das anemias, é CORRETO afirmar que:**

- a) A deficiência de vitamina C está relacionada à anemia microcítica.
- b) Na perda aguda de sangue, a anemia mais comum encontrada é a microcítica-hipocrômica.
- c) A talassemia apresenta uma anemia do tipo microcítica.
- d) A deficiência de ferro leva a uma anemia do tipo normocrômica-normocítica.
- e) A hemólise crônica leva a uma anemia microcítica-hipocrômica.

**11) Em relação às desordens imunológicas e alérgicas, é CORRETO afirmar que:**

- a) O tratamento do angioedema agudo grave deve ser feito com epinefrina em solução de 1 para 1000, em uma dose de 3ml endovenoso.
- b) Os problemas de atopia raramente acometem os olhos e o nariz.
- c) A sinusite é uma complicação rara nos pacientes com rinite alérgica.
- d) A alergia alimentar é uma resposta imune exagerada a determinados micronutrientes.
- e) Gengivites recorrentes podem ser sinais de imunodeficiência.

**12) Em relação às doenças infecciosas, é CORRETO afirmar que:**

- a) A febre de origem indeterminada é aquela que apresenta temperatura acima do normal por, pelo menos, seis semanas e, apesar de uma investigação adequada durante este período, não se tem o resultado adequado sobre o diagnóstico.
- b) A técnica mais acurada para medir a temperatura corpórea é a medida oral.
- c) O microorganismo mais frequentemente encontrado nos abscessos é o *Staphylococcus aureus*.
- d) A vacinação de tétano é feita apenas uma vez na vida.
- e) A vacina de rubéola deve ser dada para gestante no primeiro trimestre de gestação.

**13) Em relação às doenças infecciosas, é CORRETO afirmar que:**

- a) Os alimentos não interferem na absorção da amoxicilina.
- b) A digoxina reduz os níveis plasmáticos da rifampina.
- c) A neomicina deve somente ser usada por via parenteral.
- d) A toxicidade renal dos aminoglicosídeos é irreversível.
- e) A difteria é uma infecção aguda exclusivamente faringiana.

**14) Em relação às desordens psiquiátricas, é CORRETO afirmar que:**

- a) A anorexia nervosa acomete em sua grande maioria pacientes do sexo masculino.
- b) A prevalência de alcoolismo nos filhos de etilistas é igual à prevalência nos filhos dos não etilistas.
- c) O uso de esteróides anabólicos aumenta os níveis plasmáticos de HDL e diminui o de LDL.
- d) Os estados ansiosos e depressivos podem ser causados pelo diabetes Mellitus.
- e) O uso de cocaína pode causar sintomas de depressão.

**15) Com relação às desordens geniturinárias, é CORRETO afirmar que:**

- a) A presença de proteína na urina é sempre considerada anormal.
- b) Normalmente a excreção urinária de albumina é diagnosticada com valores menores do que 80mg por dia.
- c) A presença de nitritos na urina é fisiológica e inespecífica.
- d) A presença de cristalúria é rara, usual e clinicamente significativa.
- e) Microalbuminúria é diagnosticada com valores acima de 30mg/g.

**16) Em relação às desordens neurológicas, é CORRETO afirmar que:**

- a) A dor neuropática é resultante de um dano ou disfunção exclusivamente de um nervo periférico.
- b) A amitriptilina está indicada para uso nas dores neuropáticas.
- c) A agnosia é uma disfunção que envolve a compreensão ou expressão de palavras.
- d) A afasia é a incapacidade total ou parcial de recordar experiências passadas.
- e) A apraxia é a incapacidade de identificar um objeto usando um ou mais sentidos.

**17) Em relação à farmacologia clínica, é CORRETO afirmar que:**

- a) O fígado é o órgão menos importante no metabolismo das drogas.
- b) O efeito adverso das drogas é uma causa de falta de aderência ao tratamento.
- c) Em pacientes idosos, o metabolismo e excreção das drogas está aumentado.
- d) O uso de anti-inflamatórios não esteróides em pacientes idosos com hipertensão pode levar à hipotensão e ao choque.
- e) O uso da digoxina pode ter como efeito o aumento do apetite.

**18) Em relação ao câncer de próstata, é INCORRETO afirmar que:**

- a) É a quarta causa mais comum de mortalidade por câncer em homens no Brasil.
- b) Apresenta como fatores de risco, idade avançada e cor negra.
- c) É uma neoplasia responsiva à quimioterapia, porém sem aumento na sobrevida.
- d) Apesar do diagnóstico precoce, os estudos não demonstraram redução da mortalidade geral.
- e) Essa neoplasia, geralmente, tem crescimento lento.

**19) Mulher de 50 anos, com sobrepeso (índice de massa corporal de 27kg/m<sup>2</sup>), hipertensa controlada com medicações e com antecedente de diabetes gestacional, procura atendimento médico para investigação laboratorial periódica a fim de avaliar sua regulação glicêmica. Foi solicitada glicemia de jejum, que resultou 114mg/dL. O próximo passo seria:**

- a) Glicemia casual.
- b) Investigar Diabetes melitus em 3 a 7 anos, dependendo do grau de suspeita clínica.
- c) Iniciar metformina.
- d) Teste oral de tolerância à glicose (TTG-75g).
- e) Orientar retorno, se apresentar poliúria e polidipsia.

**20) Mulher de 55 anos comparece à consulta apresentando múltiplas queixas, tais como: cefaleia, dor nas costas, náuseas, insônia e dificuldade para deglutir. Ela informa que tem estes sintomas há pelo menos 5 anos, tendo se consultado com diversos médicos e realizado vários exames, sem melhora do quadro. O Médico realiza um exame clínico minucioso e, revisando os exames realizados, chega à conclusão de que se trata de uma paciente somatizadora. Diante deste tipo de paciente, dos princípios e condutas elencados abaixo, assinale a alternativa que apresenta o procedimento mais CORRETO para uma abordagem inicial.**

- a) Solicitar novos exames até encontrar algum problema que explique estes sintomas.
- b) Dizer à paciente que ela não tem nada no corpo e que seu problema é psíquico.
- c) Estabelecer um vínculo sólido, por meio do agendamento de consultas regulares.
- d) Prescrever medicamentos analgésicos e iniciar tratamento com antidepressivo.
- e) Encaminhar a paciente de imediato para avaliação e tratamento com Psiquiatra.

**21) Uma paciente de 42 anos procura o Médico referindo insônia inicial há 1 mês, dificuldade de concentração no trabalho e irritabilidade aumentada. Refere que desde o dia anterior sente dispneia, palpitações, tonturas e dormência nas mãos. Na revisão do prontuário, observa-se que ela já buscou atendimento pelos mesmos motivos outras vezes. Diante dessa situação, o Médico deve tomar algumas condutas, EXCETO:**

- a) Excluir que o quadro possa ser um efeito adverso de algum fármaco.
- b) Confrontar os dados obtidos na anamnese com as características clínicas dos transtornos de ansiedade.
- c) Tranquilizar a paciente, dizendo que ela apresenta um quadro de ansiedade e encaminhá-la ao especialista para receber a terapia adequada.
- d) Excluir doenças físicas que provoquem sintomas de ansiedade.

- e) Excluir a presença de algum transtorno psiquiátrico como depressão, transtornos psicóticos ou transtornos de personalidade, dos quais a ansiedade faz parte, mas que requerem tratamento específico ou encaminhamento para especialista.

**22) Um homem de 35 anos procura o serviço de saúde com uma história de tratamento bem sucedido de tuberculose pulmonar, porém há uma semana vem apresentando episódios recorrentes de hemoptise, febre vespertina e emagrecimento. Qual o diagnóstico mais provável?**

- a) Aspergilose.
- b) Sarcoidose.
- c) Carcinoma de pulmão.
- d) Nenhum dos anteriores.
- e) Recidiva de tuberculose pulmonar.

**23) Um dos principais objetivos do cuidado com os pacientes idosos é a manutenção da sua independência social. Para atingir tal objetivo, uma tarefa importante do Médico é desenvolver uma abordagem sistematizada para essa população. Dentre as intervenções abaixo, assinale a alternativa que NÃO apresenta evidências que justifiquem sua inclusão na abordagem ao idoso:**

- a) Rastreamento da osteoporose em todas as mulheres, através de densitometria óssea, para prevenção de fraturas.
- b) Avaliação cognitiva quando cuidadores descrevem ou informam sobre declínio cognitivo, para a prevenção de insuficiência cognitiva.
- c) Estratégias de vacinação de grande alcance em todos os idosos para prevenção de influenza.
- d) Avaliação multidisciplinar do idoso após registro de queda para a prevenção de novas quedas ou acidentes domiciliares.
- e) Vacina contra pneumococo em dose única para pacientes imunocompetentes institucionalizados com mais de 55 anos.

**24) Homem de 48 anos comparece à consulta exclusivamente para buscar “o exame da próstata”, pressionado pela esposa e preocupado com o que tem visto na imprensa, mas em dúvida sobre a necessidade do exame devido ao que tem pesquisado na Internet. Ele está assintomático e não tem história familiar de doença prostática. Quanto ao câncer de próstata, assinale a alternativa CORRETA:**

- a) A maioria dos casos de câncer de próstata ocorre em homens entre 50 e 60 anos de idade, sendo, por isso, tal grupo priorizado em programas de rastreamento.
- b) Muitos portadores de câncer de próstata, mesmo sem tratamento, apresentam câncer de crescimento lento e acabam falecendo por outras doenças.
- c) Disfunção erétil e incontinência urinária são menos comuns entre pacientes tratados de câncer de próstata do que entre pacientes semelhantes mantidos em observação expectante.
- d) Um argumento contra o rastreamento de câncer prostático em nível populacional é que a este cabe parcela insignificante da mortalidade por câncer em brasileiros.
- e) A detecção precoce do câncer de próstata não chega a tornar menos invasiva à terapêutica recomendada.

**25) Quanto ao tabagismo, considere as afirmações abaixo.**

- I. Uma intervenção breve, como simplesmente alertar o fumante, produz taxas de cessação do tabagismo de 5 a 10% por ano.
- II. Os tratamentos para deixar de fumar são mais custos-efetivos do que o tratamento da hipertensão e da dislipidemia.

- III. A bupropiona, a nortriptilina e a clonidina são os fármacos de primeira linha no tratamento da dependência da nicotina.
- IV. Os pacientes com indicação de uso da terapia de reposição de nicotina devem iniciar o tratamento 1 a 2 semanas antes de deixar de fumar.

**Assinale a alternativa que contenha as afirmativas corretas.**

- a) I e II, apenas.
- b) III e IV, apenas.
- c) I, III e IV, apenas.
- d) II, III e IV, apenas.
- e) I, II, III e IV.

**26) A atenção à saúde no Brasil tem investido na formulação, implementação e concretização de políticas de promoção, proteção e recuperação da saúde. Há um grande esforço na construção de um modelo de atenção à saúde que priorize ações de melhoria da qualidade de vida dos sujeitos e coletivos. Em relação aos objetivos da Política Nacional de Promoção da Saúde assinale a alternativa INCORRETA:**

- a) Incorporar e implementar ações de promoção da saúde, com ênfase na atenção especializada e de média e alta complexidade.
- b) Ampliar a autonomia e a co-responsabilidade de sujeitos e coletividades, inclusive o poder público, no cuidado integral à saúde e minimizar e/ou extinguir as desigualdades de toda e qualquer ordem (étnica, racial, social, regional, de gênero, de orientação/opção sexual, entre outras).
- c) Contribuir para o aumento da resolubilidade do Sistema, garantindo qualidade, eficácia, eficiência e segurança das ações de promoção da saúde.
- d) Valorizar e otimizar o uso dos espaços públicos de convivência e de produção de saúde para o desenvolvimento das ações de promoção da saúde.
- e) Favorecer a preservação do meio ambiente e a promoção de ambientes mais seguros e saudáveis.

**27) Com relação às estratégias preconizadas para implementação da Política Nacional de Promoção da Saúde, analise as sentenças abaixo:**

- I. Estruturação e fortalecimento das ações de promoção da saúde no Sistema Único de Saúde, privilegiando as práticas de saúde sensíveis à realidade do Brasil.
- II. Estímulo à inserção de ações de promoção da saúde em todos os níveis de atenção, com ênfase na atenção básica, voltadas às ações de cuidado com o corpo e a saúde; alimentação saudável e prevenção, e controle ao tabagismo.
- III. Desenvolvimento de estratégias de qualificação em ações de promoção da saúde para profissionais de saúde inseridos no Sistema Único de Saúde.
- IV. Apoio a estados e municípios que desenvolvam ações voltadas para a implementação da Estratégia Global, vigilância e prevenção de doenças e agravos não transmissíveis.

**Agora assinale a alternativa em que se indicam as sentenças corretas.**

- a) Apenas I e II estão corretas.
- b) Apenas I, II e III estão corretas.
- c) Apenas II, III e IV estão corretas.
- d) Apenas II e IV estão corretas.
- e) Todas estão corretas.

**28) Humanizar é ofertar atendimento de qualidade, articulando os avanços tecnológicos com acolhimento, com melhoria dos ambientes de cuidado e das condições de trabalho dos profissionais. Com relação aos princípios norteadores da Política Nacional de Humanização (PNH), assinale a alternativa INCORRETA:**

- a) Valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e gestão, fortalecendo e estimulando processos integradores e promotores de compromissos e responsabilização.
- b) Estímulo a processos fragmentados de produção de saúde e com a produção de sujeitos sem autonomia.
- c) Fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional, estimulando a transdisciplinaridade e a grupalidade.
- d) Atuação em rede com alta conectividade, de modo cooperativo e solidário, em conformidade com as diretrizes do SUS.
- e) Utilização da informação, da comunicação, da educação permanente e dos espaços da gestão na construção de autonomia e protagonismo de sujeitos e coletivos.

**29) A Política Nacional de Humanização (PNH) visa trabalhar para consolidar, prioritariamente, algumas ações específicas. São elas:**

- I. Reduzir as filas e o tempo de espera com ampliação do acesso e atendimento acolhedor e resolutivo baseados em critérios de risco.
- II. Reduzir as filas apenas para as consultas de especialidades básicas e o tempo de espera para as cirurgias eletivas com ampliação do acesso e atendimento resolutivo baseados em critérios socioeconômicos da população.
- III. As unidades de saúde garantirão sigilo das informações (de qualquer natureza), podendo ter acesso às informações apenas os trabalhadores de saúde.
- IV. As unidades de saúde garantirão gestão participativa aos seus trabalhadores e usuários, assim como educação permanente aos trabalhadores.

Agora assinale a alternativa em que se indicam as sentenças corretas.

- a) Apenas I e II estão corretas.
- b) Apenas I, II e III estão corretas.
- c) Apenas II, III e IV estão corretas.
- d) Apenas I e IV estão corretas.
- e) Todas estão corretas.

**30) Analise as sentenças abaixo que se referem à Constituição Federal:**

- I. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- II. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- III. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização, com direção única em cada esfera de governo; atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade.
- IV. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

**Agora assinale a alternativa em que se indicam as sentenças corretas.**

- a) Apenas I está correta.
- b) Apenas I e II estão corretas.
- c) Apenas I, II e III estão corretas.
- d) Apenas II, III e IV estão corretas.
- e) Todas estão corretas.

**31) De acordo com a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, NÃO constituirão despesas com ações e serviços públicos de saúde, para fins de apuração dos percentuais mínimos aquelas decorrentes de:**

- a) Vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária.
- b) Produção, aquisição e distribuição de insumos específicos dos serviços de saúde do SUS, tais como: imunobiológicos, sangue e hemoderivados, medicamentos e equipamentos médico-odontológicos.
- c) Saneamento básico, inclusive quanto às ações financiadas e mantidas com recursos provenientes de taxas, tarifas ou preços públicos instituídos para essa finalidade.
- d) Atenção integral e universal à saúde em todos os níveis de complexidade, incluindo assistência terapêutica e recuperação de deficiências nutricionais.
- e) Capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS).

**32) O Pacto pela Vida (2006) está constituído por um conjunto de compromissos sanitários, expressos em objetivos de processos e resultados e derivados da análise da situação de saúde do País e das prioridades definidas pelos governos federal, estaduais e municipais. Assinale a alternativa que NÃO contempla uma das prioridades do Pacto pela Vida:**

- a) Saúde do Adolescente.
- b) Saúde do Idoso.
- c) Controle do câncer de colo de útero e de mama.
- d) Fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza.
- e) Fortalecimento da Atenção Básica.

**33) A Portaria nº 4.279, de 30 de Dezembro de 2010, estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde (RAS) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Com relação a esta portaria assinale a alternativa correta:**

- a) O modelo de atenção à saúde vigente fundamentado nas ações curativas, centrado no cuidado médico e estruturado com ações e serviços de saúde dimensionados a partir da oferta, tem se mostrado altamente eficiente para dar conta dos desafios sanitários atuais e sustentáveis para os enfrentamentos futuros.
- b) A Rede de Atenção à Saúde (RAS) fundamenta-se na compreensão da Atenção Primária à Saúde (APS) como primeiro nível de atenção, enfatizando a função resolutiva dos cuidados primários sobre os problemas mais comuns de saúde e a partir do qual se realiza e coordena o cuidado em todos os pontos de atenção.
- c) A Rede de Atenção à Saúde (RAS) não tem se mostrado como uma estratégia para superar a fragmentação da atenção e da gestão nas Regiões de Saúde.
- d) A Rede de Atenção à Saúde (RAS) caracteriza-se pela formação de relações hierárquicas entre os pontos de atenção com o centro de comunicação na Atenção Especializada, pela centralidade nas necessidades em saúde de uma população, pela responsabilização na atenção hospitalar.
- e) O objetivo da Rede de Atenção à Saúde (RAS) é promover a integração sistêmica, de ações e serviços de saúde com provisão de atenção cada vez mais especializada, centrada nos equipamentos de alta tecnologia.



**34) A Política Nacional de Atenção Básica estabelece diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica. Com relação à Atenção Básica assinale a alternativa INCORRETA:**

- a) A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades.
- b) É desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios definidos, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações.
- c) É desenvolvida com o mais alto grau de centralização e capilaridade, próxima da vida das pessoas. Deve ser o contato dos usuários quando os demais pontos de atenção forem insuficientes, é um centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde que é ordenada pela média a alta complexidade.
- d) Utiliza tecnologias de cuidado complexas e variadas que devem auxiliar no manejo das demandas e necessidades de saúde de maior frequência e relevância em seu território, observando critérios de risco, vulnerabilidade, resiliência e o imperativo ético de que toda demanda, necessidade de saúde ou sofrimento devem ser acolhidos.
- e) Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social. A Atenção Básica considera o sujeito em sua singularidade e inserção sócio-cultural, buscando produzir a atenção integral.

**35) A Atenção Básica tem como fundamentos e diretrizes:**

- I. Ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, a programação descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com impacto na situação, nos condicionantes e determinantes da saúde das coletividades que constituem aquele território sempre em consonância com o princípio da equidade.
- II. Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde; o estabelecimento de mecanismos que assegurem acessibilidade e acolhimento pressupõe uma lógica de organização e funcionamento do serviço de saúde, que parte do princípio de que a unidade de saúde deva receber e ouvir todas as pessoas que procuram os seus serviços, de modo universal e sem diferenciações excludentes.
- III. Adscriver os usuários e desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado. A adscrição dos usuários é um processo de vinculação de pessoas e/ou famílias e grupos a profissionais/equipes, com o objetivo de ser referência para o seu cuidado.
- IV. Desestimular a participação dos usuários como forma de garantir aos profissionais de saúde maior tranquilidade na construção do cuidado a saúde das pessoas, da coletividade do território, no enfrentamento dos determinantes e condicionantes de saúde, na organização e orientação dos serviços de saúde a partir de lógicas mais centradas no usuário.

**Agora assinale a alternativa em que se indicam as sentenças corretas.**

- a) Apenas I está correta.
- b) Apenas I e II estão corretas.
- c) Apenas I e III estão corretas.
- d) Apenas I, II e III estão corretas.
- e) Todas estão corretas.