

Língua Portuguesa

01. Marque o grupo de palavras, grafadas corretamente, quanto ao emprego de X e CH:

- A) Xarque, xuxu, chícara, chumaço, chumbada.
- B) Trouxa, recauchutar, mexerica, mexerico, enxerido.
- C) Charque, xoque, chorar, xícara, chuleta.
- D) Xumaço, chuteira, xeque, chepa, xilofone.
- E) Cherém, xepa, xampu, chiita, chilofone.

02. Marque a alternativa, cujo grupo de palavras está corretamente acentuada, de acordo com o Novo Acordo Ortográfico da língua portuguesa:

- A) Rústico, Sofá, Harém, Assembleia, Ideia, Papéis, Balaústre.
- B) Assembléia, Heroi, Vestuário, Inevitavel, Pestífero, Rotulo, Elétrico.
- C) Idéia, Herói, Inevitável, Media, Rótulo, Egregio, Egoísta.
- D) Heróico, Vestuario, Indivíduo, Egrégio, Hidraulico, Inúmero.
- E) Individuo, Média, Pestifero, Eletrico, Egoista, Hidrelétrica, Número.

03. Podemos classificar os numerais grifados nas frases abaixo como:

- 1) Arnóbio foi o noningentésimo oitavo colocado no concurso.
- 2) Mariana respondeu a um quinto da prova oral.
- 3) Albertina deu à luz a filhos sêxtuplos.
- 4) Francisco tem um rebanho com mais de cem mil cabeças de gado.

- A) Ordinal, multiplicativo, fracionário, cardinal
- B) Cardinal, ordinal, fracionário, multiplicativo
- C) Ordinal, fracionário, multiplicativo, cardinal
- D) Multiplicativo, ordinal fracionário, cardinal
- E) Nenhuma das respostas

04. Preencha os espaços, em aberto, craseando corretamente.

_____ (A, À) tarde, iremos ao cinema com _____ (AS, ÀS) crianças, voltaremos _____ (AS, ÀS) 17 horas e aguardaremos Fernanda _____ (A, À) qualquer hora para o jantar. A refeição está pronta desde _____ (AS, ÀS) duas horas.

- A) À, ÀS, AS, À, AS
- B) A, ÀS, ÀS, À, ÀS
- C) A, AS, ÀS, A, ÀS
- D) À, AS, ÀS, A, AS
- E) A, AS, ÀS, A, AS

05. Quais das frases abaixo estão corretas quanto à concordância nominal:

- 1) Será muito cara a comemoração dos 15 anos de formatura.
- 2) Custou muito caro a festa do meu aniversário.
- 3) É bom ficar a sós com meus pensamentos.
- 4) Maria entregou as correspondências em mão.
- 5) A cirurgia demorou, eu mesma fiquei apreensiva.

- A) 1\3\5
- B) 1\3\4\5
- C) 1\4\5
- D) 1\2\4\5
- E) 1\2\3\4\5

06. Quais das frases abaixo estão corretas quanto à concordância verbal:

- 1) Mais de um professor participou das assembleias.
- 2) Mais de um professor participaram das assembleias.
- 3) Ia dar oito horas quando Maria chegou do trabalho.
- 4) Ana, José e Francisca festejou o São João na roça.
- 5) Procura-se costureiras experientes.

- A) 1\3\5
- B) 1\5
- C) 1\4
- D) 2\5
- E) 3\4\5

07. Classifique as orações coordenadas sindéticas com conjunções:

- 1) O jogador faz o gol e corre para o abraço.
- 2) O professor é profundo conhecedor do tema, entretanto está afastado de suas funções.
- 3) Fale agora, ou se cale para sempre.
- 4) Preencheu todos os requisitos para o cargo, portanto foi admitido hoje.
- 5) Dizia meu avô: saia cedo de casa, pois o trem se espera na estação.

- A) Explicativa, conclusiva, alternativa, adversativa, aditiva.
- B) Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa.
- C) Conclusiva, explicativa, alternativa, adversativa, aditiva.
- D) Alternativa, explicativa, conclusiva, adversativa, aditiva.
- E) Nenhuma das alternativas está correta.

08. As orações subordinadas adverbiais podem ser classificadas como:

- A) Apositivas, temporais, causais, comparativas, condicionais, consecutivas, conformativas.
- B) Temporais, causais, concessivas, comparativas, condicionais, consecutivas, conformativas, finais, proporcionais.
- C) Restritivas, explicativas, temporais, comparativas, condicionais, causais, consecutivas, finais.
- D) Predicativas, apositivas, concessivas, condicionais, conformativas, causais, consecutivas, finais.
- E) Objetivas diretas, predicativas, explicativas, condicionais, causais, consecutivas, proporcionais, finais.

09. Assinale a frase corretamente pontuada:

- A) Cairá a diretoria de futebol, ou eu deixarei de ser sócia.
- B) Nunca nunca esquecerei!
- C) Não, não tenho certeza, disse ele, a mim.
- D) Londres, 20, de junho, de 1980.
- E) Você vai agora! Eu, parto, às 4 horas.

10. Reproduzimos, abaixo, trecho do discurso do Papa Francisco, na Jornada Mundial da Juventude, dia 22 de julho de 2013, no Rio de Janeiro.

Com base neste trecho do discurso papal, o que o Papa quis dizer ao afirmar: “Com essas atitudes, recebemos hoje o futuro” ?

A juventude é a janela pela qual o futuro entra no mundo e, por isso, nos impõe grandes desafios. A nossa geração se demonstrará à altura da promessa contida em cada jovem quando souber abrir-lhe espaço; isso significa tutelar as condições materiais e imateriais para o seu pleno desenvolvimento; oferecer a ele fundamentos sólidos, sobre os quais construir a vida; garantir-lhe segurança e educação para que se torne aquilo que ele pode ser; transmitir-lhe valores duradouros pelos quais a vida mereça ser vivida, assegurar-lhe um horizonte transcendente que responda à sede de felicidade autêntica, suscitando nele a criatividade do bem; entregar-lhe a herança de um mundo que corresponda à medida da vida humana; despertar nele as melhores potencialidade para que seja sujeito do próprio amanhã e corresponsável do destino de todos. Com essas atitudes recebemos hoje o futuro.

- A) Recebemos hoje a tecnologia
- B) Recebemos hoje o desenvolvimento
- C) Recebemos hoje Jesus Cristo
- D) Recebemos hoje a juventude
- E) Recebemos hoje o desafio de melhorar a sociedade

11. Assinale a alternativa, cujo emprego do hífen, está correta, de acordo com o Novo Acordo Ortográfico.

- A) Ano luz, guarda-noturno, tenente-coronel, primeiro ministro, João-ninguém.
- B) Ano-luz, guardanoturno, tenente coronel, primeiro-ministro, João ninguém.
- C) Ano-luz, guarda-noturno, tenente-coronel, primeiro-ministro, João-ninguém.
- D) Ano luz, guarda-noturno, tenente-coronel, primeiro-ministro, João ninguém.
- E) Ano luz, guarda-noturno, tenente coronel, primeiro-ministro, João- ninguém.

12. Qual das alternativas abaixo reproduz Discurso Direto?

- A) Ouvimos o vaqueiro de uma fazenda próxima nos perguntar, quando estávamos numa estrada erma, o que fazíamos ali e eu pedi ajuda.
- B) Sinhá Chica é bordadeira de mão cheia. Amanhece e anoitece bordando, não sabe pedir ajuda: ordena. Difícil uma mulher tosca ser gentil para pedir. Critica as ajudantes. Ah! Duvido que não obedeçam?
- C) Estávamos numa estrada erma quando de repente ouvimos uma voz: - O que fazem aqui? Era o vaqueiro de uma fazenda próxima. Retruquei: - pode nos ajudar?
- D) Todas as alternativas.
- E) Nenhuma das alternativas.

13. Passe do discurso indireto para o direto assinalando a resposta correta:

Então perguntei se os médicos virão trabalhar esta semana.

- A) Então perguntei: - Os médicos virão trabalhar esta semana ?
- B) Então me foi perguntado se os médicos virão trabalhar esta semana.
- C) Então me perguntei se os médicos virão trabalhar esta semana.
- D) Então os médicos perguntaram se virão trabalhar esta semana.
- E) Então os médicos se perguntaram se virão trabalhar esta semana.

14. A Sociolinguística compreende o fator regional das expressões na língua portuguesa. Indique o significado das 5 (cinco) expressões da coluna à esquerda:

1) BAIXA DA ÉGUA	() muita sorte (norte)
2) ENSACAR	() engravidar alguém (nordeste)
3) FEZ MAL	() Cemitério (sul)
4) ÉGUA DE LARGURA	() lugar muito longe (nordeste)
5) CAMPO SANTO	() colocar a blusa dentro da calça(nordeste)

- A) 1, 2, 3, 4, 5
- B) 4, 3, 5, 1, 2
- C) 3, 4, 5, 1, 2
- D) 5, 1, 3, 2, 4
- E) 4, 5, 3, 2, 1

15. Podemos nos comunicar de duas formas distintas utilizando a linguagem oral e escrita. A língua falada caracteriza-se por:

- A) Representar um estágio posterior a língua.
- B) Não ter ligação com a comunicação linguística, é reconhecida pelo tom da voz do falante.
- C) Não ser espontânea, utilizar-se de caretas e sons diversos.
- D) Ser espontânea, compreender a comunicação linguística, incluir mímicas e fisionomias e é acompanhada pelo tom de voz do falante.
- E) Ser um sistema rígido e disciplinado, que conta com fisionomia e voz do falante.

Conhecimentos Específicos

16. A principal contra indicação para administração de soluções por via intramuscular na região dorsoglútea em crianças menores de um ano de vida é:

Assinale a alternativa correta:

- A) Local bastante doloroso
- B) Local próximo ao nervo ciático
- C) Local com camada subcutânea espessa
- D) Local próximo aos nervos ulnar e radial
- E) Local com pouco poder de absorção

17. Constitui-se locais indicados para administração de soluções pela via subcutânea, todos exceto:

Assinale a alternativa correta:

- A) Face externa do braço;
- B) Região antero-lateral-posterior das coxas;
- C) Face interna do antebraço;
- D) Parede abdominal;
- E) Áreas superior e externa glúteas

18. Constituem-se atribuições do Auxiliar e do Técnico de Enfermagem da Equipe de Atenção Básica na Estratégia de Saúde da Família:

- I. Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados;
- II. Participar das atividades de atenção realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc.);
- III. Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea;
- IV. Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea;
- V. Realizar ações de educação em saúde à população adstrita, conforme planejamento da equipe;
- VI. Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS;
- VII. Contribuir, participar e realizar atividades de educação permanente;
- VIII. Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico deles;

Assinale a alternativa correta:

- A) Somente as afirmativas II, III, V, VI e VII estão corretas
- B) Somente as afirmativas III, IV, V e VII estão corretas
- C) Somente as afirmativas I, II, III, IV, V, VI e VII estão corretas
- D) Somente as afirmativas I, II, III, IV e VII estão corretas
- E) Somente as afirmativas II, III, V, VII e VIII estão corretas

19. Os medicamentos de aplicação otológica são administrados pelo (a):

Assinale a alternativa correta:

- A) Nariz;
- B) Olhos;
- C) Ouvido;
- D) Garganta;
- E) Reto;

20. Com relação a coleta do escarro para realização de baciloscopia, é correto afirmar que:

- I. A fase inicial do exame, que compreende a coleta, conservação e transporte do escarro é de responsabilidade da unidade de saúde;
- II. A amostra de escarro deve ser a que provém da árvore brônquica, obtida após esforço de tosse;
- III. O volume ideal é de 5ml a 10ml de escarro;
- IV. As amostras devem ser coletadas em local fechado de preferência;
- V. É recomendado, no mínimo, a coleta de duas amostras de escarro;
- VI. A amostra de escarro deve ser a que se obtém da faringe ou por aspiração de secreções nasais ou a que contém somente saliva;

Estão erradas as afirmativas:

- A) III e V apenas
- B) II e V apenas
- C) I e III apenas
- D) III e VI apenas
- E) IV e VI apenas

21. A globulina imune Rh (D) é administrada na puérpera na profilaxia de:

Assinale a alternativa correta:

- A) Eritroblastose fetal;
- B) Trombose venosa profunda;
- C) Síndrome de asperger;
- D) Infecções;
- E) Hanseníase;

22. Entende-se por Bowie & Dick:

Assinale a alternativa correta:

- A) Processo físico ou químico que destrói microrganismos patogênicos na forma vegetativa, micobactérias, a maioria dos vírus e dos fungos, de objetos inanimados e superfícies;
- B) Equipamento automatizado de limpeza que utiliza o princípio da cavitação, em que ondas de energia acústica propagadas em solução aquosa rompem os elos que fixam a partícula de sujeira à superfície do produto;
- C) Teste realizado para avaliar o desempenho do sistema de remoção de ar da autoclave assistida por bomba de vácuo;
- D) Produto destinado a limpeza de artigos e superfícies por meio da diminuição da tensão superficial, composto por grupo de substâncias sintéticas, orgânicas, líquidas ou pós solúveis em água que contém agentes umectantes e emulsificantes que suspendem a sujeira e evitam a formação de compostos insolúveis ou espuma no instrumento ou na superfície;
- E) Processo físico ou químico que destrói a maioria dos microrganismos de artigos semicríticos, inclusive micobactérias e fungos, exceto um número elevado de esporos bacterianos;

23. A assistência de enfermagem prestada à uma gestante em trabalho de parto avançado, apresentando complicação relacionada a prolapso de cordão umbilical. Nesta situação, a mesma deverá ser encaminhada ao bloco cirúrgico, tentando priorizar a descompressão do cordão, para isto está indicado o posicionamento da gestante em:

Assinale a alternativa correta:

- A) Posição Jakkniff
- B) Posição Ortostática
- C) Posição Genupeitoral
- D) Posição Sims
- E) Posição Trendelemburg

- 24.** A prática da “higienização das mãos” nos serviços de saúde tem o intuito de prevenir e controlar as infecções relacionadas à assistência à saúde, visando à segurança do paciente, dos profissionais de saúde e de todos aqueles envolvidos nos cuidados aos pacientes. Diante desta afirmação, quais os momentos certos para esta prática, propostos pelo MS/ANVISA:

Assinale a alternativa correta:

- A) Antes de tocar o paciente, Antes de realizar procedimento limpo/asséptico, Após o risco de exposição a fluidos corporais ou excreções, Após tocar o paciente, Após tocar superfícies próximas ao paciente.
- B) Antes de tocar o paciente, Após remover luvas, Antes de procedimentos cirúrgicos.
- C) Antes de tocar o paciente, Antes de iniciar a educação em saúde, Antes do preparo de medicações.
- D) Antes de tocar o paciente, Antes e Após uso do banheiro.
- E) Antes da higienização das mãos com preparação alcoólica.

- 25.** Imediatamente após o nascimento, um recém-nascido é considerado com boa vitalidade, quando:

Assinale a alternativa correta:

- A) Apresenta tônus muscular flácido
- B) Apresenta Frequência Cardíaca menor que 100
- C) Apresenta Frequência Respiratória entre 16 a 20 rpm
- D) Apresenta temperatura corporal abaixo de 36,5°C
- E) Apresenta Frequência Cardíaca maior que 100bpm

26. O calendário básico de vacinação da criança, proposto pelo Programa Nacional de Imunização DO Ministério da Saúde (PNI/MS), visa diminuir o risco de transmissão de enfermidades imunopreveníveis. Com base nessas informações e de acordo com preconizado pelo PNI numere a coluna da direita com base nas informações da coluna da esquerda.

VACINA	INDICAÇÕES
1. HEPATITE B	() Dose única ao nascer
2. PNEUMOCÓCICA 10 VALENTE	() 1ª dose ao nascer
3. PENTA	() 1ª, 2ª e 3ª doses aos 2, 4 e 6 meses de idade, respectivamente e uma dose de reforço, preferencialmente entre 12 e 15 meses de idade.
4. ROTAVÍRUS	() 1ª e 2ª doses aos 3 e 5 meses de idade, respectivamente e uma dose de reforço, preferencialmente entre 12 e 15 meses de idade.
5. BCG	() 1ª e 2ª doses (VIP) aos 2 e 4 meses respectivamente seguida de 3ª dose e reforço (VOP) aos 6 e 15 meses respectivamente
6. MENINGOCÓCICA C CONJUGADA	() 1ª dose de reforço aos 12 meses e 2ª dose de reforço aos 4 anos de idade
7. VIP/VOP	() 1ª dose aos 12 meses e 2ª dose aos 15 meses de idade
8. TRÍPLICE VIRAL	() 1ª dose aos 2 meses e 2ª dose aos 4 meses de idade
9. DTP	() 1ª, 2ª e 3ª doses aos 2, 4 e 6 meses de idade, respectivamente

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta da coluna da direita, de cima para baixo:

- A) 5 – 2 – 1 – 6 – 7 – 3 – 5 – 8 – 4
B) 5 – 1 – 5 – 2 – 7 – 0 – 3 – 4 – 6
C) 1 – 3 – 4 – 3 – 7 – 2 – 9 – 8 – 5
D) 5 – 1 – 2 – 6 – 7 – 9 – 8 – 4 – 3
E) 1 – 3 – 6 – 8 – 7 – 9 – 5 – 4 – 2

- 27.** O Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência foi aprovado pelo Ministério da Saúde, através da Portaria GM/MS n.º 2.048, de 5 de novembro de 2002 e visa a efetiva organização e estruturação das redes assistenciais na área de urgência e emergência. Entre outros assuntos, o Regulamento estabelece normas para o funcionamento do ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL.

Analise as assertivas a seguir:

- I. Atendimento pré-hospitalar móvel primário é quando o pedido de socorro for oriundo de um cidadão.
- II. Atendimento pré-hospitalar móvel secundário é quando a solicitação partir de um serviço de saúde, no qual o paciente já tenha recebido o primeiro atendimento necessário à estabilização do quadro de urgência apresentado, mas necessite ser conduzido a outro serviço de maior complexidade para a continuidade do tratamento.
- III. Os serviços de atendimento pré-hospitalar móvel devem contar com equipe de profissionais oriundos da área da saúde e não oriundos da área da saúde.
- IV. Considera-se como nível pré-hospitalar móvel na área de urgência, o atendimento que procura chegar precocemente à vítima, após ter ocorrido um agravo à sua saúde que possa levar a sofrimento, sequelas ou mesmo à morte, sendo necessário, portanto, prestar-lhe atendimento e/ou transporte adequado a um serviço de saúde devidamente hierarquizado e integrado ao SUS;
- V. Os serviços de atendimento pré-hospitalar móvel devem contar apenas com equipe de profissionais oriundos da área da saúde.

Assinale a alternativa correta:

- A) I, II, III e IV
- B) II, II, IV E V
- C) II, III, IV E V
- D) I, III, IV E V
- E) Todas as alternativas

Rascunho

28. O REGULAMENTO TÉCNICO DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - Portaria nº 2.048, classifica as ambulâncias em A a F. Correlacione a coluna da esquerda com a coluna da direita, a respeito da classificação das ambulâncias:

TIPOS DE AMBULÂNCIAS

CLASSIFICAÇÕES

- | | | |
|---|-----|---|
| 1. TIPO B – Ambulância de Suporte Básico | () | Veículo destinado ao transporte em decúbito horizontal de pacientes que não apresentam risco de vida, para remoções simples e de caráter eletivo. |
| 2. TIPO D – Ambulância de Suporte Avançado | () | Aeronave de asa fixa ou rotativa utilizada para transporte inter-hospitalar de pacientes e aeronave de asa rotativa para ações de resgate, dotada de equipamentos médicos homologados pelo Departamento de Aviação Civil - DAC. |
| 3. TIPO F – Embarcação de Transporte Médico | () | Veículo destinado ao atendimento e transporte de pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalares e/ou de transporte inter-hospitalar que necessitam de cuidados médicos intensivos. Deve contar com os equipamentos médicos necessários para esta função. |
| 4. TIPO A – Ambulância de Transporte | () | veículo de atendimento de urgências pré hospitalares de pacientes vítimas de acidentes ou pacientes em locais de difícil acesso, com equipamentos de salvamento (terrestre, aquático e em alturas). |
| 5. TIPO E – Aeronave de Transporte Médico | () | Veículo motorizado aquaviário, destinado ao transporte por via marítima ou fluvial. Deve possuir os equipamentos médicos necessários ao atendimento de pacientes conforme sua gravidade. |
| 6. TIPO C - Ambulância de Resgate | () | Veículo destinado ao transporte interhospitalar de pacientes com risco de vida conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de pacientes com risco de vida desconhecido, não classificado com potencial de necessitar de intervenção médica no local e/ou durante transporte até o serviço de destino. |

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta da coluna da direita, de cima para baixo:

- A) 4 – 5 – 6 – 1 – 3 – 2
B) 2 – 5 – 4 – 6 – 3 – 1
C) 1 – 5 – 6 – 2 – 3 – 4
D) 2 – 5 – 1 – 6 – 3 – 4
E) 4 – 5 – 2 – 6 – 3 – 1
29. Constituem-se indicadores de saúde no Brasil, segundo Indicadores e dados Básicos (IDB) – Brasil (2011), todas as alternativas, exceto:
- A) Indicadores de recurso e Indicadores de cobertura
B) Indicadores de mortalidade e Indicadores de morbidade
C) Indicadores demográficos e Indicadores socioeconômicos
D) Indicadores de fatores de risco e proteção
E) Nenhuma das respostas acima

- 30.** Os procedimentos de medida da pressão arterial são simples e de fácil realização, contudo, nem sempre são realizados de forma adequada. Segundo a VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, constituem-se procedimentos recomendados para a medida da pressão arterial, todas as alternativas, exceto:
- A) Explicar o procedimento, deixando-o em repouso por pelo menos 5 minutos, em ambiente calmo, certificando-se que o paciente NÃO está com a bexiga cheia, NÃO praticou exercícios físicos há pelo menos 60 minutos, NÃO ingeriu bebidas alcoólicas, café ou alimentos e NÃO fumou nos 30 minutos anteriores.
 - B) O paciente deve estar na posição sentada, pernas descruzadas, pés apoiados no chão, dorso recostado na cadeira e relaxado. O braço deve estar na altura do coração (nível do ponto médio do esterno ou 4o espaço intercostal), livre de roupas, apoiado, com a palma da mão voltada para cima e o cotovelo ligeiramente fletido.
 - C) O manguito do tamanho adequado ao braço deve ser colocado sem deixar folgas, 2 a 3 cm acima da fossa cubital, centralizando sobre a artéria braquial o meio da parte compressiva do manguito.
 - D) Palpar a artéria poplíteia na fossa cubital e colocar a campânula ou o diafragma do estetoscópio sem compressão excessiva. Inflar rapidamente até ultrapassar 20 a 30 mmHg o nível estimado da pressão sistólica, obtido pela palpação.
 - E) Proceder à deflação lentamente, determinando a pressão sistólica pela ausculta do primeiro som (fase I de Korotkoff) e, após, aumentar ligeiramente a velocidade de deflação determinando a pressão diastólica no desaparecimento dos sons (fase V de Korotkoff).
- 31.** NÃO Faz parte da lista de Notificação Compulsória Imediata (LNCI), conforme Portaria nº 104, de 25.01.2011 – Ministério da Saúde:
- Assinale a alternativa correta:
- A) Hantavirose
 - B) Violência doméstica, sexual e/ou outras violências
 - C) Botulismo
 - D) Carbúnculo ou Antraz
 - E) Cólera
- 32.** Os princípios preconizados pela Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Traumatizado (SBAIT) devem ser respeitados, analisando cada fase do ABCDE dos cuidados aos traumatizados. Sobre as recomendações propostas para o atendimento inicial ao Politraumatizado, é correto afirmar que:
- A) A Fase B (Breathing) corresponde a ventilação, apenas;
 - B) A Fase D (Disability) corresponde a despir o paciente e manter controle da temperatura;
 - C) A Fase A (Airway) corresponde à manutenção das vias aéreas, apenas;
 - D) A Fase E (Exposure) corresponde a avaliação neurológica rápida;
 - E) A Fase C (Circulation) corresponde a circulação e controle de hemorragia;
- 33.** A Escala de Coma de Glasgow (GCS) é um método rápido e prático de avaliação primária neurológica do paciente vítima de traumatismo crânio-encefálico (TCE), com base nesta afirmação é incorreto afirmar que:
- A) Paciente apresentando escore na GCS entre 9 e 12 são considerados pacientes com TCE moderado;
 - B) Paciente apresentando escore na GCS igual ou inferior a 8 são considerados pacientes em estado de coma ou com TCE grave;
 - C) Pacientes com GCS menor ou igual a 8 devem ser submetidos a uma via aérea definitiva;
 - D) Paciente apresentando escore na GCS de 13 a 15 são considerados pacientes com TCE leve;
 - E) Pacientes apresentando escore na GCS de 15 são considerados pacientes livre de TCE não necessitando portando de novas avaliações;

34. A Sociedade Brasileira de Cardiologia estabelece critérios para a abordagem à vítima em PCR, através da I Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de Emergência. Sobre este assunto é correto avaliar que. Todas as alternativas são verdadeiras, exceto:

- A) Ao deparar com a vítima estando sem respirar ou estando somente com “gasping”, e existindo apenas um socorrista, chame ajuda imediatamente;
- B) Para vítimas com suspeita de PCR o socorrista deve iniciar ciclos de 30 compressões e 2 ventilações se dispositivo de barreira disponível;
- C) Primeiramente é importante avaliar se o local em que o paciente se encontra é seguro para o socorrista e para a vítima;
- D) Iniciar o **A – B – C**, onde **A** corresponde abertura das vias Aéreas, **B** Boa ventilação e **C** Compressão Torácica;
- E) Nos casos de PCR por hipóxia (afogamento, trauma, overdose de drogas e para todas as crianças), o socorrista deverá realizar cinco ciclos de RCP e, depois, chamar ajuda, se estiver sozinho.

35. Não constitui objetivo da Política Nacional de Saúde Mental do Brasil – Ministério da saúde:

Assinale a alternativa correta:

- A) Implantar o programa "De Volta Para Casa";
- B) Qualificar, expandir e fortalecer a rede extra-hospitalar formada pelos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs) e Unidades Psiquiátricas em Hospitais Gerais (UPHG);
- C) Garantir o modelo de assistência centrado no Manicômio Judiciário;
- D) Reduzir de forma pactuada e programada os leitos psiquiátricos de baixa qualidade;
- E) Incluir as ações da saúde mental na atenção básica;

36. Sobre Hanseníase, assinale (V) para as afirmativas Verdadeiras e (F) para as alternativas falsas. E em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta:

- () Os casos de recidiva em Hanseníase são raros em pacientes tratados regularmente, com os esquemas poliquimioterápicos;
- () Doença crônica granulomatosa, proveniente de infecção causada pelo *Mycobacterium leprae*;
- () A principal via de eliminação dos bacilos dos pacientes multibacilares (virchowianos e dimorfos) é a aérea superior, sendo, também, o trato respiratório a mais provável via de entrada do *M. leprae* no corpo;
- () O Período de incubação, é em média, 2 a 7 anos;
- () Pode ser classificada em:
- () PAUCIBACILAR (PB) - Casos com até 5 lesões de pele;
- () MULTIBACILAR (MB) - Casos com mais de 5 lesões de pele.
- () Os pacientes devem ser tratados em regime ambulatorial.

- A) V – V – V – V – V – V
- B) F – F – F – F – F – F
- C) V – F – F – F – V – V
- D) V – F – V – F – V – F
- E) F – V – V – V – F – F

37. Constituem-se sintomas clássicos da Tuberculose Pulmonar:

Assinale a alternativa correta:

- A) Emagrecimento abrupto, tosse produtiva e febre baixa
- B) Tosse persistente, produtiva ou não (com muco e eventualmente sangue), febre vespertina, sudorese noturna e emagrecimento.
- C) Bom estado geral, inalteração do apetite e dor torácica do tipo pleurítica
- D) Icterícia, emagrecimento, febre vespertina e tosse
- E) Irritação, com febre alta, sudorese noturna, inapetência

38. Sobre Leptospirose é incorreto afirmar que:

- A) Doença infecciosa febril de início abrupto, que pode variar desde formas assintomáticas e subclínicas até quadros clínicos graves associados a manifestações fulminantes;
- B) O principal reservatório é constituído pelos roedores;
- C) As apresentações clínicas, considerando as fases evolutivas da doença são fase mucosa e fase cutânea
- D) A infecção humana resulta da exposição direta ou indireta a urina de animais infectados. A penetração do microrganismo ocorre através da pele com presença de lesões, da pele integra imersa por longos períodos em água contaminada ou através de mucosas.
- E) O agente etiológico é a Bacteria helicoidal (espiroqueta) aeróbica obrigatória do genero *Leptospira*, do qual se conhecem atualmente 14 espécies patogênicas, sendo a mais importante a *L. interrogans*.

39. Sobre os cuidados a serem dispensados à criança acometida por Meningite Viral, é incorreto afirmar que:

- A) Extremamente importante o isolamento do paciente em ambientes próprios.
- B) Está indicado apenas tratamento de suporte;
- C) Aferição de SSVV e tomada de medidas gerais de higiene;
- D) Constitui-se em agravo de Notificação Obrigatória;
- E) Acompanhamento na coleta de liquor cefalorraquidiano

40. O Transporte Seguro realizado no atendimento ao recém-nascido que necessite de transferência inter-hospitalar deve obedecer a princípios básicos. Assinale a alternativa que não corresponde a um desses princípios:

- A) A equipe de transporte deve ter, de preferência, um pediatra ou neonatologista e estar acompanhado por um técnico de enfermagem ou por um enfermeiro que tenha conhecimento e prática no cuidado ao RN.
- B) Prévia comunicação, do profissional solicitante da transferência e a central reguladora de vagas e obrigatória comunicação com o hospital de destino;
- C) Para o uso do oxigênio e ar comprimido torna-se necessário o emprego de dois cilindros do tipo G, com capacidade para 1.000L. Eles permitem o emprego do gás por aproximadamente três horas, quando o fluxo usado é de 5L/min.
- D) Deve-se pedir autorização escrita ao responsável legal pelo RN, para a remoção. Em caso de risco iminente de vida, o profissional está autorizado a transferir o neonato sem a autorização do responsável.
- E) São exemplos de equipamentos necessários para a realização do transporte: Incubadora de dupla parede, ventilador eletrônico, bomba de infusão, termômetro, estetoscópio, oxímetro de pulso, aparelho para controle de glicemia capilar, monitor cardíaco, esfigmomanômetro, gases e luvas estéreis, material para coleta de exames, máscaras para ventilação, sondas gástricas, sondas de aspiração traqueal, laringoscópio, pilhas e lâmpadas sobressalentes, cânulas traqueais, cânula de Guedel, balão auto-inflável, manômetro, plástico poroso (PVC) e touca de malha, entre outros materiais