

Língua Portuguesa

01. Marque o grupo de palavras, grafadas corretamente, quanto ao emprego de X e CH:

- A) Xarque, xuxu, chícara, chumaço, chumbada.
- B) Trouxa, recauchutar, mexerica, mexerico, enxerido.
- C) Charque, xoque, chorar, xícara, chuleta.
- D) Xumaço, chuteira, xeque, chepa, xilofone.
- E) Cherém, xepa, xampu, chiita, chilofone.

02. Marque a alternativa, cujo grupo de palavras está corretamente acentuada, de acordo com o Novo Acordo Ortográfico da língua portuguesa:

- A) Rústico, Sofá, Harém, Assembleia, Ideia, Papéis, Balaústre.
- B) Assembléia, Heroi, Vestuário, Inevitavel, Pestífero, Rotulo, Elétrico.
- C) Idéia, Herói, Inevitável, Media, Rótulo, Egregio, Egoísta.
- D) Heróico, Vestuario, Indivíduo, Egrégio, Hidraulico, Inúmero.
- E) Individuo, Média, Pestifero, Eletrico, Egoista, Hidrelétrica, Número.

03. Podemos classificar os numerais grifados nas frases abaixo como:

- 1) Arnóbio foi o noningentésimo oitavo colocado no concurso.
- 2) Mariana respondeu a um quinto da prova oral.
- 3) Albertina deu à luz a filhos sêxtuplos.
- 4) Francisco tem um rebanho com mais de cem mil cabeças de gado.

- A) Ordinal, multiplicativo, fracionário, cardinal
- B) Cardinal, ordinal, fracionário, multiplicativo
- C) Ordinal, fracionário, multiplicativo, cardinal
- D) Multiplicativo, ordinal fracionário, cardinal
- E) Nenhuma das respostas

04. Preencha os espaços, em aberto, craseando corretamente.

_____ (A, À) tarde, iremos ao cinema com _____ (AS, ÀS) crianças, voltaremos _____ (AS, ÀS) 17 horas e aguardaremos Fernanda _____ (A, À) qualquer hora para o jantar. A refeição está pronta desde _____ (AS, ÀS) duas horas.

- A) À, ÀS, AS, À, AS
- B) A, ÀS, ÀS, À, ÀS
- C) A, AS, ÀS, A, ÀS
- D) À, AS, ÀS, A, AS
- E) A, AS, ÀS, A, AS

05. Quais das frases abaixo estão corretas quanto à concordância nominal:

- 1) Será muito cara a comemoração dos 15 anos de formatura.
- 2) Custou muito caro a festa do meu aniversário.
- 3) É bom ficar a sós com meus pensamentos.
- 4) Maria entregou as correspondências em mão.
- 5) A cirurgia demorou, eu mesma fiquei apreensiva.

- A) 1\3\5
- B) 1\3\4\5
- C) 1\4\5
- D) 1\2\4\5
- E) 1\2\3\4\5

06. Quais das frases abaixo estão corretas quanto à concordância verbal:

- 1) Mais de um professor participou das assembleias.
- 2) Mais de um professor participaram das assembleias.
- 3) Ia dar oito horas quando Maria chegou do trabalho.
- 4) Ana, José e Francisca festejou o São João na roça.
- 5) Procura-se costureiras experientes.

- A) 1\3\5
- B) 1\5
- C) 1\4
- D) 2\5
- E) 3\4\5

07. Classifique as orações coordenadas sindéticas com conjunções:

- 1) O jogador faz o gol e corre para o abraço.
- 2) O professor é profundo conhecedor do tema, entretanto está afastado de suas funções.
- 3) Fale agora, ou se cale para sempre.
- 4) Preencheu todos os requisitos para o cargo, portanto foi admitido hoje.
- 5) Dizia meu avô: saia cedo de casa, pois o trem se espera na estação.

- A) Explicativa, conclusiva, alternativa, adversativa, aditiva.
- B) Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa.
- C) Conclusiva, explicativa, alternativa, adversativa, aditiva.
- D) Alternativa, explicativa, conclusiva, adversativa, aditiva.
- E) Nenhuma das alternativas está correta.

08. As orações subordinadas adverbiais podem ser classificadas como:

- A) Apositivas, temporais, causais, comparativas, condicionais, consecutivas, conformativas.
- B) Temporais, causais, concessivas, comparativas, condicionais, consecutivas, conformativas, finais, proporcionais.
- C) Restritivas, explicativas, temporais, comparativas, condicionais, causais, consecutivas, finais.
- D) Predicativas, apositivas, concessivas, condicionais, conformativas, causais, consecutivas, finais.
- E) Objetivas diretas, predicativas, explicativas, condicionais, causais, consecutivas, proporcionais, finais.

09. Assinale a frase corretamente pontuada:

- A) Cairá a diretoria de futebol, ou eu deixarei de ser sócia.
- B) Nunca nunca esquecerei!
- C) Não, não tenho certeza, disse ele, a mim.
- D) Londres, 20, de junho, de 1980.
- E) Você vai agora! Eu, parto, às 4 horas.

10. Reproduzimos, abaixo, trecho do discurso do Papa Francisco, na Jornada Mundial da Juventude, dia 22 de julho de 2013, no Rio de Janeiro.

Com base neste trecho do discurso papal, o que o Papa quis dizer ao afirmar: “Com essas atitudes, recebemos hoje o futuro” ?

A juventude é a janela pela qual o futuro entra no mundo e, por isso, nos impõe grandes desafios. A nossa geração se demonstrará à altura da promessa contida em cada jovem quando souber abrir-lhe espaço; isso significa tutelar as condições materiais e imateriais para o seu pleno desenvolvimento; oferecer a ele fundamentos sólidos, sobre os quais construir a vida; garantir-lhe segurança e educação para que se torne aquilo que ele pode ser; transmitir-lhe valores duradouros pelos quais a vida mereça ser vivida, assegurar-lhe um horizonte transcendente que responda à sede de felicidade autêntica, suscitando nele a criatividade do bem; entregar-lhe a herança de um mundo que corresponda à medida da vida humana; despertar nele as melhores potencialidade para que seja sujeito do próprio amanhã e corresponsável do destino de todos. Com essas atitudes recebemos hoje o futuro.

- A) Recebemos hoje a tecnologia
- B) Recebemos hoje o desenvolvimento
- C) Recebemos hoje Jesus Cristo
- D) Recebemos hoje a juventude
- E) Recebemos hoje o desafio de melhorar a sociedade

11. Assinale a alternativa, cujo emprego do hífen, está correta, de acordo com o Novo Acordo Ortográfico.

- A) Ano luz, guarda-noturno, tenente-coronel, primeiro ministro, João-ninguém.
- B) Ano-luz, guardanoturno, tenente coronel, primeiro-ministro, João ninguém.
- C) Ano-luz, guarda-noturno, tenente-coronel, primeiro-ministro, João-ninguém.
- D) Ano luz, guarda-noturno, tenente-coronel, primeiro-ministro, João ninguém.
- E) Ano luz, guarda-noturno, tenente coronel, primeiro-ministro, João- ninguém.

12. Qual das alternativas abaixo reproduz Discurso Direto?

- A) Ouvimos o vaqueiro de uma fazenda próxima nos perguntar, quando estávamos numa estrada erma, o que fazíamos ali e eu pedi ajuda.
- B) Sinhá Chica é bordadeira de mão cheia. Amanhece e anoitece bordando, não sabe pedir ajuda: ordena. Difícil uma mulher tosca ser gentil para pedir. Critica as ajudantes. Ah! Duvido que não obedeçam?
- C) Estávamos numa estrada erma quando de repente ouvimos uma voz: - O que fazem aqui? Era o vaqueiro de uma fazenda próxima. Retruquei: - pode nos ajudar?
- D) Todas as alternativas.
- E) Nenhuma das alternativas.

13. Passe do discurso indireto para o direto assinalando a resposta correta:

Então perguntei se os médicos virão trabalhar esta semana.

- A) Então perguntei: - Os médicos virão trabalhar esta semana ?
- B) Então me foi perguntado se os médicos virão trabalhar esta semana.
- C) Então me perguntei se os médicos virão trabalhar esta semana.
- D) Então os médicos perguntaram se virão trabalhar esta semana.
- E) Então os médicos se perguntaram se virão trabalhar esta semana.

14. A Sociolinguística compreende o fator regional das expressões na língua portuguesa. Indique o significado das 5 (cinco) expressões da coluna à esquerda:

1) BAIXA DA ÉGUA	() muita sorte (norte)
2) ENSACAR	() engravidar alguém (nordeste)
3) FEZ MAL	() Cemitério (sul)
4) ÉGUA DE LARGURA	() lugar muito longe (nordeste)
5) CAMPO SANTO	() colocar a blusa dentro da calça(nordeste)

- A) 1, 2, 3, 4, 5
- B) 4, 3, 5, 1, 2
- C) 3, 4, 5, 1, 2
- D) 5, 1, 3, 2, 4
- E) 4, 5, 3, 2, 1

15. Podemos nos comunicar de duas formas distintas utilizando a linguagem oral e escrita. A língua falada caracteriza-se por:

- A) Representar um estágio posterior a língua.
- B) Não ter ligação com a comunicação linguística, é reconhecida pelo tom da voz do falante.
- C) Não ser espontânea, utilizar-se de caretas e sons diversos.
- D) Ser espontânea, compreender a comunicação linguística, incluir mímicas e fisionomias e é acompanhada pelo tom de voz do falante.
- E) Ser um sistema rígido e disciplinado, que conta com fisionomia e voz do falante.

Conhecimentos Específicos

- 16.** De acordo com a Resolução COFEN 302/2005, que baixa normas para ANOTAÇÃO da Responsabilidade Técnica de Enfermeiro (a), em virtude de Chefia do Serviço de Enfermagem, está incorreto afirmar que:
- A) Todo estabelecimento onde existem atividades de Enfermagem, deve obrigatoriamente apresentar Certidão de Responsabilidade Técnica de Enfermagem;
 - B) O Enfermeiro que deixar de responder pela Chefia do Serviço de Enfermagem, obrigatoriamente comunicará de imediato ao COREN, para o cancelamento da Anotação;
 - C) A Certidão de Responsabilidade Técnica - CRT, deverá ser renovada a cada 18(dezoito) meses, após sua emissão;
 - D) A Certidão de Responsabilidade Técnica deverá ser afixada em local visível ao público, dentro do estabelecimento prestador de assistência de Enfermagem.
 - E) A anotação da Certidão de Responsabilidade Técnica de Enfermagem deverá ser requerida pelo profissional Enfermeiro;
- 17.** Sobre o Processo de Enfermagem, é incorreto afirmar que:
- A) O Processo de Enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, em todos os ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem.
 - B) O Processo de Enfermagem organiza-se em quatro etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes: I - Histórico de Enfermagem, II – Diagnóstico de Enfermagem, III – Implementação, IV – Avaliação de Enfermagem
 - C) O Técnico de Enfermagem e o Auxiliar de Enfermagem participam da execução do Processo de Enfermagem, naquilo que lhes couber, sob a supervisão e orientação do Enfermeiro;
 - D) Possui sua implementação baseada pela RESOLUÇÃO COFEN Nº 358/2009;
 - E) Ao enfermeiro incumbe a liderança na execução e avaliação do Processo de Enfermagem, de modo a alcançar os resultados de enfermagem esperados.

18. Sobre as características das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), marque a única alternativa que não representa a sequência correta:

DST	AGENTE	DESCRIÇÃO
A) Donovanose	Bactéria- <i>Klebsiella granulomatis</i>	Doença bacteriana de evolução progressiva e crônica, acomete, preferencialmente, pele e mucosas das regiões genitais, perianais e inguinais, podendo ocasionar lesões granulomatosas e destrutivas.
B) Linfogranuloma	Bactéria- <i>Chlamydia trachomatis</i>	Doença caracterizada pelo envolvimento do sistema linfático, tendo como processos básicos a trombolinfangite e perilinfangite
C) Gonorréia	Bactéria- <i>Neisseria Gonorrhoeae</i>	Doença infecciosa do trato genital, pode manifesta-se sob a forma de cervicite nas mulheres e como uretrite nos homens;
D) Condiloma	Vírus- <i>Papilomavírus Humano</i>	Doença que manifesta-se como infecção subclínica nos genitais de homens e mulheres, através de lesões que podem ser única ou múltiplas, localizadas ou difusas, e de tamanho variável;
E) Crancro Mole	Vírus- <i>Haemophilus ducreyi</i>	Doença que caracteriza-se por apresentar lesões Múltiplas ou únicas, tipo úlceras, habitualmente dolorosas, de borda irregular, com contornos eritemato-edematosos e fundo irregular, cobertas por exsudato necrótico, amarelado e de odor fétido;

19. Constitui-se sinais de presunção da gravidez, todos exceto:

- A) Atraso menstrual;
- B) Presença dos batimentos cardíacos fetais (BCF) detectados pelo sonar ou pelo Pinard;
- C) Aumento do volume das mamas, hipersensibilidade nos mamilos, tubérculos de Montgomery, saída de colostro pelo mamilo;
- D) Náuseas, vômitos, tonturas, salivação excessiva, mudança de apetite, aumento da frequência urinária e sonolência;
- E) Aumento do volume abdominal, coloração violácea vulvar e cianose vaginal e cervical;

20. Em 25.10.2013, Gestante atendida em Maternidade de Baixo Risco com queixa de dor em baixo ventre, não sabe informar DUM, traz resultado de ultrassonografia (USG) obstétrica que evidenciou gestação em torno de 14,3 semanas, realizada em 30.08.2013. De acordo com os dados apresentados, calcule a idade gestacional corrigida pela USG:

- A) IG 22 semanas;
- B) IG 8 semanas;
- C) IG 32,2 semanas;
- D) IG 21 semanas;
- E) IG 22,3 semanas;

21. O Calendário de consultas de pré-natal, proposto pelo ministério da saúde, garante à gestante de baixo risco, consultas:

- A) Mensalmente até 20ª semana, quinzenalmente da 20ª até a 36ª semana e semanalmente 36ª até a 41ª semana;
- B) Mensalmente até 28ª semana, quinzenalmente da 28ª até a 30ª semana e semanalmente 30ª até a 41ª semana;
- C) Mensalmente até 24ª semana, quinzenalmente da 24ª até a 36ª semana e semanalmente 36ª até a 41ª semana;
- D) Mensalmente até 28ª semana, quinzenalmente da 28ª até a 36ª semana e semanalmente 36ª até a 41ª semana;
- E) Mensalmente até 32ª semana, quinzenalmente da 32ª até a 36ª semana e semanalmente 36ª até a 41ª semana;

22. No Brasil, segundo dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) de 2010 houve aumento das taxas de mortalidade para ambos os sexos com o passar da idade. A análise das causas básicas de morte segundo os capítulos da CID-10 mostrou que a primeira causa de morte para adultos com idades entre 20 e 59 anos é:

- A) Doenças do aparelho circulatório
- B) Doenças transmissíveis
- C) Causas externas
- D) Algumas afecções originadas no período perinatal
- E) Neoplasias

- 23.** O Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN), instituído pelo Ministério da Saúde é responsável pelo desenvolvimento de ações de triagem neonatal, diagnóstico, acompanhamento e tratamento das crianças identificadas como portadoras das doenças congênicas triadas por meio do Teste do Pezinho. Todas as doenças abaixo relacionadas são detectadas neste programa, exceto:
- A) Fenilcetonúria;
 - B) Hipotireoidismo Congênito;
 - C) Doenças Falciformes e outras Hemoglobinopatias;
 - D) Galactosemia;
 - E) Fibrose Cística;
- 24.** O Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil, proposto pelo Ministério da Saúde (2011), determina como esquema básico para tratamento da TB em adultos e adolescentes:
- R Rifampicina H isoniazida Z Pirazinamida E Etambutol
- Assinale a alternativa correta:
- A) RHZ durante a fase intensiva, nos primeiros dois meses de tratamento + RH durante a fase de manutenção nos quatro últimos meses tratamento;
 - B) RHZE durante a fase intensiva, nos primeiros dois meses de tratamento + RH durante a fase de manutenção nos sete últimos meses de tratamento;
 - C) RH durante a fase intensiva, nos primeiros dois meses de tratamento + RHZE durante a fase de manutenção nos quatro últimos meses;
 - D) RHZE durante a fase intensiva, nos primeiros dois meses de tratamento + RH durante a fase de manutenção nos quatro últimos meses tratamento;
 - E) RHE durante a fase intensiva, nos primeiros dois meses de tratamento + RHZ durante a fase de manutenção nos quatro últimos
- 25.** Segundo o Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil, proposto pelo Ministério da Saúde (2011). Todas as alternativas estão corretas, exceto:
- A) Diagnosticar e tratar correta e prontamente os casos de TB pulmonar são as principais medidas para o controle da doença;
 - B) Busca ativa do Sintomático Respiratório (SR), identificando precocemente pessoas com tosse por tempo igual ou superior a três semanas constitui em estratégia para interromper a cadeia de transmissão da Tuberculose;
 - C) Os casos de SR são orientados a coletar duas amostras de escarro, uma no momento da identificação e outra no dia seguinte;
 - D) O Tratamento Diretamente Observado (TOD) constitui uma mudança na forma de administrar os medicamentos para tratamento da TB, onde profissional treinado passa observar a tomada da medicação do paciente desde o início do tratamento até a sua cura;
 - E) Os medicamentos para tratamento dos pacientes com diagnóstico de TP deverão ser administrados preferencialmente logo após as refeições;

26. As etapas sequenciais para a realização do cateterismo vesical está corretamente descrita, apenas na alternativa:

- A) Avaliar o estado do cliente, posicionar o cliente, rever a prescrição médica, preparar material necessário, explicar o procedimento ao cliente, realizar o cateterismo, retirar materiais usados no procedimento, realizar lavagem das mãos, instruir o cliente quanto ao procedimento, lavar as mãos e registrar no prontuário;
- B) Rever a prescrição médica, preparar material necessário, explicar o procedimento ao cliente, posicionar o cliente, realizar o cateterismo, fixar o cateter, retirar materiais usados no procedimento, instruir o cliente quanto ao procedimento, lavar as mão e registrar no prontuário;
- C) Realizar lavagem das mãos, avaliar o estado do cliente, rever a prescrição médica, preparar material necessário, explicar o procedimento ao cliente, realizar o cateterismo, fixar o cateter, retirar materiais usados no procedimento, instruir o cliente quanto ao procedimento, lavar as mão e registrar no prontuário;
- D) Avaliar o estado do cliente, rever a prescrição médica, preparar material necessário, realizar lavagem das mãos, explicar o procedimento ao cliente, posicionar o cliente, realizar o cateterismo, fixar o cateter, retirar materiais usados no procedimento, instruir o cliente quanto ao procedimento;
- E) Avaliar o estado do cliente, rever a prescrição médica, realizar lavagem das mãos, preparar material necessário, explicar o procedimento ao cliente, posicionar o cliente, realizar lavagem das mãos, realizar o cateterismo, fixar o cateter, retirar materiais usados no procedimento, instruir o cliente quanto ao procedimento, lavar as mão e registrar no prontuário;

27. Relacione os sintomas com as suas devidas descrições, quanto às alterações urinárias. Numere a coluna da direita com base nas informações da coluna da esquerda e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta da coluna da direita, de cima para baixo:

ALTERAÇÃO	DESCRIÇÃO
1. Oligúria	() Dificuldade para iniciar a micção
2. Disúria	() Micção de grandes quantidades de urina
3. Hesitação	() Necessidade súbita e imperiosa de urinar
4. Poliúria	() Débito urinário diminuído em relação à Ingesta
5. Nictúria	() Alteração no ritmo da diurese, necessidade de esvaziamento da bexiga durante a noite
6. Urgência	() Micção dolorosa ou difícil

- A) 3 – 4 – 6 – 1 – 5 – 2
- B) 1 – 5 – 2 – 3 – 4 – 6
- C) 1 – 3 – 4 – 5 – 2 – 6
- D) 6 – 4 – 3 – 1 – 5 – 2
- E) 6 – 4 – 2 – 1 – 5 – 3

28. Faz parte do atendimento de enfermagem ao paciente com suspeita de dengue. Assinale (V) para as afirmativas Verdadeiras e (F) para as alternativas Falsas. E em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta:

- () Verificar pressão arterial, pulso, enchimento capilar, frequência respiratória e temperatura;
- () Pesquisar sinais de alarme (dor abdominal, vômitos persistentes, Hipotensão postural e/ou lipotímia e hepatomegalia dolorosa);
- () Realizar medidas antropométricas (peso, altura, índice de massa corporal (IMC)).
- () Realizar prova do laço na ausência de manifestações hemorrágicas
- () Realizar a notificação e investigação do caso;

- A) V – V – V – V – V
- B) F – F – F – F – F
- C) V – F – F – F – V
- D) V – F – V – F – V
- E) F – V – V – V – F

29. Sobre a Prova do Laço realizada na ocorrência de Dengue, é falso afirmar que:

- A) A prova do laço deverá ser realizada obrigatoriamente em todos os casos suspeitos de dengue durante o exame físico;
- B) Realizar prova do laço na ausência de manifestações hemorrágicas;
- C) Desenhar um quadrado de 2,5cm de lado (ou uma área ao redor da falange distal do polegar) no antebraço da pessoa e verificar a pressão arterial (deitada ou sentada). Calcular o valor médio: $(PAS+PAD)/2$. Insuflar novamente o manguito até o valor médio e manter por cinco minutos em adultos (em crianças, 3 minutos) ou até o aparecimento de petéquias ou equimoses;
- D) Após a Prova: Contar o número de petéquias no quadrado. A prova será positiva se houver 10 ou mais petéquias em adultos e 5 ou mais em crianças;
- E) Todas as alternativas são verdadeiras;

30. A Sociedade Brasileira de Cardiologia em sua I Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de Emergência estabelece recomendações para realização de ações durante a parada cardiorrespiratória (PCR) através da utilização de um mnemônico - CABD primário. Com relação às compressões torácicas utilizadas na PCR, é correto afirmar que:

- A) Maximize as interrupções das compressões;
- B) Coloque a região hipotênar de uma mão sobre o esterno da vítima e a outra mão sobre a primeira, entrelaçando-a, estenda os braços e posicione-os cerca de 90º acima da vítima e inicie as compressões;
- C) Comprima na frequência de, no mínimo, 100 compressões/ minuto e com profundidade de, no mínimo, 3 cm;
- D) Permita o retorno completo do tórax após cada compressão, retirando o contato das mãos com o mesmo;
- E) Posicione-se à frente da vítima e mantenha seus joelhos com certa distância um do outro para que tenha melhor estabilidade;

31. A I Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados Cardiovasculares de Emergência da Sociedade Brasileira de Cardiologia preconiza o uso de desfibrilação com o DEA em alguns casos de PCR. Quanto ao uso do DEA (desfibrilador automático externo), assinale (V) para as afirmativas Verdadeiras e (F) para as alternativas Falsas, E em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta:

- () O DEA é um equipamento portátil, capaz de interpretar o ritmo cardíaco, selecionar o nível de energia e carregar automaticamente, cabendo ao operador apenas pressionar o botão de choque, quando indicado;
- () O tempo ideal para a aplicação do primeiro choque compreende nos primeiros 10 minutos da PCR;
- () A desfibrilação precoce é o único tratamento para parada cardiorrespiratória em Fibrilação Ventricular/Taquicardia Ventricular sem Pulso, pode ser realizada com o DEA, que poderá ser utilizado por qualquer pessoa no ambiente pré-hospitalar;
- () O sucesso da ressuscitação está intrinsecamente relacionado a uma desfibrilação precoce, ideal, dentro dos primeiros 3 a 5 minutos após o colapso;
- () A RCP deve ser iniciada pelas compressões torácicas, cerca de 5 minutos após o choque;

- A) V – V – V – V – V
- B) F – F – F – F – F
- C) V – F – F – F – V
- D) V – F – V – V – F
- E) F – V – V – V – F

32. Sobre Hanseníase, é incorreto afirmar:

- A) Doença crônica granulomatosa, proveniente de infecção causada pelo *Mycobacterium leprae*;
- B) O Reservatório é o homem, reconhecido como única fonte de infecção, embora tenham sido identificados animais naturalmente infectados;
- C) O bacilo causador tem a capacidade de infectar grande número de indivíduos (alta infectividade), no entanto poucos adoecem (baixa patogenicidade);
- D) O principal modo de transmissão se dá pela via aérea superior, sendo o trato respiratório a mais provável via de entrada do *M. leprae* no corpo;
- E) O Ministério da Saúde recomenda o tratamento à base de Rifampicina e Cloroquina;

- 33.** São itens necessários à Estratégia Saúde da Família (ESF), exceto:
- A) Carga horária de 40 horas semanais para todos os profissionais de saúde membros da equipe de Saúde da Família, à exceção dos profissionais médicos, aos quais serão admitidas outras modalidades de jornada de trabalho;
 - B) Cadastramento de cada profissional de saúde em apenas uma ESF, exceção feita somente ao profissional médico, que poderá atuar em, no máximo, duas ESF e com carga horária total de 40 horas semanais;
 - C) Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 6.000 pessoas, sendo a média recomendada de 5.000, respeitando critérios de equidade para essa definição.
 - D) O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por ACS e de 12 ACS por equipe de Saúde da Família;
 - E) Existência de equipe multiprofissional composta por, no mínimo, médico, enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde.
- 34.** Com relação à Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde. Coloque (V) para as afirmativas Verdadeiras e (F) para as alternativas Falsas. E em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta:
- () É prevista a implantação da Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde nas Unidades Básicas de Saúde como uma possibilidade para a reorganização inicial da atenção básica, com vistas à implantação gradual da Estratégia Saúde da Família;
 - () São itens necessários à implantação desta estratégia: existência de uma Unidade Básica de Saúde, existência de um enfermeiro e cumprimento da carga horária integral de 40 horas semanais por toda a equipe de agentes comunitários;
 - () Cada ACS deve ter uma micro área sob sua responsabilidade, cuja população não ultrapasse 1000 pessoas.
 - () Existência de um enfermeiro supervisor para até, no máximo, 12 ACS e, no mínimo, quatro, constituindo, assim, uma equipe de agentes comunitários de saúde;
 - () É atribuição do enfermeiro da Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde planejar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS;
 - () São atribuições dos ACS participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS;
- A) V – F – F – V – V – F
 - B) V – V – F – V – V – F
 - C) V – F – F – F – V – V
 - D) V – F – V – F – V – F
 - E) F – V – F – V – F – V
- 35.** Constituem-se atribuições do Enfermeiro da Equipe de Atenção Básica na Estratégia de Saúde da Família, exceto a alternativa:
- A) Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias cadastradas nas equipes;
 - B) Realizar consulta de enfermagem, procedimentos e atividades em grupo;
 - C) Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS em conjunto com os outros membros da equipe;
 - D) Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS;
 - E) Indicar, de forma compartilhada com outros pontos de atenção, a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário;

- 36.** Com relação à administração de soluções por via intramuscular, na porção ântero-lateral da coxa, está incorreto afirmar que:
- A) O terço médio do músculo é o local ideal para aplicação;
 - B) Pode ser utilizado em adultos, crianças e recém-nascidos;
 - C) O músculo desta região é o vastus lateralis;
 - D) Apesar de ser considerado local muito doloroso, é um músculo com grande poder de absorção;
 - E) Na aplicação, a agulha deve ser inserida em um ângulo de 15º em direção ao joelho;
- 37.** A manobra de Bracht é indicada nos casos de:
- A) Assistência pré-hospitalar de desobstrução das vias aéreas superiores por corpo estranho;
 - B) Assistência ao diagnóstica pseudo-hipertensão em pacientes idosos que consiste na inflação do manguito no braço até o desaparecimento do pulso radial;
 - C) Assistência ao parto pélvico vaginal;
 - D) Assistência utilizada no tratamento da vertigem posicional paroxística benigna;
 - E) Todas as alternativas estão corretas.
- 38.** Todas as crianças com toxoplasmose congênita comprovada devem receber tratamento durante 12 meses, independentemente da presença de sinais e/ou sintomas da doença. O tratamento da toxoplasmose congênita é:
- A) sulfadiazina, pirimetamina e ácido fólico;
 - B) Azitromicina, Ciprofloxacina e Rifampicina
 - C) Sulfametoxazol, Trimetropim
 - D) Eritromicina e Ceftriaxona
 - E) Doxicilina e Rifampicina
- 39.** O Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI), passou a oferecer a partir do mês de setembro/2013, em toda a rede pública de saúde, a vacina **tetra viral**, a mesma vai compor o Calendário Nacional de Vacinação. Com base nesta vacina é incorreto afirmar que:
- A) Crianças com idade entre 12 a 15 meses deverão tomar a vacina tríplice viral e devem ser agendadas para receber a vacina tetra viral aos 15 meses de idade respeitando o intervalo mínimo de 60 dias entre tríplice viral e a tetra viral;
 - B) O esquema vacinal consiste na administração de uma dose exclusivamente aos 15 meses de idade, em crianças que já tenham recebido a 1ª dose da vacina tríplice viral;
 - C) O PNI não disponibilizará a vacina tetraviral para as crianças que não receberam a primeira dose da tríplice viral entre 12 e 14 meses de idade e aquelas acima de 15 meses de idade;
 - D) A dose é de 0,5mL, administrada por via subcutânea.
 - E) O esquema vacinal corresponde a uma dose de varicela e a 2ª dose da tríplice viral;
- 40.** Com base no Projeto Terapêutico Singular (PTS) inserido no âmbito da Saúde Mental, proposto pelo Ministério da Saúde, é incorreto afirmar:
- A) É necessário a elaboração de um PTS para todas as pessoas atendidas em um serviço estratégico de saúde mental, na Atenção Básica;
 - B) O PTS pode ser utilizado como dispositivo de intervenção, pois desafia a organização tradicional do processo de trabalho em saúde, pois pressupõe a necessidade de maior articulação interprofissional;
 - C) O PTS pode ser utilizado como analisador qualitativo e apregoado para todos os usuários dos serviços estratégicos de Saúde Mental;
 - D) Pode ser definido como uma estratégia de cuidado que articula um conjunto de ações resultantes da discussão e da construção coletiva de uma equipe multidisciplinar e leva em conta as necessidades, as expectativas, as crenças e o contexto social da pessoa ou do coletivo para o qual está dirigido;
 - E) Na elaboração do PTS as diferenças, conflitos e contradições precisarão ser explicitados e trabalhados, de maneira a pactuar os consensos possíveis entre os diversos agentes envolvidos.