

RASCUNHO

O texto que segue foi extraído do romance *O cortiço*, de Aluísio Azevedo.

Leia-o para responder às questões de 1 a 3.

Daí à pedreira restavam apenas uns cinquenta passos e o chão era já todo coberto por farinha de pedra moída que sujava como cal.

Aqui, ali, por toda a parte, encontravam-se trabalhadores, uns ao sol, outros debaixo de pequenas barracas feitas de lona ou de folha de palmeira. De um lado cunhavam pedra cantando; de outro quebravam a picareta; de outro afeiçoavam¹ lajedos a ponta de picão²; mais adiante faziam paralelepípedos e escopro³ e macete⁴. E todo aquele retintim de ferramentas, e o martelar da forja, e o coro dos que lá em cima brocavam a rocha para lançar-lhe fogo, e a surda zoada ao longe, que vinha do cortiço, como de uma aldeia alarmada; tudo dava a ideia de uma atividade feroz, de uma luta de vingança e ódio. Aqueles homens gotejantes de suor, bêbados de calor, desvairados de insolação, a quebrarem, a espicaçarem, a torturarem a pedra, pareciam um punhado de demônios revoltados na sua impotência contra o impassível gigante que os contemplava com desprezo, imperturbável a todos os golpes e a todos os tiros que lhe desfechavam no dorso, deixando sem um gemido que lhe abrissem as entranhas de granito. O membrudo cavouqueiro havia chegado à fralda do orgulhoso monstro de pedra; tinha-o cara a cada, mediu de alto a baixo, arrogante, num desafio surdo.

A pedreira mostrava nesse ponto de vista o seu lado mais importante. Descomposta, com o escalavrado flanco exposto ao sol, erguia-se altaneira e desassombrada, afrontando o céu, muito íngreme, lisa, escaldante e cheia de cordas que mesquinamente lhes escorriam pela ciclópica nudez com um efeito de teias de aranha. Em certos lugares, muito alto do chão, lhe haviam espetado alfinetes de ferro, amparando, sobre um precipício, miseráveis tábuas que, vistas cá de baixo, pareciam palitos, mas em cima das quais uns atrevidos pigmeus de forma humana equilibravam-se, desfechando golpes de picareta.

Aluísio Azevedo. *O cortiço*. 25 Ed. São Paulo, Ética, 1992. P.48-9.

¹ afeiçoar: dar forma a.

² picão: ferramenta de lavrar terra.

³ escopro: instrumento de lavrar pedra, madeira, etc.; cinzel.

⁴ macete: espécie de martelo usado por escultores.

1) Leia as afirmativas abaixo relação ao texto e assinale a alternativa correta.

- I. Trata-se de um texto figurativo.
- II. O texto é construído com termos concretos: pedreira, chão, pedra, farinha, trabalhadores, lona, etc.
- III. As ações e qualificações são vistas como simultâneas, não havendo relação de anterioridade e posterioridade entre elas, comuns nos textos descritivos.
- IV. O texto é essencialmente narrativo, pois o foco está na ação.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II e III apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) III e IV, apenas.
- d) I, II, III e IV.
- e) Apenas I.

2) Nesse texto temos a descrição de uma pedreira e do trabalho que nela executam os operários. Em relação a essa descrição, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. O autor descreve a pedreira metaforicamente e as expressões, em seu conjunto, constroem uma prosopopeia.
porque
 - II. Os termos com que o autor descreve a pedreira são tipicamente humanos: *gigante, contemplava com desprezo, imperturbável, dorso, monstro, deixando sem um gemido que lhe abrissem as entranhas, afrontando o céu.*
- a) A afirmativa I é verdadeira e a II é falsa.
 - b) A afirmativa I é falsa e a II é verdadeira
 - c) Ambas as afirmativas são verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa da primeira
 - d) Ambas as afirmativas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa da primeira.
 - e) Ambas as afirmativas são falsas.

3) Na visão do autor:

- I. Há uma oposição entre o homem e a natureza, em que o primeiro se acha em situação de inferioridade em relação à segunda.
- II. O trabalho é visto como *atividade feroz*, como uma luta de vingança e de ódio.
- III. A natureza é impotente diante do homem.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I. e II, apenas
- b) I apenas
- c) II apenas
- d) II e III apenas
- e) I, II e III.

4) Considere as orações abaixo.

- I. Tratam-se de problemas complexos.
- II. Vigiaram-se as mensagens.
- III. Procura-se os suspeitos do crimes.

A concordância está correta somente em

- a) I
- b) II
- c) III
- d) I e II
- e) I e III

5) Considere o período e as afirmativas abaixo.

É preferível ter câmeras de vigilância do que ficarmos sujeitos à assaltos.

- I. Há um problema de regência nominal.
- II. O uso do acento indicativo da crase está incorreto.
- III. Há um problema de concordância nominal

Está correto o que se afirma somente em

- a) I
- b) II
- c) III
- d) II e III
- e) I e II

6) Considere o período e as afirmativas.

De acordo com a polícia o rapaz que foi preso foi identificado pelas câmeras de segurança do banco.

- I. Deveria haver uma vírgula depois da palavra “preso”.
- II. Deveria haver uma vírgula depois da palavra “polícia”.
- III. Deveria haver uma vírgula depois da palavra “identificado”.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) somente III
- d) somente I e II
- e) nenhuma

7) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

Ele não foi _____ escola _____ ainda está doente?

- a) à – porque
- b) à - por que
- c) a – porque
- d) a – por que
- e) à – por quê

8) Considere os períodos abaixo.

- I. Deve existir, na empresa, poucos funcionários capacitados para esta função.
- II. Faz alguns anos que não o vejo.
- III. Houveram muitos tumultos em junho.

A concordância está correta em

- a) somente I
- b) somente II
- c) somente III
- d) somente I e II
- e) somente I e III

9) Assinale a alternativa que está de acordo com a norma culta.

- a) Ele trabalha na empresa a cinco anos.
- b) Daqui à 2 anos, terminarei o curso.
- c) O escritório fica a cinco minutos da minha casa.
- d) O congresso é de 14 à 20 de setembro.
- e) Os resultados serão divulgados à partir da semana que vem.

10) Considere o período e as afirmações abaixo.

A maioria das empresas que agem de forma sustentável ganha a confiança do consumidor.

- I. A pontuação está incorreta, pois deveria haver uma vírgula antes de “ganha”.
- II. Há um problema de concordância verbal, o correto seria “ganham”.
- III. Para que o período seguisse a norma culta, o verbo “agir” deveria estar no singular, concordando com “maioria”

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) somente III
- d) somente I e II
- e) nenhuma

11) Ana tinha certa quantia e gastou $\frac{1}{4}$ com produtos de beleza, $\frac{2}{3}$ com roupas e $\frac{1}{3}$ do restante com alimentação e ainda

Ihe sobraram R\$ 12,00. A quantia que Ana tinha inicialmente é um valor:

- a) maior que R\$ 220,00.
- b) menor que R\$ 210,00.
- c) exatamente igual a R\$ 212,00.
- d) Entre R\$ 200,00 e R\$ 215,00.
- e) Entre R\$ 215,00 e R\$ 220,00.

12) Dos 320 alunos de uma academia de ginástica, sabe-se que 170 praticam aeróbica, 148 praticam natação, 172 praticam boxe, 80 praticam aeróbica e boxe, 75 praticam natação e boxe, 62 praticam aeróbica e natação e 23 praticam os três. Nessas condições podemos afirmar que:

- a) 40 alunos praticam somente natação.
- b) 74 alunos praticam natação ou aeróbica.
- c) 91 alunos praticam aeróbica ou boxe.
- d) O total de alunos que não fazem aeróbica, boxe e natação é igual a 34.
- e) 51 alunos praticam somente boxe.

13) Os números 4,5,7,7,10,9,13,11,... estão descritos numa sequencia lógica. Desse modo, a soma entre o 20º e o 21º termos da sequencia é igual a:

- a) 57
- b) 54
- c) 55
- d) 59
- e) 52

14) Do ponto de vista da lógica matemática a negação da frase: Marcos foi ao cinema ou Maria foi fazer compras é a frase:

- a) Marcos não foi ao cinema ou Maria não foi fazer compras.
- b) Marcos foi ao cinema e Maria foi fazer compras.
- c) Marcos não foi ao cinema, então Maria não foi fazer compras.
- d) Marcos não foi ao cinema e Maria não foi fazer compras.
- e) Marcos não foi ao cinema e Maria foi fazer compras.

15) Sejam as proposições P: 10% de 40% é o mesmo que 4% e Q: a metade de um terço de x é menor que $\frac{1}{7}$ de x. Pode-se afirmar que:

- a) A conjunção entre as duas é verdadeira.
- b) P condicional Q é falso.
- c) P bicondicional Q é verdadeiro.
- d) A disjunção entre as duas é falsa.
- e) A negação de q é falsa.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

16) Entre as competências da EBSEERH não se inclui:

- a) Prestar às instituições federais de ensino superior e a outras instituições congêneres serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, mediante as condições que forem fixadas em seu estatuto social.
- b) Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa de instituições federais de ensino superior e de outras instituições congêneres, cuja vinculação com o campo da saúde pública ou com outros aspectos da sua atividade torne necessária essa cooperação, em especial na implementação das residências médica, multiprofissional e em área profissional da saúde, nas especialidades e regiões estratégicas para o SUS.
- c) Prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e a outras instituições congêneres.
- d) Prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários e federais e a outras instituições congêneres, com implementação de sistema de gestão único com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de metas.
- e) Propor as diretrizes da Política Nacional de Residência Médica.

17) Sobre a EBSEERH e a lei que a criou, assinale a alternativa incorreta:

- a) A EBSEERH e suas subsidiárias estarão sujeitas à fiscalização dos órgãos de controle interno do Poder Executivo e ao controle externo exercido pelo Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União.
- b) A EBSEERH não é autorizada a patrocinar entidade fechada de previdência privada, nos termos da legislação vigente.
- c) Os Estados poderão autorizar a criação de empresas públicas de serviços hospitalares.
- d) O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
- e) É dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.

18) O prazo de duração da EBSERH é:

- a) Indeterminado
- b) De dois anos
- c) De quatro anos
- d) De 10 anos
- e) De 8 anos

19) Compete ao Conselho de Administração da EBSERH, exceto:

- a) Aprovar o regimento interno da EBSERH
- b) Deliberar, mediante proposta da Diretoria Executiva, sobre a contratação de empréstimos no interesse da EBSERH;
- c) Opinar e submeter à aprovação do Ministério de Estado da Educação sobre a proposta de criação de escolas médicas.
- d) Aprovar o orçamento e programa de investimentos e acompanhar a sua execução
- e) Opinar e submeter à aprovação do Ministro de Estado da Fazenda, por intermédio do Ministro de Estado da Educação sobre a proposta de criação de subsidiárias.

20) Sobre o Conselho Consultivo da EBSERH, assinale a alternativa incorreta:

- a) Seu presidente será um entre os membros indicados pelo Ministro de Estado da Educação.
- b) Um dos representantes dos usuários dos hospitais universitários federais faz parte deste conselho.
- c) Um dos representantes dos residentes em saúde dos hospitais universitários federais faz parte deste conselho.
- d) Deve-se reunir ordinariamente pelo menos uma vez ao ano.
- e) Uma de suas funções é acompanhar e avaliar periodicamente o desempenho da EBSERH.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Considerando a informação em saúde e os sistemas de informação em saúde, assinale a alternativa incorreta:

- a) Dado é qualquer elemento qualitativo ou quantitativo, desvinculado de referencial explicativo.
- b) Informação é o produto da análise de um ou mais dados.
- c) A notificação é uma fonte de dado de morbidade de baixo custo, ativa e de elevada cobertura.
- d) A informação em saúde não se refere somente à produzida pelo setor de saúde.
- e) O SIA-SUS é o sistema de informações ambulatoriais do Sistema Único de Saúde.

22) Um município de pequeno porte decidiu que durante a campanha anual de vacinação contra a gripe, estaria disponível aos pacientes a dosagem de glicemia e aferição de pressão arterial. A medida foi duramente criticada pelos vereadores de oposição que a caracterizaram como desperdício de recursos e desvio do objetivo da vacinação. Em sua opinião:

- a) A medida está incorreta pois compromete o princípio da universalidade do SUS, porque torna a vacinação demorada e com risco de menor cobertura.
- b) A medida está em acordo com o princípio da integralidade do SUS.
- c) A medida fere o princípio da autonomia do usuário do SUS.
- d) A medida está em desacordo com o princípio da utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades.
- e) A medida está em desacordo com o princípio da capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.

23) Considerando os determinantes sociais de saúde e a ocorrência de hipertensão arterial, assinale a alternativa incorreta:

- a) Não parece haver relação entre renda familiar e prevalência de hipertensão arterial.
- b) Há associação entre estilo de vida sedentário e maior prevalência de hipertensão arterial.
- c) Há associação entre atividade profissional e prevalência de hipertensão.
- d) Há associação entre consumo excessivo de álcool e maior prevalência de hipertensão.
- e) Pessoas que vivem em comunidades não industriais, não aculturadas e com baixa ingestão de sal têm menor pressão arterial média, que tende a aumentar um pouco com a idade. A pressão arterial aumenta nessas pessoas quando adotam estilos de vida modernos.

24) Sobre o controle social no SUS, assinale a alternativa incorreta:

- a) O SUS foi a primeira política pública no Brasil a adotar constitucionalmente a participação popular como um de seus princípios.
- b) A participação da comunidade na gestão do SUS foi definida pela lei nº 8142/1990.
- c) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- d) A representação dos usuários nas Conferências de Saúde é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos
- e) A representação dos usuários no Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

25) O Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011 regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Considerando esse decreto, assinale a alternativa incorreta:

- a) Poderão ser instituídas Regiões de Saúde interestaduais, compostas por municípios limítrofes, por ato conjunto dos respectivos Estados em articulação com os municípios.
- b) O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico, observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção especial, conforme legislação vigente.
- c) A população indígena contará com os mesmos regramentos de acesso, que o conjunto da população conforme a necessidade de assistência integral à sua saúde, de acordo com disposições do Ministério da Saúde.
- d) O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços nos entes federativos e nas Regiões de Saúde.
- e) Ao usuário será assegurada a continuidade do cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região.

- 26) Segundo censos populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população brasileira apresentou duas importantes modificações: A participação relativa da população com 65 anos ou mais era de 4,8% em 1991, passando a 7,4% em 2010. A principal causa de mortalidade da população em 1930 eram as doenças infecciosas e em 2012 as doenças cardiovasculares. Essas modificações são denominadas, respectivamente de:
- Transição demográfica e transição epidemiológica
 - Transição demográfica e transição de mortalidade
 - Transição epidemiológica e transição demográfica
 - Transição epidemiológica e transição de mortalidade
 - Transição sanitária e transição de mortalidade
- 27) Em relação aos aspectos biológicos e fisiológicos do envelhecimento, quando comparado com indivíduos jovens, é correto afirmar que:
- O sistema tegumentar do idoso é mais delgado, na dependência do grau de exposição solar ou proteção de dano.
 - O crescimento do cabelo é mais rápido.
 - A marcha do idoso tem os passos diminuídos.
 - A velocidade de cicatrização da pele é mais rápida.
 - Na caminhada o corpo está flexionado para trás.
- 28) Assinale a alternativa correta quanto à triagem de condições clínicas e os graus de recomendação ou evidências científicas em idoso.
- Triagem de rotina para câncer de bexiga em homem – recomendada; triagem de aneurisma da aorta abdominal em homem que fuma – recomendada.
 - Triagem de bacteriúria assintomática em mulheres – recomendada; Câncer de cólon e reto em homem – recomendada.
 - Triagem para câncer de ovário em mulher – recomendada; triagem de câncer de pulmão em homem tabagista – não recomendada.
 - Triagem de dislipidemia em homem – recomendada; triagem de depressão em mulheres – recomendada.
 - Triagem para glaucoma em homem – recomendada; triagem para dislipidemia para mulheres – recomendada.
- 29) Um homem de 79 anos de idade vem em consulta, trazido por sua filha; ambos estão preocupados com sua recente piora e querem saber seu prognóstico. O paciente teve adenocarcinoma mal diferenciado do cólon diagnosticado há dois anos. Ele passou bem após ressecção cirúrgica do tumor e quimioterapia específica. Há seis meses foram diagnosticadas metástases em fígado e peritônio. Atualmente tem dor abdominal constante, controlada com fentanila e oxicodeona, conforme necessário. Ele tornar-se cada vez mais debilitado, principalmente nos últimos quatro meses. Por causa da fadiga e dor, ele é incapaz de fazer a maioria das atividades básicas da vida diária, exceto alimentação. A característica do paciente que é a mais preditiva de um mau prognóstico é:
- Baixo desempenho funcional.
 - Tumor em estágio avançado
 - Múltiplas comorbidades
 - Idade avançada
 - Uso de opióide.
- 30) Segundo critérios atuais para diagnóstico de demência são necessários a presença, no mínimo, de dois déficits cognitivos. Assinale a alternativa correta em relação à definição dos déficits cognitivos.
- Agnosia significa falha na função da linguagem.
 - Afasia significa falhas em realizar atividades motoras.
 - Apraxia significa falha em identificar objetos.
 - Agnosia significa falha em reconhecer objetos.
 - Afasia significa falha na função executiva (planejamento e execução).
- 31) Paciente de 71 anos em tratamento regular de parkinsonismo vem apresentando há cerca de três meses quadro caracterizado por perda discreta de memória, dificuldade de concentração, perda de iniciativa e apatia. A família procurou psiquiatra que fez diagnóstico de depressão e iniciou tratamento com risperidona. O paciente evoluiu sem melhora, mas apresenta piora importante do quadro de parkinsonismo após o início do tratamento psiquiátrico. O diagnóstico mais provável é:
- Demência vascular.
 - Demência por corpos de Lewy.
 - Síndrome de Alzheimer.
 - Demência secundária à doença de Parkinson
 - Encefalopatia metabólica.
- 32) Homem de 88 anos relata estar se sentido mais cansado do que o habitual e ter caído em seu quarto no dia anterior à consulta. É portador de doença de Parkinson e osteoartrite. Medicamentos em uso: carbidopa-levodopa e paracetamol. Das seguintes condutas a que pode produzir informações complementares úteis para reduzir o risco de queda é:
- Dosagem de potássio sérico.
 - Dosagem de vitamina D sérica.
 - Pesquisa de hipotensão postural.
 - Realização do Teste de Timed Up and GO.
 - Mensuração de cálcio sérico.

- 33) Uma enfermeira de sua equipe lhe pergunta quais são os pacientes mais propensos a desenvolver úlcera de pressão. Entre as respostas abaixo a única incorreta seria:
- Pacientes com aumento recente do peso corporal em mais que 10%.
 - Pacientes com contraturas.
 - Pacientes completamente dependentes de outros.
 - Imobilidade crônica na cama.
 - Incontinência urinária
- 34) Mulher de 75 anos está hospitalizada há um mês para tratamento clínico de Insuficiência Cardíaca Congestiva. Detecta-se uma úlcera por pressão estágio II de 6 x 8 x 0,5 cm na região sacral. O exame revela tecido róseo, pouca secreção, ausência de tecido necrótico ou eritema. O melhor curativo para esta úlcera por pressão é:
- Gaze umidecida com salina.
 - Alginato de cálcio.
 - Hidrocoloíde.
 - Espuma de poliuretano.
 - Peróxido de hidrogênio
- 35) Mulher de 72 anos relata pequena perda de urina quando tosse ou espirra e perda volumosa quando levanta da cama pela manhã. Necessita trocar o absorvente três vezes por dia, ficando incomodada com isso. Realizou cirurgia para incontinência urinária (IU) há seis anos, porém após um ano voltou a apresentar IU. Ao exame ginecológico apresenta prolapso vaginal de 1º grau. Quando tossiu teve perda urinária de pequeno volume. Volume residual pós micção foi de 375 mL. A conduta adequada é:
- Realizar estudo urodinâmico
 - Orientar exercício para musculatura pélvica (Kegel)
 - Iniciar com oxibutinina
 - Tratar infecção de urina
 - Encaminhar para correção cirúrgica.
- 36) O uso concomitante das seguintes drogas deve ser evitado, justificando-se suas respectivas interações medicamentosas:
- omeprazol e fenitoína, devido à inibição pela primeira droga do metabolismo da segunda, resultando em nefrotoxicidade.
 - ginkgo biloba e aspirina, devido a efeito sinérgico entre as duas drogas na anti-agregação plaquetária e conseqüente risco de sangramentos.
 - hidroclorotiazida e digoxina, devido a risco de intoxicação digitalica por hipermagnesemia provocada pela primeira droga.
 - warfarina e fenobarbital, devido à diminuição pela primeira droga do metabolismo da segunda, resultando em 7intoxicação por barbitúricos.
 - furosemida e lítio, devido à primeira droga provocar aumento da secreção da segunda, havendo menor estabilização do humor pelo lítio
- 37) Paciente do sexo feminino, 83 anos, hipertensa, em uso de besilato de anlodipina 5mg ao dia, relata edema em tornozelos durante todo o dia, sem piora com o ortostatismo e com pouca melhora quando deitada. Refere história de asma desde a infância e diabetes mellitus, para a qual utiliza glimepirida 1mg ao dia. Apresenta pressão arterial de 120 X 75 mmHg em dois momentos durante a consulta. Assinale a conduta mais adequada para ser tomada frente a essa paciente.
- Suspender a anlodipina e iniciar maleato de enalapril 5mg ao dia.
 - Suspender a anlodipina e iniciar hidroclorotiazida 50mg ao dia.
 - Manter a anlodipina e associar clortalidona 25mg ao dia.
 - Manter a anlodipina e associar furosemida 40mg ao dia.
 - Suspender a anlodipina e associar propranolol 40mg pela manhã.
- 38) Paciente de 62 anos, feminino, cursou infarto agudo do miocárdio há 2 meses. Exame de controle mostrou colesterol LDL de 139mg-dl. O médico assistente orientou que seria mais seguro manter níveis de LDL abaixo de 100mg/dL, sendo ideal valor abaixo de 70mg/dL. Dentre as alternativas abaixo, assinale qual medicação tem maior chance de êxito:
- Fluvastatina 40mg por via oral.
 - Ezetimibe 10mg por via oral.
 - Pravastatina 20mg por via oral.
 - Ciprofibrato 100mg por via oral.
 - Rosuvastatina 10mg por via oral.
- 39) Um efeito colateral do uso de neuroléptico é a Síndrome parkinsoniana, que se caracteriza por:
- Tremores, hipomínia e febre.
 - Sinal da roda denteada, crises oculogíras e marcha em bloco.
 - Sinal da roda denteada, acinesia e hipomínia.
 - Marcha em bloco, distonia e crises oculogíras.
 - Tremor, febre e acinesia.

- 40) Mulher de 72 anos com osteoartrite severa em joelho direito vem ao Pronto socorro com dor intensa na perna direita. Ela não reporta trauma recente, viagem prolongada ou história prévia de trombose venosa profunda (TVP). Ao exame físico a perna direita está vermelha, quente e dolorida do joelho até o tornozelo. A hipótese diagnóstica é celulite. Realizado teste para D-Dímero por Elisa (enzyme-linked immunosorbent assay) com resultado negativo. Iuro exame a ser realizado para excluir TVP seria:
- Ultrassom duplex bilateral compressivo.
 - Plestimografia bilateral.
 - Tomografia computadorizada com angiografia.
 - Venografia com contraste.
 - Nenhum exame é necessário.
- 41) Homem de 78 anos chega à Unidade de Emergência acompanhado da esposa. Esta refere que o paciente apresenta há 3 dias tosse com expectoração que não sabe referir a cor, temperatura de 37,8° C que cede com uso de paracetamol e retorna após 5 horas do uso e anorexia. Há 1 dia ficou mais sonolento e ficou confuso. Ao exame físico geral apresenta Pa = 120 x 75 mmHg, Saturação de O₂ em ar ambiente de 81%, frequência respiratória de 24 ipm e confusão mental. No exame respiratório semiologia compatível com Síndrome de condensação pulmonar em 1/3 inferior direito. Ao exame radiológico: condensação em 1/3 inferior direito. Exames bioquímicos: Uréia 65 mg/dL. É portador de insuficiência cardíaca compensada e não utilizou antimicrobiano nos últimos 4 meses. Realizado diagnóstico de Pneumonia Adquirida na Comunidade. Com esses dados indique o local e qual terapia antimicrobiana corretos, respectivamente.
- Internação em enfermaria, Fluorquinolona
 - Internação em unidade de terapia intensiva, Fluorquinolona
 - Ambulatorial, Fluorquinolona
 - Internação em enfermaria, Cefuroxima
 - Ambulatorial, Azitromicina associada com Amoxicilina-Clavulanato
- 42) A bacteriúria assintomática deve ser tratada em pacientes idosos nas seguintes condições clínicas:
- Idoso com lesão medular e idoso portador de Diabetes Mellitus descompensado.
 - Portador de Insuficiência Cardíaca e Idoso com cateter vesical de demora
 - Antes de procedimentos invasivos do trato genito-urinário e idoso institucionalizado
 - Idoso com obstrução do trato urinário e idoso cateterizado.
 - Portador de Diabetes Mellitus descompensado e antes de procedimentos cirúrgicos.
- 43) Homem de 72 anos apresenta alterações nos níveis de glicose de jejum nos últimos dois meses. Os valores foram entre 110, 128 e 116 mg/dL. Ele tem hipertensão arterial controlada com dieta hipossódica. Seu índice de massa corporal é 29,5 kg/m². A conduta em relação às glicemias de jejum alteradas deve ser:
- Reduzir ingestão calórica e iniciar atividade física de 150 min por semana.
 - Iniciar metformina e atividade física de 150 min por semana.
 - Iniciar metformina.
 - Reduzir ingestão calórica e iniciar glicazida.
 - Iniciar glicazida e metformina.
- 44) Homem de 75 anos refere ter uma úlcera em sua língua que não é dolorosa, exceto quando ele come alimentos ácidos ou picantes. Ele não se lembra quando observou a lesão pela primeira vez. Seu último exame odontológico foi há dois anos. Ele fumou dois maços de cigarro por dia por 40 anos, mas parou há 10 anos. Nega ingestão de álcool. Ao exame bucal há uma úlcera de 2 x 2 cm, endurecida na fronteira lateroventral esquerdo da língua próxima a um dente quebrado. A conduta indicada é:
- Encaminhar a um dentista para tratamento dentário.
 - Encaminhar para biópsia da lesão.
 - Instruir para usar um gel anestésico local para aliviar a dor.
 - Explicar que a lesão irá resolver espontaneamente em 7 a 10 dias.
 - Recomendar para evitar alimentos ácidos ou picantes.
- 45) Você atende uma paciente de 68 anos que lhe pergunta sobre a prevenção do câncer de mama. A paciente não pertence a um grupo de risco para câncer de mama. Você deve orientá-la a:
- Realizar mamografia pelo menos a cada dois anos
 - Realizar exame clínico da mama anual e mamografia a cada três anos pelo menos.
 - Realizar mamografia a cada seis meses.
 - Realizar exame clínico da mama trimestral e mamografia a cada ano pelo menos.
 - Realizar mamografia pelo menos a cada cinco anos
- 46) Uma paciente de 73 anos submetida à gastroplastia há 4 anos apresenta palidez cutâneo mucosa, fraqueza e parestesia progressiva. Hemograma apresenta presença de anemia macrocítica, hipersegmentação neutrofílica, leucócitos 3000/mm³ com diferencial normal, plaquetas 117.000/mm³. O quadro descrito sugere mais provavelmente:
- deficiência de folato.
 - deficiência de vitamina B12.
 - síndrome mielodisplásica.
 - hipotireoidismo.
 - aplasia de medula óssea

- 47) Idoso apresenta demência por Doença de Alzheimer há 1 ano, perda de peso não intencional de 2 kg nos últimos 6 meses, dependência para atividades básicas de vida diária (ABVD), relata sensação de exaustão, caminhou 4 metros em 55 segundos, da força de preensão palmar reduzida para o referencial do peso, índice de massa corporal de 19kg/m², hemoglobina de 10 g/dL e albumina sérica de 2,3 g/L. É realizado o diagnóstico de Síndrome da fragilidade. Os achados neste paciente que fazem parte do diagnóstico fenotípico de Síndrome da Fragilidade do Idoso, segundo Linda Fried são:
- Perda de peso não intencional, diminuição da força de preensão palmar, sensação de exaustão.
 - Albumina sérica menor que de 3,5 g/L, diminuição da força de preensão palmar, sensação de exaustão.
 - Caminhada de 4 metros em 55 segundos, diminuição da força de preensão palmar, índice de massa corporal de 19 kg/m².
 - Dependência para ABVD, diminuição da força de preensão palmar, índice de massa corporal de 19kg/m².
 - Índice de massa corporal de 19 kg/m², perda de peso não intencional, demência.
- 48) Mulher com 72 anos de idade, portadora de DPOC, vem em consulta acompanhada de filha com quem ela vive. A filha teve diagnóstico de influenza, realizado por teste de antígeno em swab nasal há 1 dia. A paciente foi vacinada contra influenza há 2 anos. Além da imunização contra influenza neste momento, a melhor medida de profilaxia contra influenza para a paciente seria:
- Nenhuma
 - Amantadina
 - Rimantadina
 - Oseltamivir
 - Zanamivir
- 49) Perda visual central caracterizada por dificuldade de ler e dirigir, que tem como fatores de risco a idade, história familiar e doença cardiovascular, cujo tratamento pode ser feito com zinco e betacaroteno.” Esta descrição é característica de:
- catarata.
 - presbiopia.
 - degeneração macular.
 - glaucoma de ângulo aberto.
 - retinopatia diabética não proliferativa
- 50) Sr. com 85 anos e demência frontotemporal há 8 anos, permanecendo acamado e dependente para todas atividades de vida diária, está em tratamento de pneumonia no hospital, sendo o 5º. episódio em seis meses. Era procedente do domicílio. Está com uma úlcera por pressão grau III em região sacral. A família não deseja nenhuma medida para prolongamento de vida, como manobras de reanimação cardiovascular. A recomendação mais apropriada no momento da alta seria:
- Alta para uma Instituição de Longa Permanência (ILP) e instalação de sonda enteral até a úlcera por pressão cicatrizar.
 - Manutenção do paciente em enfermaria e cuidados locais para úlcera por pressão.
 - Alta para uma Instituição de Longa Permanência (ILP) até cicatrização da úlcera por pressão.
 - Instalação de sonda enteral até a úlcera por pressão cicatrizar e alta para uma Instituição de Longa Permanência (ILP).
 - Alta para domicílio com cuidados para a úlcera por pressão.