







# RASCUNHO

O texto que segue foi extraído do romance *O cortiço*, de Aluísio Azevedo.

Leia-o para responder às questões de 1 a 3.

Daí à pedreira restavam apenas uns cinquenta passos e o chão era já todo coberto por farinha de pedra moída que sujava como cal.

Aqui, ali, por toda a parte, encontravam-se trabalhadores, uns ao sol, outros debaixo de pequenas barracas feitas de lona ou de folha de palmeira. De um lado cunhavam pedra cantando; de outro quebravam a picareta; de outro afeiçãoavam<sup>1</sup> lajedos a ponta de picão<sup>2</sup>; mais adiante faziam paralelepípedos e escopro<sup>3</sup> e macete<sup>4</sup>. E todo aquele retintim de ferramentas, e o martelar da forja, e o coro dos que lá em cima brocavam a rocha para lançar-lhe fogo, e a surda zoadada ao longe, que vinha do cortiço, como de uma aldeia alarmada; tudo dava a ideia de uma atividade feroz, de uma luta de vingança e ódio. Aqueles homens gotejantes de suor, bêbados de calor, desvairados de insolação, a quebrarem, a espicaçarem, a torturarem a pedra, pareciam um punhado de demônios revoltados na sua impotência contra o impassível gigante que os contemplava com desprezo, imperturbável a todos os golpes e a todos os tiros que lhe desfechavam no dorso, deixando sem um gemido que lhe abrissem as entranhas de granito. O membrudo cavouqueiro havia chegado à fralda do orgulhoso monstro de pedra; tinha-o cara a cada, mediu de alto a baixo, arrogante, num desafio surdo.

A pedreira mostrava nesse ponto de vista o seu lado mais importante. Descomposta, com o escalavrado flanco exposto ao sol, erguia-se altaneira e desassombrada, afrontando o céu, muito íngreme, lisa, escaldante e cheia de cordas que mesquinamente lhes escorriam pela ciclópica nudez com um efeito de teias de aranha. Em certos lugares, muito alto do chão, lhe haviam espetado alfinetes de ferro, amparando, sobre um precipício, miseráveis tábuas que, vistas cá de baixo, pareciam palitos, mas em cima das quais uns atrevidos pigmeus de forma humana equilibravam-se, desfechando golpes de picareta.

Aluísio Azevedo. *O cortiço*. 25 Ed. São Paulo, Ética, 1992. P.48-9.

<sup>1</sup> afeiçãoar: dar forma a.

<sup>2</sup> picão: ferramenta de lavrar terra.

<sup>3</sup> escopro: instrumento de lavrar pedra, madeira, etc.; cinzel.

<sup>4</sup> macete: espécie de martelo usado por escultores.

1) **Leia as afirmativas abaixo relação ao texto e assinale a alternativa correta.**

- I. Trata-se de um texto figurativo.
- II. O texto é construído com termos concretos: pedreira, chão, pedra, farinha, trabalhadores, lona, etc.
- III. As ações e qualificações são vistas como simultâneas, não havendo relação de anterioridade e posterioridade entre elas, comuns nos textos descritivos.
- IV. O texto é essencialmente narrativo, pois o foco está na ação.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) I, II e III apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) III e IV, apenas.
- d) I, II, III e IV.
- e) Apenas I.

2) **Nesse texto temos a descrição de uma pedreira e do trabalho que nela executam os operários. Em relação a essa descrição, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.**

- I. O autor descreve a pedreira metaforicamente e as expressões, em seu conjunto, constroem uma prosopopeia.  
**porque**
  - II. Os termos com que o autor descreve a pedreira são tipicamente humanos: *gigante, contemplava com desprezo, imperturbável, dorso, monstro, deixando sem um gemido que lhe abrissem as entranhas, afrontando o céu.*
- a) A afirmativa I é verdadeira e a II é falsa.
  - b) A afirmativa I é falsa e a II é verdadeira
  - c) Ambas as afirmativas são verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa da primeira
  - d) Ambas as afirmativas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa da primeira.
  - e) Ambas as afirmativas são falsas.

3) **Na visão do autor:**

- I. Há uma oposição entre o homem e a natureza, em que o primeiro se acha em situação de inferioridade em relação à segunda.
- II. O trabalho é visto como *atividade feroz*, como uma luta de vingança e de ódio.
- III. A natureza é impotente diante do homem.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) I. e II, apenas
- b) I apenas
- c) II apenas
- d) II e III apenas
- e) I, II e III.

**4) Considere as orações abaixo.**

- I. Tratam-se de problemas complexos.
- II. Vigiam-se as mensagens.
- III. Procura-se os suspeitos do crimes.

**A concordância está correta somente em**

- a) I
- b) II
- c) III
- d) I e II
- e) I e III

**5) Considere o período e as afirmativas abaixo.**

É preferível ter câmeras de vigilância do que ficarmos sujeitos à assaltos.

- I. Há um problema de regência nominal.
- II. O uso do acento indicativo da crase está incorreto.
- III. Há um problema de concordância nominal

**Está correto o que se afirma somente em**

- a) I
- b) II
- c) III
- d) II e III
- e) I e II

**6) Considere o período e as afirmativas.**

De acordo com a polícia o rapaz que foi preso foi identificado pelas câmeras de segurança do banco.

- I. Deveria haver uma vírgula depois da palavra “preso”.
- II. Deveria haver uma vírgula depois da palavra “polícia”.
- III. Deveria haver uma vírgula depois da palavra “identificado”.

**Está correto o que se afirma em**

- a) somente I
- b) somente II
- c) somente III
- d) somente I e II
- e) nenhuma

**7) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.**

Ele não foi \_\_\_\_\_ escola \_\_\_\_\_ ainda está doente?

- a) à – porque
- b) à - por que
- c) a – porque
- d) a – por que
- e) à – por quê

**8) Considere os períodos abaixo.**

- I. Deve existir, na empresa, poucos funcionários capacitados para esta função.
- II. Faz alguns anos que não o vejo.
- III. Houveram muitos tumultos em junho.

**A concordância está correta em**

- a) somente I
- b) somente II
- c) somente III
- d) somente I e II
- e) somente I e III

**9) Assinale a alternativa que está de acordo com a norma culta.**

- a) Ele trabalha na empresa a cinco anos.
- b) Daqui à 2 anos, terminarei o curso.
- c) O escritório fica a cinco minutos da minha casa.
- d) O congresso é de 14 à 20 de setembro.
- e) Os resultados serão divulgados à partir da semana que vem.

**10) Considere o período e as afirmações abaixo.**

A maioria das empresas que agem de forma sustentável ganha a confiança do consumidor.

- I. A pontuação está incorreta, pois deveria haver uma vírgula antes de “ganha”.
- II. Há um problema de concordância verbal, o correto seria “ganham”.
- III. Para que o período seguisse a norma culta, o verbo “agir” deveria estar no singular, concordando com “maioria”

**Está correto o que se afirma em**

- a) somente I
- b) somente II
- c) somente III
- d) somente I e II
- e) nenhuma

11) Ana tinha certa quantia e gastou  $\frac{1}{4}$  com produtos de beleza,  $\frac{2}{3}$  com roupas e  $\frac{1}{3}$  do restante com alimentação e ainda

Ihe sobraram R\$ 12,00. A quantia que Ana tinha inicialmente é um valor:

- a) maior que R\$ 220,00.
  - b) menor que R\$ 210,00.
  - c) exatamente igual a R\$ 212,00.
  - d) Entre R\$ 200,00 e R\$ 215,00.
  - e) Entre R\$ 215,00 e R\$ 220,00.
- 12) Dos 320 alunos de uma academia de ginástica, sabe-se que 170 praticam aeróbica, 148 praticam natação, 172 praticam boxe, 80 praticam aeróbica e boxe, 75 praticam natação e boxe, 62 praticam aeróbica e natação e 23 praticam os três. Nessas condições podemos afirmar que:
- a) 40 alunos praticam somente natação.
  - b) 74 alunos praticam natação ou aeróbica.
  - c) 91 alunos praticam aeróbica ou boxe.
  - d) O total de alunos que não fazem aeróbica, boxe e natação é igual a 34.
  - e) 51 alunos praticam somente boxe.
- 13) Os números 4,5,7,7,10,9,13,11,... estão descritos numa sequencia lógica. Desse modo, a soma entre o 20º e o 21º termos da sequencia é igual a:
- a) 57
  - b) 54
  - c) 55
  - d) 59
  - e) 52

14) Do ponto de vista da lógica matemática a negação da frase: Marcos foi ao cinema ou Maria foi fazer compras é a frase:

- a) Marcos não foi ao cinema ou Maria não foi fazer compras.
  - b) Marcos foi ao cinema e Maria foi fazer compras.
  - c) Marcos não foi ao cinema, então Maria não foi fazer compras.
  - d) Marcos não foi ao cinema e Maria não foi fazer compras.
  - e) Marcos não foi ao cinema e Maria foi fazer compras.
- 15) Sejam as proposições P: 10% de 40% é o mesmo que 4% e Q: a metade de um terço de x é menor que  $\frac{1}{7}$  de x. Pode-se afirmar que:
- a) A conjunção entre as duas é verdadeira.
  - b) P condicional Q é falso.
  - c) P bicondicional Q é verdadeiro.
  - d) A disjunção entre as duas é falsa.
  - e) A negação de q é falsa.

### LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

16) Entre as competências da EBSEERH não se inclui:

- a) Prestar às instituições federais de ensino superior e a outras instituições congêneres serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, mediante as condições que forem fixadas em seu estatuto social.
  - b) Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa de instituições federais de ensino superior e de outras instituições congêneres, cuja vinculação com o campo da saúde pública ou com outros aspectos da sua atividade torne necessária essa cooperação, em especial na implementação das residências médica, multiprofissional e em área profissional da saúde, nas especialidades e regiões estratégicas para o SUS.
  - c) Prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e a outras instituições congêneres.
  - d) Prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários e federais e a outras instituições congêneres, com implementação de sistema de gestão único com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de metas.
  - e) Propor as diretrizes da Política Nacional de Residência Médica.
- 17) Sobre a EBSEERH e a lei que a criou, assinale a alternativa incorreta:
- a) A EBSEERH e suas subsidiárias estarão sujeitas à fiscalização dos órgãos de controle interno do Poder Executivo e ao controle externo exercido pelo Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União.
  - b) A EBSEERH não é autorizada a patrocinar entidade fechada de previdência privada, nos termos da legislação vigente.
  - c) Os Estados poderão autorizar a criação de empresas públicas de serviços hospitalares.
  - d) O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
  - e) É dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.

**18) O prazo de duração da EBSERH é:**

- a) Indeterminado
- b) De dois anos
- c) De quatro anos
- d) De 10 anos
- e) De 8 anos

**19) Compete ao Conselho de Administração da EBSERH, exceto:**

- a) Aprovar o regimento interno da EBSERH
- b) Deliberar, mediante proposta da Diretoria Executiva, sobre a contratação de empréstimos no interesse da EBSERH;
- c) Opinar e submeter à aprovação do Ministério de Estado da Educação sobre a proposta de criação de escolas médicas.
- d) Aprovar o orçamento e programa de investimentos e acompanhar a sua execução
- e) Opinar e submeter à aprovação do Ministro de Estado da Fazenda, por intermédio do Ministro de Estado da Educação sobre a proposta de criação de subsidiárias.

**20) Sobre o Conselho Consultivo da EBSERH, assinale a alternativa incorreta:**

- a) Seu presidente será um entre os membros indicados pelo Ministro de Estado da Educação.
- b) Um dos representantes dos usuários dos hospitais universitários federais faz parte deste conselho.
- c) Um dos representantes dos residentes em saúde dos hospitais universitários federais faz parte deste conselho.
- d) Deve-se reunir ordinariamente pelo menos uma vez ao ano.
- e) Uma de suas funções é acompanhar e avaliar periodicamente o desempenho da EBSERH.

### **LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS**

---

**21) Considerando a informação em saúde e os sistemas de informação em saúde, assinale a alternativa incorreta:**

- a) Dado é qualquer elemento qualitativo ou quantitativo, desvinculado de referencial explicativo.
- b) Informação é o produto da análise de um ou mais dados.
- c) A notificação é uma fonte de dado de morbidade de baixo custo, ativa e de elevada cobertura.
- d) A informação em saúde não se refere somente à produzida pelo setor de saúde.
- e) O SIA-SUS é o sistema de informações ambulatoriais do Sistema Único de Saúde.

**22) Um município de pequeno porte decidiu que durante a campanha anual de vacinação contra a gripe, estaria disponível aos pacientes a dosagem de glicemia e aferição de pressão arterial. A medida foi duramente criticada pelos vereadores de oposição que a caracterizaram como desperdício de recursos e desvio do objetivo da vacinação. Em sua opinião:**

- a) A medida está incorreta pois compromete o princípio da universalidade do SUS, porque torna a vacinação demorada e com risco de menor cobertura.
- b) A medida está em acordo com o princípio da integralidade do SUS.
- c) A medida fere o princípio da autonomia do usuário do SUS.
- d) A medida está em desacordo com o princípio da utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades.
- e) A medida está em desacordo com o princípio da capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.

**23) Considerando os determinantes sociais de saúde e a ocorrência de hipertensão arterial, assinale a alternativa incorreta:**

- a) Não parece haver relação entre renda familiar e prevalência de hipertensão arterial.
- b) Há associação entre estilo de vida sedentário e maior prevalência de hipertensão arterial.
- c) Há associação entre atividade profissional e prevalência de hipertensão.
- d) Há associação entre consumo excessivo de álcool e maior prevalência de hipertensão.
- e) Pessoas que vivem em comunidades não industriais, não aculturadas e com baixa ingestão de sal têm menor pressão arterial média, que tende a aumentar um pouco com a idade. A pressão arterial aumenta nessas pessoas quando adotam estilos de vida modernos.

**24) Sobre o controle social no SUS, assinale a alternativa incorreta:**

- a) O SUS foi a primeira política pública no Brasil a adotar constitucionalmente a participação popular como um de seus princípios.
- b) A participação da comunidade na gestão do SUS foi definida pela lei nº 8142/1990.
- c) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- d) A representação dos usuários nas Conferências de Saúde é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos
- e) A representação dos usuários no Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

**25) O Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011 regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Considerando esse decreto, assinale a alternativa incorreta:**

- a) Poderão ser instituídas Regiões de Saúde interestaduais, compostas por municípios limítrofes, por ato conjunto dos respectivos Estados em articulação com os municípios.
- b) O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico, observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção especial, conforme legislação vigente.
- c) A população indígena contará com os mesmos regramentos de acesso, que o conjunto da população conforme a necessidade de assistência integral à sua saúde, de acordo com disposições do Ministério da Saúde.
- d) O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços nos entes federativos e nas Regiões de Saúde.
- e) Ao usuário será assegurada a continuidade do cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região.

26) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- ( ) A febre resulta de uma resposta termorreguladora do hipotálamo pela ação de citocinas circulantes, já a hipertermia se deve a sobrecarga dos mecanismos termorreguladores do corpo, sem alteração do *set point* do centro regulador.
  - ( ) O tratamento da hipertermia é opcional, enquanto da febre é mandatório.
  - ( ) Febre sem sinais localizatórios (FSSL) é quando estamos diante a uma criança com febre e exame físico normal.
  - ( ) Na FSSL, a criança abaixo de 3 meses, se não estiver em bom estado geral ou o número de leucócitos for  $< 5.000/mm^3$  ou  $> 15.000/mm^3$  ou houver alteração no exame de urina, deve ser considerada de alto risco de doença bacteriana grave.
  - ( ) A febre de origem indeterminada (FOI) clássica, é definida como febre por mais de três semanas, com investigação hospitalar por três dias ou três retornos ambulatoriais sem diagnóstico.
  - ( ) A bacteremia oculta (BO) é a presença de bactéria em hemocultura de uma criança com FSSL e o agente etiológico mais comum é o *Streptococcus pyogenes*.
- a) F; V; V; F; V; V.  
 b) V; F; V; F; F; V.  
 c) V; V; F; F; V; F.  
 d) F; V; F; V; V; F.  
 e) V; F; F; V; V; F.

27) Com relação às reações de fase aguda do soro, é incorreto afirmar que:

- a) A velocidade de hemossedimentação (VHS) reflete alterações de várias proteínas séricas, principalmente as do fibrinogênio.
- b) Crianças obesas apresentam VHS maiores que crianças não obesas.
- c) A proteína C reativa (PCR) tem meia-vida curta, o que permite monitorar mais rapidamente as alterações que estão acontecendo no soro e tem comportamento regular nas diferentes formas de inflamação.
- d) A alfa-1-glicoproteína sérica diminui nos processos inflamatórios, neoplásicos e infecciosos.
- e) A procalcitonina aumenta rapidamente em resposta à presença de endotoxinas bacterianas. Altos níveis são observados na meningite bacteriana, choque séptico, bacteremia e pielonefrite.

28) Correlacione as colunas e marque a alternativa respectivamente correta.

- |                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| A. Sarampo                 | ( ) Manchas de Forchheimer    |
| B. Mononucleose infecciosa | ( ) "Cara esbofetada"         |
| C. Rubéola                 | ( ) Sinal de Koplik           |
| D. Escarlatina             | ( ) Linfanodomegalia cervical |
| E. Eritema infeccioso      | ( ) Língua em framboesa       |

- a) C; E; A; B; D.  
 b) E; C; B; D; A.  
 c) C; A; B; E; D.  
 d) D; E; A; B; C.  
 e) A; C; B; D; E.

29) A toxoplasmose congênita é uma importante infecção do período intrauterino que pode causar lesões graves e até fatais ao feto, dependendo do período da gestação que acomete. Desta forma, assinale a alternativa incorreta.

- a) O período de incubação para a transmissão adquirida intra-útero não é conhecido. Entretanto, sabe-se que a transmissão dessa infecção para o feto no primeiro trimestre de gestação é de 10% e atinge valores de 70% a 90% no terceiro trimestre.
- b) Os sintomas, quando presentes, podem ser inespecíficos e devem fazer parte do diagnóstico diferencial das outras infecções de transmissão intrauterina.
- c) Apesar do quadro clínico da toxoplasmose congênita ser muito variável, desde uma infecção grave fulminante a casos moderados e subclínicos, o acometimento neurológico não necessariamente está presente nos casos leves.
- d) As lesões oculares primárias da toxoplasmose congênita são localizadas na retina e na coróide.
- e) São achadas freqüentes do sistema nervoso central, calcificações intracranianas, microcefalias, e hidrocefalias.

30) São medidas corretas para conduzir o feto e recém-nascido (RN) exposto ao vírus da hepatite B (VHB), exceto a que se apresenta na alternativa:

- a) O aleitamento materno é contraindicado, uma vez que antígenos do VHB são detectados no leite materno.
- b) Medidas invasivas ao feto, como a amniocentese e a cordocentese devem ser evitadas.
- c) Manobras de ressuscitação e de aspiração gástrica devem ser gentis para evitar que ocorram traumas e maior contaminação do RN com secreções maternas.
- d) Recomenda-se que seja feita a vacina para hepatite B e imunoglobulina hiperimune para hepatite B (IGHB) nas primeiras 12 horas de vida.
- e) As injeções intramusculares e endovenosas devem ser administradas somente após o banho.

31) Uma gestante, dá entrada em uma maternidade em franco trabalho de parto, sem nenhuma consulta de pré-natal. Na sua história, ela conta que é usuária de drogas. É realizado o teste rápido para anti-HIV, cujo resultado vem positivo. A conduta correta diante ao recém-nascido é:

- a) Prescrever banho após nascimento com clorexidina e zidovudina endovena.
- b) Aguardar o exame sorológico da mãe para iniciar a zidovudina e proscrever o aleitamento materno.
- c) Medidas de rotina, como a mãe não recebeu zidovudina endovenosa antes do parto, pois medidas específicas ao recém nascido não modificam o risco de transmissão.
- d) Banho imediato após o parto, iniciar zidovudina via oral até duas horas de vida e proscrever aleitamento materno.
- e) Proscrever aleitamento materno, iniciar zidovudina via oral no primeiro dia de vida sulfametoxazol+trimetoprima no segundo dia de vida.

**32) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- ( ) As aminopenicilinas permanecem como drogas de primeira linha no tratamento de infecções de vias aéreas superiores causadas por pneumococos.
  - ( ) Em ambientes hospitalares, muitos estafilococos, principalmente coagulase positivo, atualmente já são sensíveis à oxacilina.
  - ( ) As cefalosporinas de terceira geração, quando comparadas às de primeira geração, têm uma atividade menor contra os germes gram-positivos, porém maior atividade contra as bactérias gram-negativas.
  - ( ) Os carbapenens são antibióticos betalactâmicos de amplo espectro, com ação contra um grande número de germes, incluindo gram-positivo, gram-negativo e anaeróbio, porém, três bactérias são naturalmente resistentes: *Stenotrophomonas malphilia*, *Enterococcus faecium* e *Burkoderia cepacia*.
  - ( ) Com relação à ceftriaxona, deve-se preferi-la à cefotaxima, para uso no período neonatal, por não interferir no metabolismo e na excreção das bilirrubinas.
  - ( ) A cefepime e cefepiroma, são cefalosporinas de quarta geração com atividade contra enterobactérias e *Pseudomonas aeruginosa*.
- a) V, V, F, F, V, F.  
b) V, F, F, V, F, F.  
c) F, V, F, V, V, F.  
d) F, V, V, F, F, V.  
e) V, F, V, V, F, F.

**33) Assinale a alternativa incorreta em relação ao grupo de infecções de pele e partes moles:**

- a) A erisipela é a infecção mais superficial do grupo, estando restrita à epiderme; há edema ao redor dos folículos pilosos, que leva ao aspecto de "pele de laranja". O principal agente etiológico é o estreptococos beta-hemolíticos.
- b) O impetigo é uma infecção de pele muito comum. O impetigo bolhoso tem como agente etiológico o *Staphylococcus aureus*, isolado ou combinado ao estreptococo.
- c) A celulite é um processo mais profundo, com processo inflamatório alastrando pelo tecido celular subcutâneo. Sua evolução é insidiosa e seus limites mal definidos. Os agentes envolvidos são *S. aureus* e *S. pyogenes*.
- d) A fasciite necrosante representa um espectro mais grave de infecção no qual a progressão ocorre ao longo da fáscia muscular, com poucas evidências externas da extensão do processo. Os principais agentes envolvidos são *S. aureus* e *S. pyogenes*.
- e) Um abscesso é uma coleção de pus localizada na epiderme, exteriorizando-se como uma área eritematosa com uma flutuação. *S. aureus* e *S. pyogenes* são as causas mais frequentes.

**34) O melhor tratamento para osteomielite bacteriana em crianças abaixo de 3 meses de idade é:**

- a) Penicilina Cristalina e cefalexina.
- b) Oxacilina e gentamicina.
- c) Cefalexina e gentamicina.
- d) Oxacilina e amoxicilina.
- e) Penicilina Cristalina e amoxicilina.

**35) As evidências de melhora do tratamento em piodrites incluem, exceto:**

- a) Diminuição nos níveis de PCR e/ou VHS.
- b) Paciente estar afebril por 48 a 72 horas.
- c) Cultura do líquido sinovial negativo.
- d) O leucograma estar normal.
- e) Sinais e sintomas locais com melhor ou desaparecimento.

**36) As manifestações extrapulmonares da tuberculose na criança ocorrem em 25% do total dos casos. O bacilo pode disseminar no momento da primoinfecção para qualquer órgão ou tecido. Desta forma, assinale a alternativa que apresenta a forma de tuberculose extrapulmonar mais comum.**

- a) Gânglios periféricos.
- b) Sistema nervoso central.
- c) Pleura.
- d) Miliar.
- e) Ossos.

**37) Em relação à tuberculose na infância é correto afirmar:**

- a) A meningite tuberculose evolui de forma insidiosa, com distúrbio comportamental e crises convulsivas. No líquor há predomínio de linfócitos com hiperproteinorraquia e normoglicorraquia.
- b) A baciloscopia por lavagem gástrica é um método simples e eficaz, com alta sensibilidade para tuberculose na infância.
- c) As manifestações clínicas da tuberculose pulmonar são exuberantes e constituem, perda de peso, tosse seca, febre baixa e falta de apetite.
- d) A disseminação linfohematogênica do bacilo da tuberculose é um evento constante na fase tardia da primoinfecção.
- e) O diagnóstico da tuberculose pulmonar na infância baseia-se no somatório de pontos com referência à identificação da fonte contagiante adulto, na apresentação do quadro clínico e radiológico, no teste tuberculínico e no estado nutricional do paciente.

- 38) Lactente de 9 meses de idade, apresentando febre e irritabilidade há 24 horas, recusa alimentar e vômitos, evolui apresentando convulsão tônico-clônica generalizada, com duração de cerca de 1 minuto. A mãe refere que algumas vacinas estão atrasadas, mas não se encontra com o cartão vacinal. Ao exame físico: irritabilidade alternada com sonolência, ausência de sinais neurológicos localizatórios, fontanela anterior normotensa. T = 39°C, FC = 130 bpm, FR = 36 mrpm, PA = 80 x 40 mmHg. Pulsos periféricos normopalpáveis, tempo de enchimento capilar menor do que dois segundos. Sem sinais de infecção respiratória. Colhidos hemograma (HMG), hemocultura e líquido (LCR). O resultado parcial do LCR mostrou: 700 leucócitos/mm<sup>3</sup> (80% polimorfonucleares), glicorraquia = 20 mg/100 ml, proteinorraquia = 120 mg/100 ml, látex negativo, cultura em andamento. HMG: 16.500 GB (70% seg; 3% eos; 20% linf; 7% mono). Glicemia capilar = 150 mg/dl. O diagnóstico e a conduta terapêutica inicial devem ser respectivamente:
- Meningite viral; Aciclovir IV.
  - Bacteremia; Penicilina Cristalina IV.
  - Meningite bacteriana; Ceftriaxone e corticóide IV.
  - Convulsão febril; antitérmico IM.
  - Meningite tuberculosa; iniciar Rifampicina, Isoniazida e Pirazinamida.
- 39) Lactente de um ano e dois meses é levado a atendimento médico com quadro de febre não aferida há dois dias, tosse e dificuldade para respirar, a mãe informa que o paciente não está conseguindo ingerir líquidos e que apresentou vômitos nas últimas 24 horas. Exame físico: FC: 120 bpm; FR: 60 rpm; roncos difusos à ausculta pulmonar e crepitações finas em base direita. Raio X de tórax (PA): velamento homogêneo em base direita, sem apagamento do seio costofrênico D; sem sinais de hiperinsuflação. Neste momento a conduta mais apropriada é:
- Introduzir amoxicilina 50mg/kg/dia, via oral tratamento ambulatorial, reavaliação em 48 horas.
  - Introduzir amoxicilina 50mg/kg/dia, via oral, tratamento hospitalar.
  - Introduzir claritromicina 200mg/kg/dia, endovenoso, tratamento hospitalar.
  - Introduzir penicilina cristalina 200.000 UI/kg/dia, intravenoso, tratamento hospitalar.
  - Introduzir ceftriaxone 100mg/kg/dia, intramuscular, tratamento ambulatorial, com reavaliação em 48 horas.
- 40) As infecções virais constituem uma das principais causas de doenças do trato respiratório em crianças abaixo de cinco anos de idade. Nesta faixa etária, as crianças podem ter cerca de 5 a 6 episódios de infecções respiratórias por ano, desta forma, assinale a afirmativa incorreta.
- O vírus influenza tem a característica de causar surtos epidêmicos ou pandemias, devido à capacidade de desenvolver alterações antigênicas *major* (*antigenic drift*) e *minor* (*antigenic shift*).
  - O quadro clínico do adenovírus é semelhante à faringoamigdalite estreptocócica. Outras formas clínicas são pertussis-símile, conjuntivite, cistite aguda hemorrágica e gastroenterite.
  - O vírus sincicial respiratório é um dos agentes mais comumente relacionados com doença respiratória aguda em crianças e a principal causa de bronquiolite. O isolamento viral das secreções nasofaríngeas é possível nos primeiros 3 a 8 dias da doença.
  - A infecção pelo vírus influenza A H1N1, a febre é um sinal muito importante e deve acompanhar uma síndrome gripal.
  - Os rinovírus são os responsáveis pela maioria dos quadros de resfriado comum, tanto nos adultos como nas crianças, sendo muito raro o envolvimento do trato respiratório inferior.
- 41) A dor de garganta é uma queixa comum de crianças e adolescentes, que frequentemente leva o paciente à consulta médica. Sabe-se que muitos agentes causam faringite, porém duas causas importantes são o estreptococo do grupo A (EGA) e o Vírus Epstein-Barr (VEB), assinale a alternativa incorreta em relação às características de cada agente:
- A faringite por EGA ocorre mais comumente em crianças em idade escolar e por VEB em adolescentes.
  - Clinicamente a faringite por EGA tem início abrupto e está associado à febre, cefaléia e dor abdominal; já o VEB o início é insidioso, com fase prodrômica de mal estar e cefaléia, febre, faringite e linfonodomegalia cervical posterior.
  - A faringite por EGA pode cursar com petéquias no palato, o que não ocorre com o VEB.
  - A cultura de orofaringe é padrão-ouro para o diagnóstico da faringite por EGA, realizada com amostras de ambos os pilares das tonsilas e da parede posterior da faringe.
  - A pesquisa para diagnóstico da mononucleose infecciosa começa com a contagem dos leucócitos com diferencial (predomínio de linfócitos, com mais de 10% de atípia) e teste de anticorpos heterófilos.
- 42) São fatores de risco para desenvolvimento de infecção fúngica invasiva, exceto:
- Cateter venoso central.
  - Nutrição parenteral.
  - Antibioticoterapia de amplo espectro.
  - Quebra da barreira mucosa, epitelial ou pele.
  - Infecções por anaeróbios.
- 43) Nos casos de meningite por *Haemophilus influenzae* tipo B, as medidas de controle dos comunicantes são, exceto:
- Isolamento respiratório hospitalar do paciente até 24 horas após o início da antibioticoterapia adequada.
  - Quarentena dos comunicantes.
  - Quimioprofilaxia para comunicantes domiciliares (adultos e crianças), onde haja pelo menos outra criança, que não seja o caso índice, com idade menor de 4 anos.
  - Quimioprofilaxia para comunicantes que compartilham alojamentos coletivos (orfanatos, internatos e outros).
  - Quimioprofilaxia para comunicantes íntimos (creche ou pré-escola) nos quais tenham ocorrido dois ou mais casos e que existam crianças menores de dois anos.

- 44) A prevenção das Doenças Sexualmente Transmissíveis nas Vítimas de Abuso Sexual, em adolescentes, está indicada nas seguintes patologias, **exceto**:
- Gonorreia (*Neisseria gonorrhoeae*).
  - Condiloma acuminado (HPV).
  - Infecção por *Clamidia trachomatis*.
  - Sífilis (*Treponema pallidum*).
  - Tricomoníase e vaginose bacteriana.
- 45) Lactente de 10 meses é atendido no pronto socorro com quadro de diarreia sanguinolenta há 5 dias. Mãe refere que criança está com diminuição da diurese e percebeu que seu filho está mais "inchado". Ao exame: paciente está com febre (38,5°C), palidez cutâneo-mucosa importante, petéquias e edema palpebral. Os exames laboratoriais revelam Hb = 6g/dl, plaquetas = 65.000 mm<sup>3</sup>, uréia = 138mg/dl e creatinina = 3 mg/dl. Diante deste quadro, o agente etiológico mais provável é:
- Escherichia coli* enteroinvasiva.
  - Escherichia coli* enterotoxigênica.
  - Escherichia coli* êntero-hemorrágica.
  - Escherichia coli* enteropatogênica.
  - Escherichia coli* enteroagregativa.
- 46) Em relação à Vacina Oral do Rotavírus Humano G1P1, é correto afirmar que:
- A primeira dose é aplicada aos 2 meses, no máximo até 4 meses e 7 dias de vida.
  - A segunda dose com 5 meses de idade, mas no máximo até 6 meses e 15 dias.
  - O intervalo mínimo entre as doses é de duas semanas.
  - A vacina do rotavírus pode ser aplicada simultaneamente a outras vacinas.
  - Deve ser aplicada nova dose após regurgitação ou vômito.
- 47) São Doenças de Notificação Compulsória todas alternativas abaixo, **exceto**:
- Poliomielite, Rubéola e Sarampo.
  - Doença meningocócica, Paracoccidiodomicose e Difteria.
  - Meningite viral, Influenza humana e Tularemia.
  - Síndrome da Rubéola congênita, Raiva humana e Peste.
  - Botulismo, Carbúnculo e Cólera.
- 48) A traqueíte bacteriana é uma infecção grave que se apresenta clinicamente como uma obstrução importante da via aérea superior, cujo agente etiológico mais frequente é \_\_\_\_\_. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
- Streptococcus pneumoniae*.
  - Haemophilus influenzae* b.
  - Estreptococo* alfa hemolítico.
  - Staphilococcus aureus*.
  - Estreptococo* beta hemolítico.
- 49) O diagnóstico da rinosinusite aguda na criança, geralmente é feito baseado em dados de \_\_\_\_\_. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
- História clínica e exame físico.
  - Tomografia computadorizada de crânio.
  - Raio X de seios da face.
  - Endoscopia nasal.
  - Transiluminação dos seios da face.
- 50) São fatores predisponentes para infecção do trato urinário todas alternativas abaixo, **exceto**:
- Bexiga neurogênica.
  - Refluxo vesico - ureteral.
  - Constipação intestinal.
  - Presença de prepúcio.
  - Prematuridade.