

**Concurso Público para provimento de cargos de  
Médico - Nível III (Grau A) - Residência Médica  
Medicina Intensiva Pediátrica**

Nome do Candidato

Caderno de Prova '18', Tipo 001

Nº de Inscrição

MODELO

Nº do Caderno

MODELO1

Nº do Documento

0000000000000000

ASSINATURA DO CANDIDATO

00001-0001-0001

**P R O V A****Conhecimentos Gerais  
Conhecimentos Específicos  
Dissertativa****INSTRUÇÕES**

- Verifique se este caderno:
  - corresponde a sua opção de cargo.
  - contém 40 questões, numeradas de 1 a 40.
  - contém a proposta e espaços para rascunho e transcrição definitiva das três questões dissertativas.Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.  
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

**VOCÊ DEVE**

- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: (A) ● (C) (D) (E)
- Ler o que se pede na Prova Dissertativa e utilizar, se necessário, o espaço para rascunho.

**ATENÇÃO**

- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de material transparente de tinta preta.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Em hipótese alguma os rascunhos das questões da Prova Dissertativa serão corrigidos.
- A duração da prova é de 5 horas para responder a todas as questões objetivas, preencher a Folha de Respostas e responder a Prova Dissertativa (rascunho e transcrição).
- Ao término da prova, chame o fiscal da sala e devolva todo o material recebido.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.

**CONHECIMENTOS GERAIS**

1. Em relação às instituições públicas, é correto afirmar:
- (A) Uma organização é considerada moderna se é capaz de usar o conhecimento para desenvolver e oferecer novos produtos e serviços, dentro de espírito inovador e criativo.
  - (B) Um ambiente de trabalho moderno é bastante rígido, proporciona disciplina, impermeabiliza procedimentos já existentes dentro da organização e evita inovações que desestabilizem a rotina.
  - (C) O fornecimento de informações aos cidadãos é essencialmente seletivo, para que eles não influenciem significativamente as decisões políticoadministrativas.
  - (D) A política de capacitação de servidores públicos prescinde de ferramentas de informática e uso das tecnologias da informação.
  - (E) O compartilhamento de conhecimento e informação na gestão pública será incluído como prioridade apenas em políticas de gestão do conhecimento futuras.
- 
2. No momento em que o Governo avalia o desempenho de suas organizações e de seus servidores por metas ou objetivos alcançados, ele está avaliando a gestão pública por meio
- (A) da eficiência.
  - (B) da eficácia.
  - (C) da efetividade.
  - (D) da qualidade.
  - (E) do custo.
- 
3. De uma maneira geral, as competências gerenciais são classificadas em três categorias: conhecimentos, habilidades e atitudes. Essas categorias são necessárias para ocupar um cargo de gerente e dependem do nível hierárquico do cargo, das tarefas a serem desenvolvidas pelo gerente e do tipo de organização, entre outros fatores. A relação correta entre habilidades e nível hierárquico é:
- (A) Quanto mais alto o nível hierárquico do cargo a ser ocupado, mais habilidades técnicas serão requeridas.
  - (B) Em cargos de gerências táticas e intermediárias são requeridas com maior intensidade as chamadas habilidades e atitudes.
  - (C) Em cargos com características operacionais são requeridas maiores habilidades técnicas como principal condição desse gerenciamento.
  - (D) Quanto mais operacional o cargo a ser ocupado, mais habilidades atitudinais serão requeridas.
  - (E) Quanto mais operacional o cargo a ser ocupado, mais habilidades conceituais serão requeridas.
- 
4. O Brasil é um Estado organizado de forma Federativa. Isto significa que as atribuições inerentes aos poderes executivo, legislativo e judiciário são divididas em duas esferas de atuação: a Federal (União) e a Estadual. Em relação a essas esferas, é INCORRETO afirmar que
- (A) a cúpula dos três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário formam o núcleo estratégico do Estado.
  - (B) aos Estados e Municípios são atribuídas as ações de caráter local.
  - (C) a Constituição da União e as leis federais determinam o escopo e o alcance das constituições dos Estados Federados.
  - (D) o critério de divisão de poderes entre União e Estados membros é, ao mesmo tempo, funcional e territorial.
  - (E) os Estados têm total autonomia para formulação e aplicação de suas políticas, independentemente do poder central.
- 
5. No Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI) consta que: “são significativos os fatores externos decorrentes do desenvolvimento do capital humano sob a perspectiva do Ciclo de Vida. Ao mesmo tempo em que uma população saudável e bem nutrida influencia positivamente os indicadores educacionais, o investimento em educação tem reflexos positivos sobre os indicadores de saúde”.
- Dentre outras, são ações propostas no PMDI:
- (A) adoção de perspectiva integrada de desenvolvimento do capital humano; salto de qualidade no ensino e ampliação da escolaridade da população jovem mineira, orientada por padrões internacionais (OCDE); superação da pobreza crônica das novas gerações; protagonismo juvenil e capacitação para o trabalho.
  - (B) aumento do número de escolas e hospitais de atendimento público; aumento de ambulatórios setoriais ou regionais; aumento do número de vagas para médicos no atendimento público.
  - (C) adoção de qualidade no ensino e no atendimento público em todos os órgãos destinados à população; superação da pobreza crônica e capacitação para o trabalho.
  - (D) superação da pobreza crônica; elaboração de programas materno-infantil e de adolescentes para diminuir a mortalidade infantil; construções de escola de nível médio e de ensino superior.
  - (E) construções de redes de hospitais de atendimento público; implantação em todo o estado mineiro do Programa de Saúde do Trabalhador; Construção de Escolas Públicas para aumentar o número de vagas disponíveis e capacitação para o trabalho.



6. É VETADO ao Funcionário Público
- (A) facilitar as atividades de fiscalização pelos órgãos de controle.
  - (B) observar os princípios e valores da Ética Pública.
  - (C) divulgar e informar a todos os integrantes de sua classe sobre a existência de Código de Conduta Ética.
  - (D) utilizar-se do cargo, emprego ou função para obter qualquer favorecimento para si ou outrem.
  - (E) apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função.
- 
7. Dentre as características das organizações públicas modernas, nas quais o conhecimento é valorizado, encontra-se
- (A) coordenação centralizada de tarefas.
  - (B) predomínio do trabalho individual.
  - (C) transmissão do conhecimento coletivo, de preferência, em forma de documentos impressos.
  - (D) o servidor-polivalente e inovador.
  - (E) diminuição do poder dos usuários dos serviços dessas empresas.
- 
8. Segundo seu delineamento, em um estudo de
- (A) *coorte*, a exposição é medida antes do desenvolvimento da doença.
  - (B) caso-controle, a exposição é medida antes do desenvolvimento da doença.
  - (C) prevalência, a exposição é medida antes do desenvolvimento da doença.
  - (D) caso-controle, o risco da doença não é medido diretamente.
  - (E) caso-controle e de prevalência, o risco da doença é medido diretamente.
- 
9. O sistema de planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS) pressupõe
- (A) que as peculiaridades, necessidades e realidades de saúde do país sejam homogeneizadas e contempladas dentro de um documento igual para todos os estados.
  - (B) que a esfera federal de gestão realize todo o planejamento e a regionalização das ações fique a cargo dos estados e municípios.
  - (C) que cada esfera de gestão (municipal, estadual e federal) realize o seu planejamento.
  - (D) instrumentos de planejamento de centralização: Plano Diretor, Plano Diretor de Investimento (PDI) e Programação Pactuada e Integrada da Atenção em Saúde (PPI).
  - (E) Plano Federal Bienal de Saúde, instrumento básico que norteia a Programação Bienal das ações e serviços de saúde prestados.
- 
10. Sobre os modelos de atenção à saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), é correto afirmar que
- (A) se fundamentam em regionalização, integralização e terceirização dos serviços.
  - (B) cada doença tem um nível de atenção à saúde (primária, média complexidade e alta complexidade) predeterminado.
  - (C) se fundamentam em regionalização e integração dos serviços interfederativos.
  - (D) foram implantados com vistas ao atendimento das Doenças de Notificação Compulsória (DNC).
  - (E) os serviços de atenção primária são as únicas portas de entrada no sistema SUS.



- 
11. O projeto de vigilância em saúde (Vigisus) é
- (A) voltado à redução de mortalidade por doenças transmissíveis e não abrange a exposição a fatores de risco associados com a saúde.
  - (B) composto de duas fases: Vigisus I (1999 a 2004) para Estruturação do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e Vigisus II (2005-2013) para Modernização do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde.
  - (C) destinado à redução da mortalidade e da morbidade de doenças transmissíveis, mas não abrange as doenças não transmissíveis.
  - (D) executado pela Secretaria de Vigilância em Saúde e Fundação Nacional de Saúde, sendo financiado pelo Banco Interamericano para Reconstrução e Desenvolvimento.
  - (E) direcionado para serviços de saneamento em grandes aglomerados urbanos e, por isso, não inclui a saúde de povos indígenas e quilombolas.
- 
12. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições,
- (A) o controle e a fiscalização do serviço de internação e atendimento ambulatorial, não abrangendo a execução da política de sangue e seus derivados.
  - (B) a fiscalização e inspeção de alimentos quanto à qualidade sanitária, sem abranger a vigilância nutricional e a orientação alimentar.
  - (C) a participação na formulação da política de saúde pública, não incluindo a execução de ações de saneamento básico.
  - (D) a participação no controle e formulação da política de medicamentos, excetuando a participação na produção de insumos de interesse para a saúde.
  - (E) a participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substância e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
- 
13. O controle social no Sistema Único de Saúde
- (A) diminuiu após a Norma Operacional Básica (NOB 1/96), desde que esta redefiniu vínculos de serviços com seus usuários.
  - (B) está contemplado em um dos blocos de financiamento para a gestão do Sistema Único de Saúde.
  - (C) está previsto somente para serviços públicos de assistência à saúde.
  - (D) pressupõe ações dos usuários sobre serviços, exclusivamente, da iniciativa privada.
  - (E) requer financiamento do próprio usuário.
- 
14. A educação em saúde, segundo o Sistema Único de Saúde (SUS),
- (A) é o objetivo de um Programa destinado a capacitar trabalhadores da saúde para a utilização adequada de equipamentos usados em serviços de saúde.
  - (B) está prevista em legislação, mas ainda não existe uma secretaria de gestão relacionada a essa área.
  - (C) restringe-se a um compromisso de buscar alternativas para os problemas relacionados a não valorização dos trabalhadores da saúde.
  - (D) refere-se à qualificação de trabalhadores da saúde e, ainda, à promoção de hábitos saudáveis aos usuários do SUS.
  - (E) prevê atividades exclusivas dos trabalhadores da saúde para atendimento da população.
- 
15. Quanto ao financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS),
- (A) os recursos de custeio da esfera federal destinados à assistência podem corresponder ao Piso Assistencial Básico (PAB) destinado ao custeio de procedimentos e ações de assistência básica, de responsabilidade tipicamente municipal.
  - (B) na esfera estadual, conta com recursos transferidos pela União e essas transferências regulares não estão condicionadas à contrapartida deste nível de governo.
  - (C) na esfera municipal, além dos recursos oriundos do respectivo Tesouro, existem transferências eventuais da União para municípios, as quais não estão condicionadas à contrapartida deste nível de governo.
  - (D) os fundos de saúde dos municípios não podem receber verba oriunda de reembolso de despesas realizadas em função de atendimentos prestados por unidades públicas a beneficiários de planos privados de saúde.
  - (E) os recursos de custeio da esfera federal, destinados às ações e serviços de saúde, configuram o Teto Financeiro Global (TFG) e o teto financeiro do estado; não deve conter os tetos de municípios.
-



16. Na legislação do Sistema Único de Saúde,
- (A) “Programação Pactuada e Integrada (PPI)” restringe-se às atividades de assistência ambulatorial e hospitalar, constituindo um instrumento essencial de reorganização do modelo de atenção e da gestão do SUS, de alocação dos recursos e de explicitação do pacto estabelecido entre as três esferas de governo.
  - (B) “Teto Financeiro da Assistência do Município (TFAM)” é um montante que corresponde ao financiamento do conjunto de ações assistenciais em situações de emergência, assumidas pela Secretaria Municipal de Saúde, transferido eventualmente do Fundo Nacional ao Fundo Municipal de Saúde.
  - (C) “Índice de Valorização de Resultados (IVR)” consiste na atribuição de valores adicionais ao teto financeiro da assistência do estado, transferidos eventualmente do Fundo Nacional ao Fundo Estadual de Saúde, quando houver obtenção de resultados de impacto positivo sobre as condições de saúde da população.
  - (D) “Remuneração por Serviços Produzidos” restringe-se ao pagamento direto aos prestadores privados contratados e conveniados, contra apresentação de faturas, referentes a serviços realizados conforme programação e mediante prévia autorização do gestor.
  - (E) “Fração Assistencial Especializada (FAE)” é um montante que corresponde a procedimentos ambulatoriais de média complexidade, medicamentos e insumos excepcionais, órteses e próteses ambulatoriais e Tratamento Fora do Domicílio (TFD), sob gestão do Estado.
- 
17. O Plano Diretor de Regionalização (PDR) do Sistema Único de Saúde (SUS) prevê:
- (A) Municípios em Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada (GPAB-A), com capacidade de ofertar com suficiência a totalidade de serviços de média complexidade, incluindo atividades ambulatoriais de apoio diagnóstico e terapêutico e de internação hospitalar para sua própria população.
  - (B) Nos municípios habilitados em Gestão Plena da Atenção Básica-Ampliada (GPAB-A) que tenham serviços de alta complexidade em seu território, nos quais as funções de gestão e relacionamento com prestadores de alta complexidade são de responsabilidade do gestor municipal, podendo este delegar aos gestores de hospitais as funções de controle e avaliação dos prestadores.
  - (C) Ao governo federal cabe prever a parcela dos recursos a serem gastos em cada município, para cada área de alta complexidade, destacando a parcela a ser utilizada com a população do próprio município e a parcela a ser gasta com a população de referência, sempre de acordo com a Programação Pactuada e Integrada.
  - (D) A assistência de alta complexidade deve ser programada no âmbito federal, e em alguns casos macrorregionais, tendo em vista as características especiais desse grupo: alta densidade tecnológica e alto custo, economia de escala, escassez de profissionais especializados e concentração de oferta em poucos municípios.
  - (E) A programação da assistência de alta complexidade, consolidada pela Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde, não deve conter a referência de pacientes para outros Estados, ou mesmo, reconhecer o fluxo programado de pacientes de outros Estados.
- 
18. As ações de auditoria dentro do Sistema Único de Saúde (SUS) são
- (A) atividades que necessitam de um órgão que consolide as informações necessárias, analise os resultados obtidos em decorrência de suas ações, mas não proponha medidas corretivas.
  - (B) de responsabilidade das três esferas gestoras do SUS, o que exige a estruturação do respectivo órgão de controle, avaliação e auditoria, incluindo a definição dos recursos e da metodologia adequada de trabalho.
  - (C) ações de controle que podem, ou não, auditar procedimentos prévios à realização de serviços e à ordenação dos respectivos pagamentos.
  - (D) ações de controle que excluem autorização de internações e procedimentos ambulatoriais, desde que sejam critérios médicos.
  - (E) monitoramentos da qualidade dos serviços prestados, sem priorizar a regularidade e fidedignidade de registros de produção e faturamento de serviços.
- 
19. Segundo Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde (SUS-NOAS 01), houve fortalecimento do controle, regulação e avaliação da assistência aos usuários devido
- (A) à criação de procedimentos técnico-administrativos prévios à prestação de serviços hospitalares, os quais não podem ser fiscalizados pelos usuários.
  - (B) à previsão de compra de serviços da rede privada, pautada apenas na sua indisponibilidade na rede pública.
  - (C) à possibilidade de compra de serviços da rede privada com base no interesse público e necessidades assistenciais.
  - (D) à implementação de indicadores objetivos baseados em critérios técnicos que não podem ser avaliados pelos usuários.
  - (E) ao fato do gestor federal elaborar todos os planos de controle, regulação e avaliação para fortalecimento da capacidade de gestão.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

20. O reflexo de Moro deve, tipicamente, desaparecer na idade de
- (A) 6 – 8 semanas.
  - (B) 2 – 3 semanas.
  - (C) 4 – 6 semanas.
  - (D) 8 – 10 semanas.
  - (E) 10 – 12 semanas

21. Num lactente de 1 mês de vida, espera-se um aumento do perímetro cefálico, desde o nascimento, de
- (A) 4 cm.
  - (B) 0,5 cm.
  - (C) 1 cm.
  - (D) 1,25 cm.
  - (E) 2 cm.

22. A tabela abaixo apresenta as potências relativas dos efeitos glico e mineralocorticoide, em relação à hidrocortisona, de alguns corticoesteroides utilizados na prática clínica.

**potência relativa (em relação a hidrocortisona)**

	glicocorticoide	mineralocorticoide
Corticoide A	1,0	1,0
Corticoide B	3,5 – 4,0	0,8
Corticoide C	4,0	0,8
Corticoide D	5,0	0 – 0,5
Corticoide E	30	0

O corticoesteroide representado pela denominação “corticoide E” corresponde à

- (A) dexametasona.
  - (B) metilprednisolona.
  - (C) prednisona.
  - (D) prednisolona.
  - (E) deflazacort.
23. Lactente de 2 anos está sob tratamento hospitalar de possível pneumonia associada à assistência a saúde com teicoplanina e imipenem. Além disso, recebe inaloterapia com salbutamol e brometo de ipratrópio e metilprednisolona para o quadro de broncoespasmo. No terceiro dia de tratamento apresenta crise convulsiva tônico-clônica generalizada. Suspeita-se que a crise seja relacionada ao uso de alguma das drogas descritas acima. Destas drogas, a que mais provavelmente pode ser implicada na complicação convulsiva é
- (A) salbutamol.
  - (B) teicoplanina.
  - (C) imipenem.
  - (D) brometo de ipratrópio.
  - (E) metilprednisolona.

24. Todas as substâncias abaixo podem ter efeito antagonista, ou ação como antídoto, em intoxicações específicas, EXCETO:
- (A) hipossulfito de sódio.
  - (B) fosfato monobásico de potássio.
  - (C) glicose.
  - (D) gluconato de cálcio.
  - (E) Vitamina K.

25. As cardiopatias congênitas não cianogênica e cianogênica mais frequentes são, respectivamente:
- (A) comunicação interventricular e Tetralogia de Fallot.
  - (B) comunicação interatrial e Tetralogia de Fallot.
  - (C) comunicação interventricular e transposição dos grandes vasos da base.
  - (D) comunicação interatrial e transposição dos grandes vasos da base.
  - (E) persistência do canal arterial e atrioventricularis communis.

26. Um lactente de 2 meses apresenta quadro de hipotonia e é suspeito de ser portador de Síndrome de Werdnig-Hoffman. Dos sinais abaixo, aquele que mais reforça este diagnóstico é
- (A) convulsões parciais complexas.
  - (B) febres frequentes e refratárias a tratamento.
  - (C) normoreflexia em tendões profundos.
  - (D) fasciculação de língua.
  - (E) atrofia do nervo óptico.

27. Os pais de um lactente portador de hipospádia procuram orientação médica sobre a possibilidade de circuncisão no seu filho. O médico deverá destacar corretamente que
- (A) existe um risco consistentemente maior de câncer de pênis em crianças não circuncisadas.
  - (B) o risco de infecção urinária em crianças não circuncisadas é 10 a 15 vezes maior que nas circuncisadas.
  - (C) a circuncisão reduz o risco de transmissão de doenças sexualmente transmissíveis.
  - (D) são muito raras as complicações da circuncisão.
  - (E) a circuncisão é procedimento seguro e de baixo risco em crianças com hipospádia.

28. Uma menina de 4 anos apresenta história de há 2 semanas ter tido quadro de diarreia com muco e sangue que durou 5 dias. Há 1 semana vem apresentando fadiga e edema periorbitário bilateral. Qual das alternativas abaixo apresenta os resultados de exames que mais provavelmente estarão associados ao quadro dessa paciente?
- (A) Elevados tempos de protrombina e tromboplastina parcial ativada.
  - (B) Hipoalbuminemia.
  - (C) Complemento baixo.
  - (D) Anticorpo antinúcleo positivo.
  - (E) Anemia e plaquetopenia.

29. Dos problemas abaixo, o mais frequentemente encontrado em pacientes com trissomia do 21 é
- (A) anomalias do trato gastrointestinal.
  - (B) leucemia.
  - (C) persistência do canal arterial.
  - (D) síndrome convulsiva.
  - (E) déficit auditivo.



30. Um lactente de 1 ano e 4 meses chega ao pronto-socorro com quadro de sangramento retal indolor. As fezes têm consistência de geleia. O exame físico, incluindo a avaliação da região retal, é normal. O estudo contrastado de trânsito intestinal é normal. Sobre esta condição, podemos afirmar que
- (A) é a anomalia gastrointestinal congênita mais frequente.  
 (B) a radiografia simples do abdômen é geralmente diagnóstica.  
 (C) a alteração anatômica tipicamente se localiza a 1 cm da válvula ileocecal.  
 (D) a apresentação clínica mais comum é a de obstrução intestinal.  
 (E) geralmente torna-se clinicamente aparente após os 2 anos de idade.
- 
31. Um lactente de 1 mês apresenta quadro de vômitos frequentes e acidose metabólica hipoclorêmica. O estudo diagnóstico neste momento é
- (A) pesquisa de ácidos orgânicos na urina.  
 (B) ultrassonografia abdominal.  
 (C) dosagem de 17-hidroxiprogesterona na urina.  
 (D) coprocultura.  
 (E) ultrassonografia de crânio.
- 
32. Um lactente de 2 meses apresenta quadro de dispneia e cianose. O raio X de tórax mostra uma cardiomegalia mínima e infiltrado reticular difuso nos campos pulmonares. Este quadro pode ser justificado por
- (A) atresia de artéria pulmonar.  
 (B) miocardite viral aguda.  
 (C) hipoplasia ventricular esquerda.  
 (D) drenagem anômala total das veias pulmonares com obstrução venosa.  
 (E) transposição dos grandes vasos da base.
- 
33. Uma menina de 5 anos, previamente hígida, apresenta quadro agudo de edema e oligúria. A pesquisa laboratorial revela hipoalbuminemia e hipercolesterolemia. A principal causa de mortalidade nesta condição é
- (A) hiperlipidemia.  
 (B) insuficiência renal aguda.  
 (C) peritonite bacteriana.  
 (D) insuficiência cardíaca congestiva.  
 (E) hipertensão.
- 
34. Um lactente de 1 ano apresenta história de baixo ganho ponderal. A mãe revela que o filho começou a apresentar fezes amolecidas a partir de 8 meses de idade e que o mesmo tem um apetite muito pobre. Ao exame físico, a criança tem uma aparência pequena, é irritada, apresenta pouco tecido gorduroso subcutâneo e tem um abdômen proeminente. A abordagem diagnóstica neste momento é a realização de
- (A) anticorpo anti-endomísio.  
 (B) sedimento urinário.  
 (C) cloro no suor.  
 (D) dosagem de imunoglobulinas.  
 (E) pesquisa de sangue oculto nas fezes.
- 
35. Um pré-escolar de 5 anos apresenta faringite e cultura de orofaringe positiva para estreptococo do grupo A. Das complicações supurativas e não supurativas das infecções pelo estreptococo do grupo A em orofaringe e pele, aquela que é somente associada à infecção de orofaringe é a
- (A) febre reumática.  
 (B) escarlatina.  
 (C) síndrome do choque tóxico.  
 (D) fasciite necrosante.  
 (E) glomerulonefrite.
- 
36. A infecção pelo rotavírus promove diarreia por meio de
- (A) ação fermentativa direta sobre os resíduos alimentares.  
 (B) efeito secretor direto do vírus na cripta do enterócito.  
 (C) ação inflamatória invasora da submucosa intestinal.  
 (D) efeito osmótico pela destruição da lactase do epitélio intestinal e de efeito toxigênico pela ação da proteína viral secretora NSP4.  
 (E) ação ainda desconhecida.
- 
37. Uma lactente de 3 meses chega ao pronto-socorro com quadro de irritabilidade e inapetência há 2 dias. Ao exame físico encontra-se afebril, com FC = 280 bpm, PA = 85/50, SatO<sub>2</sub> = 98% em ar ambiente e com pulso palpável. O traçado do ECG não evidencia onda P e tem QRS estreito. A conduta neste momento é
- (A) propranolol VO 1 mg/kg.  
 (B) cardioversão sincronizada com dose de 4 joules/kg.  
 (C) amiodarona IV 5 mg/kg.  
 (D) digoxina IV 10 mcg/kg.  
 (E) administração adenosina IV em bolo, 0,1 mg/kg.
- 
38. Um lactente de 18 meses está atrasado no esquema de vacinação, não tendo recebido nenhuma dose da vacina contra o meningococo C. Neste momento, para imunizá-lo contra o meningococo C, o menor deverá receber a vacina conjugada em
- (A) esquema de 2 doses com intervalo de 1 mês.  
 (B) dose única da vacina.  
 (C) esquema de 3 doses com intervalo de 2 meses.  
 (D) esquema de 2 doses com intervalo de 1 ano.  
 (E) esquema de 2 doses com intervalo de 6 meses.
- 
39. A respeito da infecção pelo *Mycoplasma pneumoniae*, podemos afirmar que
- (A) apresenta período de incubação prolongado, em média de 3 semanas.  
 (B) a tosse intensa é possível mas incomum.  
 (C) o diagnóstico se confirma por meio da cultura de secreção respiratória.  
 (D) os casos suspeitos necessitam, em ambiente hospitalar, de precauções de contato.  
 (E) os macrolídeos são os antibióticos de escolha, pois agem na parede celular da bactéria.
- 
40. Um escolar de 7 anos apresenta diagnóstico de leucemia linfóide aguda. São prescritas as drogas para indução quimioterápica. Nesta fase, existe o risco de síndrome de lise tumoral. Nesta síndrome encontramos:
- (A) hipocalemia, hiperuricemia e hipofosfatemia.  
 (B) hipercalemia, hipouricemia e hiperfosfatemia.  
 (C) hipercalemia, hiperuricemia e hiperfosfatemia.  
 (D) hipocalemia, hipouricemia e hipofosfatemia.  
 (E) hipercalemia, hiperuricemia e hipofosfatemia.



NÃO ESCREVA NESTA PÁGINA







NÃO ESCREVA NESTA PÁGINA



**QUESTÃO 2**

Faça a prescrição médica visando o tratamento do quadro de pneumonia nas primeiras 24 horas e justifique.


RASCUNHO

**Redação Definitiva**


NOTA



NÃO ESCREVA NESTA PÁGINA



**QUESTÃO 3**

Este é um trecho do protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da Doença de Alzheimer.

*A Doença de Alzheimer (DA) é um transtorno neurodegenerativo progressivo e fatal que se manifesta por deterioração cognitiva e da memória, comprometimento progressivo das atividades de vida diária e uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e de alterações comportamentais. Embora não haja cura para DA, a descoberta de que é caracterizada por déficit colinérgico resultou no desenvolvimento de tratamentos medicamentosos que aliviam os sintomas.*

*O diagnóstico da DA é de exclusão e segue os critérios do National Institute of Neurologic and Communicative Disorders and Stroke and the Alzheimer Disease and Related Disorders Association (NINCDSADRDA).*

*Os Inibidores da acetilcolinesterase representam a principal linha de tratamento da DA. As revisões chegam a conclusões similares em certas doses testadas. Comparados com placebo, os inibidores da colinesterase revelaram efeitos consistentes. Revisões da Cochrane Collaboration de cada um dos inibidores da colinesterase já foram completadas e publicadas. Há vinte e três estudos com donepezila (5.272 pacientes randomizados), nove com rivastigmina (3.449 pacientes randomizados) e nove com galantamina (5.194 pacientes randomizados). O objetivo da maioria destes estudos é avaliar a eficácia e a tolerabilidade do inibidor da colinesterase entre os grupos tratados e placebo ao longo de 3 ou 6 meses. Apenas 46% dos ensaios clínicos randomizados discutiram a significância clínica dos seus resultados, sendo que a maioria das medidas de significância clínica era baseada em opinião.*

*As revisões chegam a conclusões similares: em certas doses testadas, nas mais altas do que nas mais baixas, os inibidores da colinesterase mostram maior eficácia sobre a função cognitiva, atividades de vida diária, comportamento e estado clínico global, comparada a do placebo, bem como mais efeitos adversos, como náusea, anorexia, vômitos, cefaleia e dor abdominal, associados com o inibidor da colinesterase do que com o placebo.*

Com base no texto, retirado dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde, pergunta-se:

a. Qual é o objetivo da elaboração de diretrizes médicas?


**Redação Definitiva**




b. Quais foram os métodos de coleta de evidências para estabelecer a opção terapêutica?


**Redação Definitiva**


c. Se você fosse planejar um estudo para obter um alto grau de recomendação e força de evidência para os medicamentos propostos, como organizaria?


**Redação Definitiva**






NÃO ESCREVA NESTA PÁGINA