

RASCUNHO

O texto que segue foi extraído do romance *O cortiço*, de Aluísio Azevedo.

Leia-o para responder às questões de 1 a 3.

Daí à pedreira restavam apenas uns cinquenta passos e o chão era já todo coberto por farinha de pedra moída que sujava como cal.

Aqui, ali, por toda a parte, encontravam-se trabalhadores, uns ao sol, outros debaixo de pequenas barracas feitas de lona ou de folha de palmeira. De um lado cunhavam pedra cantando; de outro quebravam a picareta; de outro afeiçãoavam¹ lajedos a ponta de picão²; mais adiante faziam paralelepípedos e escopro³ e macete⁴. E todo aquele retintim de ferramentas, e o martelar da forja, e o coro dos que lá em cima brocavam a rocha para lançar-lhe fogo, e a surda zoadada ao longe, que vinha do cortiço, como de uma aldeia alarmada; tudo dava a ideia de uma atividade feroz, de uma luta de vingança e ódio. Aqueles homens gotejantes de suor, bêbados de calor, desvairados de insolação, a quebrarem, a espicaçarem, a torturarem a pedra, pareciam um punhado de demônios revoltados na sua impotência contra o impassível gigante que os contemplava com desprezo, imperturbável a todos os golpes e a todos os tiros que lhe desfechavam no dorso, deixando sem um gemido que lhe abrissem as entranhas de granito. O membrudo cavouqueiro havia chegado à fralda do orgulhoso monstro de pedra; tinha-o cara a cada, mediu de alto a baixo, arrogante, num desafio surdo.

A pedreira mostrava nesse ponto de vista o seu lado mais importante. Descomposta, com o escalavrado flanco exposto ao sol, erguia-se altaneira e desassomburada, afrontando o céu, muito íngreme, lisa, escaldante e cheia de cordas que mesquinamente lhes escorriam pela ciclópica nudez com um efeito de teias de aranha. Em certos lugares, muito alto do chão, lhe haviam espetado alfinetes de ferro, amparando, sobre um precipício, miseráveis tábuas que, vistas cá de baixo, pareciam palitos, mas em cima das quais uns atrevidos pigmeus de forma humana equilibravam-se, desfechando golpes de picareta.

Aluísio Azevedo. *O cortiço*. 25 Ed. São Paulo, Ética, 1992. P.48-9.

¹ afeiçãoar: dar forma a.

² picão: ferramenta de lavrar terra.

³ escopro: instrumento de lavrar pedra, madeira, etc.; cinzel.

⁴ macete: espécie de martelo usado por escultores.

1) **Leia as afirmativas abaixo relação ao texto e assinale a alternativa correta.**

- I. Trata-se de um texto figurativo.
- II. O texto é construído com termos concretos: pedreira, chão, pedra, farinha, trabalhadores, lona, etc.
- III. As ações e qualificações são vistas como simultâneas, não havendo relação de anterioridade e posterioridade entre elas, comuns nos textos descritivos.
- IV. O texto é essencialmente narrativo, pois o foco está na ação.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II e III apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) III e IV, apenas.
- d) I, II, III e IV.
- e) Apenas I.

2) **Nesse texto temos a descrição de uma pedreira e do trabalho que nela executam os operários. Em relação a essa descrição, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.**

- I. O autor descreve a pedreira metaforicamente e as expressões, em seu conjunto, constroem uma prosopopeia.
porque
 - II. Os termos com que o autor descreve a pedreira são tipicamente humanos: *gigante, contemplava com desprezo, imperturbável, dorso, monstro, deixando sem um gemido que lhe abrissem as entranhas, afrontando o céu.*
- a) A afirmativa I é verdadeira e a II é falsa.
 - b) A afirmativa I é falsa e a II é verdadeira
 - c) Ambas as afirmativas são verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa da primeira
 - d) Ambas as afirmativas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa da primeira.
 - e) Ambas as afirmativas são falsas.

3) **Na visão do autor:**

- I. Há uma oposição entre o homem e a natureza, em que o primeiro se acha em situação de inferioridade em relação à segunda.
- II. O trabalho é visto como *atividade feroz*, como uma luta de vingança e de ódio.
- III. A natureza é impotente diante do homem.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I. e II, apenas
- b) I apenas
- c) II apenas
- d) II e III apenas
- e) I, II e III.

4) Considere as orações abaixo.

- I. Tratam-se de problemas complexos.
- II. Vigiaram-se as mensagens.
- III. Procura-se os suspeitos do crimes.

A concordância está correta somente em

- a) I
- b) II
- c) III
- d) I e II
- e) I e III

5) Considere o período e as afirmativas abaixo.

É preferível ter câmeras de vigilância do que ficarmos sujeitos à assaltos.

- I. Há um problema de regência nominal.
- II. O uso do acento indicativo da crase está incorreto.
- III. Há um problema de concordância nominal

Está correto o que se afirma somente em

- a) I
- b) II
- c) III
- d) II e III
- e) I e II

6) Considere o período e as afirmativas.

De acordo com a polícia o rapaz que foi preso foi identificado pelas câmeras de segurança do banco.

- I. Deveria haver uma vírgula depois da palavra “preso”.
- II. Deveria haver uma vírgula depois da palavra “polícia”.
- III. Deveria haver uma vírgula depois da palavra “identificado”.

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) somente III
- d) somente I e II
- e) nenhuma

7) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.

Ele não foi _____ escola _____ ainda está doente?

- a) à – porque
- b) à - por que
- c) a – porque
- d) a – por que
- e) à – por quê

8) Considere os períodos abaixo.

- I. Deve existir, na empresa, poucos funcionários capacitados para esta função.
- II. Faz alguns anos que não o vejo.
- III. Houveram muitos tumultos em junho.

A concordância está correta em

- a) somente I
- b) somente II
- c) somente III
- d) somente I e II
- e) somente I e III

9) Assinale a alternativa que está de acordo com a norma culta.

- a) Ele trabalha na empresa a cinco anos.
- b) Daqui à 2 anos, terminarei o curso.
- c) O escritório fica a cinco minutos da minha casa.
- d) O congresso é de 14 à 20 de setembro.
- e) Os resultados serão divulgados à partir da semana que vem.

10) Considere o período e as afirmações abaixo.

A maioria das empresas que agem de forma sustentável ganha a confiança do consumidor.

- I. A pontuação está incorreta, pois deveria haver uma vírgula antes de “ganha”.
- II. Há um problema de concordância verbal, o correto seria “ganham”.
- III. Para que o período seguisse a norma culta, o verbo “agir” deveria estar no singular, concordando com “maioria”

Está correto o que se afirma em

- a) somente I
- b) somente II
- c) somente III
- d) somente I e II
- e) nenhuma

- 11) Ana tinha certa quantia e gastou $\frac{1}{4}$ com produtos de beleza, $\frac{2}{3}$ com roupas e $\frac{1}{3}$ do restante com alimentação e ainda
- Ihe sobraram R\$ 12,00. A quantia que Ana tinha inicialmente é um valor:**
- maior que R\$ 220,00.
 - menor que R\$ 210,00.
 - exatamente igual a R\$ 212,00.
 - Entre R\$ 200,00 e R\$ 215,00.
 - Entre R\$ 215,00 e R\$ 220,00.
- 12) Dos 320 alunos de uma academia de ginástica, sabe-se que 170 praticam aeróbica, 148 praticam natação, 172 praticam boxe, 80 praticam aeróbica e boxe, 75 praticam natação e boxe, 62 praticam aeróbica e natação e 23 praticam os três. **Nessas condições podemos afirmar que:**
- 40 alunos praticam somente natação.
 - 74 alunos praticam natação ou aeróbica.
 - 91 alunos praticam aeróbica ou boxe.
 - O total de alunos que não fazem aeróbica, boxe e natação é igual a 34.
 - 51 alunos praticam somente boxe.
- 13) Os números 4,5,7,7,10,9,13,11,... estão descritos numa sequencia lógica. Desse modo, a soma entre o 20º e o 21º termos da sequencia é igual a:
- 57
 - 54
 - 55
 - 59
 - 52
- 14) **Do ponto de vista da lógica matemática a negação da frase: Marcos foi ao cinema ou Maria foi fazer compras é a frase:**
- Marcos não foi ao cinema ou Maria não foi fazer compras.
 - Marcos foi ao cinema e Maria foi fazer compras.
 - Marcos não foi ao cinema, então Maria não foi fazer compras.
 - Marcos não foi ao cinema e Maria não foi fazer compras.
 - Marcos não foi ao cinema e Maria foi fazer compras.
- 15) **Sejam as proposições P: 10% de 40% é o mesmo que 4% e Q: a metade de um terço de x é menor que $\frac{1}{7}$ de x. Pode-se afirmar que:**
- A conjunção entre as duas é verdadeira.
 - P condicional Q é falso.
 - P bicondicional Q é verdadeiro.
 - A disjunção entre as duas é falsa.
 - A negação de q é falsa.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

- 16) **Entre as competências da EBSEERH não se inclui:**
- Prestar às instituições federais de ensino superior e a outras instituições congêneres serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, mediante as condições que forem fixadas em seu estatuto social.
 - Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa de instituições federais de ensino superior e de outras instituições congêneres, cuja vinculação com o campo da saúde pública ou com outros aspectos da sua atividade torne necessária essa cooperação, em especial na implementação das residências médica, multiprofissional e em área profissional da saúde, nas especialidades e regiões estratégicas para o SUS.
 - Prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e a outras instituições congêneres.
 - Prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários e federais e a outras instituições congêneres, com implementação de sistema de gestão único com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de metas.
 - Propor as diretrizes da Política Nacional de Residência Médica.
- 17) **Sobre a EBSEERH e a lei que a criou, assinale a alternativa incorreta:**
- A EBSEERH e suas subsidiárias estarão sujeitas à fiscalização dos órgãos de controle interno do Poder Executivo e ao controle externo exercido pelo Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União.
 - A EBSEERH não é autorizada a patrocinar entidade fechada de previdência privada, nos termos da legislação vigente.
 - Os Estados poderão autorizar a criação de empresas públicas de serviços hospitalares.
 - O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
 - É dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.

18) O prazo de duração da EBSERH é:

- a) Indeterminado
- b) De dois anos
- c) De quatro anos
- d) De 10 anos
- e) De 8 anos

19) Compete ao Conselho de Administração da EBSERH, exceto:

- a) Aprovar o regimento interno da EBSERH
- b) Deliberar, mediante proposta da Diretoria Executiva, sobre a contratação de empréstimos no interesse da EBSERH;
- c) Opinar e submeter à aprovação do Ministério de Estado da Educação sobre a proposta de criação de escolas médicas.
- d) Aprovar o orçamento e programa de investimentos e acompanhar a sua execução
- e) Opinar e submeter à aprovação do Ministro de Estado da Fazenda, por intermédio do Ministro de Estado da Educação sobre a proposta de criação de subsidiárias.

20) Sobre o Conselho Consultivo da EBSERH, assinale a alternativa incorreta:

- a) Seu presidente será um entre os membros indicados pelo Ministro de Estado da Educação.
- b) Um dos representantes dos usuários dos hospitais universitários federais faz parte deste conselho.
- c) Um dos representantes dos residentes em saúde dos hospitais universitários federais faz parte deste conselho.
- d) Deve-se reunir ordinariamente pelo menos uma vez ao ano.
- e) Uma de suas funções é acompanhar e avaliar periodicamente o desempenho da EBSERH.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Considerando a informação em saúde e os sistemas de informação em saúde, assinale a alternativa incorreta:

- a) Dado é qualquer elemento qualitativo ou quantitativo, desvinculado de referencial explicativo.
- b) Informação é o produto da análise de um ou mais dados.
- c) A notificação é uma fonte de dado de morbidade de baixo custo, ativa e de elevada cobertura.
- d) A informação em saúde não se refere somente à produzida pelo setor de saúde.
- e) O SIA-SUS é o sistema de informações ambulatoriais do Sistema Único de Saúde.

22) Um município de pequeno porte decidiu que durante a campanha anual de vacinação contra a gripe, estaria disponível aos pacientes a dosagem de glicemia e aferição de pressão arterial. A medida foi duramente criticada pelos vereadores de oposição que a caracterizaram como desperdício de recursos e desvio do objetivo da vacinação. Em sua opinião:

- a) A medida está incorreta pois compromete o princípio da universalidade do SUS, porque torna a vacinação demorada e com risco de menor cobertura.
- b) A medida está em acordo com o princípio da integralidade do SUS.
- c) A medida fere o princípio da autonomia do usuário do SUS.
- d) A medida está em desacordo com o princípio da utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades.
- e) A medida está em desacordo com o princípio da capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.

23) Considerando os determinantes sociais de saúde e a ocorrência de hipertensão arterial, assinale a alternativa incorreta:

- a) Não parece haver relação entre renda familiar e prevalência de hipertensão arterial.
- b) Há associação entre estilo de vida sedentário e maior prevalência de hipertensão arterial.
- c) Há associação entre atividade profissional e prevalência de hipertensão.
- d) Há associação entre consumo excessivo de álcool e maior prevalência de hipertensão.
- e) Pessoas que vivem em comunidades não industriais, não aculturadas e com baixa ingestão de sal têm menor pressão arterial média, que tende a aumentar um pouco com a idade. A pressão arterial aumenta nessas pessoas quando adotam estilos de vida modernos.

24) Sobre o controle social no SUS, assinale a alternativa incorreta:

- a) O SUS foi a primeira política pública no Brasil a adotar constitucionalmente a participação popular como um de seus princípios.
- b) A participação da comunidade na gestão do SUS foi definida pela lei nº 8142/1990.
- c) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- d) A representação dos usuários nas Conferências de Saúde é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos
- e) A representação dos usuários no Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

25) O Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011 regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Considerando esse decreto, assinale a alternativa incorreta:

- a) Poderão ser instituídas Regiões de Saúde interestaduais, compostas por municípios limítrofes, por ato conjunto dos respectivos Estados em articulação com os municípios.
- b) O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico, observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção especial, conforme legislação vigente.
- c) A população indígena contará com os mesmos regramentos de acesso, que o conjunto da população conforme a necessidade de assistência integral à sua saúde, de acordo com disposições do Ministério da Saúde.
- d) O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços nos entes federativos e nas Regiões de Saúde.
- e) Ao usuário será assegurada a continuidade do cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região.

- 26) A saturação arterial de oxigênio esperada de um recém-nascido em boas condições de vitalidade entre 5 e 10 minutos de vida, conforme recomendação do Curso do Reanimação Neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria é:
- 70 a 80%.
 - 75 a 85%.
 - 80 a 90%.
 - 85 a 95%.
 - Maior do que 90%.
- 27) O Ministério da Saúde recomenda que devem permanecer em Alojamento Conjunto os recém-nascidos que apresentem os critérios mínimos de:
- Boa vitalidade, peso de nascimento > 2500g, controle térmico.
 - Boa sucção, peso de nascimento > 1800g, idade gestacional > 33 semanas.
 - Controle térmico, Apgar de quinto minuto > 5, peso de nascimento > 1800g.
 - Boa sucção, peso de nascimento > 2000g, idade gestacional > 34 semanas.
 - Controle térmico, peso de nascimento > 2000g, idade gestacional > 35 semanas.
- 28) Recém-nascido prematuro, idade gestacional estimada de 31 semanas e peso de 1500g, após os passos iniciais da reanimação encontra-se em apneia. Seu serviço dispõe de blender (misturador) em sala de parto. Sua conduta deve ser iniciar ventilação com pressão positiva com balão e máscara com concentração de oxigênio de:
- 21%.
 - 40%.
 - 60%.
 - 80%.
 - 100%.
- 29) Recém-nascido de 38 semanas, com peso ao nascer de 2200g, filho de mãe cardiopata em uso de pindolol, com 12 horas de vida apresenta tremores, hiperreflexia e um episódio convulsivo. A hipótese mais provável para esse quadro é:
- Hipoglicemia.
 - Meningite.
 - Hipocalcemia.
 - Hemorragia peri – intraventricular.
 - Síndrome de abstinência.
- 30) Recém-nascido de cesárea eletiva, idade gestacional de 35 semanas, peso ao nascer de 2500g, Apgar de 7 e 8, evolui com desconforto respiratório progressivo nas primeiras horas de vida. Foi colocado em CPAP nasal com 6 cm de água e FiO₂ de 0,47. Nessa condição a gasometria mostrou 7,27, PO₂ 65, PCO₂ 43, Bic 18, BE - 7. A hipótese mais provável é:
- Taquipnéia transitória do recém-nascido.
 - Pneumonia congênita.
 - Hipertensão pulmonar.
 - Cardiopatía congênita.
 - Síndrome do desconforto respiratório.
- 31) Você indicou fototerapia de alta irradiância para um recém-nascido com doença hemolítica Rh e hiperbilirrubinemia grave. Nesse caso a irradiância espectral do equipamento deve ser superior a (mW/cm² /nm):
- 10.
 - 15.
 - 20.
 - 25.
 - 30.
- 32) Gestante de 34 semanas, com quadro de febre, taquicardia (materna e fetal) e leucócitos de 25.000 /mm³ ao hemograma. Recebeu uma dose de penicilina cristalina e foi submetida a cesariana. Criança nasceu pesando 2400g, Apgar de 4 e 7, assintomático para infecção. Sua conduta frente a esse recém-nascido deverá ser conforme guideline do Center for Disease control (CDC):
- Colher hemograma, hemocultura e iniciar antibióticos.
 - Colher hemograma, hemocultura e aguardar resultados para iniciar antibióticos.
 - Colher Hemograma, hemocultura, LCR, RX tórax e iniciar antibióticos.
 - Não colher exames, não iniciar antibióticos inicialmente. Avaliar clinicamente por no mínimo 48h.
 - Colher hemograma e PCR entre 24 e 48 horas de vida e iniciar antibióticos dependendo dos resultados.
- 33) Neonato de termo, pesando 4.300g, nascido de parto vaginal com Apgar de 3-5-7, evoluiu com taquipneia e necessidade de oxigênio. Ao exame físico observou-se ainda flacidez de membro superior direito e incapacidade de movimentar esse membro. O movimento da mão era preservado. A hipótese diagnóstica mais provável é:
- Fratura de clavícula.
 - Paralisia braquial obstétrica do tipo Erb Duchene.
 - Paralisia de Klumpke.
 - Síndrome de Horner.
 - Paralisia braquial completa.

- 34) Neonato a termo, do sexo masculino, nascido de parto vaginal sem intercorrências e mãe sem patologias, com 24 horas de vida apresentou lesões vesico-pustulosas superficiais que evoluíram para máculas hiperpigmentadas na porção inferior da face, mento e região cervical. O esfregaço das lesões mostrou numerosos neutrófilos sem eosinófilos. Não havia outras alterações ao exame físico e o estado geral era bom. A hipótese mais provável é:
- Impetigo.
 - Eritema tóxico.
 - Melanose pustular transitória.
 - Infecção por herpes vírus.
 - Miliária cristalina.
- 35) São consideradas estratégias neuroprotetoras contra formas graves de hemorragia peri-intraventricular em prematuros extremos:
- Uso de fenobarbital profilático.
 - Uso profilático de surfactante exógeno.
 - Hipotermia.
 - Corticoide antenatal.
 - Bloqueadores de canais de cálcio.
- 36) Recém-nascido a termo, de parto vaginal, em boas condições de vitalidade, pesando 3.500g, evoluiu sem intercorrências nas primeiras 24 horas de vida. Com 36 horas apresentou cianose intensa sem resposta a oxigenoterapia e sem outros achados semiológicos. Rx de tórax com área cardíaca normal e trama vascular diminuída; hemograma normal, PCR negativa. A hipótese diagnóstica mais provável é:
- Pneumonia congênita.
 - Atresia aórtica.
 - Drenagem anômala de veias pulmonares.
 - Atresia tricúspide.
 - Pneumotórax.
- 37) O tripsinogênio imunorreativo (IRT) dosado no teste do pezinho entre o 3º e o 7º dia de vida é considerado normal se o resultado for (ng/dl):
- < 250.
 - < 70.
 - < 100.
 - < 150.
 - < 200.
- 38) Recém-nascido a termo, pesando 2.500g, parto normal, Apgar 7 e 8, filho de mãe tabagista sem patologias, foi mantido em alojamento conjunto e aleitamento materno exclusivo. Apresentou dificuldade para mamar nas primeiras horas de vida recebendo complementação das mamadas com fórmula. Com 48 horas de vida apresentou vômitos, hipotonia, icterícia com aumento de bilirrubina conjugada, hepatoesplenomegalia, e evoluiu rapidamente para encefalopatia. Hemograma normal com proteína C reativa de 1mg/dl; hemocultura negativa; análise do líquido normal; sorologias para toxoplasmose, citomegalovírus, hepatite, sífilis, HIV não reagentes; tomografia de crânio normal. Glicemia de 50mg/dl. A hipótese diagnóstica mais provável é :
- Nesidioblastose.
 - Galactosemia.
 - Alergia a proteína do leite de vaca.
 - Sepse.
 - Leucinose.
- 39) Gestante com VDRL positivo no pré-natal, recebeu 3 doses de penicilina sendo a última uma semana antes do parto. A criança nasceu prematura de 35 semanas, pesando 1.800g em boas condições, sem alterações ao exame físico. A conduta frente a essa situação deve ser:
- Mãe tratada. Não investigar e nem tratar recém-nascido.
 - Colher VDRL do RN e se negativo considerar infecção pouco provável. Não tratar o recém-nascido.
 - Colher VDRL do RN, fazer Rx de ossos longos, punção lombar e hemograma. Tratar com penicilina cristalina se VDRL positivo no líquido e penicilina procaína ou cristalina se líquido normal.
 - Colher VDRL do RN, fazer punção lombar, Rx de ossos longos e fundo de olho. Tratar com penicilina procaína se exames alterados.
 - Colher VDRL do RN. Se negativo fazer uma dose de penicilina benzatina e acompanhar.
- 40) O esquema vacinal do prematuro, conforme o calendário nacional de imunizações do Ministério da Saúde preconiza que:
- A vacina contra hepatite deve ser administrada em 3 doses em todos os prematuros (ao nascer, com 1 e 6 meses).
 - Prematuros extremos hospitalizados devem receber vacina contra pólio tipo Sabin.
 - A vacinação do prematuro deve seguir a idade corrigida.
 - As doses das vacinas devem ser adequadas para o peso.
 - A vacina contra rotavírus é contraindicada em recém-nascidos com enterocolite necrosante ou malformações intestinais.

41) São critérios de inclusão na vigilância epidemiológica de infecções em recém-nascidos de alto risco:

- a) Peso de nascimento < 1500g.
- b) Uso de ventilação mecânica sob intubação ou traqueostomia.
- c) Uso de cateter vascular central.
- d) Cirurgias.
- e) Todas as anteriores.

42) Recém-nascido prematuro tardio é internado na Unidade Neonatal com diagnóstico de pneumonia por vírus sincicial respiratório. O isolamento desse paciente deve ser do tipo:

- a) Aerossol.
- b) Gotículas.
- c) Contato.
- d) Padrão.
- e) Não necessita de isolamento.

43) Na desnutrição intrauterina é correto afirmar que:

- a) Os recém-nascidos com restrição de crescimento são também pequenos para idade gestacional.
- b) Pré-eclâmpsia, desnutrição e tabagismo são causas de restrição de crescimento simétrico.
- c) A perda de peso pós-nascimento é alta e a recuperação do peso de nascimento ocorre por volta do primeiro mês de vida.
- d) Recém-nascidos com restrição de crescimento podem desenvolver a longo prazo a síndrome metabólica conforme a teoria da Reprogramação.
- e) O peso ao nascer é considerado o principal parâmetro no diagnóstico da restrição de crescimento.

44) Prematuro de 30 semanas de idade gestacional, peso ao nascer de 1.250g, apresentou síndrome do desconforto respiratório e recebeu surfactante no primeiro dia de vida. Com 24 horas foi observado sopro sistólico e taquicardia. Realizado ecocardiograma que mostrou persistência de canal arterial pequeno e sem repercussão hemodinâmica. A melhor conduta frente a esse caso é:

- a) Restrição hídrica e diuréticos.
- b) Digoxina.
- c) Inibidores da ciclo-oxigenase (ibuprofeno ou indometacina).
- d) Conduta expectante. Monitorizar clínica e ecocardiograficamente.
- e) Dobutamina.

45) Com relação a mortalidade infantil é correto afirmar que:

- I. A mortalidade neonatal representa 60 a 70% da mortalidade infantil.
- II. Asfixia perinatal é importante causa de óbito evitável em recém-nascidos a termo e com peso adequado.
- III. Diarreia e desnutrição ainda são causas importantes de óbitos evitáveis no período pós neonatal.
- IV. A maior parte dos óbitos infantis ocorrem na primeira semana de vida.

Estão corretas as afirmativas:

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas III e IV
- c) I apenas.
- d) Apenas I, II e III.
- e) I, II, III e IV.

46) Dentre as doenças e condições abaixo assinale a que não é de notificação compulsória no Brasil:

- a) Criança exposta ao risco de transmissão vertical pelo vírus da imunodeficiência humana.
- b) Criança exposta ao risco de transmissão vertical de toxoplasmose.
- c) Sífilis congênita
- d) Síndrome da rubéola congênita
- e) Tétano neonatal

47) Comparados aos RN a termo, os prematuros tardios apresentam maior risco para as seguintes situações:

- a) Anemia, acidose metabólica e hipoglicemia.
- b) Hipoglicemia, icterícia e hipotermia.
- c) Policitemia, traumas obstétricos e distúrbios respiratórios.
- d) Distúrbios respiratórios, desidratação e apneia.
- e) Policitemia, hipercalemia e hipotermia.

48) Adolescente de 16 anos, primigesta, com pré-natal adequado e sem intercorrências. Deu à luz a uma menina de 38 semanas e peso de 3.400 g. No quarto dia de vida a RN apresentou icterícia zona IV de Kramer. O peso era de 2.900 g, sem outras alterações ao exame físico. A mãe relata aleitamento materno exclusivo, fissuras no mamilo e dor ao amamentar. Tipagem sanguínea da mãe = A(+) e Tipagem sanguínea da RN = O(-). Com base nesses dados a provável fisiopatologia dessa icterícia é:

- a) Aumento da produção de bilirrubina por hemólise.
- b) Diminuição da conjugação hepática da bilirrubina por ação do leite materno.
- c) Deficiência primária na captação hepática.
- d) Aumento da circulação entero-hepática da bilirrubina.
- e) Hemólise induzida por ação hormonal do leite materno.

- 49) Em uma localidade houve 838 nascidos vivos e seis óbitos fetais em um determinado ano; 22 crianças morreram antes de completar um ano de idade, sendo 2 entre 0 e 6 dias de vida, 6 entre 7 e 27 dias de vida e 14 após o 28º dia de vida. Analise os indicadores abaixo e assinale a alternativa correta:
- a) O coeficiente de mortalidade infantil foi de 33,1
 - b) O coeficiente de mortalidade neonatal precoce foi de 9,5
 - c) O coeficiente de mortalidade neonatal foi de 9,5
 - d) O coeficiente de mortalidade perinatal foi de 9,5
 - e) O coeficiente de mortalidade neonatal foi de 26,2
- 50) Com 48 horas de vida, antes da alta hospitalar, você realiza a oximetria de pulso (teste do coraçãozinho) em um recém-nascido a termo, adequado para idade gestacional, que está em aleitamento materno exclusivo no alojamento conjunto. A SpO2 do membro superior direito é de 93% e do membro inferior direito é de 89%. Sua conduta frente a esse achado é:
- a) Alta hospitalar com retorno na Unidade Básica.
 - b) Realizar ecocardiograma. Não dar alta hospitalar até esclarecimento diagnóstico.
 - c) Observar internado e refazer a oximetria em 24h.
 - d) Realizar outra oximetria em 1 hora. Se a saturação nos membros for maior ou igual a 95% e a diferença < 3% entre as medidas, dar alta hospitalar e seguimento de rotina.
 - e) Realizar palpação dos pulsos, e aferir pressão arterial dos membros. Se houver diferença na palpação dos pulsos ou na medida de pressão arterial, solicitar ECG, Rx de tórax e ecocardiograma.