

**Concurso Público para provimento de cargos de
Médico - Nível III (Grau A) - Residência Médica
Oftalmologia**

Nome do Candidato

Caderno de Prova '25', Tipo 001

Nº de Inscrição

MODELO

Nº do Caderno

MODELO1

Nº do Documento

0000000000000000

ASSINATURA DO CANDIDATO

00001-0001-0001

P R O V A**Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos
Dissertativa****INSTRUÇÕES**

- Verifique se este caderno:
 - corresponde a sua opção de cargo.
 - contém 40 questões, numeradas de 1 a 40.
 - contém a proposta e espaços para rascunho e transcrição definitiva das três questões dissertativas.Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE

- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: (A) ● (C) (D) (E)
- Ler o que se pede na Prova Dissertativa e utilizar, se necessário, o espaço para rascunho.

ATENÇÃO

- Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de material transparente de tinta preta.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Em hipótese alguma os rascunhos das questões da Prova Dissertativa serão corrigidos.
- A duração da prova é de 5 horas para responder a todas as questões objetivas, preencher a Folha de Respostas e responder a Prova Dissertativa (rascunho e transcrição).
- Ao término da prova, chame o fiscal da sala e devolva todo o material recebido.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.

**CONHECIMENTOS GERAIS**

1. Em relação às instituições públicas, é correto afirmar:
 - (A) Uma organização é considerada moderna se é capaz de usar o conhecimento para desenvolver e oferecer novos produtos e serviços, dentro de espírito inovador e criativo.
 - (B) Um ambiente de trabalho moderno é bastante rígido, proporciona disciplina, impermeabiliza procedimentos já existentes dentro da organização e evita inovações que desestabilizem a rotina.
 - (C) O fornecimento de informações aos cidadãos é essencialmente seletivo, para que eles não influenciem significativamente as decisões políticoadministrativas.
 - (D) A política de capacitação de servidores públicos prescinde de ferramentas de informática e uso das tecnologias da informação.
 - (E) O compartilhamento de conhecimento e informação na gestão pública será incluído como prioridade apenas em políticas de gestão do conhecimento futuras.

2. No momento em que o Governo avalia o desempenho de suas organizações e de seus servidores por metas ou objetivos alcançados, ele está avaliando a gestão pública por meio
 - (A) da eficiência.
 - (B) da eficácia.
 - (C) da efetividade.
 - (D) da qualidade.
 - (E) do custo.

3. De uma maneira geral, as competências gerenciais são classificadas em três categorias: conhecimentos, habilidades e atitudes. Essas categorias são necessárias para ocupar um cargo de gerente e dependem do nível hierárquico do cargo, das tarefas a serem desenvolvidas pelo gerente e do tipo de organização, entre outros fatores. A relação correta entre habilidades e nível hierárquico é:
 - (A) Quanto mais alto o nível hierárquico do cargo a ser ocupado, mais habilidades técnicas serão requeridas.
 - (B) Em cargos de gerências táticas e intermediárias são requeridas com maior intensidade as chamadas habilidades e atitudes.
 - (C) Em cargos com características operacionais são requeridas maiores habilidades técnicas como principal condição desse gerenciamento.
 - (D) Quanto mais operacional o cargo a ser ocupado, mais habilidades atitudinais serão requeridas.
 - (E) Quanto mais operacional o cargo a ser ocupado, mais habilidades conceituais serão requeridas.

4. O Brasil é um Estado organizado de forma Federativa. Isto significa que as atribuições inerentes aos poderes executivo, legislativo e judiciário são divididas em duas esferas de atuação: a Federal (União) e a Estadual. Em relação a essas esferas, é INCORRETO afirmar que
 - (A) a cúpula dos três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário formam o núcleo estratégico do Estado.
 - (B) aos Estados e Municípios são atribuídas as ações de caráter local.
 - (C) a Constituição da União e as leis federais determinam o escopo e o alcance das constituições dos Estados Federados.
 - (D) o critério de divisão de poderes entre União e Estados membros é, ao mesmo tempo, funcional e territorial.
 - (E) os Estados têm total autonomia para formulação e aplicação de suas políticas, independentemente do poder central.

5. No Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI) consta que: “são significativos os fatores externos decorrentes do desenvolvimento do capital humano sob a perspectiva do Ciclo de Vida. Ao mesmo tempo em que uma população saudável e bem nutrida influencia positivamente os indicadores educacionais, o investimento em educação tem reflexos positivos sobre os indicadores de saúde”.
Dentre outras, são ações propostas no PMDI:
 - (A) adoção de perspectiva integrada de desenvolvimento do capital humano; salto de qualidade no ensino e ampliação da escolaridade da população jovem mineira, orientada por padrões internacionais (OCDE); superação da pobreza crônica das novas gerações; protagonismo juvenil e capacitação para o trabalho.
 - (B) aumento do número de escolas e hospitais de atendimento público; aumento de ambulatórios setoriais ou regionais; aumento do número de vagas para médicos no atendimento público.
 - (C) adoção de qualidade no ensino e no atendimento público em todos os órgãos destinados à população; superação da pobreza crônica e capacitação para o trabalho.
 - (D) superação da pobreza crônica; elaboração de programas materno-infantil e de adolescentes para diminuir a mortalidade infantil; construções de escola de nível médio e de ensino superior.
 - (E) construções de redes de hospitais de atendimento público; implantação em todo o estado mineiro do Programa de Saúde do Trabalhador; Construção de Escolas Públicas para aumentar o número de vagas disponíveis e capacitação para o trabalho.



6. É VETADO ao Funcionário Público
- (A) facilitar as atividades de fiscalização pelos órgãos de controle.
 - (B) observar os princípios e valores da Ética Pública.
 - (C) divulgar e informar a todos os integrantes de sua classe sobre a existência de Código de Conduta Ética.
 - (D) utilizar-se do cargo, emprego ou função para obter qualquer favorecimento para si ou outrem.
 - (E) apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função.
-
7. Dentre as características das organizações públicas modernas, nas quais o conhecimento é valorizado, encontra-se
- (A) coordenação centralizada de tarefas.
 - (B) predomínio do trabalho individual.
 - (C) transmissão do conhecimento coletivo, de preferência, em forma de documentos impressos.
 - (D) o servidor-polivalente e inovador.
 - (E) diminuição do poder dos usuários dos serviços dessas empresas.
-
8. Segundo seu delineamento, em um estudo de
- (A) *coorte*, a exposição é medida antes do desenvolvimento da doença.
 - (B) caso-controle, a exposição é medida antes do desenvolvimento da doença.
 - (C) prevalência, a exposição é medida antes do desenvolvimento da doença.
 - (D) caso-controle, o risco da doença não é medido diretamente.
 - (E) caso-controle e de prevalência, o risco da doença é medido diretamente.
-
9. O sistema de planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS) pressupõe
- (A) que as peculiaridades, necessidades e realidades de saúde do país sejam homogeneizadas e contempladas dentro de um documento igual para todos os estados.
 - (B) que a esfera federal de gestão realize todo o planejamento e a regionalização das ações fique a cargo dos estados e municípios.
 - (C) que cada esfera de gestão (municipal, estadual e federal) realize o seu planejamento.
 - (D) instrumentos de planejamento de centralização: Plano Diretor, Plano Diretor de Investimento (PDI) e Programação Pactuada e Integrada da Atenção em Saúde (PPI).
 - (E) Plano Federal Bienal de Saúde, instrumento básico que norteia a Programação Bienal das ações e serviços de saúde prestados.
-
10. Sobre os modelos de atenção à saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), é correto afirmar que
- (A) se fundamentam em regionalização, integralização e terceirização dos serviços.
 - (B) cada doença tem um nível de atenção à saúde (primária, média complexidade e alta complexidade) predeterminado.
 - (C) se fundamentam em regionalização e integração dos serviços interfederativos.
 - (D) foram implantados com vistas ao atendimento das Doenças de Notificação Compulsória (DNC).
 - (E) os serviços de atenção primária são as únicas portas de entrada no sistema SUS.



-
11. O projeto de vigilância em saúde (Vigisus) é
- (A) voltado à redução de mortalidade por doenças transmissíveis e não abrange a exposição a fatores de risco associados com a saúde.
 - (B) composto de duas fases: Vigisus I (1999 a 2004) para Estruturação do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e Vigisus II (2005-2013) para Modernização do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde.
 - (C) destinado à redução da mortalidade e da morbidade de doenças transmissíveis, mas não abrange as doenças não transmissíveis.
 - (D) executado pela Secretaria de Vigilância em Saúde e Fundação Nacional de Saúde, sendo financiado pelo Banco Interamericano para Reconstrução e Desenvolvimento.
 - (E) direcionado para serviços de saneamento em grandes aglomerados urbanos e, por isso, não inclui a saúde de povos indígenas e quilombolas.
-
12. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições,
- (A) o controle e a fiscalização do serviço de internação e atendimento ambulatorial, não abrangendo a execução da política de sangue e seus derivados.
 - (B) a fiscalização e inspeção de alimentos quanto à qualidade sanitária, sem abranger a vigilância nutricional e a orientação alimentar.
 - (C) a participação na formulação da política de saúde pública, não incluindo a execução de ações de saneamento básico.
 - (D) a participação no controle e formulação da política de medicamentos, excetuando a participação na produção de insumos de interesse para a saúde.
 - (E) a participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substância e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
-
13. O controle social no Sistema Único de Saúde
- (A) diminuiu após a Norma Operacional Básica (NOB 1/96), desde que esta redefiniu vínculos de serviços com seus usuários.
 - (B) está contemplado em um dos blocos de financiamento para a gestão do Sistema Único de Saúde.
 - (C) está previsto somente para serviços públicos de assistência à saúde.
 - (D) pressupõe ações dos usuários sobre serviços, exclusivamente, da iniciativa privada.
 - (E) requer financiamento do próprio usuário.
-
14. A educação em saúde, segundo o Sistema Único de Saúde (SUS),
- (A) é o objetivo de um Programa destinado a capacitar trabalhadores da saúde para a utilização adequada de equipamentos usados em serviços de saúde.
 - (B) está prevista em legislação, mas ainda não existe uma secretaria de gestão relacionada a essa área.
 - (C) restringe-se a um compromisso de buscar alternativas para os problemas relacionados a não valorização dos trabalhadores da saúde.
 - (D) refere-se à qualificação de trabalhadores da saúde e, ainda, à promoção de hábitos saudáveis aos usuários do SUS.
 - (E) prevê atividades exclusivas dos trabalhadores da saúde para atendimento da população.
-
15. Quanto ao financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS),
- (A) os recursos de custeio da esfera federal destinados à assistência podem corresponder ao Piso Assistencial Básico (PAB) destinado ao custeio de procedimentos e ações de assistência básica, de responsabilidade tipicamente municipal.
 - (B) na esfera estadual, conta com recursos transferidos pela União e essas transferências regulares não estão condicionadas à contrapartida deste nível de governo.
 - (C) na esfera municipal, além dos recursos oriundos do respectivo Tesouro, existem transferências eventuais da União para municípios, as quais não estão condicionadas à contrapartida deste nível de governo.
 - (D) os fundos de saúde dos municípios não podem receber verba oriunda de reembolso de despesas realizadas em função de atendimentos prestados por unidades públicas a beneficiários de planos privados de saúde.
 - (E) os recursos de custeio da esfera federal, destinados às ações e serviços de saúde, configuram o Teto Financeiro Global (TFG) e o teto financeiro do estado; não deve conter os tetos de municípios.
-



16. Na legislação do Sistema Único de Saúde,
- (A) “Programação Pactuada e Integrada (PPI)” restringe-se às atividades de assistência ambulatorial e hospitalar, constituindo um instrumento essencial de reorganização do modelo de atenção e da gestão do SUS, de alocação dos recursos e de explicitação do pacto estabelecido entre as três esferas de governo.
 - (B) “Teto Financeiro da Assistência do Município (TFAM)” é um montante que corresponde ao financiamento do conjunto de ações assistenciais em situações de emergência, assumidas pela Secretaria Municipal de Saúde, transferido eventualmente do Fundo Nacional ao Fundo Municipal de Saúde.
 - (C) “Índice de Valorização de Resultados (IVR)” consiste na atribuição de valores adicionais ao teto financeiro da assistência do estado, transferidos eventualmente do Fundo Nacional ao Fundo Estadual de Saúde, quando houver obtenção de resultados de impacto positivo sobre as condições de saúde da população.
 - (D) “Remuneração por Serviços Produzidos” restringe-se ao pagamento direto aos prestadores privados contratados e conveniados, contra apresentação de faturas, referentes a serviços realizados conforme programação e mediante prévia autorização do gestor.
 - (E) “Fração Assistencial Especializada (FAE)” é um montante que corresponde a procedimentos ambulatoriais de média complexidade, medicamentos e insumos excepcionais, órteses e próteses ambulatoriais e Tratamento Fora do Domicílio (TFD), sob gestão do Estado.
-
17. O Plano Diretor de Regionalização (PDR) do Sistema Único de Saúde (SUS) prevê:
- (A) Municípios em Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada (GPAB-A), com capacidade de ofertar com suficiência a totalidade de serviços de média complexidade, incluindo atividades ambulatoriais de apoio diagnóstico e terapêutico e de internação hospitalar para sua própria população.
 - (B) Nos municípios habilitados em Gestão Plena da Atenção Básica-Ampliada (GPAB-A) que tenham serviços de alta complexidade em seu território, nos quais as funções de gestão e relacionamento com prestadores de alta complexidade são de responsabilidade do gestor municipal, podendo este delegar aos gestores de hospitais as funções de controle e avaliação dos prestadores.
 - (C) Ao governo federal cabe prever a parcela dos recursos a serem gastos em cada município, para cada área de alta complexidade, destacando a parcela a ser utilizada com a população do próprio município e a parcela a ser gasta com a população de referência, sempre de acordo com a Programação Pactuada e Integrada.
 - (D) A assistência de alta complexidade deve ser programada no âmbito federal, e em alguns casos macrorregionais, tendo em vista as características especiais desse grupo: alta densidade tecnológica e alto custo, economia de escala, escassez de profissionais especializados e concentração de oferta em poucos municípios.
 - (E) A programação da assistência de alta complexidade, consolidada pela Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde, não deve conter a referência de pacientes para outros Estados, ou mesmo, reconhecer o fluxo programado de pacientes de outros Estados.
-
18. As ações de auditoria dentro do Sistema Único de Saúde (SUS) são
- (A) atividades que necessitam de um órgão que consolide as informações necessárias, analise os resultados obtidos em decorrência de suas ações, mas não proponha medidas corretivas.
 - (B) de responsabilidade das três esferas gestoras do SUS, o que exige a estruturação do respectivo órgão de controle, avaliação e auditoria, incluindo a definição dos recursos e da metodologia adequada de trabalho.
 - (C) ações de controle que podem, ou não, auditar procedimentos prévios à realização de serviços e à ordenação dos respectivos pagamentos.
 - (D) ações de controle que excluem autorização de internações e procedimentos ambulatoriais, desde que sejam critérios médicos.
 - (E) monitoramentos da qualidade dos serviços prestados, sem priorizar a regularidade e fidedignidade de registros de produção e faturamento de serviços.
-
19. Segundo Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde (SUS-NOAS 01), houve fortalecimento do controle, regulação e avaliação da assistência aos usuários devido
- (A) à criação de procedimentos técnico-administrativos prévios à prestação de serviços hospitalares, os quais não podem ser fiscalizados pelos usuários.
 - (B) à previsão de compra de serviços da rede privada, pautada apenas na sua indisponibilidade na rede pública.
 - (C) à possibilidade de compra de serviços da rede privada com base no interesse público e necessidades assistenciais.
 - (D) à implementação de indicadores objetivos baseados em critérios técnicos que não podem ser avaliados pelos usuários.
 - (E) ao fato do gestor federal elaborar todos os planos de controle, regulação e avaliação para fortalecimento da capacidade de gestão.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

<p>20. Com relação ao glaucoma e suas classificações, pode-se afirmar que</p> <p>(A) defeito de transiluminação na região do esfíncter iriano é encontrado no glaucoma pseudoesfoliativo.</p> <p>(B) idoso, negro e hipermetrópe são fatores de risco para Glaucoma Primário de Ângulo Aberto.</p> <p>(C) com a idade, os sinais e sintomas no glaucoma pigmentar aumentam em todos os indivíduos.</p> <p>(D) a neovascularização da íris não regride espontaneamente no glaucoma neovascular.</p> <p>(E) fuso de Krukemberg é encontrado no glaucoma pseudoesfoliativo.</p>	<p>24. Atualmente, diversos são os aparelhos de facoemulsificação existentes. Nos que utilizam bomba de Venturi NÃO se consegue configurar:</p> <p>(A) irrigação.</p> <p>(B) vácuo.</p> <p>(C) aspiração (<i>flow rate</i>).</p> <p>(D) poder do ultrassom.</p> <p>(E) pulso do ultrassom.</p>
<p>21. Com relação as ceratites, pode-se afirmar que</p> <p>(A) trofozoítas de <i>Acanthamoeba</i> libera enzimas responsáveis pela destruição da córnea.</p> <p>(B) na ceratite <i>punctata</i> superficial de Thygeson, as lesões são discretamente erodadas.</p> <p>(C) na ceratite rosácea não são encontradas perfurações corneanas.</p> <p>(D) no tratamento inicial da ceratite por <i>Acanthamoeba</i> utiliza-se Brolene e esteroides tópicos.</p> <p>(E) o maior risco de perfuração corneana fúngica se dá pela presença das leveduras.</p>	<p>25. Paciente, feminina, de 26 anos chega ao pronto-socorro com queixa de baixa visual. Ao exame encontra-se PKs granulomatosos, reação de câmara anterior de 3+, opacidades em vítreo anterior e lesão focal de retinocoroidite exudativa. A hipótese diagnóstica mais provável é</p> <p>(A) manifestação ocular de Behcet.</p> <p>(B) sarcoidose.</p> <p>(C) vogt-Koyahraghi-Harada.</p> <p>(D) uveíte por toxoplasmose.</p> <p>(E) coroidite Serpiginosa.</p>
<p>22. Paciente chega ao consultório referindo-se a estrabismo. Ao exame de motilidade ocular observa-se dificuldade de elevação em adução à direita. Está correto afirmar que</p> <p>(A) o teste de Krimsky é útil para o diagnóstico.</p> <p>(B) há hiperfunção do oblíquo superior esquerdo no olhar para a direita.</p> <p>(C) se trata de um caso de Síndrome de Duane.</p> <p>(D) há estreitamento da fenda palpebral na adução.</p> <p>(E) se trata de um caso de Síndrome de Brown.</p>	<p>26. Paciente chega ao consultório oftalmológico com desejo de usar lentes de contato. Sobre as lentes, pode-se afirmar que</p> <p>(A) astigmatismo de 0,25 em geral deve ser corrigido com lente de contato gelatinosa tórica.</p> <p>(B) as lentes de contato rígidas gás-permeáveis possui como vantagem, a rápida adaptação.</p> <p>(C) uma lente de contato com raio de curvatura 9,0 mm é mais plana que uma de 8,6 mm.</p> <p>(D) ao usar lente de contato de teste de -1,0, em paciente míope com sobre-refração de -6,0 o grau final da lente será -7,0 DE.</p> <p>(E) o "L" do DK/L refere-se ao tipo de material da lente de contato.</p>
<p>23. Paciente com ceratocone em grau avançado necessita de transplante de córnea. Sobre os transplantes pode-se afirmar que</p> <p>(A) o tecido doador deve ser removido nas primeiras 24 horas após a morte.</p> <p>(B) córneas de indivíduos doadores jovens possuem melhores resultados, principalmente quando de bebês.</p> <p>(C) leucemia não é contra indicação para captação de córnea.</p> <p>(D) enxertos de 8,5 mm são preferidos no momento do transplante.</p> <p>(E) na ceratoplastia lamelar profunda não há risco de rejeição epitelial.</p>	<p>27. Com relação à dinâmica do humor aquoso e o controle pressórico intraocular medicamentoso, pode-se afirmar que</p> <p>(A) não está entre os efeitos colaterais, a ocorrência de conjuntivite alérgica, com o uso de tartarato de brimonidina.</p> <p>(B) a drenagem, via malha trabecular e via uveoescleral, ocorre de forma dependente da pressão intraocular.</p> <p>(C) drogas antagonistas beta-adrenérgicas atuam na regulação da AMPc diminuindo a PIO em até 10%.</p> <p>(D) as células epiteliais não pigmentadas do corpo ciliar são responsáveis pela produção do humor aquoso.</p> <p>(E) análogos de Prostaglandinas possuem como principal mecanismo de ação a diminuição da produção de humor aquoso.</p>



28. Dentre alguns materiais utilizados para confecção de lentes corretivas para óculos tem-se o policarbonato, vidro Crown, CR-39. Com base no índice de refração de cada um deles, em ordem crescente, é:
- (A) CR-39, vidro Crown e policarbonato.
 - (B) CR-39, policarbonato e vidro Crown.
 - (C) policarbonato, CR-39 e vidro Crown.
 - (D) vidro Crown, CR-39 e policarbonato.
 - (E) vidro Crown, policarbonato e CR-39.
29. Ao colocar um objeto no infinito diante de uma lente de -5D, sua imagem será encontrada:
- (A) 0,2 m na frente da lente.
 - (B) 2 mm na frente da lente.
 - (C) 2 mm atrás da lente.
 - (D) sem saber a vergência dos raios do objeto é impossível o cálculo.
 - (E) 2 m atrás da lente.
30. Com relação à pálpebra e suas afecções:
- (A) o cisto de Zeiss possui histologicamente reação inflamatória lipogranulomatosa.
 - (B) o carcinoma de células escamosas pode mimetizar calázio "recorrente".
 - (C) regressão espontânea em geral não ocorre nos calázios.
 - (D) o principal agente causador do hordéolo é o *Streptococcus piogenes*.
 - (E) o Cisto de Moll caracteriza-se pela presença de líquido claro.
31. Sobre a retinopatia diabética, pode-se afirmar que
- (A) o controle metabólico inadequado é o fator de risco mais importante.
 - (B) os microaneurismas retinianos são achados precocemente e ocorrem devido à proliferação de pericitos vasculares.
 - (C) a panfotocoagulação está indicada em pacientes com retinopatia diabética não proliferativa moderada, grave e proliferativa.
 - (D) a hemorragia vítrea sem grande melhora no primeiro mês deve ser tratada com vitrectomia.
 - (E) a fotocoagulação focal no edema macular diabético aumenta a chance de ganho de visão.
32. Um exame importante na propedêutica oftalmológica é a realização da gonioscopia. Dentre as alternativas abaixo, assinale a correta.
- (A) A goniolente de Goldmann é adequada para a gonioscopia de identificação.
 - (B) A faixa do corpo ciliar em geral é mais larga nos olhos míopes.
 - (C) Para uso da goniolente de Zeiss faz-se necessário associação de substância viscosa.
 - (D) A pigmentação do trabeculado em olhos sádios é maior no trabeculado anterior e superiormente.
 - (E) Através da gonioscopia simples, não é possível identificar a linha de Sampaolesi.
33. Entre as opções abaixo, qual não está associada à proliferação de células-tronco límbicas?
- (A) Aniridia.
 - (B) Síndrome de Stevens-Johnson.
 - (C) Lesão química.
 - (D) Úlcera em escudo.
 - (E) Ceratite puntata superficial.
34. Paciente idoso, apresentando baixa acuidade visual súbita há dois dias em olho direito por oclusão de veia central da retina do tipo isquêmica. Com relação aos achados clínicos e conduta, pode-se afirmar que:
- (A) a acuidade visual é prejudicada em grau moderado a grave.
 - (B) a maioria dos sinais agudos regredem após 9 a 12 meses com recuperação visual de bom prognóstico.
 - (C) o paciente deverá ser examinado frequentemente nos primeiros 6 meses, incluindo exame gonioscópico.
 - (D) a panfotocoagulação retiniana se faz mandatória precocemente em todos os casos.
 - (E) o desenvolvimento de vasos colaterais do disco óptico é um preditor do aparecimento de *rubeosis iridis*.
35. Em relação às ptoses palpebrais, pode-se afirmar que
- (A) na ptose congênita simples, a prega palpebral superior está frequentemente ausente.
 - (B) nas situações em que haja ptose congênita e a pálpebra oclua totalmente o eixo visual, a cirurgia poderá ser realizada até a idade de 7 anos sem que ocorra prejuízo à acuidade visual.
 - (C) é incomum a presença de posições viciosas de cabeça.
 - (D) não há relação entre ptose palpebral congênita e tocotraumatismo.
 - (E) erros refrativos são incomuns na ptose congênita.



36. Em relação às queimaduras oculares, pode-se afirmar que
- (A) as principais complicações por queimaduras devido à substâncias básicas são lesões, principalmente, durante a fase aguda.
 - (B) as queimaduras oculares por lesões químicas devido à substâncias ácidas independem da integridade epitelial corneana prévia.
 - (C) de acordo com a classificação de *Dua et. al* (2001), a queimadura ocular grau III compreende perda total do epitélio, 1/3 a 1/2 de isquemia do limbo e dificuldade de observação dos detalhes irianos.
 - (D) a presença de queimaduras limbares e conjuntivais palpebrais têm prognósticos semelhantes.
 - (E) estão associados à uveíte e glaucoma.
-
37. Uma paciente, 45 anos, branca, é encaminhada para seu consultório com queixa de baixa acuidade visual. Ao exame a acuidade visual não melhora de 20/60. À biomicroscopia observa-se precipitados ceráticos difusos sobre o endotélio, discreta inflamação da câmara anterior e a íris de um de seus olhos azuis está mais escura. Com base no caso clínico acima, pode-se afirmar que:
- (A) Mais de 30% dos pacientes com esta doença cursam com envolvimento bilateral sem nenhuma nítida heterocromia.
 - (B) O olho envolvido é mais claro que o sadio.
 - (C) A análise patológica das espécimes deste caso revelaram a presença de plasmócitos no corpo ciliar.
 - (D) A presença de sinéquias anteriores é muito comum.
 - (E) A alteração da cor da íris deve-se à presença de depósito inflamatório em seu epitélio pigmentado.
-
38. O paciente D.N.M. de 63 anos, engenheiro, foi ao seu consultório com queixa de baixa de acuidade visual (BAV) após cirurgia de catarata em olho direito. De antecedentes oftalmológicos referia hipermetropia em ambos os olhos. Você realiza a refração do paciente e observa:
- OD -2,00 DE -1,50 DC a 180°
OE +4,25 DE -0,75 DC a 90°
- Adição para perto de +2,50 DE AO com AV de J1.
- Realizando o teste de acuidade visual monocularmente ele atinge 20/20 em ambos os olhos, porém ele se queixa da visão binocular. Diante do exposto, a melhor solução para este caso é
- (A) óculos bifocal topo reto.
 - (B) prisma.
 - (C) lente de contato.
 - (D) refração estática.
 - (E) óculos polarizados.
-
39. A associação mais frequente entre artrite idiopática juvenil (AIJ) e iridociclite é:
- (A) Fator reumatoide (FR) positivo.
 - (B) Anticorpo antinuclear (ANA) positivo na forma pauciarticular.
 - (C) FR negativo, ANA negativo na forma poliarticular.
 - (D) ANA positivo na forma poliarticular.
 - (E) ANA negativo na forma pauciarticular.
-
40. Qual dos achados retinianos abaixo é mais comum em pacientes portadores de AIDS?
- (A) Manchas algodinosas, podendo ser brancas e/ou amareladas com limites imprecisos.
 - (B) Retinite por CMV com CD4 de 450 cels/mm³.
 - (C) Necrose retiniana Aguda (NRA) por tuberculose.
 - (D) Retinite de Purtscher.
 - (E) Coroidite por *Pneumocystis*.

**PROVA DISSERTATIVA****QUESTÃO 1**

Uma das grandes causas de cegueira irreversível atualmente é o glaucoma. Sobre os glaucomas em geral, responda as questões abaixo.

- a. Defina glaucoma primário de ângulo aberto.

Redação Definitiva

- b. Dentre os fatores de risco para o desenvolvimento do glaucoma primário de ângulo aberto, cite dois de forte associação e dois de menor associação.

Redação Definitiva

- c. Uma das causas de glaucoma secundário é a presença de hifema. Cite a classificação, segundo Edwards & Layden.

Redação Definitiva



d. Cite a fisiopatologia do aumento da pressão intraocular no glaucoma secundário ao hifema.

Redação Definitiva

e. Dentre os exames para diagnóstico e seguimento de olhos glaucomatosos, biomicroscopia de fundo e o exame de campo visual são mandatórios. Em qual deles primeiramente se identifica dano causado pelo glaucoma? Cite três alterações campimétricas características decorrentes de lesões glaucomatosas.

Redação Definitiva

NOTA



QUESTÃO 2

Com relação a esclera e suas afecções, responda as questões abaixo.

a. Diferencie clinicamente esclerite de episclerite.

Redação Definitiva

b. Como é realizado o teste da fenilefrina e qual o seu significado?

Redação Definitiva

c. Para o tratamento das esclerites anteriores nodulares e difusas qual a classe dos medicamentos de primeira linha mais utilizada e a via de administração?

Redação Definitiva

NOTA



NÃO ESCREVA NESTA PÁGINA



QUESTÃO 3

Este é um trecho do protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da Doença de Alzheimer.

A Doença de Alzheimer (DA) é um transtorno neurodegenerativo progressivo e fatal que se manifesta por deterioração cognitiva e da memória, comprometimento progressivo das atividades de vida diária e uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e de alterações comportamentais. Embora não haja cura para DA, a descoberta de que é caracterizada por déficit colinérgico resultou no desenvolvimento de tratamentos medicamentosos que aliviam os sintomas.

O diagnóstico da DA é de exclusão e segue os critérios do National Institute of Neurologic and Communicative Disorders and Stroke and the Alzheimer Disease and Related Disorders Association (NINCDSADRDA).

Os Inibidores da acetilcolinesterase representam a principal linha de tratamento da DA. As revisões chegam a conclusões similares em certas doses testadas. Comparados com placebo, os inibidores da colinesterase revelaram efeitos consistentes. Revisões da Cochrane Collaboration de cada um dos inibidores da colinesterase já foram completadas e publicadas. Há vinte e três estudos com donepezila (5.272 pacientes randomizados), nove com rivastigmina (3.449 pacientes randomizados) e nove com galantamina (5.194 pacientes randomizados). O objetivo da maioria destes estudos é avaliar a eficácia e a tolerabilidade do inibidor da colinesterase entre os grupos tratados e placebo ao longo de 3 ou 6 meses. Apenas 46% dos ensaios clínicos randomizados discutiram a significância clínica dos seus resultados, sendo que a maioria das medidas de significância clínica era baseada em opinião.

As revisões chegam a conclusões similares: em certas doses testadas, nas mais altas do que nas mais baixas, os inibidores da colinesterase mostram maior eficácia sobre a função cognitiva, atividades de vida diária, comportamento e estado clínico global, comparada a do placebo, bem como mais efeitos adversos, como náusea, anorexia, vômitos, cefaleia e dor abdominal, associados com o inibidor da colinesterase do que com o placebo.

Com base no texto, retirado dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde, pergunta-se:

a. Qual é o objetivo da elaboração de diretrizes médicas?

RASCUNHO

Redação Definitiva



b. Quais foram os métodos de coleta de evidências para estabelecer a opção terapêutica?

Redação Definitiva

c. Se você fosse planejar um estudo para obter um alto grau de recomendação e força de evidência para os medicamentos propostos, como organizaria?

Redação Definitiva



- d. Para a dispensação de medicamentos específicos, há a necessidade de termo de esclarecimento e responsabilidade. Considerando as informações fornecidas, escreva um modelo do referido termo para a prescrição, usando medicamento inibidor da acetilcolinesterase como exemplo.

RASCUNHO

Redação Definitiva

NOTA



NÃO ESCREVA NESTA PÁGINA