







# RASCUNHO

O texto que segue foi extraído do romance *O cortiço*, de Aluísio Azevedo.

Leia-o para responder às questões de 1 a 3.

Daí à pedreira restavam apenas uns cinquenta passos e o chão era já todo coberto por farinha de pedra moída que sujava como cal.

Aqui, ali, por toda a parte, encontravam-se trabalhadores, uns ao sol, outros debaixo de pequenas barracas feitas de lona ou de folha de palmeira. De um lado cunhavam pedra cantando; de outro quebravam a picareta; de outro afeiçãoavam<sup>1</sup> lajedos a ponta de picão<sup>2</sup>; mais adiante faziam paralelepípedos e escopro<sup>3</sup> e macete<sup>4</sup>. E todo aquele retintim de ferramentas, e o martelar da forja, e o coro dos que lá em cima brocavam a rocha para lançar-lhe fogo, e a surda zoada ao longe, que vinha do cortiço, como de uma aldeia alarmada; tudo dava a ideia de uma atividade feroz, de uma luta de vingança e ódio. Aqueles homens gotejantes de suor, bêbados de calor, desvairados de insolação, a quebrarem, a espicaçarem, a torturarem a pedra, pareciam um punhado de demônios revoltados na sua impotência contra o impassível gigante que os contemplava com desprezo, imperturbável a todos os golpes e a todos os tiros que lhe desfechavam no dorso, deixando sem um gemido que lhe abrissem as entranhas de granito. O membrudo cavouqueiro havia chegado à fralda do orgulhoso monstro de pedra; tinha-o cara a cada, mediu de alto a baixo, arrogante, num desafio surdo.

A pedreira mostrava nesse ponto de vista o seu lado mais importante. Descomposta, com o escalavrado flanco exposto ao sol, erguia-se altaneira e desassombrada, afrontando o céu, muito íngreme, lisa, escaldante e cheia de cordas que mesquinamente lhes escorriam pela ciclópica nudez com um efeito de teias de aranha. Em certos lugares, muito alto do chão, lhe haviam espetado alfinetes de ferro, amparando, sobre um precipício, miseráveis tábuas que, vistas cá de baixo, pareciam palitos, mas em cima das quais uns atrevidos pigmeus de forma humana equilibravam-se, desfechando golpes de picareta.

Aluísio Azevedo. *O cortiço*. 25 Ed. São Paulo, Ética, 1992. P.48-9.

<sup>1</sup> afeiçãoar: dar forma a.

<sup>2</sup> picão: ferramenta de lavrar terra.

<sup>3</sup> escopro: instrumento de lavrar pedra, madeira, etc.; cinzel.

<sup>4</sup> macete: espécie de martelo usado por escultores.

1) **Leia as afirmativas abaixo relação ao texto e assinale a alternativa correta.**

- I. Trata-se de um texto figurativo.
- II. O texto é construído com termos concretos: pedreira, chão, pedra, farinha, trabalhadores, lona, etc.
- III. As ações e qualificações são vistas como simultâneas, não havendo relação de anterioridade e posterioridade entre elas, comuns nos textos descritivos.
- IV. O texto é essencialmente narrativo, pois o foco está na ação.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) I, II e III apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) III e IV, apenas.
- d) I, II, III e IV.
- e) Apenas I.

2) **Nesse texto temos a descrição de uma pedreira e do trabalho que nela executam os operários. Em relação a essa descrição, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.**

- I. O autor descreve a pedreira metaforicamente e as expressões, em seu conjunto, constroem uma prosopopeia.  
**porque**
  - II. Os termos com que o autor descreve a pedreira são tipicamente humanos: *gigante, contemplava com desprezo, imperturbável, dorso, monstro, deixando sem um gemido que lhe abrissem as entranhas, afrontando o céu.*
- a) A afirmativa I é verdadeira e a II é falsa.
  - b) A afirmativa I é falsa e a II é verdadeira
  - c) Ambas as afirmativas são verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa da primeira
  - d) Ambas as afirmativas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa da primeira.
  - e) Ambas as afirmativas são falsas.

3) **Na visão do autor:**

- I. Há uma oposição entre o homem e a natureza, em que o primeiro se acha em situação de inferioridade em relação à segunda.
- II. O trabalho é visto como *atividade feroz*, como uma luta de vingança e de ódio.
- III. A natureza é impotente diante do homem.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) I. e II, apenas
- b) I apenas
- c) II apenas
- d) II e III apenas
- e) I, II e III.

**4) Considere as orações abaixo.**

- I. Tratam-se de problemas complexos.
- II. Vigiarão-se as mensagens.
- III. Procura-se os suspeitos do crimes.

**A concordância está correta somente em**

- a) I
- b) II
- c) III
- d) I e II
- e) I e III

**5) Considere o período e as afirmativas abaixo.**

É preferível ter câmeras de vigilância do que ficarmos sujeitos à assaltos.

- I. Há um problema de regência nominal.
- II. O uso do acento indicativo da crase está incorreto.
- III. Há um problema de concordância nominal

**Está correto o que se afirma somente em**

- a) I
- b) II
- c) III
- d) II e III
- e) I e II

**6) Considere o período e as afirmativas.**

De acordo com a polícia o rapaz que foi preso foi identificado pelas câmeras de segurança do banco.

- I. Deveria haver uma vírgula depois da palavra “preso”.
- II. Deveria haver uma vírgula depois da palavra “polícia”.
- III. Deveria haver uma vírgula depois da palavra “identificado”.

**Está correto o que se afirma em**

- a) somente I
- b) somente II
- c) somente III
- d) somente I e II
- e) nenhuma

**7) Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas.**

Ele não foi \_\_\_\_\_ escola \_\_\_\_\_ ainda está doente?

- a) à – porque
- b) à - por que
- c) a – porque
- d) a – por que
- e) à – por quê

**8) Considere os períodos abaixo.**

- I. Deve existir, na empresa, poucos funcionários capacitados para esta função.
- II. Faz alguns anos que não o vejo.
- III. Houveram muitos tumultos em junho.

**A concordância está correta em**

- a) somente I
- b) somente II
- c) somente III
- d) somente I e II
- e) somente I e III

**9) Assinale a alternativa que está de acordo com a norma culta.**

- a) Ele trabalha na empresa a cinco anos.
- b) Daqui à 2 anos, terminarei o curso.
- c) O escritório fica a cinco minutos da minha casa.
- d) O congresso é de 14 à 20 de setembro.
- e) Os resultados serão divulgados à partir da semana que vem.

**10) Considere o período e as afirmações abaixo.**

A maioria das empresas que agem de forma sustentável ganha a confiança do consumidor.

- I. A pontuação está incorreta, pois deveria haver uma vírgula antes de “ganha”.
- II. Há um problema de concordância verbal, o correto seria “ganham”.
- III. Para que o período seguisse a norma culta, o verbo “agir” deveria estar no singular, concordando com “maioria”

**Está correto o que se afirma em**

- a) somente I
- b) somente II
- c) somente III
- d) somente I e II
- e) nenhuma

11) Ana tinha certa quantia e gastou  $\frac{1}{4}$  com produtos de beleza,  $\frac{2}{3}$  com roupas e  $\frac{1}{3}$  do restante com alimentação e ainda

Ihe sobraram R\$ 12,00. A quantia que Ana tinha inicialmente é um valor:

- a) maior que R\$ 220,00.
- b) menor que R\$ 210,00.
- c) exatamente igual a R\$ 212,00.
- d) Entre R\$ 200,00 e R\$ 215,00.
- e) Entre R\$ 215,00 e R\$ 220,00.

12) Dos 320 alunos de uma academia de ginástica, sabe-se que 170 praticam aeróbica, 148 praticam natação, 172 praticam boxe, 80 praticam aeróbica e boxe, 75 praticam natação e boxe, 62 praticam aeróbica e natação e 23 praticam os três. Nessas condições podemos afirmar que:

- a) 40 alunos praticam somente natação.
- b) 74 alunos praticam natação ou aeróbica.
- c) 91 alunos praticam aeróbica ou boxe.
- d) O total de alunos que não fazem aeróbica, boxe e natação é igual a 34.
- e) 51 alunos praticam somente boxe.

13) Os números 4,5,7,7,10,9,13,11,... estão descritos numa sequencia lógica. Desse modo, a soma entre o 20º e o 21º termos da sequencia é igual a:

- a) 57
- b) 54
- c) 55
- d) 59
- e) 52

14) Do ponto de vista da lógica matemática a negação da frase: Marcos foi ao cinema ou Maria foi fazer compras é a frase:

- a) Marcos não foi ao cinema ou Maria não foi fazer compras.
- b) Marcos foi ao cinema e Maria foi fazer compras.
- c) Marcos não foi ao cinema, então Maria não foi fazer compras.
- d) Marcos não foi ao cinema e Maria não foi fazer compras.
- e) Marcos não foi ao cinema e Maria foi fazer compras.

15) Sejam as proposições P: 10% de 40% é o mesmo que 4% e Q: a metade de um terço de x é menor que  $\frac{1}{7}$  de x. Pode-se afirmar que:

- a) A conjunção entre as duas é verdadeira.
- b) P condicional Q é falso.
- c) P bicondicional Q é verdadeiro.
- d) A disjunção entre as duas é falsa.
- e) A negação de q é falsa.

#### LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

16) Entre as competências da EBSEERH não se inclui:

- a) Prestar às instituições federais de ensino superior e a outras instituições congêneres serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, mediante as condições que forem fixadas em seu estatuto social.
- b) Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa de instituições federais de ensino superior e de outras instituições congêneres, cuja vinculação com o campo da saúde pública ou com outros aspectos da sua atividade torne necessária essa cooperação, em especial na implementação das residências médica, multiprofissional e em área profissional da saúde, nas especialidades e regiões estratégicas para o SUS.
- c) Prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e a outras instituições congêneres.
- d) Prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários e federais e a outras instituições congêneres, com implementação de sistema de gestão único com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de metas.
- e) Propor as diretrizes da Política Nacional de Residência Médica.

17) Sobre a EBSEERH e a lei que a criou, assinale a alternativa incorreta:

- a) A EBSEERH e suas subsidiárias estarão sujeitas à fiscalização dos órgãos de controle interno do Poder Executivo e ao controle externo exercido pelo Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União.
- b) A EBSEERH não é autorizada a patrocinar entidade fechada de previdência privada, nos termos da legislação vigente.
- c) Os Estados poderão autorizar a criação de empresas públicas de serviços hospitalares.
- d) O regime de pessoal permanente da EBSEERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
- e) É dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social.

**18) O prazo de duração da EBSERH é:**

- a) Indeterminado
- b) De dois anos
- c) De quatro anos
- d) De 10 anos
- e) De 8 anos

**19) Compete ao Conselho de Administração da EBSERH, exceto:**

- a) Aprovar o regimento interno da EBSERH
- b) Deliberar, mediante proposta da Diretoria Executiva, sobre a contratação de empréstimos no interesse da EBSERH;
- c) Opinar e submeter à aprovação do Ministério de Estado da Educação sobre a proposta de criação de escolas médicas.
- d) Aprovar o orçamento e programa de investimentos e acompanhar a sua execução
- e) Opinar e submeter à aprovação do Ministro de Estado da Fazenda, por intermédio do Ministro de Estado da Educação sobre a proposta de criação de subsidiárias.

**20) Sobre o Conselho Consultivo da EBSERH, assinale a alternativa incorreta:**

- a) Seu presidente será um entre os membros indicados pelo Ministro de Estado da Educação.
- b) Um dos representantes dos usuários dos hospitais universitários federais faz parte deste conselho.
- c) Um dos representantes dos residentes em saúde dos hospitais universitários federais faz parte deste conselho.
- d) Deve-se reunir ordinariamente pelo menos uma vez ao ano.
- e) Uma de suas funções é acompanhar e avaliar periodicamente o desempenho da EBSERH.

### **LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS**

---

**21) Considerando a informação em saúde e os sistemas de informação em saúde, assinale a alternativa incorreta:**

- a) Dado é qualquer elemento qualitativo ou quantitativo, desvinculado de referencial explicativo.
- b) Informação é o produto da análise de um ou mais dados.
- c) A notificação é uma fonte de dado de morbidade de baixo custo, ativa e de elevada cobertura.
- d) A informação em saúde não se refere somente à produzida pelo setor de saúde.
- e) O SIA-SUS é o sistema de informações ambulatoriais do Sistema Único de Saúde.

**22) Um município de pequeno porte decidiu que durante a campanha anual de vacinação contra a gripe, estaria disponível aos pacientes a dosagem de glicemia e aferição de pressão arterial. A medida foi duramente criticada pelos vereadores de oposição que a caracterizaram como desperdício de recursos e desvio do objetivo da vacinação. Em sua opinião:**

- a) A medida está incorreta pois compromete o princípio da universalidade do SUS, porque torna a vacinação demorada e com risco de menor cobertura.
- b) A medida está em acordo com o princípio da integralidade do SUS.
- c) A medida fere o princípio da autonomia do usuário do SUS.
- d) A medida está em desacordo com o princípio da utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades.
- e) A medida está em desacordo com o princípio da capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência.

**23) Considerando os determinantes sociais de saúde e a ocorrência de hipertensão arterial, assinale a alternativa incorreta:**

- a) Não parece haver relação entre renda familiar e prevalência de hipertensão arterial.
- b) Há associação entre estilo de vida sedentário e maior prevalência de hipertensão arterial.
- c) Há associação entre atividade profissional e prevalência de hipertensão.
- d) Há associação entre consumo excessivo de álcool e maior prevalência de hipertensão.
- e) Pessoas que vivem em comunidades não industriais, não aculturadas e com baixa ingestão de sal têm menor pressão arterial média, que tende a aumentar um pouco com a idade. A pressão arterial aumenta nessas pessoas quando adotam estilos de vida modernos.

**24) Sobre o controle social no SUS, assinale a alternativa incorreta:**

- a) O SUS foi a primeira política pública no Brasil a adotar constitucionalmente a participação popular como um de seus princípios.
- b) A participação da comunidade na gestão do SUS foi definida pela lei nº 8142/1990.
- c) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- d) A representação dos usuários nas Conferências de Saúde é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos
- e) A representação dos usuários no Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) é paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

**25) O Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011 regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências. Considerando esse decreto, assinale a alternativa incorreta:**

- a) Poderão ser instituídas Regiões de Saúde interestaduais, compostas por municípios limítrofes, por ato conjunto dos respectivos Estados em articulação com os municípios.
- b) O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico, observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção especial, conforme legislação vigente.
- c) A população indígena contará com os mesmos regramentos de acesso, que o conjunto da população conforme a necessidade de assistência integral à sua saúde, de acordo com disposições do Ministério da Saúde.
- d) O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços nos entes federativos e nas Regiões de Saúde.
- e) Ao usuário será assegurada a continuidade do cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região.



- 26) A avaliação laboratorial de uma criança com suspeita de Infecção do Trato Urinário (ITU) inclui a obtenção de uma amostra de urina para realização de exame de urina l e cultura quantitativa de urina. Quanto aos métodos de coleta e interpretação dos resultados dos exames de urina pode-se afirmar, exceto que:
- A sondagem vesical ou punção suprapúbica são os métodos de escolha para lactentes ou crianças pequenas sem controle esfinteriano.
  - A coleta de urina por jato médio é o método preferido para as crianças mais velhas que apresentam controle urinário.
  - Recomenda-se que a urina obtida por saco coletor não seja usada para cultura.
  - A Academia Americana de Pediatria considera o crescimento de qualquer número de bactéria gram-positiva como significante.
  - A presença de leucócito-esterase na urina nem sempre é sinal de ITU verdadeira, porque os leucócitos podem estar presentes na urina em outras condições, tais como na Doença de Kawasaki.
- 27) O crescimento e o desenvolvimento da criança e do adolescente estendem-se desde a concepção até a fase adulta. O crescimento é considerado um dos melhores indicadores de saúde da criança. Sendo assim, a monitoração e a avaliação permanentes do crescimento e do desenvolvimento são fundamentais na atenção integral à saúde da criança e do adolescente e devem fazer parte integrante de toda consulta pediátrica. Com relação à avaliação do crescimento e desenvolvimento é **incorreto** afirmar que:
- No primeiro trimestre de vida, o bebê pode ganhar de 800 a 900 g/mês.
  - O primeiro semestre de vida é o período mais vulnerável aos distúrbios de crescimento frente às situações adversas.
  - Durante o primeiro ano de vida a criança cresce em torno de 24 cm e ganha em torno de 6 Kg.
  - No segundo ano de vida, a criança cresce em torno de 12 cm e ganha mais ou menos 2,5 Kg.
  - A partir da fase escolar, a velocidade de crescimento é praticamente constante, de 5 a 6 cm/ano, até o início do estirão da adolescência, que nas meninas ocorre em torno dos 11 anos e nos meninos, em torno dos 13 anos.
- 28) O período de crescimento intrauterino é de vital importância para o ser humano e o peso ao nascer é o indicador que melhor retrata o que ocorre durante a fase fetal. Em relação ao baixo peso ao nascer (BPN), pode-se afirmar que:
- Os bebês prematuros com peso abaixo de 2.500g, porém, com o peso adequado para idade gestacional (AIG), apresentam melhor prognóstico em relação ao crescimento pós-natal compensatório, quando comparados com os bebês pequenos para idade gestacional (PIG), mesmo sendo bebês a termo (> 37 semanas de gestação).
  - Os bebês prematuros com peso abaixo de 2.500g e pequenos para idade gestacional (PIG) apresentam um melhor prognóstico em relação ao crescimento pós-natal compensatório, quando comparados com os bebês pequenos para idade gestacional (PIG) e termo (> 37 semanas de gestação).
  - Os bebês prematuros com peso abaixo de 2.500g, porém, com o peso adequado para idade gestacional (AIG) apresentam um pior prognóstico em relação ao crescimento pós-natal compensatório, quando comparados com os bebês pequenos para idade gestacional (PIG) e a termo (> 37 semanas de gestação).
  - Os bebês prematuros com peso abaixo de 2.500g, porém, com o peso adequado para idade gestacional (AIG), apresentam um pior prognóstico em relação ao crescimento pós-natal compensatório, quando comparados com os bebês pequenos para idade gestacional (PIG) e prematuros (< 37 semanas de gestação).
  - Os bebês prematuros com peso abaixo de 2.500g e pequenos para idade gestacional (PIG) apresentam um pior prognóstico em relação ao crescimento pós-natal compensatório, quando comparados com os bebês pequenos para idade gestacional (PIG), mesmo sendo bebês a termo (> 37 semanas de gestação).
- 29) As infecções bacterianas da pele (piodermites) representam 20 a 25% de todas as dermatoses. A infecção superficial bacteriana causada pelo *Corynebacterium minutissimum*, que produz porfirinas, o que faz com que fluoresça à luz de Wood com coloração róseo-coral, que é mais comum em adulto, mas pode ocorrer na faixa etária entre 5 e 14 anos e ocorre, principalmente, em locais úmidos do corpo, como as axilas, as pregas inguinais e os espaços interdigitais e aparece sob a forma de placas eritematosas, bem delimitadas, com descamação e maceração nas regiões interdigitais, devem ser diagnosticadas como:
- Eritrasma.
  - Ceratólise Puntata.
  - Ectima.
  - Doença de Ritter.
  - Dactilite.
- 30) A única forma de tratamento classificada como de “forte recomendação” pela Academia Norte-Americana de Pediatria e deve ser a primeira medicação a ser prescrita para uma criança com Otite Média Aguda (OMA) é:
- Anestésico tópico.
  - Antibiótico sistêmico.
  - Analgésico sistêmico.
  - Antiinflamatório sistêmico.
  - Antibiótico tópico.
- 31) A diferenciação da rinossinusite de um resfriado comum, gripe, adenoidite ou quadro alérgico não é fácil. De acordo com o American College of Radiology, em relação à realização de exames radiológicos na suspeita de rinossinusite bacteriana (RBA), é correto afirmar que:
- Não se devem realizar radiografias para diagnóstico de RBA em crianças de qualquer idade, pois o diagnóstico é clínico.
  - A solicitação de radiografias para diagnóstico de RBA está indicada apenas para as crianças maiores de 6 anos de idade.
  - O RX normal não afasta completamente o diagnóstico de doenças de seios paranasais.
  - A solicitação de radiografias para diagnóstico de RBA está indicada apenas para as crianças menores de 6 anos de idade.
  - Os exames radiológicos devem ser solicitados na suspeita de RBA, em todas as faixas etárias.

- 32) O ferro por via oral é a primeira opção de tratamento da anemia ferropriva, sendo esta forma de tratamento eficaz na maioria dos casos. Porém, em algumas situações específicas, a administração de ferro via parenteral é uma opção terapêutica que deve ser considerada. São indicações de tratamento com ferro parenteral, exceto:
- Intolerância ao ferro via oral determinada pela ocorrência de eventos adversos que levaram ao abandono do tratamento.
  - Normalização mais rápida dos estoques de ferro evitando o uso prolongado da terapia por via oral e seus efeitos adversos.
  - Situações especiais, como programas de autotransfusão de pré-depósito, questões religiosas (pacientes testemunhas de Jeová).
  - Resposta insatisfatória com o ferro por via oral, geralmente devido a mau absorção, que ocorre em situações tais como: gastropластиа redutora, gastrectomia, doença gastrointestinal inflamatória crônica, incluindo infecção pelo *H. pylori*, doença celíaca e gastrite atrófica autoimune.
  - Anemia ferropriva intensa (Hb < 8g/dl) em paciente hemodinamicamente instável, com o objetivo de se obter resposta terapêutica mais rápida e diminuir o risco da necessidade de transfusão de hemácias.
- 33) A introdução oportuna de alimentos complementares durante a infância é necessária por razões nutricionais e de desenvolvimento e para permitir a transição do aleitamento para alimentos da família. Assinale abaixo o esquema correto para introdução dos alimentos complementares.
- 4º mês: frutas (raspada, amassada, suco); 5º ao 6º mês: primeira papa; 6º ao 7º mês: segunda papa; 8º ao 9º mês: ovo, peixe; 10º ao 11º mês: gradativamente passar para a consistência da comida da família; 12º mês: comida da família.
  - 6º mês: frutas (raspada, amassada, suco); 6º mês: primeira papa; 7º mês: segunda papa; 8º mês: gradativamente passar para a consistência da comida da família; 9º mês: ovo, peixe; 10º mês: comida da família.
  - 6º mês: frutas (raspada, amassada, suco); 6º ao 7º mês: primeira papa; 7º ao 8º mês: segunda papa; 8º ao 10º mês: gradativamente passar para a consistência da comida da família, ovo, peixe; 10º mês: comida da família.
  - 6º mês: frutas (raspada, amassada, suco); 6º ao 7º mês: primeira papa, ovo, peixe; 7º ao 8º mês: segunda papa; 9º ao 11º mês: gradativamente passar para a consistência da comida da família; 12º mês: comida da família.
  - 6º mês: frutas (raspada, amassada, suco); 6º mês: primeira papa; 7º mês: segunda papa; 8º mês: ovo, peixe; 9º mês: gradativamente passar para a consistência da comida da família; 10º mês: comida da família.
- 34) As implicações éticas de uma conduta médica ou terapêutica requer consideração de pelo menos 5 dos princípios básicos da bioética, que são:
- Ortotanásia, beneficência; autonomia, cuidados paliativos e sigilo médico.
  - Não-maleficência, beneficência; autonomia, preservação da vida e justiça distributiva.
  - Não-maleficência, beneficência; racionalidade preservação da vida e sigilo médico.
  - Ortotanásia, beneficência; racionalidade, cuidados paliativos e justiça distributiva.
  - Não-maleficência, beneficência; racionalidade, cuidados paliativos e sigilo médico.
- 35) A forma de violência psicológica, para a qual o pediatra deve estar atento, caracterizada como a situação na qual o paciente é levado ao Serviço de Saúde para cuidados médicos, mas os sintomas e sinais que ele apresenta são inventados ou provocados por seus pais ou responsáveis é denominado:
- Síndrome de Brugada.
  - Síndrome de Borderline.
  - Síndrome de Münchausen por transferência.
  - Síndrome de Mirizzi.
  - Síndrome de Nagali.
- 36) De acordo com o calendário vacinal da Sociedade Brasileira de Pediatria de 2013, a vacina HPV (human papiloma vírus) está indicada para:
- Meninos e meninas a partir de 8 anos de idade.
  - Meninas a partir de 9 anos de idade.
  - Meninas a partir de 8 anos de idade.
  - Meninos e meninas a partir de 9 anos de idade.
  - Meninas a partir de 12 anos de idade.
- 37) De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, são sinais de alerta para o diagnóstico das Imunodeficiência primária, exceto:
- Efeito adverso ao BCG (Bacilo de Calmette-Guérin) e/ou infecção por micobactéria.
  - Duas ou mais novas otites no último ano.
  - Infecções intestinais de repetição / diarreia crônica / giardíase.
  - Abscessos de repetição ou ectima.
  - Um episódio de infecção sistêmica grave (meningite, osteoartrite, septicemia).
- 38) Criança de 5 anos, do sexo feminino, acompanhada devido a coarctação da aorta de grau leve apresenta déficit no crescimento com percentil 5% para altura. O diagnóstico da causa da baixa estatura mais provável é:
- Hipotireoidismo.
  - Síndrome de Noonan.
  - Síndrome de Williams.
  - Síndrome dos ovários policísticos.
  - Síndrome de Turner.

- 39) O quadro de choque que cursa com aumento da pressão venosa central, diminuição da pressão arterial média, diminuição do índice cardíaco, aumento da resistência vascular sistêmica e aumento da pressão de capilar pulmonar é:
- Cardiogênico.
  - Hipovolêmico.
  - Séptico frio.
  - Séptico quente.
  - Neurogênico.
- 40) Segundo as diretrizes para o tratamento de insuficiência cardíaca do American College of Cardiology (ACC) e da American Heart Association (AHA) de 2002, a classificação de um menino de 4 anos de idade, portador de miocardiopatia dilatada, assintomático e com exame ecocardiográfico com fração de ejeção do ventrículo esquerdo de 55% é no \_\_\_\_\_. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.
- Estágio A.
  - Estágio B.
  - Estágio C.
  - Estágio D.
  - Estágio interterminado.
- 41) A cetoacidose diabética é a complicação aguda mais temível da diabetes mellitus tipo I. Os critérios laboratoriais para o diagnóstico de cetoacidose diabética são:
- Glicemia > 150 mg/dL, pH < 7,2 com bicarbonato < 10, cetonemia > 2 mMol/L e cetonúria > 60 mg/dL.
  - Glicemia > 180 mg/dL, pH < 7,3 com bicarbonato < 15, cetonemia > 2 mMol/L e cetonúria > 60 mg/dL.
  - Glicemia > 180 mg/dL, pH < 7,2 com bicarbonato < 10, cetonemia > 3 mMol/L e cetonúria > 80 mg/dL.
  - Glicemia > 200 mg/dL, pH < 7,2 com bicarbonato < 10, cetonemia > 3 mMol/L e cetonúria > 80 mg/dL.
  - Glicemia > 200 mg/dL, pH < 7,3 com bicarbonato < 15, cetonemia > 3 mMol/L e cetonúria > 80 mg/dL.
- 42) As convulsões são causas importantes de atendimento de urgência na faixa etária pediátrica. As três principais causas de estado de mal epiléptico são:
- Relacionadas à febre, infecções do sistema nervoso central e tumores do sistema nervoso central.
  - Relacionadas à febre, distúrbios hidroeletrólíticos e metabólicos e tumores do sistema nervoso central.
  - Relacionadas à febre, infecções do sistema nervoso central e distúrbios hidroeletrólíticos e metabólicos.
  - Infecções do sistema nervoso central, distúrbio hidroeletrólíticos e metabólicos e tumores do sistema nervoso central.
  - Intoxicações, infecções do sistema nervoso central e tumores do sistema nervoso central.
- 43) Adolescente vítima de politraumatismo chega ao PS com cianose, hipotensão arterial, dispneia, desvio da traqueia para a direita, ausência de murmúrio vesicular a esquerda, com enfisema subcutâneo e timpanismo à percussão. O diagnóstico clínico é de \_\_\_\_\_. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:
- Pneumotórax aberto.
  - Pneumotórax hipertensivo.
  - Tamponamento cardíaco.
  - Tórax instável.
  - Hemotórax.
- 44) O eritema marginado e os nódulos subcutâneos são manifestações pouco frequentes na febre reumática, porém quando estão presentes estão associados à presença de \_\_\_\_\_. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:
- Cardite.
  - Coréia de Sydenham.
  - PANDAS (Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated With Streptococcal Infection).
  - Artrite.
  - Hemicoréia.
- 45) As gastroenterites na faixa etária pediátrica estão relacionadas com vários fatores de riscos. Os principais fatores de risco para as gastroenterites na faixa etária pediátrica são:
- Contaminação ambiental e idade abaixo de um ano.
  - Sarampo e falta de aleitamento materno (exclusivo ou predominante).
  - Falta de aleitamento materno (exclusivo ou predominante) e o aumento da exposição à enteropatógenos.
  - Falta de aleitamento materno (exclusivo ou predominante) e desnutrição proteico-calórica.
  - Contaminação ambiental e o aumento da exposição a enteropatógenos.
- 46) Refluxo vesicoureteral pode causar complicações importantes desde a vida intrauterina e deve ser diagnosticado o mais precoce possível. Após um quadro de infecções urinárias de repetição, com uretrocistografia miccional que mostrou refluxo maciço com dilatação e tortuosidade significativas do ureter e perda da impressão papilar. A descrição acima é de um refluxo vesicoureteral:
- Grau I.
  - Grau II.
  - Grau III.
  - Grau IV.
  - Grau V.

- 47) A desnutrição energético-proteica primária tem diminuído em nosso meio enquanto que a secundária tem aumentado proporcionalmente devido a maior sobrevivência de crianças portadoras de doenças crônicas. Assinale a alternativa correta a respeito do hormônio do crescimento na desnutrição energética-proteica:
- O GH encontra-se diminuído na desnutrição aguda e elevado na desnutrição crônica, existindo correlação negativa significativa entre os níveis de GH e albumina.
  - O GH encontra-se elevado tanto na desnutrição aguda como crônica, existindo correlação positiva significativa entre os níveis de GH e albumina.
  - O GH encontra-se elevado na desnutrição aguda e diminuído na desnutrição crônica, existindo correlação negativa significativa entre os níveis de GH e albumina.
  - O GH encontra-se elevado tanto na desnutrição aguda como crônica, existindo correlação negativa significativa entre os níveis de GH e albumina.
  - O GH encontra-se diminuído na desnutrição aguda e elevado na desnutrição crônica, existindo correlação positiva significativa entre os níveis de GH e albumina.
- 48) A infecção por *Giardia lamblia* deve ser considerada em crianças e adolescentes que apresentam diarreia não disentérica, diarreia persistente, diarreia intermitente, constipação, má absorção, dor abdominal em cólica e distensão abdominal, desnutrição ou perda de peso. No entanto, muitas vezes, os portadores são assintomáticos. O tratamento, em adolescentes acima de 12 anos, é feito por meio da administração de:
- Albendazol na dose de 400 mg por dia em dose única.
  - Albendazol na dose de 400 mg por dia durante 3 dias.
  - Albendazol na dose de 400 mg por dia durante 5 dias.
  - Nitazoxanide na dose de 500 mg por dia em dose única.
  - Tinidazol na dose de 100 mg por dia durante 5 dias.
- 49) Sarampo é uma doença infectocontagiosa altamente contagiosa. A transmissão do sarampo ocorre:
- Um dia antes e até 5 dias após o aparecimento do rash cutâneo.
  - Um dia antes e até 7 dias após o aparecimento do rash cutâneo.
  - Três dias antes e até 6 dias após o aparecimento do rash cutâneo.
  - Três dias antes e até 14 dias após o aparecimento do rash cutâneo.
  - Sete dias antes e até 14 dias após o aparecimento do rash cutâneo.
- 50) O trauma é uma das principais causas de mortalidade da criança em países desenvolvidos. No Brasil também ocupa posição de destaque como causa de mortalidade na faixa etária pediátrica. A criança apresenta características próprias da idade que a distingue dos adultos. Assinale a alternativa que não é uma característica da faixa etária pediátrica.
- As crianças possuem menor massa corpórea, a energia do trauma se dissipa em área menor propiciando lesões múltiplas.
  - As crianças geralmente não possuem maturidade psicológica e as sequelas psíquicas podem ser marcantes.
  - As crianças possuem maior superfície corpórea quando comparada com os adultos, o que condiciona maior perda calórica necessitando de maior proteção térmica.
  - As crianças possuem maior proteção de seus órgãos internos, sendo pouco frequente as lesões pulmonares e hepatoesplênicas.
  - As crianças possuem esqueleto menos calcificado e mais maleável com risco menor de fratura.