PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCURSO PÚBLICO

Edital Nº 003/2012

MÉDICO CIRURGIÃO DE CABEÇA E PESCOÇO

INSTRUÇÕES

- 01. Examine com atenção o Caderno de Provas e verifique se ele está correto.
- 02. Esta prova contém 32 (trinta e duas) questões, cada uma com 4 (quatro) alternativas.
- 03. Leia cuidadosamente as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- 04. Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.
- 05. Procure responder todas as questões.
- 06. Assine o Cartão-Resposta no local destinado à assinatura do candidato.
- 07. Não haverá substituição do Cartão-Resposta.
- 08. No final da prova, entregue o Cartão-Resposta e o Caderno de Provas.
- 09. Use unicamente caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

BOA SORTE!

Realização: UNIVALI - ProEn

Processo Seletivo

(DESTACAR SOMENTE ESTA PARTE)

GABARITO PARA CONFERÊNCIA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01) Baseado na anatomia da cabeça e pescoço, assinale a alternativa correta.
 A ⇒ O ramo marginal mandibular do nervo facial localiza-se profundo à artéria e veia facial. B ⇒ A artéria cervical transversa é ramo do tronco tireocervical e situa-se superficial ao nervo frênico. C ⇒ O nervo hipoglosso apresenta um trajeto superficial à artéria carótida interna. D ⇒ O nervo laríngeo não recorrente ocorre mais frequentemente no lado esquerdo.
02) Paciente de 62 anos, sexo masculino, procura serviço médico com sinais e sintomas de disfonia há 8 meses, evoluindo com disfagia e linfonodomegalia cervical no nível II de um dos lados do pescoço. Apresenta história pregressa de tabagismo e etilismo. Baseado apenas na história clínica deste caso, antes de fazer o exame físico do paciente, analise as afirmações a seguir.
O sítio primário do tumor provavelmente é a laringe glótica, devido ao primeiro sintoma ter sido a disfonia.
II O fato de neste caso apresentar linfonodomegalia, provavelmente metastática, o sítio primário do tumor deve ser a laringe supra-glótica.
A laringoscopia é fundamental para a realização do estadiamento clínico do paciente, no entanto, não fornece orientação na opção da modalidade terapêutica a ser escolhida.
IV Nesta evolução clínica, a disfagia é característica de tumor primário da hipofaringe.
V O melhor exame custo-benefício para realizar o estadiamento radiológico deste paciente é a tomografia computadorizada da laringe.
Todas as afirmações corretas estão nos itens:
$\mathbf{A} \Rightarrow IV - V$ $\mathbf{B} \Rightarrow I - II - V$ $\mathbf{C} \Rightarrow II - III - IV$ $\mathbf{D} \Rightarrow I - V$
03) Assinale a alternativa correta.
 A ⇒ O Estado de Santa Catarina apresenta características epidemiológicas diferentes comparadas aos outros estados do país, referente aos tumores de cabeça e pescoço. B ⇒ Nos últimos anos houve um aumento na incidência de todos os tipos de câncer da tireoide. C ⇒ No Brasil, o câncer de laringe é o mais frequente do trato aerodigestivo superior. D ⇒ Dos tumores malignos da cabeça e pescoço, o câncer de laringe é o único que apresentou aumento da mortalidade nos últimos 20 anos.
04) Marque com V as afirmações verdadeiras e com F as falsas .
 () O carcinoma mucoepidermóide é o tumor maligno mais frequente da glândula parótida. () O carcinoma adenoide cístico é o tumor maligno mais frequente da glândula submandibular. () O neurotropismo é característica do carcinoma mucoepidermóide de alto grau. () A saliva produzida pela glândula submandibular apresenta uma constituição mais serosa e por isso é o sítio mais frequente de sialolitíase. () A sialolitíase alitiásica é uma complicação frequente após tratamento com iodo radioativo utilizado em doenças tireoidianas
A sequência correta, de cima para baixo, é:

05) Considerando as doenças da tireoide, é correto afirmar:
$\mathbf{A}\Rightarrow 50\%$ dos pacientes com nódulo de tireoide diagnosticado apresentam mais que 1 nódulo no exame ultrassonográfico.
B ⇒ A punção aspirativa com agulha fina é mandatória em todo o nódulo de tireoide.
C ⇒ A ultrassonografia só diagnostica nódulos de tireoide maiores que 5 mm.
D ⇒ A tomografia computadorizada com contraste iodado é contra-indicada para investigação de bócio

06) Sobre o estadiamento TNM (6ª edição) em cabeça e pescoço, correlacione as colunas a seguir.

(1)	Tumor de 2 cm na borda lateral da língua.	() T1	!
(2)	Lesão ulcerada na face laríngea da epiglote infra e supra hióidea.	() TO)
(3)	Linfonodomegalia cervical metastática com exame otorrinolaringológico normal.	() T2	?
(4)	Paralisia da hemilaringe.	() T4	a
(5)	Lesão ulcerada da língua, impossibilitando a sua mobilização por infiltração tumoral.	() <i>T3</i>	;
Δο	seguência correta , de cima para baixo, é:			

A sequencia correta, de cima para baixo, é:

mergulhante.

$$A \Rightarrow 3 - 5 - 1 - 4 - 2$$
 $C \Rightarrow 1 - 2 - 4 - 3 - 5$
 $B \Rightarrow 2 - 4 - 1 - 5 - 3$ $D \Rightarrow 1 - 3 - 2 - 5 - 4$

07) Assinale a alternativa que contém contraindicações para realizar laringectomia supracricóide.

A ⇒ Invasão do pecíolo da epiglote, invasão paraglótica.

B ⇒ Invasão da comissura anterior, doença linfonodal extensa.

C ⇒ Invasão da comissura anterior, invasão do espaço interaritenoideo.

D ⇒ Paralisia da articulação cricoaritenoidea unilateral, invasão subglótica anterior maior que 1 cm.

08) Assinale a alternativa correta.

A ⇒ Invasão da comissura anterior não apresenta importância na definição do tratamento do câncer de laringe.

B ⇒ A presença de traqueostomia é um dos fatores preditivos de pior resposta ao tratamento rádio e quimioterápico no câncer de laringe.

C ⇒ A radioterapia não aumenta a incidência de disfagia após o tratamento do câncer de laringe.

D ⇒ Invasão da musculatura pré-tireoideana no câncer de laringe é contraindicação para o tratamento cirúrgico.

09) Marque com V as afirmações verdadeiras e com F as falsas.

- () A invasão do espaço interaritenoideo é uma contraindicação para a realização da laringectomia subtotal descrita por Bruce Pearson.
-) A paralisia da articulação cricoaritenoidea unilateral é uma contraindicação para a realização da Laringectomia subtotal descrita por Bruce Pearson.
- () A qualidade vocal da laringectomia supraglótica é superior quando comparada a da laringectomia supracricóide.
- () A laringectomia supraglótica não é indicada em casos de resgate, onde não houve uma resposta completa ao tratamento com rádio e quimioterapia.
-) A broncoaspiração é uma complicação frequente em cirurgias parciais e subtotais da laringe.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

 $A \Rightarrow V - F - V - F - V$ $C \Rightarrow V - V - F - V - F$ $B \Rightarrow F - F - F - F - V$ $D \Rightarrow V - V - V - V - V$

10) Assinale a alternativa correta.

A ⇒ A linfadenectomia cervical profilática para os tumores do trato aerodigestivo superior deve ser considerada sempre que a incidência de metástase no nível de drenagem é maior que 20%.

B ⇒ A invasão da artéria carótida comum é contraindicação absoluta para realizar esvaziamento cervical.

C ⇒ A ressecção do nervo espinhal é comum nas linfadenectomias seletivas.

D ⇒ Invasão da musculatura pré-tireoideana no câncer de laringe é contraindicação para laringectomia total.

11) Assinale a alternativa correta.

A ⇒ A região subglótica é o local mais frequente de estenose pós traqueostomia.

B ⇒ A cricotireoidostomia é o procedimento de urgência de escolha para aquisição de via aérea pérvia em pacientes com câncer de laringe.

C ⇒ A insuflação do balão da cânula de traqueostomia com uma pressão maior que 20 mmHg aumenta a incidência de estenose de traqueia.

D ⇒ Traqueostomia, por ser um procedimento cirúrgico, sempre deve ser realizado dentro de um centro cirúrgico e sob anestesia geral.

12) Assinale a alternativa correta.

A ⇒ A presença de metástase cervical em câncer de boca, quando tratado corretamente, não altera o prognóstico do paciente.

B ⇒ O esvaziamento cervical radical para um tumor de boca engloba os níveis I, II, III e IV.

C ⇒ O melhor método para diagnóstico de metástase cervical é a tomografia computadorizada.

D ⇒ O esvaziamento cervical seletivo para um tumor de boca engloba os níveis I, II e III.

13) Para qual dos pacientes abaixo você **não** indicaria Punção Aspirativa com Agulha Fina?

A ⇒ Masculino, 54 anos, oroscopia, laringoscopia e rinoscopia normais, linfonodomegalia de consistência endurecida de 2,5 cm de diâmetro em nível II à direita.

B ⇒ Masculino, 36 anos, nódulo sólido hiperecogênico, medindo 0,6 cm de diâmetro, terço inferior do lobo direito da tireóide, vascularização periférica do nódulo ao Doppler.

C ⇒ Feminino, 24 anos, nódulo cístico em lobo direito da tireoide de 3,6 cm de diâmetro.

D ⇒ Feminino, 58 anos, câncer de mama à direita tratado há 3 anos, nódulo supraclavicular à direita.

14) Para qual dos pacientes abaixo você não indicaria qualquer tipo de linfadenectomia?

A ⇒ Carcinoma epidermóide de borda de língua, com 4 cm de extensão, sem linfonodomegalia cervical na ultrassonografia.

B ⇒ Carcinoma medular de tireoide em lobo direito, tumor de 2,5 cm de diâmetro sem extravasamento da cápsula da glândula.

 C ⇒ Carcinoma papilífero de tireoide, com 1,5 cm de diâmetro, sem extravasamento da cápsula da glândula, sem metástase cervical na exploração cirúrgica. D ⇒ Carcinoma epidermóide de laringe com invasão grosseira da cartilagem tireóide.
15) Paciente do sexo feminino, 35 anos de idade, com nódulo de tireoide de 0,9 cm de diâmetro, sem linfonodomegalia cervical. A PAAF mostrou Carcinoma Papilífero.
Qual a alternativa que contém um tratamento que jamais deve ser indicado para esta paciente?
 A ⇒ Tireoidectomia parcial. B ⇒ Tireoidectomia total. C ⇒ Tireoidectomia total e iodo radioativo adjuvante. D ⇒ Nodulectomia.
16) Marque com V as afirmações verdadeiras e com F as falsas.
() O retalho miomucoso de músculo bucinador é uma boa indicação para defeitos do assoalho ante- rior e lateral da boca, principalmente em pacientes edêntulos.
 O retalho fasciocutâneo de vasos perfurante da artéria supraclavicular é uma boa opção para defeitos da cabeça e pescoço, inclusive na reconstrução da faringe.
 O retalho microcirúrgico fasciocutâneo de vasos perfurantes da artéria epigástrica inferior profun- da é uma boa opção para reconstrução após glossectomia total.
() Retalhos microcirúrgicos de escápula e fíbula são boas opções para reconstrução maxilar.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
$\mathbf{A} \Rightarrow V - V - V - V$ $\mathbf{B} \Rightarrow F - V - F - V$ $\mathbf{D} \Rightarrow V - V - F - V$
17) Sobre metástases cervicais e esvaziamento cervical, é correto afirmar:
 A ⇒ As metástases cervicais do câncer de rinofaringe devem ser tratadas primeiramente com cirurgia nos casos que apresentarem um diâmetro maior que 3 cm ou sinais radiológicos de ruptura capsular. B ⇒ A presença de metástase cervical em carcinoma bem diferenciado da tireoide diminui aproximadamente em 17% a sobrevida dos pacientes. C ⇒ A presença de metástase cervical em carcinoma epidermoide de boca diminui aproximadamente em 50% a sobrevida dos pacientes.
D ⇒ A ruptura capsular e as micrometástases não apresentam importância prognóstica nos carcinomas epidermoides da laringe.
18) Em relação à indicação de paratireoidectomia em casos de hiperparatireoidismo primário, marque com V as afirmações verdadeiras e com F as falsas.
() Calcemia maior que 12 mg/dl
 () Nefrolitíase () Osteopenia diagnosticada na densitometria óssea
() Osteíte fibrosa cística
() Hipercalciúria (maior que 400 mg/dl)
A sequência correta , de cima para baixo, é:
$\mathbf{A} \Rightarrow F - V - F - V - F$ $\mathbf{C} \Rightarrow V - V - F - V - V$ $\mathbf{B} \Rightarrow V - V - F - F - F$ $\mathbf{D} \Rightarrow F - F - F - V - F$

23) Em Santa Catarina, por determinação do Tribunal Superior Eleitoral, no próximo dia 03 de março de 2013 alguns municípios terão uma renovação de eleições municipais. Portanto acontecerá uma nova eleição para Prefeito e Vice-prefeito. Identifique quais são estes municípios.

_	ão, Campos Novos, Criciúma e Tangará. ão, Campo Erê, Criciúma e Tangará.					
C ⇒ Balneário Piçarras, Campo Erê, Criciúma e Tangará.						
•	o Norte, Lages e Lebon Régis.					
24) Em razão de sua	a vocação para a pesca o município de Itajaí (SC) é conhecido nacionalmente como:					
A ⇒ a capital brasile	eira da Pesca.					
B ⇒ a capital brasile	eira da pesca do Atum.					
C ⇒ a capital brasile	eira da pesca da Sardinha.					
D ⇒ a capital nacion	nal do Camarão.					
25) A Copa das Cor mês de:	nfederações de futebol em 2013 será disputada no Brasil. O evento acontecerá no					
A ⇒ Agosto.	C ⇒ Junho.					
$\mathbf{B} \Rightarrow \text{Julho}.$	D ⇒ Setembro.					
para transmitir o ser blica Federativa do E	ninos são manifestações gráficas e musicais de importante valor histórico, criadas entimento de união nacional e mostrar a soberania do país. A Constituição da Repú-Brasil estabelece que o Brasil possui símbolos oficiais. cionais oficiais, exceto:					
_	ública e o Selo Nacional.					
•	esfera cujo raio tem 5 cm. Assinale a alternativa que representa o valor do volume ual esta esfera pode ser inserida. $\mathbf{C}\Rightarrow 1250~\text{cm}^3$ $\mathbf{D}\Rightarrow 100~\text{cm}^3$					
no primeiro dia, por a Considerando qu tém o número de dia	o veículo passou por um teste de desempenho no qual ele foi conduzido por 10 km 20 km no segundo dia, por 40 km no terceiro dia e assim por diante. e no último dia de testes o veículo rodou 5120 km, assinale a alternativa que conse em que foram realizados testes.					
	⇒ 10					
29) João sempre me dade que passei a n	ente. Ao ser questionado se tinha passado a noite em casa João disse: "Não é veroite fora de casa."					

Considerando as afirmações acima podemos concluir que:

A ⇒ João não passou a noite em casa.

B ⇒ João não está mentindo.

C ⇒ João passou a noite em casa.

D ⇒ João não passou a noite fora de casa.

30) Antônio costuma organizar partidas de voleibol com seus amigos. Em uma determinada tarde estão prontos para jogar oito pessoas, dentre elas Antônio.

Assinale a alternativa que contém a quantidade de formações diferentes que podem ser feitas para um time de seis jogadores considerando que Antônio sempre joga.

 $\mathbf{A} \Rightarrow 7$ $\mathbf{C} \Rightarrow 56$

 $\mathbf{B} \Rightarrow 28$ $\mathbf{D} \Rightarrow 21$

31) Se Maria é artista, então Ana é médica. Se Ana é médica, então Isa é engenheira. Ora, Isa não é engenheira, logo:

A ⇒ Ana é médica e Isa não é engenheira.

B ⇒ Maria é artista e Ana é médica.

C ⇒ Maria não é artista e Ana não é médica.

D ⇒ Maria não é artista e Ana é médica.

32) Uma pesquisa foi realizada com um grupo de 50 pessoas a respeito de suas opiniões sobre dois candidatos ao governo. Deste grupo, 30 pessoas simpatizam com o candidato A, 20 simpatizam com o candidato B e 15 simpatizam com ambos os candidatos.

Assinale a alternativa que contém o número de pessoas que não simpatizam com nenhum dos dois candidatos.

 $\mathbf{A} \Rightarrow 10$ $\mathbf{C} \Rightarrow 25$

 $\mathbf{B} \Rightarrow 15$ $\mathbf{D} \Rightarrow 20$