

PREFEITURA DE ORLEANS
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013
CARGO DE MEDICO DA SAÚDE DA FAMÍLIA

CONHECIMENTOS GERAIS

PORTUGUES:

1. Assinale a alternativa correta em relação ao uso do verbo e de seu respectivo pronome:

- a) Nós se decepcionamos com o show daquele artista.
- b) Não vá a lugar nenhum sem eu, isso é uma ordem!
- c) Encontrei ele saindo do bar e fiquei preocupada.
- d) **Eu o convidei para sair.**
- e) Nenhuma das alternativas

2. Assinale a alternativa que apresenta a grafia correta de todas as palavras:

- a) **pusesses, cheirosa, atrás, através**
- b) quis, possui, pesquisa, encharcado
- c) enchada, creolina, seringa, atrasado
- d) faixa, feixe, caixa, chingar
- e) caixa, possui, seringa, enchada

3. Complete as frases abaixo e depois assinale a alternativa verdadeira:

I. Sentei na..... do cavalo e prenderam-me nadaquela prisão.

II. Eu..... o equipamento.

III. Meus....., senhora, seu filho passou no vestibular.

IV. Agi com..... diante daquela situação complicada.

- a) **sela/cela – concerto – cumprimentos – descrição**
- b) cela/sela – concerto – cumprimentos – descrição
- c) cela/sela – concerto – cumprimentos – descrição
- d) sela/cela – concerto – cumprimentos – descrição
- e) nenhuma das alternativas está correta

4. O uso da crase está correto em todas as proposições, exceto em:

- a) À meia-noite os fogos iluminavam a bela Ilha do Mel.
- b) Obedecer às leis de trânsito é vital.
- c) Referiu-se às pessoas que se faziam presentes.
- d) **Fui à Paris em setembro do ano passado.**
- e) Todas as alternativas estão incorretas.

5. Assinale a opção em que todas as palavras possuem dígrafo:

- a) queijo, perto, guerra, casa
- b) mexer, manchar, florescer, quantos
- c) **cachaça, verruga, bainha, passagem**
- d) volta, aquilo, valsa, concha
- e) todas não possuem dígrafo

PREFEITURA DE ORLEANS
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013
CARGO DE MEDICO DA SAÚDE DA FAMÍLIA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

1. É contra-indicação absoluta para o uso de terapia hormonal no climatério:

- a) Diabetes mellitus;
- b) Obesidade;
- c) Insuficiência hepática grave;**
- d) HTA;
- e) Osteoporose.

2. Sobre os aspectos educativos da atividade médica, é correto afirmar que:

- a) Uma relação mais horizontal e de diálogo amigável e solidário entre médico e pacientes em geral prejudica os aspectos educativos da atividade médica, que requerem firmeza e autoridade na orientação dos doentes.
- b) Os médicos da atenção primária à saúde devem delegar as tarefas educativas para a enfermagem e os agentes comunitários de saúde, supervisionando-os, onforme diretrizes da Estratégia Saúde da Família.
- c) Entrar em acordo com o doente sobre a natureza dos seus principais problemas de saúde e construir conjuntamente com ele um plano realista de manejo terapêutico, adaptado à sua realidade e à sua vivência pessoal e cultural melhora a relação médico-paciente e a efetividade educativa da atividade médica.
- d) A parceria e intimidade da relação médico-paciente não tem relação com maior efetividade educativa do médico.
- e) Diferenças culturais e de experiência de vida entre profissional e usuários devem ser relevadas, pois há evidências de que a efetividade das ações educativas dos médicos dependem fundamentalmente da qualidade científica das informações transmitidas aos pacientes.

- a) Opção “a”;
- b) Opção “c”;**
- c) Opção “d”;
- d) Opção “e”;
- e) Opções “a” e “c”.

3. São contra-indicações absolutas ao uso da pílula anticoncepcional na adolescência, EXCETO:

- a) Hipertensão arterial leve ou moderada;**
- b) Câncer de mama;
- c) Hepatopatia aguda;
- d) Fenômenos tromboembólicos;
- e) Todas estão corretas.

PREFEITURA DE ORLEANS
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013
CARGO DE MEDICO DA SAÚDE DA FAMÍLIA

4. Adolescente de 16 anos vai ao consultório para saber qual método anticoncepcional ela poderia usar. A paciente relata ao médico que faz uso de anticonvulsivantes (fenobarbital e hidantoína), é diabética insulino-dependente mal controlada, nulípara. Após exame minucioso o médico resolve indicar:

- a) Pílula pós-coito;
- b) Dispositivo intrauterino (DIU);
- c) Mini pílula;
- d) Preservativo;
- e) **Todas.**

5. Durante a consulta pré-natal de rotina. Uma primigesta de 20 anos de idade, com 16 semanas de gestação traz os seguintes resultados de exames laboratoriais: Glicemia 74 mg/dL, Hb 12gr/dL, VDRL (+) FTA – Abs (+). Ao examinar a paciente o médico constatou algumas erupções cutâneas, e condiloma plano, o restante do exame físico era normal. A conduta a seguir quanto a tratamento da doença é:

- a) Penicilina Benzatina 2,4 milhões UI, via intramuscular em dose única;
- b) Penicilina Benzatina 2,4 milhões UI, via intramuscular semanalmente, dose total 7,2 milhões UI;
- c) Penicilina Benzatina 2,4 milhões UI, dose total 9,6 milhões UI;
- d) **Penicilina Benzatina 2,4 milhões UI, via intramuscular repetida após uma semana, dose total 4,8 milhões UI;**
- e) Amoxicilina 4g dose única.

6. Paciente na 9a semana de gestação apresenta sorologia para toxoplasmose Ig G e Ig M negativas. A melhor conduta a seguir é:

- a) Seguimento pré-natal rotineiro;
- b) Realizar pesquisas de Ig M no sangue fetal e espiracinamina;
- c) **Repetição da sorologia de 2/2 meses e orientação higiênicodietética;**
- d) Encaminhar ao serviço de medicina fetal para melhor Avaliação;
- e) Sorologia pós-nascimento.

7. Paciente no puerpério consulta ao médico porque deseja usar anticoncepcional; a paciente informa que o RN está com 01 mês de vida e está dando exclusivamente leite materno. Qual é a melhor opção de contraceptivo hormonal que o médico indica?

- a) Contraceptivo combinado oral de baixa dosagem;
- b) Contraceptivo combinado oral ou injetável de media dosagem;
- c) **Contraceptivo com progestágeno somente;**

PREFEITURA DE ORLEANS
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013
CARGO DE MEDICO DA SAÚDE DA FAMÍLIA

- d) Contraceptivo Combinado oral ou injetável de baixa dosagem;
- e) Contraceptivo oral a base de estrogênio.

8. Com relação à enterobiose (verminose transmitida pelo *Enterobius vermiculares*) é CORRETO afirmar que:

- a) Em crianças de baixa idade, pode ocorrer prolapso retal;
- b) A procura de ovos no exame de fezes tem positividade alta;
- c) O prurido anal é a manifestação clínica mais típica;
- d) O tratamento é feito com metronidazol;
- e) Ocasiona dor abdominal crônica associada com diarreia.

9. O uso de betabloqueadores está contra-indicado na seguinte patologia, EXCETO:

- a) Asma;
- b) Bloqueio Atrioventricular de segundo e terceiro grau;
- c) Angina;
- d) Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (D.P.O.C);
- e) Bradicardia sinusal.

10. Uma das complicações de colecistite litíase é o íleo biliar. O local mais freqüente de obstrução por íleo biliar é:

- a) Duodeno;
- b) Reto;
- c) Íleo terminal;
- d) Sigmóide;
- e) colédoco.

11. Sobre os princípios fundamentais ou doutrinários do SUS, abaixo mencionados entre aspas, é correto afirmar:

- a) “Integralidade” significa que em todos os serviços de saúde devem ser prestados todos os cuidados necessários ao atendimento integral das necessidades de saúde do usuário.
- b) “Equidade” significa que o pagamento dos serviços deve ser justo e proporcional à condição econômica do doente.
- c) “Participação popular” significa que a população tem o direito de participar de todas as campanhas preventivas promovidas pelos serviços públicos de saúde.
- d) “Hierarquização” significa que deve haver uma hierarquia profissional na administração pública, com os médicos nas chefias dos serviços que prestam assistência médica.

PREFEITURA DE ORLEANS
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013
CARGO DE MEDICO DA SAÚDE DA FAMÍLIA

e) “Universalidade” significa que o cuidado à saúde é direito de todos e, portanto, o acesso deve ser universal aos serviços públicos de saúde, sem distinções ou privilégios de raça, classe social, etnia, situação trabalhista, etc.

- a) somente a opção “c”;
- b) Opção “a” e opção “e”;
- c) Opção “e”, “d” e “e”;
- d) Somente a opção “d”;
- e) **Somente a opção “e”.**

12. São critérios de encaminhamento de unidades básicas de saúde para unidades de referência especializada os seguintes itens, EXCETO:

- a) **Pacientes com hipertensão arterial moderada;**
- b) Pacientes com lesões vasculares de extremidades, incluindo pé diabéticos;
- c) Pacientes com infarto agudo do miocárdio recente;
- d) Pacientes gestantes com Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus;
- e) Pacientes (crianças) com gastroenterite aguda.

13. Dos medicamentos usados para tratamento profilático de enxaquecas estão incluídos, EXCETO:

- a) **Sumatriptano;**
- b) Fluranizina;
- c) Acido Valpróico;
- d) Propanolol;
- e) Paracetamol 750 mg.

14. O uso de anticoncepcional oral de emergência na adolescência, após coito desprotegido é seguro quando usado após a relação sexual até o período de:

- a) 36 horas;
- b) **72 horas;**
- c) 24 horas;
- d) 48 horas;
- e) 12 horas.

15. A vacina contra a Hepatite B deve ser aplicada. Marque a resposta CORRETA:

- a) Ao nascer, com dois meses de vida, aos três meses de vida e aos seis meses de vida;
- b) **Ao nascer, com um mês de vida e aos seis meses de vida;**
- c) Aos quatro meses de vida, aos seis meses de vida e aos nove meses de vida;
- d) Ao nascer, com quatro meses de vida e aos nove meses de vida;

PREFEITURA DE ORLEANS
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013
CARGO DE MEDICO DA SAÚDE DA FAMÍLIA

e) Ao nascer, com seis meses e aos nove meses de vida.

16. Paciente diabético insulino-dependente utiliza combinação de insulina NPH e regular antes do café e jantar e vem apresentando hiperglicemia matinal, com níveis satisfatórios nos outros horários. A medida a ser adotada no caso é:

I - Solicitar hemoglobina glicosilada.

II - Realizar determinação de glicemia digital às três horas da madrugada.

III - Aumentar a dose de insulina regular antes do jantar.

IV - Suprimir o lanche noturno.

V - Trocar o esquema para insulina glargina.

Temos item certo:

a) I.

b) II.

c) III.

d) I e III

e) Nenhum item está certo.

17. Paciente de 52 anos, tabagista há 40 anos /um maço diário, em tratamento prévio para DPOC, vem apresentando há uma semana piora da tosse, com escarro amarelado em grande quantidade, febre, dispnéia mais intensa e sibilância. Em relação a esses sintomas é correto afirmar que:

I - trata-se da evolução normal da DPOC, sendo necessário apenas uso de broncodilatador de alívio.

II - Nesse caso a solicitação de exames com radiografia do tórax e gasometria não é necessária.

III - Os sintomas são de exacerbação da DPOC, provavelmente de origem infecciosa.

IV - No tratamento de exacerbação os antibióticos nunca são necessários.

V - Indica-se a avaliação funcional por espirometria de urgência.

Pergunta-se:

a) I está correto;

b) II, III e apenas IV estão corretos;

c) **Apenas III está correto;**

d) I, II, III, IV e V estão corretos;

e) Apenas opção V.

PREFEITURA DE ORLEANS
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013
CARGO DE MEDICO DA SAÚDE DA FAMÍLIA

18. A cefaléia que se manifesta durante o sono, de início e desaparecimento súbitos, duração inferior a uma hora e acompanhada de lacrimejamento geralmente é:

- a) **histamínica cluster;**
- b) enxaqueca;
- c) epiléptica;
- d) tensional.
- e) vaso motora

19. A neoplasia que se associa com maior freqüência à trombose venosa e embolia pulmonar é originária de:

- a) **pâncreas**
- b) mama
- c) estômago
- d) pulmão
- e) fígado

20. A presença de febre, aumento de volume da tireóide, sinais discretos de hipertireoidismo associado a T3 e T4 elevados no soro, com capacitação baixa de iodo radioativo sugere:

- a) doença de Basedow-Graves;
- b) uso indevido de hormônio tireoidiano;
- c) manifestação tardia de tireoidite do Hashimoto;
- d) **tireoidite subaguda;**
- e) Hipotireoidismo secundário