



P.M. Ouroeste
Processo Seletivo Simplificado 02/2013

INSTITUIÇÃO
SOLER
DE ENSINO

CARGO:
MÉDICO DO PSF

INSCRIÇÃO Nº: _____

ASSINATURA DO CANDIDATO:

Cargo: Médico do PSF

Língua Portuguesa

01. Observe o período:

“(…) via-se em todas as faces pintado o espanto e o terror.” (AH)

O sujeito é:

- a) Em todas as faces.
- b) O espanto A.
- c) O terror.
- d) O espanto e o terror.

02. A palavra “pintado”, na questão acima, quanto à sua classe gramatical, é um:

- a) Verbo.
- b) Adjetivo.
- c) Advérbio.
- d) Substantivo.

03. Assinale a alternativa que apresenta erro:

- a) Era uma vez um mundo muito distante.
- b) Fazem três anos que não a vejo.
- c) Existiam várias razões para a sua partida.
- d) Faltam dois dias para o embarque.

04. Empregando-se à, a, às ou as, conforme o caso, obtém-se:

“Primeiro foi ___ Portugal, depois ___ Espanha, Bélgica e, então ___ Itália, de onde regressou ___ suas atividades rotineiras.

- a) à, à, a, as
- b) à, à, a, às
- c) a, à, à, às
- d) a, a, a, as

05. Em “Sabe-se apenas que vai chover”, a palavra grifada constitui um/uma:

- a) Pronome.
- b) Preposição.
- c) Conjunção.
- d) Interjeição.

06. Em “Para eu ler os livros e revistas preciso de silêncio”, a palavra grifada constitui um/uma:

- a) Locução.
- b) Conjunção.
- c) Interjeição.
- d) Preposição.

07. Escreva, dentro dos parênteses, (I), (G) ou (P), conforme a forma verbal esteja no infinitivo, gerúndio ou particípio, respectivamente:

- vendido ()
- cantando ()
- cantado ()
- aceso ()
- ido ()
- rir ()

A sequência correta é:

- a) P - G - P - P - P - I.
- b) I - G - I - P - I - P.
- c) G - G - G - I - I - I.
- d) P - G - P - I - P - P.

08. Quanto à sua formação, a palavra “burocracia”, em “Odeio a burocracia dos dias atuais”, é formada por:

- a) Justaposição.
- b) Aglutinação.
- c) Derivação.
- d) Hibridismo.

09. Marque a opção que mais se ajusta, tendo em vista o significado do latinismo grifado:

“Para o Sr. Renato Castelo Branco, presidente da Agência CBB, a capacidade aquisitiva, em termos de renda per capita média,

prova que houve, no Brasil, um progresso imenso.” (JB, 1º Cad., p. 7, 17/01/2007).

- a) Renda dos resultados médios.
- b) Renda da classe média.
- c) Renda média das grandes capitais.
- d) Renda para cada indivíduo.

10. Numere os períodos, ordenando-os de modo a formar um texto coerente e marque a alternativa que contém a sequência correta:

() Entretanto, ao final e ao cabo, ele é um eterno frustrado com as insuficiências desse mesmo poder público, quando posto o desempenho desse em confronto com as expectativas tão largas da maioria dos cidadãos.

() Evidência disso é que desde as providências mais corriqueiras, a autenticação de um documento, até as mais úteis ou emergenciais, como a solução de uma disputa contra o outro cidadão, ou rápido atendimento numa emergência médica, o Estado estende seus enormes braços, seja para acolher, colaborar ou massacrar o indivíduo posto sob seu domínio.

() Desde que nasce até quando morre, e mesmo depois disso, o cidadão vive à sombra do Estado, representado pela soma dos poderes públicos interferentes em sua vida.

() No Brasil, essa discussão é apaixonada e recorrente. Por cacoete histórico, o brasileiro espera do poder público.

() Por isso, nas democracias, é natural e compreensível a discussão sobre o tamanho e os papéis do estado, especialmente quando o calendário político se aproxima da renovação dos mandatos daqueles que assumem a função política de representar e conduzir as missões do governo.

(Baseado em Paulo Rabello de Castro)

- a) 3, 2, 1, 5, 4.
- b) 1, 3, 5, 2, 4.
- c) 2, 3, 5, 4, 1.
- d) 5, 2, 1, 4, 3.

Conhecimentos Específicos

11. O contato da criança com o serviço de saúde, independente do fato ou queixa que o motivou, deve ser tido como uma oportunidade para a análise integrada e preditiva de sua saúde e de realização de promoção da saúde. O acompanhamento sistemático do crescimento da criança constitui o eixo central desse atendimento. Qual é o calendário mínimo de consultas que o médico de saúde da família deve fazer à criança no primeiro ano de vida? Assinale a alternativa correta:

- a) Seis, a primeira com 15 dias, a segunda no 2º mês, a terceira no 4º mês, a quarta no 6º mês, a quinta no 9º mês e a sexta no 12º mês.
- b) Seis, a primeira com 10 dias, a segunda no 1º mês, a terceira no 2º mês, a quarta no 4º mês, a quinta no 6º mês e a sexta no 12º mês.
- c) Sete, a primeira com 7 dias, a segunda no 1º mês, a terceira no 2º mês, a quarta no 4º mês, a quinta no 6º mês e a sexta no 9º e a sétima no 12º mês.
- d) Sete, a primeira com 15 dias, a segunda no 1º mês, a terceira no 2º mês, a quarta no 4º mês, a quinta no 6º mês e a sexta no 9º e a sétima no 12º mês.

12. O olhar atento dos profissionais de saúde da família e de todos os que acompanham a criança para o processo de seu desenvolvimento é fundamental para a promoção de maior qualidade de vida, seja no curso esperado do desenvolvimento, seja quando existam agravos já instalados. De acordo com a caderneta da criança adotada pelo Ministério da Saúde assinale a alternativa falsa:

- a) As megadoses de vitamina A devem ser oferecidas à criança de 4 em 4 meses. O intervalo mínimo seguro entre a administração de duas megadoses é de 3 meses.
- b) Os suplementos de vitamina A possuem duas concentrações: as cápsulas de 100.000 UI (amarelas) devem ser administradas às crianças de 6 a 11 meses.

- c) As cápsulas de 200.000 UI (vermelhas) de vitamina A são administradas às crianças de 12 meses a 4 anos e 11 meses.
- d) A partir do 6º mês até os 4 anos e 11 meses de idade, todas as crianças que residam em área de risco devem receber doses de vitamina A.

13. Ao longo dos dois últimos séculos, a revolução tecnológica e industrial, com consequências econômicas e sociais, resultaram em uma mudança drástica do perfil da morbimortalidade da população com grande predomínio das doenças e mortes devido às doenças crônicas não transmissíveis. O Ministério da Saúde vêm adotando várias estratégias e ações para reduzir o ônus das doenças cardiovasculares na população brasileira. Assinale a alternativa que não se encaixa nas estratégias para diminuição das doenças cardiovasculares adotadas pelo Ministério da Saúde.

- a) Medidas anti-tabágicas.
- b) Promoção da saúde com ênfase no adolescente.
- c) Políticas de alimentação e nutrição.
- d) Adoção da estratégia Saúde da família.

14. A prevalência mundial de asma brônquica em crianças e adolescentes oscila entre 5% e 22%, avaliada em estudo internacional que contou com dados de cinco capitais brasileiras. Em serviços de pediatria, a asma é responsável por aproximadamente 5% das consultas ambulatoriais e até 16% das consultas de emergência. Assinale a alternativa correta:

- a) A asma é uma doença crônica das vias aéreas que se manifesta por episódios de tosse produtiva, sibilância e dispnéia.
- b) Quando um indivíduo sensível é exposto a um estímulo nas vias aéreas há hipersecreção mucosa sem edema.
- c) Há uma imediata ativação de células inflamatórias e liberação de mediadores, quando em crise.
- d) Há contração da musculatura esquelética dos brônquios.

15. Quando se suspeita de diverticulite aguda qual exame deve ser contra indicado? Assinale a alternativa correta:

- a) Enema opaco.
- b) Radiografia simples de abdome.
- c) Tomografia computadorizada.
- d) Colonoscopia.

16. Malária é uma doença infecciosa febril aguda, causada por protozoários. Reveste-se de importância epidemiológica, por sua gravidade clínica e elevado potencial de disseminação, em áreas com densidade vetorial que favoreça a transmissão, a grande maioria dos casos ocorre na região amazônica, assinale a alternativa falsa:

- a) 75% dos casos são devidos ao Plasmodium vivax.
- b) Menos de 1% dos casos evolui para a morte.
- c) A maioria dos casos de morte são causadas pelo Plasmodium falciparum.
- d) O período de incubação varia de 14 a 21 dias.

17. Tontura e vertigem são condições muito frequentes na prática médica e na grande maioria das vezes, não estão associadas a problema clínico grave, assinale a alternativa errada:

- a) Vertigem é quando o paciente tem a sensação de que tudo está rodando ao redor dele ou que ele próprio está rodando.
- b) O nistagmo pode ser avaliado pela manobra de Siment.
- c) Tontura é um sintoma comum que o paciente geralmente refere quando se sente inseguro na sua movimentação ou posição em relação ao meio ambiente externo.
- d) O nistágmo de posição pode ser pesquisado pela manobra de Bárány.

18. O objetivo primordial do tratamento da hipertensão arterial é a redução da morbidade e da mortalidade cardiovascular do paciente hipertenso, aumentadas em decorrência dos altos níveis tensionais e de outros fatores agravantes. São utilizadas tanto as medidas não-farmacológicas isoladas como associadas a fármacos anti-hipertensivos. Os agentes anti-hipertensivos a serem utilizados devem promover a redução não só dos níveis tensionais como também a redução de eventos cardiovasculares

fatais e não-fatais. Reduções da PA para níveis inferiores a 130/85mmHg são recomendadas para situações específicas: dentre as alternativas abaixo assinale a alternativa que não é específica:

- a) Pacientes com baixo risco cardiovascular.
- b) Pacientes com microalbuminúria e com comprometimento renal.
- c) Pacientes com insuficiência cardíaca.
- d) Na prevenção secundária de acidente vascular cerebral.

19. Os agentes anti-hipertensivos exercem sua ação terapêutica através de distintos mecanismos que interferem na fisiopatologia da hipertensão arterial. Entretanto, a monoterapia inicial é eficaz em apenas 40% a 50% dos casos. Muitos pacientes necessitam a associação de fármacos anti-hipertensivos. Em se tratando de administração de doses diárias mínimas e máximas dos medicamentos, assinale a alternativa em que as doses não estão corretas.

- a) Propranolol 80 a 320 mg.
- b) Enalapril 5 a 40 mg.
- c) Hidroclorotiazida 12,5 a 50 mg.
- d) Furosemida 40 a 120 mg.

20. Os marcos do desenvolvimento contidos na Caderneta de Saúde da Criança, servem como subsídios para dialogar com a família, obtendo maiores informações sobre o que não puder ser observado durante a consulta e orientando para os cuidados necessários. Além disso, os cuidadores da criança devem ser orientados para que, os marcos do desenvolvimento sejam atentamente observados, possibilitando a prevenção de agravos e, quando necessário, realizando a intervenção o mais precocemente possível. Pensando em prevenção de agravos, assinale a alternativa correta de acordo com as orientações do Ministério da Saúde:

- a) O xarope de sulfato ferroso possui concentração de 25 mg de ferro elementar por ml, e o responsável pela criança deverá oferecer a ela 5 ml VO uma vez por semana, ininterruptamente, até os 24 meses de idade.
- b) A partir do 6º até o 18º mês de idade, o médico da Saúde da Família deve prescrever às crianças xarope de sulfato ferroso.
- c) O xarope de sulfato ferroso possui concentração de 25 mg de ferro elementar por ml, e o responsável pela criança deverá oferecer a ela 5 ml VO duas vezes por semana, ininterruptamente, até os 18 meses de idade.
- d) A partir do 6º até o 24º mês de idade, o médico da Saúde da Família deve prescrever a todas as crianças xarope de sulfato ferroso.