

Texto: **O Brasil na rota dos remédios falsificados**
Alan Rodrigues (alan@istoe.com.br)

Um relatório divulgado recentemente pela Organização Mundial de Saúde (OMS) emitiu mais um ruidoso sinal de alerta sobre a debilitada saúde do País. Segundo o documento, 19% dos remédios comercializados por aqui são ilegais. A estimativa é que se vendam vinte medicamentos falsos em cada lote de 100. Eles são vendidos em feiras, bancas de ambulantes, pela internet e, inclusive, nas farmácias. E chegam ao Brasil vindos do Paraguai, China e Índia. Podem vir prontos para o consumo ou ainda na matéria-prima (o chamado princípio ativo) – que é manipulada em estabelecimentos clandestinos, sem a menor condição de higiene e geralmente elaborada na dose errada.

As consequências das ações dessa máfia bilionária são nefastas. De acordo com os pesquisadores da OMS, a pirataria de substâncias matou cerca de 700 mil pessoas no mundo em 2014 – não há dados específicos para o Brasil. É um problema que aflige governos e fabricantes no mundo todo, principalmente em período de crise econômica. “Como é mais barato, as pessoas acham que estão fazendo um bom negócio ao comprar medicamentos falsos. Não estão. As mortes estão aí para comprovar”, diz Edson Vismona, do Conselho Nacional de Combate à Pirataria. “É uma burrice consumir remédios ilegais”, afirma Anthony Wong, diretor médico do Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas de São Paulo. “Esse é um problema mundial de saúde, incluindo Estados Unidos e Europa, onde a vigilância é muito maior do que aqui.”

Existem três princípios determinantes para o sucesso da indústria de medicamentos falsos: mercado, preço e fiscalização falha. As estatísticas sobre o tamanho desse comércio clandestino mostram que, na última década, a falsificação e comercialização aumentaram 800%. Atualmente, o negócio, que rendeu US\$ 200 bilhões em 2014, cresce 13% ao ano. “Às vezes ele é mais rentável do que o tráfico de entorpecentes”, afirma o delegado da polícia federal de São Paulo André Luiz Previato Kodkaoglanian. “São quadrilhas ligadas diretamente às organizações criminosas internacionais.”

http://www.istoe.com.br/reportagens/437819_O+BRASIL+NA+ROTA+DOS+REMEDIOS+FALSIFICADOS, aceso em 14 de out. de 2015.

01) A ideia principal do texto é:

- (A) 19% dos remédios comercializados no Brasil são ilegais e falsos.
- (B) A falta de remédios nos postos de saúde e hospitais no Brasil.
- (C) A alta dos preços dos remédios.
- (D) A falta de organização do comércio de remédios no Brasil.
- (E) A indústria de remédios aliada aos

benefícios que os médicos recebem para indicá-los.

02) Marque a alternativa que contempla os três princípios para o sucesso da indústria farmacêutica falsificada:

- (A) mercado, preço alto e qualidade.
- (B) dificuldade para conseguir os remédios e fiscalização apurada.
- (C) indústria estrangeira, qualidade e fiscalização falha.
- (D) organização, preço baixo e qualidade.
- (E) mercado, preço e fiscalização falha.

03) Assinale a alternativa que aponta as consequências da ação da indústria farmacêutica falsificada:

- (A) O sucateio da saúde pública, pois o dinheiro dos remédios ajudam a manter os hospitais do país.
- (B) Cria dificuldades para encontrar os remédios verdadeiros, pois não se sabe mais quais são, devido à grande circulação de remédios falsificados.
- (C) Gera menos impostos para as indústrias farmacêuticas brasileiras, prejudicando a economia.
- (D) As pessoas compram remédios falsificados devido ao seu baixo preço e correm risco de morrer. Por conta disso, cerca de 700 mil pessoas morrem por sua ingestão.
- (E) Pela ingestão dos remédios, as pessoas desenvolvem deficiências com o tempo, podendo ficar cegas, surdas ou parar de andar, por exemplo.

04) Assinale a alternativa que substitui o termo sublinhado na frase abaixo, sem prejuízo do sentido:

“Às vezes ele é mais rentável do que o tráfico de entorpecentes”, afirma o delegado da polícia federal de São Paulo André Luiz Previato Kodkaoglanian.

- (A) difícil.
- (B) interessante.
- (C) lucrativo.
- (D) positivo.
- (E) determinante.

05) Assinale a alternativa, na qual os termos sublinhados, na oração abaixo, classificam-se, morfológicamente na ordem em que aparecem, como:

“Existem três princípios determinantes para o sucesso da indústria de medicamentos falsos: mercado, preço e fiscalização falha.”

- (A) adjetivo, numeral, substantivo.
- (B) substantivo, numeral, adjetivo.
- (C) numeral, substantivo, adjetivo.
- (D) conjunção, substantivo, numeral.

(E) numeral, pronome, adjetivo.

06) A palavra NEFASTAS, na oração abaixo, concorda com:

As consequências das ações dessa máfia bilionária são “nefastas”.

- (A) as consequências das ações.
- (B) elas.
- (C) ações.
- (D) dessa máfia.
- (E) nenhuma das alternativas anteriores.

07) O plural da oração sublinhada é:

O remédio vem pronto.

- (A) Os remédios veem prontos.
- (B) Os remédios vêm prontos.
- (C) Os remédios vem prontos.
- (D) Os remédios vêem prontos.
- (E) Os remédios vêm prontos.

08) Assinale a alternativa correta quanto ao tempo e modo dos verbos sublinhados na oração abaixo:

“As estatísticas sobre o tamanho desse comércio clandestino mostram que, na última década, a falsificação e comercialização aumentaram 800%.”

- (A) presente do indicativo, pretérito perfeito do modo indicativo.
- (B) presente do subjuntivo, pretérito perfeito do modo indicativo.
- (C) imperativo afirmativo, pretérito mais que perfeito do modo indicativo.
- (D) presente do indicativo, futuro do pretérito do modo indicativo.
- (E) imperativo negativo, pretérito perfeito do modo indicativo.

09) Assinale a alternativa em que o uso da crase está correto:

- (A) Os documentos devem ser entregues na portaria. Assina à gerência à noite.
- (B) Os documentos foram remetidos à Gerência.
- (C) Os remédios são destinados à todas as pessoas doentes nos postos de saúde.
- (D) À população precisa de remédios.
- (E) Foram à Portugal.

10) As palavras cujo acento se justifica pela mesma regra de “café” são:

- (A) Látex, patê.

- (B) Consórcio, secretária.
- (C) Pelé, filé.
- (D) Também, refém.
- (E) Centésimo, saúde.

11) Em uma comunidade constituída de 1800 pessoas, há três programas de TV, esporte (E), novela (N) e filme (F). A tabela abaixo indica quantas pessoas assistem cada tipo de programa:

Programas	E	N	F	E e N	N e F	E e F	E, N e F
Número de telespectadores	400	1220	1080	220	800	180	100

Assim, verifique usando a tabela, quantas pessoas não assistem nem um destes programas:

- (A) 400.
- (B) 100.
- (C) 300.
- (D) 200.
- (E) 500.


12) Foram entrevistadas 50 pessoas sobre suas preferências de duas marcas A e B. Onde os resultados foram: 21 pessoas disseram que usar a marca A, 10 pessoas responderam que usar a marca A e B e 5 pessoas não usam nem uma das marcas. Com estas informações quantas pessoas usam somente a marca B?

- (A) 24.
- (B) 30.
- (C) 44.
- (D) 35.
- (E) 15.

13) Analisando a sequência a seguir 1, 1, 2, 3, 5, 8, podemos dizer que o oitavo termo da sequência será?

- (A) 13.
- (B) 21.
- (C) 15.
- (D) 20.
- (E) 34.

14) Observe a figura a seguir:



Qual o próximo elemento da sequência?

(A)



(B)



(C)



(D)



(E) Nenhuma das alternativas anteriores.

15) Um vendedor é representante de uma marca que disponibiliza duas linhas de produtos, uma mais popular (produto A) e outra mais sofisticada (produto B). Para o produto A que custa R\$ 62,00 ele ganha uma comissão de 20% por unidade e para o produto B que custa R\$ 150,00 ele ganha uma comissão de 25% por unidade. Na venda de uma unidade de cada ele ganhará:

- (A) R\$ 50,00.
- (B) R\$ 50,10.
- (C) R\$ 48,90.
- (D) R\$ 49,50.
- (E) R\$ 49,90.

16) Certa empresa produz diariamente quantidades iguais do produto P. Se essa empresa usar três medidas iguais do componente A em cada unidade do produto final P, serão necessárias 480 dessas medidas para suprir a produção de P durante 2 dias. Se passar a usar 2,5 medidas de A em cada unidade de P, o número de medidas de A necessário para suprir a produção de P, durante 5 dias, será igual a:


- (A) 1100.
- (B) 980.
- (C) 1000.

- (D) 1250.
- (E) 1050.

17) Durante certa semana, uma loja de sapatos constatou que a razão entre o número de pares de sapatos vendidos de adultos e infantis foi de 3 para 7, nesta ordem. Sabendo-se que nessa semana foram vendidos ao todo 180 pares de sapatos, pode-se concluir que o número de pares de sapatos infantis superou o de adultos em:

- (A) 126 pares.
- (B) 72 pares.
- (C) 54 pares.
- (D) 100 pares.
- (E) 65 pares.

18) A figura abaixo mostra uma parede com alguns azulejos, onde os espaços em branco representam os azulejos que caíram. Sabendo que todos os azulejos são iguais e quadrados, então a razão dos azulejos que caíram e os que estão na parede é?



- (A) 2/5.
- (B) 4/5.
- (C) 5/3.
- (D) 3/5.
- (E) 4/3.

19) O preço de um produto sofreu um reajuste de 12% aumentando para R\$ 60,48. Qual era o preço desse produto antes do reajuste?

- (A) R\$ 50,24.
- (B) R\$ 54,24.
- (C) R\$ 54,00.
- (D) R\$ 52,24.
- (E) R\$ 52,00.

20) Sabendo que uma pessoa percorre 21km, sendo que destes ela faz 6 km a pé a 3 km por hora e 15 km de barco a 5 km por hora. Qual o tempo gasto no percurso?

- (A) 6 horas.

- (B) 4 horas.
- (C) 3 horas.
- (D) 7 horas.
- (E) 5 horas.

21) “Estão constantemente se renovando e se dividem continuamente, durante toda a vida do indivíduo, para substituir as células destruídas fisiologicamente. Seus principais representantes são as células dos epitélios de revestimento (epitélio da mucosa bucal, vagina, ducto, etc).”

O texto acima se refere a qual tipo de célula:

- (A) Células Estáveis.
- (B) Células Permanentes.
- (C) Células Troco.
- (D) Células Lábeis.
- (E) Células Embrionárias.

22) Sendo a obstrução respiratória a principal causa de mortalidade e morbidez nos pacientes com lesões maxilo-faciais, o anestesista deve focar sua avaliação inicial para o controle das vias aéreas.

Todas as alternativas abaixo apresentam alternativas para controlar um acesso para respiração numa urgência em que o paciente se encontre totalmente obstruído, exceto:

- (A) Um simples puxão da mandíbula e estabilização do pescoço.
- (B) Retração mandibular com estabilização de um abridor nasal.
- (C) Tração da mandíbula para frente.
- (D) Aplicação de uma pinça na porção anterior da língua para exteriorizá-la e abrir a orofaringe.
- (E) O maxilar deve ser puxado para frente e para cima no trauma do terço médio da face, quando uma fratura Lefort é a provável causa de obstrução.

23) Todas as alternativas abaixo apresentam corretos efeitos colaterais de ordem local que podem ocorrer na anestesia local, exceto:

- (A) Equimose.
- (B) Isquemia Facial.
- (C) Úlcera da Glote.
- (D) Cegueira Temporária.
- (E) Entrecruzamento do Olho.

24) Assinale a alternativa incorreta com relação à citologia esfoliativa:

- (A) Consiste no exame microscópico do material raspado da superfície da lesão da mucosa bucal.

(B) Pode ser realizada em lesões profundas cobertas por mucosa sadia, lesões com mucosa superficial necrosada ou hiperqueratinizadas.

(C) Possui a vantagem de ser rápido, o que diminui a ansiedade do paciente.

(D) É um procedimento simples, não invasivo onde não há necessidade do uso de anestesia.

(E) Apresenta limitações, o que torna sua indicação bastante precisa, sendo útil no auxílio (triagem) do diagnóstico de tumores malignos e alguns processos infecciosos.

25) “É um tipo de retalho que ocasionalmente é usado no palato. Esse retalho é planejado para ser movimentado de uma área e depois girado para preencher um defeito de tecidos moles em outra área. É usado principalmente para fechamento de comunicações bucossinusais.”

O texto acima se refere a qual tipo de retalho mucoperiosteais:

- (A) Envelope.
- (B) Quadrangular.
- (C) Três ângulos.
- (D) Triangular.
- (E) Pediculado.

26) Assinale a alternativa que apresenta o nome do antibiótico que apresenta como efeitos adversos: distúrbios gastrintestinais, a icterícia colestática como sinal de toxicidade hepática e efeitos adversos na paciente gestante:

- (A) Eritromicina.
- (B) Clindamicina.
- (C) Penicilina.
- (D) Ampicilina.
- (E) Tetraciclina.

27) O objetivo da cirurgia pré-protética é criar estruturas de suporte adequadas para subsequente colocação de aparelhos protéticos. O melhor suporte para dentadura apresenta as seguintes características:

- (A) Relação apropriada dos maxilares nos sentidos ântero-posterior, transversal e vertical.
- (B) Nenhuma evidência de condições patológicas intra ou extra-orais.
- (C) A forma ideal do processo alveolar tem a configuração de um amplo V, com os componentes o mais divergentes possível.
- (D) Nenhuma protuberância ou irregularidade nos tecidos ósseo ou mole.
- (E) Presença de mucosa queratinizada adequadamente aderida na área chapeável primária.

28) Assinale a alternativa que não está correta com relação ao procedimento Cirúrgico-Ortodôntico de tracionamento dental:

- (A) A técnica cirúrgica visa remover obstáculos mecânicos que estejam no trajeto de erupção do dente, expor a coroa dental dentro do osso e adaptar nela um dispositivo ortodôntico ligado a um fio de aço. Esse fio fica exposto na boca através da gengiva e preso ao aparelho ortodôntico, sem incomodar o Cliente.
- (B) Nas situações nas quais o elemento dental retido apresenta-se em posição favorável para erupção e com sua raiz ainda em fase de desenvolvimento (rizogênese incompleta), só não se concretizando pela presença de algum obstáculo mecânico. Nesses casos, apenas a remoção desta barreira e a manutenção do espaço na boca para a erupção passiva desse dente, sem auxílio da ortodontia, podem proporcionar excelentes resultados aos Clientes.
- (C) O tracionamento está indicado para dentes que estão mal posicionados dentro do osso e/ou que apresentem sua raiz desenvolvida (rizogênese completa). O estágio de desenvolvimento da raiz do dente e sua precisa localização devem ser definidos através de exames clínicos, radiográficos e tomográficos.
- (D) Quando a coroa do dente estiver exposta na cavidade bucal, após período aproximado de seis meses a um ano de tração, substitui-se o dispositivo adaptado pelo cirurgião na cirurgia por um braquete (peça do aparelho ortodôntico), com o objetivo de posicionar corretamente o dente na arcada dentária.
- (E) O tracionamento pode ser realizado com uma diversidade de aparelhos móveis e fixos. A força de tracionamento deve ser suave, ou seja, não ultrapassando 10 gramas, e pode ser produzida por molas ou elásticos.

29) Assinale a alternativa que não apresenta uma contra indicação local das cirurgias paraendodônticas:

- (A) Problemas periodontais severos, determinando suporte ósseo insatisfatório.
- (B) Ápices relacionados a reparos anatômicos de risco.
- (C) Ápices de difícil acesso cirúrgico.
- (D) Pacientes que receberam radiação nos maxilares.
- (E) Quando o tratamento ou retratamento do Canal Radicular for a forma mais conveniente e segura para a cura da lesão.

30) Assinale a alternativa incorreta com relação ao tratamento cirúrgico das infecções de origem odontogênicas:

- (A) O princípio básico para o tratamento de uma infecção odontogênica é a criação de uma via de drenagem para a coleção purulenta além, da remoção da causa, sendo provavelmente a drenagem o procedimento cirúrgico mais antigo.
- (B) O tratamento medicamentoso somente deve ser realizado isoladamente nos casos onde seja suficiente a administração de um antimicrobiano sem o tratamento definitivo do dente afetado.
- (C) A via de drenagem deverá ser mantida com a colocação de um dreno que permanecerá enquanto ainda houver secreção purulenta.
- (D) Nos casos de múltiplas lojas de infecção, pode-se manter mais de um dreno no local, ficando um em cada espaço. Nas drenagens extrabucais com mais de uma incisão, o dreno deverá comunicar as incisões.
- (E) Os drenos colocados após tratamento de infecções profundas deverão ser removidos gradualmente, poucos centímetros por dia, para permitir que a ferida seja reparada a partir da porção mais profunda até a superfície.

31) Assinale a alternativa incorreta com relação ao tratamento dos cistos do complexo maxilo mandibular:

- (A) A Enucleação preconiza a remoção total da cápsula cística e do seu conteúdo, visando à reparação por primeira intenção.
- (B) A Marsupialização visa à reparação por segunda intenção.
- (C) A Marsupialização está indicada para cistos grandes que ponham em risco estruturas nobres.
- (D) A técnica combinada trata-se da descompressão pela remoção da cápsula cística e consequente cessação da pressão interna, reduzindo consideravelmente o tamanho da lesão permitindo uma futura enucleação.
- (E) A Enucleação transforma o cisto em cavidade acessória à boca por meio da remoção de porções iguais de tecido gengival, tecido ósseo e da cápsula cística.

32) Todas as alternativas abaixo apresentam fatores que determinarão o tratamento para cada caso de malignidade da cavidade oral, exceto:

- (A) diagnóstico histopatológico.
- (B) localização do tumor.
- (C) sexo do paciente.
- (D) presença e grau de metástase.
- (E) radiosensibilidade do tumor.

33) Assinale a alternativa incorreta com relação ao Tumor Odontogênico Adenomatóide:

- (A) A maioria dos casos é diagnosticada em pacientes com mais de 50 anos de idade, com sintomatologia dolorosa e imagem radiográfica de radiotransparência multilocular.
- (B) Possui grande tendência para ocorrer na região anterior dos maxilares (principalmente maxila), sendo duas vezes mais comuns nas mulheres.
- (C) Na grande maioria dos casos o tumor apresenta-se como uma radiotransparência unilocular circunscrita, que envolve a coroa de um dente incluso (mais comumente um canino), podendo estender-se apicalmente à raiz do dente envolvido.
- (D) Histopatologicamente o tumor apresenta uma cápsula fibrosa espessa e estruturas epiteliais semelhantes a ductos – estruturas tubulares, sendo que os núcleos das células colunares polarizadas estão em direção oposta aos espaços centrais.
- (E) O tratamento baseia-se na enucleação do tumor.

34) Todas as alternativas abaixo apresentam o tempo de estabilização para cada injúria dentoalveolar, exceto:

- (A) dente com mobilidade – 3 a 4 semanas.
- (B) deslocamento dentário – 60 a 120 dias.
- (C) fratura radicular – 2 a 4 meses.
- (D) dente reimplantado maduro – 7 a 10 dias.
- (E) dente reimplantado imaturo – 3 a 4 semanas.

35) Pacientes com doença articular degenerativa podem se apresentar com, exceto:

- (A) Dor diretamente sobre a ATM.
- (B) Limitação de abertura da boca associado com clique ou crepitação.
- (C) Achados radiográficos revelam espaço articular reduzido e achatamento da cabeça do côndilo.
- (D) Espasmos musculares intensos.
- (E) Os sintomas se agravam com a função.

36) Assinale a alternativa que não apresenta uma indicação para se realizar uma biópsia:

- (A) Alterações hiperkeratóticas persistente na superfície dos tecidos.
- (B) Qualquer tumefação persistente, visível ou palpável sob tecido relativamente normal.
- (C) Qualquer lesão inflamatória que não responde ao tratamento local depois de 6 meses.

- (D) Lesões ósseas não identificadas especificamente por meio dos achados clínicos e radiográficos.
- (E) Lesões que interferem com a função do local.

37) O acesso cirúrgico Risdon é:

- (A) Pré-auricular.
- (B) Submandibular.
- (C) Retromandibular.
- (D) Intra oral maxilar.
- (E) Intra oral mandibular.

38) “Usada para localização das fraturas do arco zigomático; para pesquisa da integridade da parede posterior do seio maxilar; para o exame da mandíbula (processo coronóide e côndilo).” Assinale a alternativa que apresenta o nome da técnica radiográfica citada acima:

- (A) Telerradiografia Hirtz.
- (B) Waters.
- (C) Towner.
- (D) Standart.
- (E) Carpal.

39) Assinale a alternativa que não apresenta um procedimento que deve ser realizado nas primeiras etapas de atendimento ao paciente politraumatizado da face:

- (A) A primeira etapa na avaliação do paciente traumatizado é o exame cardiopulmonar, garantindo que ele esteja com as vias aéreas superiores desobstruídas e adequadamente ventilado.
- (B) Durante a fase inicial de avaliação, problemas que possam trazer risco à vida do paciente, como hemorragia de grandes proporções, devem ser cuidados.
- (C) Deve-se fazer uma avaliação do estado neurológico do paciente e um exame da coluna cervical.
- (D) A avaliação física das estruturas faciais deve ser imediatamente realizada de forma organizada e sequencial. O crânio e a face devem ser cuidadosamente inspecionados.
- (E) O pescoço deve ser imobilizado temporariamente até que as injúrias nessa região tenham sido adequadamente solucionadas.

40) Entre as sequelas mais comuns dos traumas Naso-Órbito-Etmoidal estão, exceto:

- (A) hipertelorismo.
- (B) enoftalmia.
- (C) síndrome da fissura nasal.
- (D) dacriocistite.
- (E) amaurose.