



LÍNGUA PORTUGUESA

Leia a matéria a seguir e a utilize para responder as perguntas seguintes:

QUE PAÍS...

Dissecando os gastos públicos no Brasil, um economista descobriu barbaridades no Orçamento da União deste ano. Por exemplo:

Considerada a despesa geral da Câmara, cada deputado federal custa ao país, diariamente, R\$ 3.700. Ou R\$ 1,3 milhão por ano.

Entre os senadores, a loucura é ainda maior, pois o custo individual diário pula para R\$ 71.900. E o anual, acreditem, para R\$ 26 milhões.

Comparados a outras "rubricas", os números beiram o delírio. É o caso do que a mesma União despense com a saúde de cada brasileiro – apenas R\$ 0,36 por dia.

E, com a educação, humilhantes R\$ 0,20.

(Ricardo Boechat, Jornal da Band, 6/11/01)

- Segundo o texto, quando se trata em "gastos públicos" se refere exclusivamente a:
 - Pagamentos com educação.
 - Salários dos cargos comissionados.
 - Gastos gerais do Governo.
 - Investimentos no setor oficial da câmara.
- O chamado Orçamento da União é um documento que:
 - Polariza os fatos e controvérsias.
 - É consultado apenas nos momentos de crise.
 - Tem a função de relatar de forma transparente a movimentação financeira do Governo.
 - Tem a função única e exclusiva de amenizar a situação do governo em momentos de falta de recursos.
- Os exemplos citados pelo jornalista:
 - Atendem a seu interesse jornalístico.
 - Indicam dados pouco precisos e irresponsáveis.
 - Acobertam problemas do Governo.
 - Mostram que os gastos com a classe menos favorecida são em demasia e desnecessários.
- Considerando o sentido geral do texto, o adjetivo que substitui de forma INADEQUADA os pontos das reticências do título do texto é:
 - Autoritário
 - Injusto
 - Estranho
 - Desigual
- O gerúndio da primeira frase pode ter como forma verbal desenvolvida adequada ao texto:
 - Entre tudo dissecasse.
 - Porque já dissecou.
 - Já que dissecou.
 - Enquanto dissecava.

- De acordo com o texto, na oração "Ou R\$ 1,3 milhão por ano."
 - O termo milhão deveria ser substituído por milhas.
 - A conjunção ou tem representação de retificação ao termo anterior.
 - O termo milhão concorda com a quantidade da fração.
 - Todas alternativas estão corretas.
- O item do texto em que o jornalista NÃO inclui termo que indique sua opinião sobre o conteúdo veiculado pelo texto é:
 - "...cada deputado federal custa ao país, diariamente, R\$3.700."
 - "Entre os senadores, a loucura é ainda maior..."
 - "...os números beiram o delírio."
 - "...um economista descobriu barbaridades no Orçamento da União..."
- "Comparados a outras 'rubricas', os números beiram o delírio."; o comentário correto sobre o significado dos elementos desse segmento do texto é:
 - O delírio refere-se aos gastos esbanjadores com coisas a não ser na saúde.
 - As outras rubricas referidas no texto são a educação e a saúde.
 - Comparados com a saúde, os gastos citados são justificados e coerentes.
 - Altos números referem-se à grande quantidade de governadores.

MATEMÁTICA

- Em um processo de embalagem de figurinhas, 10% das figurinhas possuem prêmios. As figurinhas são embaladas em envelopes com 5 unidades cada. A probabilidade de haver exatamente figurinha premiada em um envelope é de, aproximadamente:
 - 28%
 - 30%
 - 32%
 - 34%
- Uma motocicleta a uma velocidade de 80 km/h, gasta em um percurso 2h30min. Caso a motocicleta reduza a sua velocidade para 60 km/h, qual seria o tempo gasto para fazer este mesmo percurso?
 - 3h18min
 - 3h33min
 - 3h38min
 - 3h43min
- Observe a sequência abaixo e indique qual será o seu 8º elemento:
2, 3, 5, 8, (...)
 - 21
 - 34
 - 55
 - 89



12. Uma camiseta custa R\$ 42,25. Comprei no atacado 18 camisetas, e consegui um desconto de 16%. Quanto paguei pelas camisetas?

- A. R\$ 636,78
- B. R\$ 638,82
- C. R\$ 641,26
- D. R\$ 642,25

13. Um determinado automóvel gasta 45 litros de combustível para percorrer 585 quilômetros. Quantos litros este automóvel consumiria para percorrer 1/5 desta distância?

- A. 5 litros
- B. 7 litros
- C. 9 litros
- D. 11 litros

14. Ainda em relação ao automóvel da questão anterior, caso o consumo médio de combustível do automóvel melhorasse em 2 quilômetros percorridos a mais por litro de combustível, qual a distância que este automóvel iria percorrer, utilizando o mesmo combustível que foi utilizado antes para fazer 1/5 daquele percurso?

- A. 165 km
- B. 135 km
- C. 105 km
- D. 75 km

15. Observe os números abaixo e indique a média do grupo:

45 - 63 - 75 - 78 - 84 - 92 - 95

- A. 72
- B. 74
- C. 76
- D. 78

CONHECIMENTOS GERAIS

16. Qual a data da instalação oficial do Município de Rio do Oeste?

(Fonte: www.riodoeste.com.br)

- A. 23/06/1958
- B. 23/07/1958
- C. 31/01/1959
- D. 03/10/1958

17. O rompimento de uma barragem de uma mineradora causou um dos maiores desastres ambientais da história do Brasil, praticamente extinguindo toda a vida de um rio, até chegar ao mar, no Estado do Espírito Santo. Qual o nome da cidade mineira onde se localizava esta barragem?

(Fonte: www.uol.com.br)

- A. Paracatu
- B. Samarco
- C. Mariana
- D. Rio Doce

18. Em relação aos Símbolos do município de Rio do Oeste, qual o significado da "espada" do brasão municipal?

(Fonte: www.riodoeste.com.br)

- A. Simboliza a luta dos moradores contra as adversidades naturais que assolam o município.
- B. Simboliza o conflito ocorrido nas terras do município, quando da Guerra do Contestado.
- C. Simboliza uma homenagem aos imigrantes italianos, referenciando a sua terra de origem.
- D. Simboliza a luta dos pioneiros na conquista do sertão bravo.

19. Um dos assuntos em mais ênfase no momento é o processo de impeachment da atual presidente do Brasil. Qual presidente sofreu este processo e foi afastado do seu cargo no Brasil, em nossa história recente?

(Fonte: www.uol.com.br)

- A. Fernando Henrique
- B. Fernando Collor
- C. Itamar Franco
- D. José Sarney

20. Qual o nome do primeiro prefeito do Município de Rio do Oeste, nomeado quando da instalação oficial do município?

(Fonte: www.riodoeste.com.br)

- A. Massimo Girardi
- B. Leandro Bertoli
- C. Aderbal Ramos da Silva
- D. Adolfo Konder

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. A diarreia é definida como excesso de fezes superior a 200g ao dia. A maioria dos autores revisados classifica os episódios de diarreia em três categorias:

- A. Diarreia persistente (duração superior a 10 dias), diarreia crônica (duração superior a 30 dias) e ainda diarreia aguda (duração inferior a 10 dias).
- B. Diarreia persistente (duração superior a 14 dias), diarreia crônica (duração superior a 30 dias) e ainda diarreia aguda (duração inferior a 14 dias).
- C. Diarreia persistente (duração superior a 20 dias), diarreia crônica (duração superior a 60 dias) e ainda diarreia aguda (duração inferior a 20 dias).
- D. Diarreia persistente (duração superior a 14 dias), diarreia crônica (duração superior a 60 dias) e ainda diarreia aguda (duração inferior a 14 dias).

22. Segundo os critérios de classificação propostos pelo American College of Rheumatology considera-se comprometimento renal no Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) a presença de:

- A. Proteinúria persistente (> 0,2 g/dia ou 2+) ou cilindrúria anormal.
- B. Proteinúria persistente (> 0,3 g/dia ou 2+) ou cilindrúria anormal.
- C. Proteinúria persistente (> 0,4 g/dia ou 3+) ou cilindrúria anormal.
- D. Proteinúria persistente (> 0,5 g/dia ou 3+) ou cilindrúria anormal.



23. O ambiente socioeconômico é o principal responsável pela chance de desenvolver doença reumática e também está relacionada à qualidade do cuidado cardiovascular oferecido a população. É estimado que um número importante de pacientes não tem diagnóstico de febre reumática. A cardiopatia reumática é uma causa prevenível de Insuficiência Cardíaca, sendo o tratamento precoce com:
- A. Penicilina, nos casos suspeitos de amigdalite estreptocócica, a forma mais adequada para prevenir a doença.
 - B. Ceftriaxone, nos casos suspeitos de amigdalite estreptocócica, a forma mais adequada para prevenir a doença.
 - C. Ciprofloxacino, nos casos suspeitos de amigdalite estreptocócica, a forma mais adequada para prevenir a doença.
 - D. Azitromicina, nos casos suspeitos de amigdalite estreptocócica, a forma mais adequada para prevenir a doença.
24. Órgão colegiado, deliberativo e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera do governo integrante da estrutura básica do Ministério da Saúde, da Secretaria do Estado da Saúde, do Distrito Federal e dos Municípios:
- A. Conselho Nacional de Deliberação em Saúde
 - B. Comissão Colegiada de Saúde
 - C. Conselho Deliberativo de Saúde
 - D. Conselho de Saúde
25. A medicina nuclear com técnicas de SPECT (*single photon emission tomography*) pode contribuir na Insuficiência Cardíaca fundamentalmente de duas maneiras distintas:
- A. Avaliação da área miocárdica e da função ventricular.
 - B. Avaliação da perfusão miocárdica e da função ventricular.
 - C. Avaliação da perfusão miocárdica e da condução ventricular.
 - D. Avaliação da área miocárdica e da condução ventricular.
26. Antiarrítmico que está relacionado a hipotireoidismo, fibrose pulmonar e depósitos em córnea é:
- A. Digoxina
 - B. Quinidina
 - C. Amiodarona
 - D. Adenosina
27. Assinale a alternativa incorreta com relação às causas pré-renais de Insuficiência Renal:
- A. Hipovolemia: hemorragias, perdas gastrointestinais, terceiro espaço, queimaduras, sobrecarga de diuréticos, febre.
 - B. Diminuição do débito cardíaco: arritmias, insuficiência cardíaca congestiva, infarto agudo do miocárdio, tamponamento pericárdico.
 - C. Drogas: agentes antiinflamatórios não hormonais, inibidores da enzima de conversão da angiotensina, ciclos-porina, agentes contrastados para RX.
 - D. Obstrução bilateral dos ureteres: tumores da próstata e cérvix, fibrose retroperitoneal idiopática, hemorragia retroperitoneal, ligadura acidental durante cirurgias pélvicas.
28. Não está entre as principais causas pulmonares de dor torácica:
- A. Pleurite
 - B. Hipertensão pulmonar
 - C. Transtornos somatoformes
 - D. Pneumotórax
29. Com relação à pneumonia comunitária grave, a indicação de terapia intensiva é de fundamental importância, tendo em vista que a precocidade do reconhecimento pode melhorar o prognóstico e evolução. A antibioticoterapia deve ser iniciada em até:
- A. 2 horas da chegada ao serviço hospitalar.
 - B. 4 horas da chegada ao serviço hospitalar.
 - C. 8 horas da chegada ao serviço hospitalar.
 - D. 12 horas da chegada ao serviço hospitalar.
30. Entre as carências nutricionais, são causas típicas de anemia megaloblástica:
- A. Deficiência de vitamina B12 e deficiência de ácido fólico.
 - B. Deficiência de vitamina C e de vitamina D.
 - C. Deficiência de vitamina C e deficiência de ácido fólico.
 - D. Deficiência de tiamina e deficiência de ácido fólico.
31. Candidose oral ou leucoplasia pilosa; disfunção do sistema nervoso central; herpes zoster em indivíduos com até 60 anos de idade e tuberculose pulmonar, pleural ou de linfonodos localizados numa única região, indicam:
- A. 02 pontos na escala de sinais, sintomas e doenças no critério Rio de Janeiro/Caracas para AIDS.
 - B. 05 pontos na escala de sinais, sintomas e doenças no critério Rio de Janeiro/Caracas para AIDS.
 - C. 07 pontos na escala de sinais, sintomas e doenças no critério Rio de Janeiro/Caracas para AIDS.
 - D. 10 pontos na escala de sinais, sintomas e doenças no critério Rio de Janeiro/Caracas para AIDS.
32. Segundo os critérios de classificação propostos pelo American College of Rheumatology, considera-se lesão hematológica no Lúpus eritematoso sistêmico (LES) a presença de:
- A. Anemia hemolítica ou leucopenia (menor que 2.000/mm³ em duas ou mais ocasiões) ou linfopenia (menor que 500/mm³ em duas ou mais ocasiões) ou plaquetopenia (menor que 50.000/mm³ na ausência de outra causa).
 - B. Anemia hemolítica ou leucopenia (menor que 3.000/mm³ em duas ou mais ocasiões) ou linfopenia (menor que 1.000/mm³ em duas ou mais ocasiões) ou plaquetopenia (menor que 75.000/mm³ na ausência de outra causa).
 - C. Anemia hemolítica ou leucopenia (menor que 4.000/mm³ em duas ou mais ocasiões) ou linfopenia (menor que 1.500/mm³ em duas ou mais ocasiões) ou plaquetopenia (menor que 100.000/mm³ na ausência de outra causa).
 - D. Anemia hemolítica ou leucopenia (menor que 5.000/mm³ em duas ou mais ocasiões) ou linfopenia (menor que 2.000/mm³ em duas ou mais ocasiões) ou plaquetopenia (menor que 150.000/mm³ na ausência de outra causa).



33. São características da fase catarral da Coqueluche:
- A. Com duração de uma ou duas semanas, inicia-se com manifestações respiratórias e sintomas leves (febre pouco intensa, mal-estar geral, coriza e tosse seca), seguidos pela instalação gradual de surtos de tosse, cada vez mais intensos e frequentes, até que passam a ocorrer as crises de tosse paroxísticas.
 - B. Geralmente afebril ou com febre baixa. Em alguns casos ocorrem vários picos de febre ao longo do dia. A manifestação típica são os paroxismos de tosse seca.
 - C. Os episódios de tosse paroxística aumentam em frequência e intensidade nas duas primeiras semanas e, depois, diminuem paulatinamente. Nos intervalos dos paroxismos, o paciente passa bem. Essa fase dura de 2 a 6 semanas.
 - D. Esta fase pode persistir por mais de 2 a 6 semanas e alguns casos pode se prolongar por até 3 meses.
34. Com relação aos métodos diagnósticos para doença de Lyme é incorreto afirmar:
- A. A cultura para isolamento da *B. burgdorferi* é definitiva, mas raramente é bem sucedida a partir de sangue do paciente, ocorrendo em aproximadamente 50% dos casos em material de biópsia da lesão.
 - B. A sorologia por ELISA e imunofluorescência indireta são os métodos mais utilizados pois os títulos de anticorpos IgM específicos em geral alcançam o máximo em 3 a 6 semanas.
 - C. Os anticorpos IgM exibem reação cruzada com outras espiroquetas, inclusive o *Treponema pallidum*, os pacientes com doença de Lyme mostram resultado positivo no VDRL.
 - D. O Western Blot é valioso quando se suspeita de ELISA falso-positivo. A reação em cadeia da polimerase (PCR) é empregada para detecção do DNA da espiroqueta em material do hospedeiro.
35. O Diagnóstico diferencial da Meningite bacteriana é feito através do isolamento da *Neisseria meningitidis* do sangue ou líquor (LCR). O LCR pode se apresentar:
- A. Turvo, com cor leitosa ou xantocrômica.
 - B. A bioquímica evidencia glicose e cloretos aumentados (concentração de glicose superior a 50% da glicemia, coletada simultaneamente ao líquor).
 - C. Proteínas diminuídas (abaixo de 100mg/dl).
 - D. Pleiocitose, aumento do número de leucócitos, predominando polimorfonucleares eosinófilos.
36. Indivíduos em risco de desenvolver DM tipo 2, devem ser estimulados a mudanças de estilo de vida, a partir de programas educativos baseados em perda moderada de peso corporal e prática semanal de atividade física de:
- A. 60 minutos/semana
 - B. 120 minutos/semana
 - C. 150 minutos/semana
 - D. 180 minutos/semana
37. Com relação aos aspectos clínicos e epidemiológicos da Brucelose, é correto o que se afirma em:
- A. Em alguns casos, podem surgir supurações de órgãos, como fígado e baço.
 - B. Micose sistêmica, predominantemente pulmonar, podendo, também, comprometer pele, laringe, ossos, articulação, meninges, entre outros.
 - C. São sinais mais frequentes: comprometimento respiratório baixo, febre, sudorese noturna, dor pleural, dispneia, tosse produtiva, artralgia, anorexia.
 - D. Eritema nodoso, polimorfo e reações exantemáticas podem ocorrer em até um quinto dos casos.
38. Casos leves de pericardite no LES podem apresentar boa resposta inicial a:
- A. Antiinflamatórios não-hormonais (AINH)
 - B. Glicocorticóides
 - C. Metrotexato
 - D. Gamaglobulina
39. Infecção intestinal causada por nematódeos, que pode apresentar-se assintomática, em caso de infecções leves. Em crianças com parasitismo intenso, pode ocorrer hipoproteïnemia e atraso no desenvolvimento físico e mental. Com frequência, dependendo da intensidade da infecção, acarreta anemia ferropriva:
- A. Ancilostomíase
 - B. Amebíase
 - C. Ascaridíase
 - D. Criptosporidíose
40. Para o tratamento da Ascaridíase, é recomendação do Ministério da Saúde:
- A. Albendazol (ovocida, larvicida e vermicida), 400mg/dia, em dose única para adultos.
 - B. Albendazol (ovocida, larvicida e vermicida), 400mg/dia, em duas doses para adultos.
 - C. Albendazol (ovocida, larvicida e vermicida), 800mg/dia, em dose única para adultos.
 - D. Albendazol (ovocida, larvicida e vermicida), 800mg/dia, em duas doses para adultos.