

CLÍNICA MÉDICA

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTE INSTRUÇÕES

- 1 – Este caderno contém as questões da **Prova Objetiva**.
- 2 – Use, como rascunho, a Folha de Respostas reproduzida ao final deste caderno.
- 3 – Ao receber a **Folha de Respostas**:
 - Confira seu nome, número de inscrição e o cargo.
 - Assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

4 – **ATENÇÃO:** transcreva no espaço apropriado da sua **FOLHA DE RESPOSTAS**, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

“Saúde cuidada, vida conservada.” Provérbio latino

ATENÇÃO:

FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

5 – Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

- 01 A B C D • use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
- 02 A B C D • preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;
- 03 A B C D • assinale somente **uma** alternativa em cada questão.
- 04 A B C D Sua resposta **NÃO** será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.

A **Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

ATENÇÃO: Conforme o subitem 7.4 O tempo de duração das provas abrange a assinatura e a transcrição das respostas para a folha de respostas. 7.5 O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do local de realização da prova após 120 (cento e vinte) minutos contados do seu início. 7.20 Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógio digital, *paggers*, *beep*, agenda eletrônica, calculadora, *walkman*, *notebook*, *palmtop*, tablet, gravador, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico. 7.23 Durante o período de realização das provas, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer outros meios. 7.24 Durante o período de realização das provas, não será permitido o uso de óculos escuros, bonés, chapéus e similares. 7.25 Será vedado ao candidato o porte de arma(s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença para o respectivo porte. 7.30 Será eliminado o candidato que: tratar com falta de urbanidade examinadores, auxiliares, aplicadores ou autoridades presentes; deixar o local de realização das provas sem a devida autorização; usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros; deixar de atender às normas contidas nos cadernos de provas e na folha de respostas e às demais orientações expedidas pela FUNDEP, durante a realização das provas; deixar de entregar a Folha de resposta objetiva ou entregá-la com marcação diferente das instruções contidas no caderno de questões ou sem assinatura no local reservado para a assinatura (**alíneas a, b, d, h e m**).

Os gabaritos e as questões das Provas Objetivas serão divulgados no endereço eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br no dia 19 de outubro de 2015.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 5 (CINCO) HORAS

ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a)

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, **79 (setenta e nove) questões de múltipla escolha** com **4 (quatro) alternativas de respostas para cada questão**, assim distribuídas: **BLOCO A**: 5 (cinco) questões de **Cooperativismo**, 4 (quatro) questões de **Cirurgia Geral**, 4 (quatro) questões de **Clínica Médica**, 4 (quatro) questões de **Ginecologia/Obstetrícia**, 4 (quatro) questões de **Pediatria**, 8 (oito) questões de **Saúde Pública e Saúde Suplementar**; **BLOCO B**: 50 (cinquenta) questões de **Conhecimentos Específicos**, todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe **imediatamente** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos posteriores.

BLOCO A

COOPERATIVISMO

QUESTÃO 1

Sobre o Sistema Unimed e a Unimed BH, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O Sistema Unimed é formado por sociedades de médicos, organizadas no formato societário de cooperativas de trabalho médico.
- B) A Unimed BH é uma cooperativa de primeiro grau ou singular do Sistema Unimed.
- C) A entidade médica que liderou a formação da Mediminas, que posteriormente passou a ser denominada Unimed BH, foi o Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais.
- D) A primeira Cooperativa Unimed foi fundada na Cidade de Santos – SP no ano de 1967.

QUESTÃO 2

Em relação à organização e ao funcionamento das cooperativas no Brasil, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A instância máxima de deliberação em uma cooperativa é a Assembleia Geral dos Associados.
- B) O associado poderá ser eliminado da sociedade por infração à lei ou ao estatuto da cooperativa.
- C) A demissão do cooperado – saída voluntária da cooperativa – poderá ser impedida pelos órgãos da administração, caso o trabalho desse cooperado seja indispensável ao bom funcionamento da cooperativa.
- D) A prestação de contas da administração da cooperativa se dará na Assembleia Geral Ordinária realizada no primeiro trimestre de cada ano.

QUESTÃO 3

Em relação aos princípios do Cooperativismo e a organização do setor no Brasil, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Os diretores e conselheiros de uma cooperativa são democraticamente eleitos pelos associados e funcionários da cooperativa.
- B) A solidariedade, a democracia e a equidade são princípios universais do cooperativismo.
- C) Os fundos de investimento estão impedidos de adquirir parte do capital das cooperativas, ainda que de forma minoritária.
- D) A Confederação Nacional do Cooperativismo (CENCOOP), o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP) e a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) são entidades do cooperativismo brasileiro que compõem o sistema OCB.

QUESTÃO 4

A Lei Nº 5.764 de 16 de dezembro de 1971, que define a Política Nacional de Cooperativismo no Brasil, consagra os seguintes princípios universais do cooperativismo **EXCETO**:

- A) A adesão dos sócios deve ser voluntária.
- B) Nas cooperativas singulares, o voto é singular.
- C) As cooperativas são sociedades de pessoas; sociedades essas não sujeitas à falência.
- D) As quotas-partes do capital da sociedade podem ser negociadas em bolsa de valores pelos sócios.

QUESTÃO 5

Sobre a organização do Sistema Unimed e o funcionamento da Unimed BH, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O Sistema Cooperativo Unimed é formado por cooperativas singulares, por federações estaduais ou regionais e por uma confederação denominada Unimed do Brasil.
- B) A Unimed BH, além da Assembleia Geral de Cooperados, possui uma Assembleia Geral de Delegados formada por associados eleitos dentro das especialidades médicas.
- C) O Conselho Social da Unimed BH possui função consultiva, discute as macropolíticas e as estratégias da Cooperativa e é formado por delegados, conselheiros e membros do Núcleo de Integração com Cooperados.
- D) A lei Nº 9.656/98 regulamenta a Saúde Suplementar no Brasil e estabelece regras para os planos privados de assistência à saúde, exceto para as cooperativas que devem observar somente a Lei Nº 5.764/71 (Lei do Cooperativismo).

CIRURGIA GERAL

QUESTÃO 6

Sobre a avaliação clínica pré-operatória, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Homens com menos de 40 anos de idade, assintomáticos e sem comorbidades, que irão ser submetidos a intervenções cirúrgicas sem previsão de sangramento, não necessitam de nenhum exame complementar pré-operatório.
- B) A história clínica constitui meio mais efetivo para diagnosticar fatores de risco associados a doenças coexistentes do que o exame físico e os exames complementares.
- C) A radiografia de tórax deve ser rotineira em pacientes acima de 50 anos de idade, em ambos os sexos.
- D) Em pacientes em uso de Digoxina, justifica-se a realização pré-operatória de ureia / creatinina, dosagem de eletrólitos e eletrocardiograma.

QUESTÃO 7

Em relação à resposta metabólica ao trauma operatório, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Os macrófagos apresentam mobilização mais rápida em direção à área traumatizada do que os neutrófilos, porém seu tempo de vida é mais curto.
- B) Os neutrófilos promovem lesão tecidual por diversos mecanismos, destacando-se a liberação de enzimas proteolíticas, como as elastases.
- C) O óxido nítrico é produzido por vários tipos de células e pode mediar a vasodilatação e regular o tônus vascular.
- D) As proteínas reactantes da fase aguda são produzidas pelo fígado em resposta à injúria, na tentativa de manter a homeostasia.

QUESTÃO 8

No que se refere à cicatrização de feridas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Hipóxia relativa e acidose deprimem o estímulo à proliferação de células endoteliais.
- B) Na fase inflamatória, ocorre aumento da permeabilidade vascular, mediada, entre outras, pela serotonina e histamina.
- C) Os leucócitos têm importante papel na remoção de detritos celulares e de bactérias do leito da lesão.
- D) Os monócitos ativam-se em macrófagos, que são responsáveis pela produção de interleucina 1.

QUESTÃO 9

Em relação ao choque, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A presença de hipotensão sem taquicardia concomitante é sinal sugestivo de choque neurogênico.
- B) É característica do choque cardiogênico a redução da perfusão tecidual com volemia adequada.
- C) Gasometria arterial inalterada não exclui o diagnóstico de choque obstrutivo por embolia pulmonar.
- D) São causas habituais de choque obstrutivo: infarto agudo do miocárdio, dissecação aguda da aorta, embolia pulmonar e pneumotórax hipertensivo.

CLÍNICA MÉDICA

QUESTÃO 10

Analise as afirmativas a seguir sobre a diarreia.

- I. A associação de lesões aftosas na boca com lesões anais e perianais pode sugerir a presença da doença de Crohn.
- II. É a manifestação clínica que mais frequentemente se associa a doenças do intestino delgado.
- III. Quando a origem é o intestino delgado, as dejeções são pequenas, com número diário muito aumentado, frequentemente com muco, pus e sangue.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 11

Em relação à pancreatite aguda, assinale a alternativa que **NÃO** é considerada causa dessa doença.

- A) Cirurgia abdominal
- B) Hiperlipidemia
- C) Hipocalcemia
- D) Trauma abdominal contuso

QUESTÃO 12

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, estabelecendo a correlação diagnóstica entre os exames complementares e as doenças ou situações que afetam o aparelho respiratório.

COLUNA I

1. Alfa-1 antitripsina
2. Dímero D
3. Dosagem de cloro no suor
4. Espirometria
5. Ultrassonografia

COLUNA II

- () Asma
- () Derrame pleural
- () Embolia pulmonar
- () Enfisema pulmonar
- () Mucoviscidose

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) 4 5 2 1 3
- B) 1 5 3 4 2
- C) 3 1 2 5 4
- D) 5 4 3 1 2

QUESTÃO 13

Analise o caso clínico a seguir.

Homem de 42 anos de idade, sem antecedentes patológicos, apresenta há várias semanas parestesias nos pés, ataxia leve e diminuição da sensibilidade vibratória e da propriocepção nas pernas.

Considerando esse caso, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico **mais provável**.

- A) Anemia falciforme
- B) Anemia perniciosa
- C) Esclerose múltipla
- D) Talassemia

GINECOLOGIA / OBSTETRÍCIA

QUESTÃO 14

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente, 25 anos de idade, fez exame citopatológico cervicovaginal de rotina. O resultado revelou presença de células com relação núcleo-citoplasma aumentado, halo perinuclear e multinucleação.

Nesse caso, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico **mais provável**.

- A) Infecção por papilomavírus humano
- B) Cervicite crônica bacteriana
- C) Infecção por herpes-vírus tipo 2
- D) Neoplasia intraepitelial de alto grau

QUESTÃO 15

Considere o caso clínico a seguir.

Paciente, de 48 anos de idade, G1P1A0, relata menopausa há 2 anos. Na época do diagnóstico da menopausa, iniciou terapia hormonal devido a calor intenso. Já tentou suspender, porém o calor é recorrente. No momento, não apresenta queixas nem sangramento vaginal; é hipertensa e faz uso de Enalapril; mãe teve câncer de mama. Ao exame, apresenta: PA = 140 x 90 mmHg; IMC 24 kg/m²; mamas e exame ginecológico sem alterações.

Nesse caso, assinale a alternativa que apresenta **corretamente** a conduta a ser adotada.

- A) Solicitar exames complementares de rotina, como mamografia e ultrassonografia, e manter terapia hormonal até o resultado dos exames.
- B) Manter a terapia hormonal, independentemente dos resultados dos exames, pois a paciente teve diagnóstico de menopausa recentemente.
- C) Orientar a paciente sobre os riscos cardiovasculares da terapia hormonal e suspendê-la, pois a paciente é hipertensa.
- D) Suspender a terapia hormonal e solicitar ultrassonografia transvaginal de urgência e, somente depois do resultado desse exame, discutir a possibilidade de retorno.

QUESTÃO 16

Analise o quadro clínico a seguir.

Paciente, 35 anos de idade, primigesta, com 36 semanas de gestação, pré-natal acompanhado no ambulatório de alto risco, devido à hipertensão arterial crônica. Apresentou crise convulsiva há 2 horas e foi encaminhada à maternidade. Faz uso de Alfametildopa (1,5 g por dia) desde o primeiro trimestre de gestação. No exame físico, apresenta PA = 160 x 100 mmHg, pulso 94 bpm, dinâmica uterina sem contrações, batimentos cardíofetais de 130 bpm, colo grosso posterior e dilatado 2,0 cm.

A respeito desse quadro, assinale a alternativa que apresenta a **melhor** conduta a ser adotada.

- A) Prescrever sulfato de magnésio endovenoso e indicar resolução da gestação.
- B) Prescrever corticoide intramuscular por 48h e recomendar controle materno-fetal.
- C) Prescrever Nifedipina via oral associada à Alfametildopa e recomendar controle materno-fetal.
- D) Pedir exames para avaliação da função renal e hepática e recomendar controle materno-fetal.

QUESTÃO 17

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente, 16 anos de idade, primigesta, iniciou pré-natal tardiamente. Encontra-se com 27 semanas de gestação e o último hemograma apresentou hemoglobina de 11 g/dL, em exame de rotina pré-natal.

Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta a **melhor** conduta a ser adotada.

- A) Realizar coleta seriada de hemograma e encaminhar para acompanhamento no ambulatório de alto risco.
- B) Introduzir ferro elementar 120 a 240 mg/dia e ácido fólico 5 mg/dia e encaminhar para acompanhamento no ambulatório de alto risco.
- C) Introduzir ferro elementar 40 mg/dia e manter orientação dietética considerando o estilo de vida da paciente.
- D) Solicitar exame parasitológico de fezes e ferritina sérica e retorno precoce para iniciar terapêutica.

PEDIATRIA

QUESTÃO 18

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda o aleitamento materno exclusivo até:

- A) 4 meses.
- B) 6 meses.
- C) 12 meses.
- D) 24 meses.

QUESTÃO 19

Quanto à avaliação do crescimento, é **CORRETO** afirmar:

- A) Apesar da simplicidade da utilização da antropometria, a falta de uma curva nacional fez com que o Ministério da Saúde contraindicasse a sua utilização em saúde pública.
- B) Para avaliar o crescimento, a medida da altura é mais importante que a do peso, devido à facilidade de sua obtenção.
- C) A caderneta do Ministério da Saúde utiliza curvas de percentil porque são mais fidedignas que as que utilizam escore z.
- D) O acompanhamento da medida de peso e sua localização em um gráfico é uma importante forma de avaliar o crescimento de uma criança.

QUESTÃO 20

Quanto ao tratamento de uma criança com diarreia aguda e com desidratação, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Caso a criança esteja desidratada, sempre iniciar com hidratação endovenosa.
- B) A prescrição de antibióticos é necessária porque a maioria das diarreias agudas é de origem bacteriana.
- C) Na desidratação leve e moderada, na qual não há sinais de choque, deve-se iniciar a hidratação com terapia de reidratação oral.
- D) Em uma criança com diarreia e desidratada, e sabendo-se que o vômito agravaria seu quadro, é imperioso o uso de antieméticos nesses casos.

QUESTÃO 21

No tratamento das pneumonias, é **CORRETO** afirmar que:

- A) todas as crianças após o diagnóstico de pneumonia bacteriana devem ser hospitalizadas.
- B) as pneumonias virais são muito raras, por isso, a utilização de antibióticos é tão importante numa criança com quadro respiratório.
- C) a droga de escolha para o tratamento da pneumonia na comunidade é a Penicilina Benzatina, pelo seu baixo custo.
- D) a Amoxicilina é utilizada para tratamento da maioria das pneumonias bacterianas.

SAÚDE PÚBLICA E SAÚDE SUPLEMENTAR

QUESTÃO 22

De acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Considerando as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) O SUS prevê atendimento parcial, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- B) O SUS prevê atendimento parcial, com prioridade para os serviços assistenciais, sem prejuízo das atividades preventivas.
- C) O SUS prevê atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- D) O SUS prevê atendimento integral, com prioridade para os serviços assistenciais, sem prejuízo das atividades preventivas.

QUESTÃO 23

Analise os dados sobre o número de óbitos infantis por residência no período de 2010 a 2013.

Região / ano	2010	2011	2012	2013
Norte	5.289	5.093	5.113	5.163
Nordeste	13.197	3.006	12.527	12.717
Sudeste	4.120	14.172	4.114	13.748
Sul	4.220	4.395	4.238	4.141
Centro-Oeste	3.044	3.050	3.131	3.197
Total	39.870	39.716	39.123	38.966

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE MORTALIDADE (SIM), 2015.

Sobre o cálculo da taxa de mortalidade infantil, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) É necessário conhecer a estimativa populacional para cada ano (número de óbitos / população x 1 000).
- B) É necessário conhecer o número de nascidos vivos em cada ano (número de óbitos / nascidos vivos x 1 000).
- C) É necessário multiplicar o número de óbitos por 100, já que se trata de uma porcentagem (número de óbitos x 100).
- D) É necessário conhecer o número de óbitos em crianças de 0-7 dias (número de óbitos em crianças de 0-7 dias).

QUESTÃO 24

Os sistemas nacionais de saúde dos países em desenvolvimento vêm apresentando graves problemas relacionados à escassez de recursos financeiros, decorrentes da vertiginosa ampliação de tecnologias na área da saúde. Dessa forma, torna-se cada vez mais urgente o desenvolvimento de estratégias para enfrentamento das questões relativas à incorporação tecnológica desordenada.

(CONASS, 2012).

Sobre as estratégias de enfrentamento, analise as afirmativas a seguir:

- I. Estratégias de enfrentamento incluem avaliações de eficácia / efetividade e custo das tecnologias em saúde.
- II. A avaliação de tecnologias em saúde não influencia a decisão clínica, visto que esta é uma decisão individual.
- III. A avaliação de tecnologias opera somente no campo de saúde pública, uma vez que, no sistema privado, o custo não é um fator limitante para a obtenção de produtos em saúde.

Está(ão) **CORRETA(S)** a(s) afirmativa(s):

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) III, apenas.
- D) II e III, apenas.

QUESTÃO 25

Uma das principais diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) é a universalidade. Entretanto, observa-se elevado número de estabelecimentos de saúde privados no Brasil.

De acordo com a Constituição Federal, de que forma ocorre a participação do sistema de saúde privado?

- A) Complementar ao SUS.
- B) Opcional para o SUS.
- C) Compulsório para cidadãos com alto poder aquisitivo.
- D) Obrigatório para empresas.

QUESTÃO 26

De acordo com o Art. 3º da Resolução Normativa Nº 259 de 2011, a operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas em prazos pré-estabelecidos.

Sobre esses prazos, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Consulta básica (pediatria, clínica médica, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia): em até 7 (sete) dias úteis.
- B) Consulta nas especialidades médicas (nefrologista, pneumologista, ortopedista): em até 14 (quatorze) dias úteis.
- C) Serviços de diagnóstico por laboratório de análises clínicas em regime ambulatorial: em até 3 (três) dias úteis.
- D) Urgência e emergência: em até 3 (três) dias úteis.

QUESTÃO 27

De acordo com a Lei Nº 9.656 de 1998, o plano-referência de assistência à saúde deve contemplar os seguintes procedimentos, **EXCETO**:

- A) Cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar
- B) Centro de terapia intensiva
- C) Tratamento clínico ou cirúrgico experimental
- D) Tratamento antineoplásico

QUESTÃO 28

De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) "a cobrança feita aos beneficiários de plano de saúde pelos prestadores de serviços, como a conhecida taxa de disponibilidade, são consideradas indevidas".

Disponível em: < <http://www.ans.gov.br/a-ans/sala-de-noticias-ans/consumidor/2519-taxa-de-disponibilidade-para-acompanhamento-de-parto-e-ilegal-#sthash.JjpSqr9H.dpuf> >.
Acesso em: 14 ago. 2015.

A esse respeito, assinale a alternativa em que essa afirmativa se baseia.

- A) Artigo 198 da Constituição Federal de 1988 (Integralidade das ações em saúde)
- B) Artigo 10 da Lei Nº 9.656 de 1998 (Constituição do plano-referência de assistência à saúde)
- C) Artigo 3º da Resolução Normativa N.º 338 de 2013 (Dos princípios de atenção à saúde na saúde suplementar)
- D) Artigo 2º da Resolução Normativa Nº 124 de 2006 (Das infrações a que estão submetidos os planos privados de assistência à saúde)

QUESTÃO 29

De acordo com a Resolução Nº 338 de 2013, a atenção à saúde na Saúde Suplementar deverá observar os seguintes princípios, **EXCETO**:

- A) Centrar ações no cuidado médico para evitar falta de integração no cuidado ao paciente.
- B) Incorporar de ações de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças, bem como de estímulo ao parto normal.
- C) Usar a epidemiologia para monitoramento da qualidade das ações e gestão em saúde.
- D) Adotar medidas que evitem a estigmatização e a institucionalização dos portadores de transtornos mentais, visando o aumento de sua autonomia.

CLÍNICA MÉDICA

QUESTÃO 30

Em relação às manifestações da síncope, assinale a que **NÃO** é considerada típica dessa situação clínica.

- A) Confusão mental no pós- crise.
- B) Crises associadas à posição ereta prolongada.
- C) Crises com sensação de atordoamento.
- D) Sudorese antes da crise.

QUESTÃO 31

Em relação aos benefícios decorrentes da redução dos níveis de colesterol, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) O risco de infarto agudo do miocárdio é maior nos pacientes que usam apenas estatinas do que nos que usam estatinas e ezetimibe.
- B) O uso concomitante de estatinas e ezetimibe é mais eficaz em reduzir o colesterol do que o uso isolado de uma das drogas.
- C) O uso de estatinas reduz os níveis de colesterol LDL (lipoproteína de baixa densidade) e o risco de acidentes cardiovasculares.
- D) Pacientes com *diabetes mellitus* ou idosos acima de 75 anos não se beneficiam quando se usa a associação estatina / ezetimibe.

QUESTÃO 32

Analise as seguintes afirmativas a respeito de angioedema.

- I. Episódios de angioedema podem ser desencadeados por traumas físicos, por terapia com estrógenos, inibidores da enzima conversora da angiotensina e bloqueadores dos receptores da angiotensina.
- II. O angioedema mediado por bradicinina é recorrente e sempre associado a urticárias, podendo ser hereditário ou adquirido.
- III. Quando associado a urticárias geralmente é histaminérgico e tem boa resposta ao tratamento com adrenalina, corticosteroides e anti-histamínicos.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 33

Assinale a alternativa que **NÃO** está associada às alterações comumente observadas no exame físico de pacientes com cirrose hepática.

- A) Contratura de Dupuytren
- B) Eritema palmar
- C) Osteoartropatia hipertrófica
- D) Telangiectasias

QUESTÃO 34

Em relação às arritmias cardíacas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A adenosina intravenosa é o tratamento de primeira escolha para as taquicardias paroxísticas supraventriculares sem instabilidade hemodinâmica.
- B) A fibrilação atrial é a arritmia mais comumente encontrada, sendo responsável por um terço das internações por distúrbios do ritmo cardíaco.
- C) As taquiarritmias com sinais clínicos de instabilidade hemodinâmica devem ser imediatamente tratadas com Amiodarona ou Procainamida intravenosa.
- D) O flutter atrial pode ocorrer em coração estruturalmente normal, mas em geral está associado a várias cardiopatias, ao alcoolismo e à tireotoxicose.

QUESTÃO 35

Assinale a alternativa que apresenta a causa de alcalose metabólica.

- A) Diarreia intensa
- B) Intoxicação por álcool metílico (metanol)
- C) Nefropatia crônica avançada
- D) Transfusão de grande volume de sangue com citrato

QUESTÃO 36

Analise as seguintes afirmativas sobre as leucemias.

- I. A leucemia linfocítica crônica não requer tratamento específico, pois quase sempre acomete pacientes muito idosos, e mesmo os novos tratamentos propostos não têm mudado o prognóstico.
- II. Atualmente, cerca de 70-80% dos pacientes com leucemia mieloide aguda, abaixo de 60 anos de idade, obtêm remissão completa da doença com a quimioterapia.
- III. A leucemia linfoblástica aguda acomete sobretudo crianças entre três e sete anos, e cerca de 20% das leucemias agudas no adulto são desse tipo.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 37

Em relação aos linfomas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A doença de Hodgkin é um grupo de linfomas caracterizados pela presença das células de Reed-Sternberg, com pico de incidência na terceira e na sexta década de vida.
- B) O diagnóstico anatomopatológico dos linfomas pode ser feito por aspiração do linfonodo, não sendo necessária a biópsia para sua correta classificação.
- C) Os linfomas não Hodgkin formam um grupo heterogêneo de câncer dos linfócitos, cuja evolução varia de indolente a rapidamente progressivo.
- D) Pacientes com linfoma devem ser acompanhados por hematologista ou oncologista, pois são muitos os tipos desse câncer com tratamentos diferentes a cada caso.

QUESTÃO 38

Em relação à dor pélvica, assinale a alternativa que está **MAIS** relacionada a quadros clínicos crônicos que agudos.

- A) Doença inflamatória pélvica
- B) Endometriose
- C) Nefrolitíase
- D) Ruptura de cisto ovariano

QUESTÃO 39

Analise as afirmativas a seguir sobre o alcoolismo crônico.

- I. A anemia comumente encontrada nesses pacientes é multifatorial, decorrente de perda sanguínea, deficiência nutricional, hepatopatia e hipersplenismo.
- II. O hepatocarcinoma está associado à história de hepatites B ou C, e sua incidência não está aumentada nesses pacientes quando os marcadores para tais hepatites estão negativos.
- III. Tremores, hiperatividade, taquicardia, sudorese profusa, ansiedade, insônia, agitação psicomotora e alucinações são manifestações típicas da síndrome de abstinência alcoólica.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 40

A dermatose eosinofílica ou síndrome de Sweet (nódulos ou placas eritematosos, febre e infiltrado dérmico) é uma manifestação paraneoplásica **MAIS** associada à leucemia:

- A) linfoblástica aguda.
- B) linfocítica crônica.
- C) mieloide aguda.
- D) mieloide crônica.

QUESTÃO 41

Numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I**, estabelecendo a melhor correlação entre as síndromes paraneoplásicas cutâneas ou reumatológicas e as neoplasias a elas associadas.

COLUNA I

1. Acantose nigricans
2. Amiloidose
3. Dermatomiosite
4. Osteoartropatia hipertrófica
5. Pênfigo paraneoplásico

COLUNA II

- () Adenocarcinoma
- () Câncer gástrico
- () Câncer de pulmão
- () Linfoma
- () Mieloma múltiplo

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) 4 5 2 1 3
- B) 3 1 4 5 2
- C) 1 3 4 2 5
- D) 1 2 3 5 4

QUESTÃO 42

Em relação à úlcera péptica, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A doença é mais comum em fumantes e 2/3 dos casos ocorrem em homens.
- B) Após a cicatrização inicial, o risco da recorrência da úlcera sem tratamento, em 12 meses, é superior a 50%.
- C) O alcoolismo está associado a significativo aumento da incidência dessa doença, embora não altere o risco de hemorragias.
- D) O risco de essa doença surgir durante o tratamento com anti-inflamatórios é maior em pacientes acima dos 60 anos.

QUESTÃO 43

Numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I**, estabelecendo a melhor correlação entre os agentes cancerígenos e a localização ou tipo de neoplasia maligna a que tais agentes podem estar associados.

COLUNA I

1. Aflatoxina
2. Asbestos
3. Benzeno
4. *Helicobacter pylori*
5. Vírus da AIDS

COLUNA II

- () Estômago
- () Fígado
- () Leucemia mieloide aguda
- () Linfoma
- () Pleura, peritônio

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) 4 1 3 5 2
- B) 3 2 4 1 5
- C) 4 3 2 5 1
- D) 2 1 3 4 5

QUESTÃO 44

Em relação às alterações do eletrocardiograma descritas a seguir, assinale com **V** as afirmativas **VERDADEIRAS** e com **F** as **FALSAS**.

- () A fibrilação atrial é uma arritmia arritmica com a distância R – R' variável e a frequência ventricular pode estar aumentada, normal ou diminuída.
- () A intoxicação digitálica é diagnosticada por meio da alteração do segmento ST (infradesnivelamento) e do achatamento de onda T.
- () No bloqueio completo do ramo direito, a morfologia do complexo QRS na derivação V1 é uma onda QS com alargamento superior a 0,12 mseg.
- () O hipotireoidismo, o derrame pericárdico e a obesidade podem causar complexos QRS de baixa voltagem.
- () Ondas T simétricas e pontiagudas são tipicamente observadas na hiperpotassemia.

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) F V V V F
- B) V F V F V
- C) V V F V F
- D) V F F V V

QUESTÃO 45

Numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I**, estabelecendo a melhor correlação entre as classes de drogas anti-hipertensivas e suas principais contraindicações.

COLUNA I

1. Beta-bloqueadores adrenérgicos
2. Diuréticos de alça
3. Diuréticos tiazídicos
4. Inibidores de ECA
5. Simpaticolíticos de ação central

COLUNA II

- () Asma
- () Coma hepático
- () Estenose das artérias renais
- () Gota
- () Hipotensão ortostática

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) 3 2 5 1 4
- B) 3 1 2 5 4
- C) 1 3 4 2 5
- D) 1 2 4 3 5

QUESTÃO 46

Em relação à asma, assinale com **V** as afirmativas **VERDADEIRAS** e com **F** as **FALSAS**.

- () A prevalência mundial dessa doença tem diminuído desde 1970, sobretudo em países industrializados; fato atribuído ao maior controle sanitário, à maior eficácia dos atuais medicamentos e à redução do tabagismo.
- () Caracteriza-se por episódios recorrentes de obstrução das vias aéreas inferiores, que tendem a se agravar com o tempo, na maioria das vezes, levando à insuficiência respiratória.
- () É uma doença extremamente comum, que afeta mais as crianças do sexo masculino que as do sexo feminino e, após a puberdade, ligeiramente mais as mulheres que os homens.
- () No tratamento, é indispensável o acompanhamento do volume expiratório forçado no 1º segundo ou, preferencialmente, do *peak flow* (pico do fluxo expiratório), que é de baixo custo e de fácil manuseio para praticamente todos os pacientes.
- () Sempre ocorre inflamação das vias aéreas inferiores e uma exagerada broncoconstricção a estímulos que causam pequeno ou nenhum efeito em indivíduos não asmáticos.

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) F V F V F
- B) V F F F V
- C) F F V V V
- D) V F F V V

QUESTÃO 47

Em relação à diarreia, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A presença de esteatorreia permite diagnosticar a síndrome de má absorção.
- B) Cerca de 80% dos casos agudos são provocados por vírus, bactérias e parasitas.
- C) Cirurgias bariátricas podem causar diarreia e dificultar a absorção de cálcio e ferro.
- D) Evacuações duas vezes por dia e fezes de consistência diminuída são suficientes para definir essa doença.

QUESTÃO 48

Assinale a alternativa que representa a **MAIOR** causa de complicações e morte nos pacientes com *diabetes mellitus* tipo 2.

- A) Câncer
- B) Doença cerebrovascular
- C) Doença cardiovascular
- D) Nefropatia terminal

QUESTÃO 49

Analisar as afirmativas a seguir sobre as infecções do trato urinário (ITU).

- I. A ITU no sexo masculino, mesmo na primeira manifestação, merece investigação com exame de urina, cultura e até exames de imagem do aparelho urinário.
- II. Em mulheres, a ITU pode ser tratada empiricamente e a investigação pode ser feita somente se o tratamento falhar ou se apresentar manifestações de pielonefrite.
- III. O tratamento da bacteriúria assintomática em pacientes diabéticos reduz significativamente as complicações tanto da infecção urinária quanto do *diabetes mellitus*.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 50

Analisar a situação clínica a seguir.

Paciente HIV+ dá à luz após ter feito corretamente toda a profilaxia medicamentosa.

Em relação à amamentação, assinale a alternativa que apresenta a **MELHOR** conduta.

- A) Contraindicar amamentação, pois, mesmo após a profilaxia, o risco de transmissão pelo leite materno persiste.
- B) Contraindicar amamentação somente se houver traumatismo do mamilo com sangramento visível.
- C) Liberar aleitamento logo após o parto, pois o recém-nascido está protegido.
- D) Liberar aleitamento se a carga viral da mãe estiver indetectável.

QUESTÃO 51

Em paciente internado com insuficiência cardíaca congestiva, a indicação de restrição hídrica está **MAIS BEM** indicada quando há:

- A) derrame pleural.
- B) hepatomegalia dolorosa.
- C) hiponatremia.
- D) hipo-osmolaridade urinária.

QUESTÃO 52

Assinale a alternativa que apresenta a disfunção responsável pelo aumento progressivo da creatinina sérica, o qual pode ser causado pela obstrução parcial do trato urinário.

- A) Hematúria
- B) Piúria
- C) Poliúria
- D) Proteinúria

QUESTÃO 53

Em relação à profilaxia primária da ruptura de varizes esofagianas (prevenção do primeiro sangramento), assinale a alternativa terapêutica **MAIS ADEQUADA**.

- A) Betabloqueadores não específicos
- B) Cirurgia de derivação
- C) Escleroterapia endoscópica
- D) Nitratos

QUESTÃO 54

Assinale a manifestação **MAIS** comumente observada em paciente com pancreatite aguda.

- A) Ascite
- B) Dor abdominal
- C) Febre
- D) Sinais de irritação peritoneal

QUESTÃO 55

Assinale a alternativa que apresenta a complicação **MAIS FREQUENTE** em relação à massagem cardíaca externa em adultos.

- A) Embolia gordurosa
- B) Fratura de arcos costais
- C) Laceração hepática
- D) Pneumotórax

QUESTÃO 56

Assinale a causa **MAIS FREQUENTE** de morte súbita em atletas.

- A) Displasia arritmogênica do ventrículo esquerdo
- B) Doença coronária
- C) Miocardiopatia hipertrófica
- D) Síndrome de Wolf-Parkinson-White

QUESTÃO 57

São manifestações provocadas pela intoxicação por digitálicos, **EXCETO**:

- A) Arritmia cardíaca
- B) Fadiga, fraqueza e irritabilidade
- C) Hipoglicemia
- D) Anorexia, náuseas e vômitos

QUESTÃO 58

Considere o caso clínico a seguir.

Homem de 63 anos de idade chega ao serviço de urgência com dispneia e dor torácica de início súbito. O eletrocardiograma mostra taquicardia sinusal (136/min), desvio de SÂQRS para a direita, onda S em D1, onda Q e inversão de onda T em D3.

Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta a hipótese diagnóstica **MAIS PROVÁVEL**.

- A) Dissecção aguda da aorta
- B) Infarto agudo do miocárdio
- C) Pericardite aguda
- D) Tromboembolismo pulmonar agudo

QUESTÃO 59

Analise as seguintes afirmativas sobre as demências.

- I. As demências causadas por trauma craniano, encefalite e acidente vascular podem começar abruptamente e, então, permanecer sem progressão por longos períodos.
- II. A demência vascular é mais comum em homens e atinge em sua maioria pessoas com menos de 65 anos de idade.
- III. A doença de Alzheimer contribui para morte prematura, e a taxa de mortalidade anual gira em torno de 10%.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 60

Em relação à rubéola, assinale a afirmativa **INCORRETA**.

- A) A presença de tosse, coriza e conjuntivite quase sempre afasta o diagnóstico.
- B) É doença perfeitamente prevenível com vacina.
- C) Em 50-70% dos casos, nota-se manchas de Koplik na cavidade oral.
- D) O exantema evolui no sentido cefalocaudal e centrífugo.

QUESTÃO 61

Em relação à pneumonia por *Pneumocystis*, assinale com **V** as afirmativas **VERDADEIRAS** e com **F** as **FALSAS**.

- () Febre, tosse não produtiva, dispneia e taquipneia são as manifestações mais comuns.
- () Pacientes HIV positivos não costumam apresentar essa doença quando a contagem de linfócitos CD4 está superior a 200 cel/mm³.
- () O *Pneumocystis jirovecii* é um protozoário que causa pneumonia exclusivamente em pacientes imunodeficientes.
- () O *Pneumocystis carinii* infecta sobretudo ratos, enquanto o *P. jirovecii* é o principal agente em humanos.
- () Os testes sorológicos e a cultura de escarro são muito úteis, pois permitem diagnóstico e tratamento mais precoces.

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) V V F V F
- B) V F F F V
- C) F F V V V
- D) V F F V F

QUESTÃO 62

Em relação às reações medicamentosas, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) O exantema maculopapular que surge em quem já usou Ampicilina ou Amoxicilina impede que tais medicamentos sejam administrados novamente nesses pacientes.
- B) Pacientes com história de alergia à Penicilina têm risco aumentado de reação adversa às Cefalosporinas e a Carbapenem.
- C) Pacientes com história pregressa de alergia à Penicilina apresentarão reação à droga em mais de 80% dos casos, quando reexpostos.
- D) Pacientes com insuficiência renal crônica, com clearance de creatinina entre 40-60 mL/min, podem receber doses plenas de aminoglicosídeos, desde que corretamente hidratados.

QUESTÃO 63

Analise as seguintes afirmativas sobre a dengue.

- I. A leucopenia e a plaquetopenia ocorrem tardiamente nessa síndrome, sendo que nos casos de pior prognóstico observa-se leucocitose, às custas do aumento de linfócitos.
- II. Nos pacientes com quadro de dengue hemorrágica, ocorre aumento da permeabilidade capilar devido à disfunção endotelial, com hemoconcentração e choque como consequências.
- III. São considerados sinais de alerta: dor abdominal intensa, hepatomegalia dolorosa, hipotensão arterial, diminuição da temperatura corporal, sudorese e aumento repentino do hematócrito.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 64

Em relação às alterações observadas na estrogiloidíase, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Anorexia, desconforto abdominal e diarreia são frequentes.
- B) Eosinofilia periférica é muito comum.
- C) Larvas filarioides são encontradas no escarro e outros líquidos, nos casos de hiperinfecção.
- D) Presença de ovos nas fezes é muito frequente.

QUESTÃO 65

Numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I**, estabelecendo a melhor correlação entre as doenças e as drogas utilizadas no tratamento.

COLUNA I

1. Alcoolismo
2. Coronariopatia
3. Fibrose cística (mucoviscidose)
4. Hiperlipidemia
5. Leucemia mieloide crônica

COLUNA II

- () Clopidogrel
- () Estatina
- () Imatinib
- () Ivacaftor
- () Topiramato

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) 2 4 5 3 1
- B) 2 4 5 1 3
- C) 3 2 1 5 4
- D) 2 5 4 3 1

QUESTÃO 66

Considere o caso clínico a seguir.

Jovem norte-americano de 21 anos de idade, há 1 ano em Belo Horizonte, procura o pronto-atendimento com febre de oito dias, calafrios, mialgia, náuseas, vômitos e cefaleia sem fotofobia. Há dois dias percebeu exantema na face, tronco e extremidades, não sabendo precisar o padrão de evolução. Apresenta, ainda, tosse leve, respiração curta e diarreia. Linfonodos submentonianos levemente aumentados. Exame neurológico normal. Exames complementares: hemoglobina: 15,3 g%; leucócitos: 6 400 com 78% de neutrófilos, 16% de linfócitos, monócitos 5%; plaquetas: 99 000; anti-HIV negativo; liquor límpido com 15 células nucleadas/mm³, proteína 49 mg/dL; IgM para dengue negativa.

Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta a hipótese diagnóstica **MAIS PROVÁVEL**.

- A) Meningite asséptica
- B) Mononucleose infecciosa
- C) Rubéola
- D) Tifo (riquetsiose)

QUESTÃO 67

Em relação à doença inflamatória intestinal, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Aproximadamente 10% dos pacientes apresentam colite indeterminada, termo utilizado quando não se consegue diferenciar a retocolite ulcerativa da doença de Crohn.
- B) O acometimento perianal (fissuras, marcas na pele) e a tendência à formação de fístulas são características da doença de Crohn.
- C) O risco de câncer do intestino grosso é significativamente maior nos pacientes com retocolite ulcerativa que naqueles com doença de Crohn.
- D) O tabagismo está associado a pior prognóstico nos pacientes com doença de Crohn e a uma melhor evolução na retocolite ulcerativa.

QUESTÃO 68

Em relação à tuberculose, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A ascite na tuberculose peritoneal é exsudativa, a menos que a infecção surja em pacientes com ascite transudativa preexistente, como na hepatopatia alcoólica.
- B) A 6ª e a 7ª vértebras cervicais e as torácicas superiores são as mais acometidas nessa forma da doença, em geral, se iniciando nas regiões posteriores dos corpos vertebrais.
- C) O aumento dos casos de tuberculose em todo o mundo, com o surgimento da AIDS, resultou em aumento da resistência aos tuberculostáticos.
- D) O pulmão é o local onde ocorre a maioria dos casos de reativação da doença, com a formação característica do granuloma com necrose caseosa.

QUESTÃO 69

Analisar as seguintes afirmativas sobre as teníases.

- I. A infecção pelo *Diphyllobothrium latum*, adquirida pela ingestão de peixe cru ou malcozido, pode causar anemia megaloblástica e neuropatia por deficiência de vitamina B12.
- II. A ingestão de alimentos contaminados por fezes contendo ovos de *Taenia solium* pode ocasionar a cisticercose, uma das principais causas de convulsões em nosso meio.
- III. A maioria dos pacientes infectados pela *Taenia saginata* é assintomática, mas dor abdominal e sintomas gastrintestinais podem estar presentes, em alguns casos. A eliminação de proglotes nas fezes é a queixa mais comum.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 70

Em relação à hipertensão arterial secundária, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Deve ser suspeitada quando a hipertensão surge em pessoas muito jovens, nas que se tornam hipertensas após os 50 anos e nas que tinham a pressão arterial bem controlada e se tornam refratárias ao tratamento.
- B) Em cerca de 80% dos casos de síndrome de Cushing, há hipertensão decorrente dos níveis elevados de glicocorticoides que induzem à retenção de sal e água por meio do seu efeito mineralocorticoide.
- C) Hipocalemia, hipertensão resistente a medicamentos e níveis baixos de renina plasmática são achados característicos do feocromocitoma.
- D) O aldosteronismo primário é uma de suas causas frequentes, com maior incidência entre os 30 e 60 anos de vida.

QUESTÃO 71

Em relação à leishmaniose visceral, assinale a alternativa que **NÃO** representa uma característica dessa doença.

- A) Hipergamaglobulinemia monoclonal
- B) Inflamação sistêmica
- C) Leucopenia
- D) Plaquetopenia e anemia

QUESTÃO 72

Analisar as seguintes afirmativas sobre hipoglicemia.

- I. A hipoglicemia pós-prandial reativa é observada em cirurgias gastrointestinais, como a gastrectomia e a de *by-pass* gástrico (Y de Roux), associada à síndrome de *dumping*.
- II. A hipoglicemia relacionada à ingestão de álcool se deve à depleção do glicogênio hepático e à inibição da gliconeogênese pelo álcool, sendo mais comum em desnutridos.
- III. O insulinoma leva geralmente à hipoglicemia pós-prandial, a qual se associa a algum grau de disfunção do sistema nervoso central, como comportamento anormal, alterações motoras e sensoriais.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 73

Em relação à artrite reumatoide, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A atividade da artrite pode ser avaliada por meio dos níveis de proteína C reativa, desde que não haja anemia e a hemossedimentação esteja abaixo de 30 mm/60 min.
- B) Acomete mais as mulheres que os homens, na proporção de 3:1, além de atingi-las em faixa etária mais baixa (4ª e 5ª década).
- C) O anticorpo anti-peptídeo citrulinico cíclico (anti-CCP) é o teste sanguíneo mais específico para o diagnóstico dessa doença, com especificidade acima de 90%.
- D) Os anti-inflamatórios não hormonais trazem algum alívio sintomático, mas nunca devem ser usados como monoterapia, pois não alteram a progressão da artrite.

QUESTÃO 74

Em relação aos acidentes ofídicos, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A comum ausência de alterações locais é uma das características dos acidentes crotálicos.
- B) Acidentes crotálicos apresentam menor morbimortalidade que os botrópicos.
- C) O veneno crotálico possui ação neurotóxica, miotóxica, nefrotóxica e coagulante.
- D) Serpentes de gêneros diferentes podem causar manifestações clínicas semelhantes.

QUESTÃO 75

Numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I**, estabelecendo a melhor correlação entre os tipos ou causas de cefaleia e suas principais características.

COLUNA I

1. Cefaleia tensional
2. Cefaleia em salvas (*cluster*)
3. Enxaqueca
4. Hemorragia subaracnoidea
5. Hipertensão intracraniana

COLUNA II

- () Dor aguda, de grande intensidade e súbita instalação.
- () Dor de moderada intensidade, holocraniana, história familiar +; melhora com atividade.
- () Melhora no ortostatismo e piora ao deitar.
- () Náuseas ou vômitos, fotofobia, dor uni ou bilateral, pulsátil.
- () Ptose palpebral, dor unilateral lacrimejamento ipsilateral, miose, congestão nasal.

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) 2 4 5 3 1
- B) 4 1 5 3 2
- C) 3 1 2 5 4
- D) 1 5 4 3 2

QUESTÃO 76

Assinale a alternativa que apresenta a medicação indicada para o tratamento da intoxicação por Paracetamol.

- A) Atropina
- B) Fisostigmina
- C) N-acetilcisteína
- D) Vitamina K

QUESTÃO 77

Em relação à doença cerebral vascular isquêmica, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A fibrilação atrial traz um risco de 3 a 5% por ano para acidentes isquêmicos, que aumenta com a idade, com a disfunção do ventrículo esquerdo e com a hipertensão não controlada.
- B) Contraceptivos orais devem ser fortemente desaconselhados a mulheres fumantes que são hipertensas ou diabéticas.
- C) Hipertensão arterial é o fator de risco mais importante tanto para os acidentes vasculares cerebrais isquêmicos quanto para os hemorrágicos.
- D) O PET SCAN (tomografia por emissão de pósitrons) permite distinguir se o quadro isquêmico decorre de êmbolos cardíacos ou de trombos murais de artérias intracranianas.

QUESTÃO 78

Numere a **COLUNA II** de acordo com a **COLUNA I**, estabelecendo a melhor correlação entre as etiologias das pneumonias e as mais prováveis predisposições e complicações.

COLUNA I

1. Anaeróbios
2. *Klebsiella pneumoniae*
3. *Mycoplasma pneumoniae*
4. *Pseudomonas aeruginosa*
5. *Streptococcus pneumoniae*

COLUNA II

- () Adultos jovens, exantema, anemia hemolítica.
- () Alcoolismo, empiema, cavitação.
- () Bronquiectasia, fibrose cística, cavitação.
- () Doença cardiopulmonar crônica, endocardite, meningite.
- () Higiene oral precária, aspiração, abscesso, empiema.

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) 2 4 5 3 1
- B) 5 2 4 1 3
- C) 3 1 2 5 4
- D) 3 2 4 5 1

QUESTÃO 79

Em relação à depressão, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Como os antidepressivos só mostram seus efeitos após 1-2 semanas, com benefício máximo após 6-8 semanas, é fundamental o acompanhamento semanal dos pacientes nessa fase inicial.
- B) Embora as formas leves com frequência passem espontaneamente, os pacientes podem persistir com manifestações de irritabilidade e grande ansiedade por anos antes de procurar tratamento.
- C) O teste de supressão pela dexametasona demonstra que o eixo hipotalâmico-hipofisário-adrenal está hiperativo nesses pacientes, mas esse teste é pouco sensível para o diagnóstico da depressão.
- D) Psicoterapia no lugar de medicação antidepressiva, na fase inicial do tratamento, mesmo nos casos leves a moderados, não é a conduta mais indicada.

FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

01	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

28	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

55	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
61	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
64	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
65	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
66	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
67	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
68	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
69	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
70	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
71	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
72	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
73	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
74	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
75	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
76	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
77	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
78	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
79	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

**ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**