

DERMATOLOGIA

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTE INSTRUÇÕES

- 1 – Este caderno contém as questões da **Prova Objetiva**.
- 2 – Use, como rascunho, a Folha de Respostas reproduzida ao final deste caderno.
- 3 – Ao receber a **Folha de Respostas**:
 - Confira seu nome, número de inscrição e o cargo.
 - Assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

4 – **ATENÇÃO:** transcreva no espaço apropriado da sua **FOLHA DE RESPOSTAS**, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

“Saúde cuidada, vida conservada.” Provérbio latino

ATENÇÃO:

FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

- 5 – Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

- 01

A	B	C	D
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 • use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
- 02

A	B	C	D
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 • preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;
- 03

A	B	C	D
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 • assinale somente **uma** alternativa em cada questão.
- 04

A	B	C	D
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

 Sua resposta **NÃO** será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.

A **Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

ATENÇÃO: Conforme o subitem 7.4 O tempo de duração das provas abrange a assinatura e a transcrição das respostas para a folha de respostas. 7.5 O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do local de realização da prova após 120 (cento e vinte) minutos contados do seu início. 7.20 Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, telefone celular, relógio digital, *paggers*, *beep*, agenda eletrônica, calculadora, *walkman*, *notebook*, *palmtop*, tablet, gravador, transmissor/receptor de mensagens de qualquer tipo ou qualquer outro equipamento eletrônico. 7.23 Durante o período de realização das provas, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer outros meios. 7.24 Durante o período de realização das provas, não será permitido o uso de óculos escuros, bonés, chapéus e similares. 7.25 Será vedado ao candidato o porte de arma(s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença para o respectivo porte. 7.30 Será eliminado o candidato que: tratar com falta de urbanidade examinadores, auxiliares, aplicadores ou autoridades presentes; deixar o local de realização das provas sem a devida autorização; usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros; deixar de atender às normas contidas nos cadernos de provas e na folha de respostas e às demais orientações expedidas pela FUNDEP, durante a realização das provas; deixar de entregar a Folha de resposta objetiva ou entregá-la com marcação diferente das instruções contidas no caderno de questões ou sem assinatura no local reservado para a assinatura (**alíneas a, b, d, h e m**).

Os gabaritos e as questões das Provas Objetivas serão divulgados no endereço eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br no dia 19 de outubro de 2015.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 5 (CINCO) HORAS

ATENÇÃO

Sr.(a) Candidato(a)

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, **79 (setenta e nove) questões de múltipla escolha** com **4 (quatro) alternativas de respostas para cada questão**, assim distribuídas: **BLOCO A**: 5 (cinco) questões de **Cooperativismo**, 4 (quatro) questões de **Cirurgia Geral**, 4 (quatro) questões de **Clínica Médica**, 4 (quatro) questões de **Ginecologia/Obstetrícia**, 4 (quatro) questões de **Pediatria**, 8 (oito) questões de **Saúde Pública e Saúde Suplementar**; **BLOCO B**: 50 (cinquenta) questões de **Conhecimentos Específicos**, todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe **imediatamente** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos posteriores.

BLOCO A

COOPERATIVISMO

QUESTÃO 1

Sobre o Sistema Unimed e a Unimed BH, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O Sistema Unimed é formado por sociedades de médicos, organizadas no formato societário de cooperativas de trabalho médico.
- B) A Unimed BH é uma cooperativa de primeiro grau ou singular do Sistema Unimed.
- C) A entidade médica que liderou a formação da Mediminas, que posteriormente passou a ser denominada Unimed BH, foi o Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais.
- D) A primeira Cooperativa Unimed foi fundada na Cidade de Santos – SP no ano de 1967.

QUESTÃO 2

Em relação à organização e ao funcionamento das cooperativas no Brasil, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A instância máxima de deliberação em uma cooperativa é a Assembleia Geral dos Associados.
- B) O associado poderá ser eliminado da sociedade por infração à lei ou ao estatuto da cooperativa.
- C) A demissão do cooperado – saída voluntária da cooperativa – poderá ser impedida pelos órgãos da administração, caso o trabalho desse cooperado seja indispensável ao bom funcionamento da cooperativa.
- D) A prestação de contas da administração da cooperativa se dará na Assembleia Geral Ordinária realizada no primeiro trimestre de cada ano.

QUESTÃO 3

Em relação aos princípios do Cooperativismo e a organização do setor no Brasil, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Os diretores e conselheiros de uma cooperativa são democraticamente eleitos pelos associados e funcionários da cooperativa.
- B) A solidariedade, a democracia e a equidade são princípios universais do cooperativismo.
- C) Os fundos de investimento estão impedidos de adquirir parte do capital das cooperativas, ainda que de forma minoritária.
- D) A Confederação Nacional do Cooperativismo (CNCOOOP), o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP) e a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) são entidades do cooperativismo brasileiro que compõem o sistema OCB.

QUESTÃO 4

A Lei Nº 5.764 de 16 de dezembro de 1971, que define a Política Nacional de Cooperativismo no Brasil, consagra os seguintes princípios universais do cooperativismo **EXCETO**:

- A) A adesão dos sócios deve ser voluntária.
- B) Nas cooperativas singulares, o voto é singular.
- C) As cooperativas são sociedades de pessoas; sociedades essas não sujeitas à falência.
- D) As quotas-partes do capital da sociedade podem ser negociadas em bolsa de valores pelos sócios.

QUESTÃO 5

Sobre a organização do Sistema Unimed e o funcionamento da Unimed BH, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O Sistema Cooperativo Unimed é formado por cooperativas singulares, por federações estaduais ou regionais e por uma confederação denominada Unimed do Brasil.
- B) A Unimed BH, além da Assembleia Geral de Cooperados, possui uma Assembleia Geral de Delegados formada por associados eleitos dentro das especialidades médicas.
- C) O Conselho Social da Unimed BH possui função consultiva, discute as macropolíticas e as estratégias da Cooperativa e é formado por delegados, conselheiros e membros do Núcleo de Integração com Cooperados.
- D) A lei Nº 9.656/98 regulamenta a Saúde Suplementar no Brasil e estabelece regras para os planos privados de assistência à saúde, exceto para as cooperativas que devem observar somente a Lei Nº 5.764/71 (Lei do Cooperativismo).

CIRURGIA GERAL

QUESTÃO 6

Sobre a avaliação clínica pré-operatória, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Homens com menos de 40 anos de idade, assintomáticos e sem comorbidades, que irão ser submetidos a intervenções cirúrgicas sem previsão de sangramento, não necessitam de nenhum exame complementar pré-operatório.
- B) A história clínica constitui meio mais efetivo para diagnosticar fatores de risco associados a doenças coexistentes do que o exame físico e os exames complementares.
- C) A radiografia de tórax deve ser rotineira em pacientes acima de 50 anos de idade, em ambos os sexos.
- D) Em pacientes em uso de Digoxina, justifica-se a realização pré-operatória de ureia / creatinina, dosagem de eletrólitos e eletrocardiograma.

QUESTÃO 7

Em relação à resposta metabólica ao trauma operatório, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Os macrófagos apresentam mobilização mais rápida em direção à área traumatizada do que os neutrófilos, porém seu tempo de vida é mais curto.
- B) Os neutrófilos promovem lesão tecidual por diversos mecanismos, destacando-se a liberação de enzimas proteolíticas, como as elastases.
- C) O óxido nítrico é produzido por vários tipos de células e pode mediar a vasodilatação e regular o tônus vascular.
- D) As proteínas reactantes da fase aguda são produzidas pelo fígado em resposta à injúria, na tentativa de manter a homeostasia.

QUESTÃO 8

No que se refere à cicatrização de feridas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Hipóxia relativa e acidose deprimem o estímulo à proliferação de células endoteliais.
- B) Na fase inflamatória, ocorre aumento da permeabilidade vascular, mediada, entre outras, pela serotonina e histamina.
- C) Os leucócitos têm importante papel na remoção de detritos celulares e de bactérias do leito da lesão.
- D) Os monócitos ativam-se em macrófagos, que são responsáveis pela produção de interleucina 1.

QUESTÃO 9

Em relação ao choque, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A presença de hipotensão sem taquicardia concomitante é sinal sugestivo de choque neurogênico.
- B) É característica do choque cardiogênico a redução da perfusão tecidual com volemia adequada.
- C) Gasometria arterial inalterada não exclui o diagnóstico de choque obstrutivo por embolia pulmonar.
- D) São causas habituais de choque obstrutivo: infarto agudo do miocárdio, dissecação aguda da aorta, embolia pulmonar e pneumotórax hipertensivo.

CLÍNICA MÉDICA

QUESTÃO 10

Analise as afirmativas a seguir sobre a diarreia.

- I. A associação de lesões aftosas na boca com lesões anais e perianais pode sugerir a presença da doença de Crohn.
- II. É a manifestação clínica que mais frequentemente se associa a doenças do intestino delgado.
- III. Quando a origem é o intestino delgado, as dejeções são pequenas, com número diário muito aumentado, frequentemente com muco, pus e sangue.

Estão **CORRETAS** as afirmativas:

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 11

Em relação à pancreatite aguda, assinale a alternativa que **NÃO** é considerada causa dessa doença.

- A) Cirurgia abdominal
- B) Hiperlipidemia
- C) Hipocalcemia
- D) Trauma abdominal contuso

QUESTÃO 12

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, estabelecendo a correlação diagnóstica entre os exames complementares e as doenças ou situações que afetam o aparelho respiratório.

COLUNA I

1. Alfa-1 antitripsina
2. Dímero D
3. Dosagem de cloro no suor
4. Espirometria
5. Ultrassonografia

COLUNA II

- () Asma
- () Derrame pleural
- () Embolia pulmonar
- () Enfisema pulmonar
- () Mucoviscidose

Assinale a sequência **CORRETA**.

- A) 4 5 2 1 3
- B) 1 5 3 4 2
- C) 3 1 2 5 4
- D) 5 4 3 1 2

QUESTÃO 13

Analise o caso clínico a seguir.

Homem de 42 anos de idade, sem antecedentes patológicos, apresenta há várias semanas parestesias nos pés, ataxia leve e diminuição da sensibilidade vibratória e da propriocepção nas pernas.

Considerando esse caso, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico **mais provável**.

- A) Anemia falciforme
- B) Anemia perniciosa
- C) Esclerose múltipla
- D) Talassemia

GINECOLOGIA / OBSTETRÍCIA

QUESTÃO 14

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente, 25 anos de idade, fez exame citopatológico cervicovaginal de rotina. O resultado revelou presença de células com relação núcleo-citoplasma aumentado, halo perinuclear e multinucleação.

Nesse caso, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico **mais provável**.

- A) Infecção por papilomavírus humano
- B) Cervicite crônica bacteriana
- C) Infecção por herpes-vírus tipo 2
- D) Neoplasia intraepitelial de alto grau

QUESTÃO 15

Considere o caso clínico a seguir.

Paciente, de 48 anos de idade, G1P1A0, relata menopausa há 2 anos. Na época do diagnóstico da menopausa, iniciou terapia hormonal devido a calor intenso. Já tentou suspender, porém o calor é recorrente. No momento, não apresenta queixas nem sangramento vaginal; é hipertensa e faz uso de Enalapril; mãe teve câncer de mama. Ao exame, apresenta: PA = 140 x 90 mmHg; IMC 24 kg/m²; mamas e exame ginecológico sem alterações.

Nesse caso, assinale a alternativa que apresenta **corretamente** a conduta a ser adotada.

- A) Solicitar exames complementares de rotina, como mamografia e ultrassonografia, e manter terapia hormonal até o resultado dos exames.
- B) Manter a terapia hormonal, independentemente dos resultados dos exames, pois a paciente teve diagnóstico de menopausa recentemente.
- C) Orientar a paciente sobre os riscos cardiovasculares da terapia hormonal e suspendê-la, pois a paciente é hipertensa.
- D) Suspender a terapia hormonal e solicitar ultrassonografia transvaginal de urgência e, somente depois do resultado desse exame, discutir a possibilidade de retorno.

QUESTÃO 16

Analise o quadro clínico a seguir.

Paciente, 35 anos de idade, primigesta, com 36 semanas de gestação, pré-natal acompanhado no ambulatório de alto risco, devido à hipertensão arterial crônica. Apresentou crise convulsiva há 2 horas e foi encaminhada à maternidade. Faz uso de Alfametildopa (1,5 g por dia) desde o primeiro trimestre de gestação. No exame físico, apresenta PA = 160 x 100 mmHg, pulso 94 bpm, dinâmica uterina sem contrações, batimentos cardíofetais de 130 bpm, colo grosso posterior e dilatado 2,0 cm.

A respeito desse quadro, assinale a alternativa que apresenta a **melhor** conduta a ser adotada.

- A) Prescrever sulfato de magnésio endovenoso e indicar resolução da gestação.
- B) Prescrever corticoide intramuscular por 48h e recomendar controle materno-fetal.
- C) Prescrever Nifedipina via oral associada à Alfametildopa e recomendar controle materno-fetal.
- D) Pedir exames para avaliação da função renal e hepática e recomendar controle materno-fetal.

QUESTÃO 17

Analise o caso clínico a seguir.

Paciente, 16 anos de idade, primigesta, iniciou pré-natal tardiamente. Encontra-se com 27 semanas de gestação e o último hemograma apresentou hemoglobina de 11 g/dL, em exame de rotina pré-natal.

Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta a **melhor** conduta a ser adotada.

- A) Realizar coleta seriada de hemograma e encaminhar para acompanhamento no ambulatório de alto risco.
- B) Introduzir ferro elementar 120 a 240 mg/dia e ácido fólico 5 mg/dia e encaminhar para acompanhamento no ambulatório de alto risco.
- C) Introduzir ferro elementar 40 mg/dia e manter orientação dietética considerando o estilo de vida da paciente.
- D) Solicitar exame parasitológico de fezes e ferritina sérica e retorno precoce para iniciar terapêutica.

PEDIATRIA

QUESTÃO 18

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda o aleitamento materno exclusivo até:

- A) 4 meses.
- B) 6 meses.
- C) 12 meses.
- D) 24 meses.

QUESTÃO 19

Quanto à avaliação do crescimento, é **CORRETO** afirmar:

- A) Apesar da simplicidade da utilização da antropometria, a falta de uma curva nacional fez com que o Ministério da Saúde contraindicasse a sua utilização em saúde pública.
- B) Para avaliar o crescimento, a medida da altura é mais importante que a do peso, devido à facilidade de sua obtenção.
- C) A caderneta do Ministério da Saúde utiliza curvas de percentil porque são mais fidedignas que as que utilizam escore z.
- D) O acompanhamento da medida de peso e sua localização em um gráfico é uma importante forma de avaliar o crescimento de uma criança.

QUESTÃO 20

Quanto ao tratamento de uma criança com diarreia aguda e com desidratação, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Caso a criança esteja desidratada, sempre iniciar com hidratação endovenosa.
- B) A prescrição de antibióticos é necessária porque a maioria das diarreias agudas é de origem bacteriana.
- C) Na desidratação leve e moderada, na qual não há sinais de choque, deve-se iniciar a hidratação com terapia de reidratação oral.
- D) Em uma criança com diarreia e desidratada, e sabendo-se que o vômito agravaria seu quadro, é imperioso o uso de antieméticos nesses casos.

QUESTÃO 21

No tratamento das pneumonias, é **CORRETO** afirmar que:

- A) todas as crianças após o diagnóstico de pneumonia bacteriana devem ser hospitalizadas.
- B) as pneumonias virais são muito raras, por isso, a utilização de antibióticos é tão importante numa criança com quadro respiratório.
- C) a droga de escolha para o tratamento da pneumonia na comunidade é a Penicilina Benzatina, pelo seu baixo custo.
- D) a Amoxicilina é utilizada para tratamento da maioria das pneumonias bacterianas.

SAÚDE PÚBLICA E SAÚDE SUPLEMENTAR

QUESTÃO 22

De acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Considerando as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) O SUS prevê atendimento parcial, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- B) O SUS prevê atendimento parcial, com prioridade para os serviços assistenciais, sem prejuízo das atividades preventivas.
- C) O SUS prevê atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
- D) O SUS prevê atendimento integral, com prioridade para os serviços assistenciais, sem prejuízo das atividades preventivas.

QUESTÃO 23

Analise os dados sobre o número de óbitos infantis por residência no período de 2010 a 2013.

Região / ano	2010	2011	2012	2013
Norte	5.289	5.093	5.113	5.163
Nordeste	13.197	3.006	12.527	12.717
Sudeste	4.120	14.172	4.114	13.748
Sul	4.220	4.395	4.238	4.141
Centro-Oeste	3.044	3.050	3.131	3.197
Total	39.870	39.716	39.123	38.966

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE MORTALIDADE (SIM), 2015.

Sobre o cálculo da taxa de mortalidade infantil, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) É necessário conhecer a estimativa populacional para cada ano (número de óbitos / população x 1 000).
- B) É necessário conhecer o número de nascidos vivos em cada ano (número de óbitos / nascidos vivos x 1 000).
- C) É necessário multiplicar o número de óbitos por 100, já que se trata de uma porcentagem (número de óbitos x 100).
- D) É necessário conhecer o número de óbitos em crianças de 0-7 dias (número de óbitos em crianças de 0-7 dias).

QUESTÃO 24

Os sistemas nacionais de saúde dos países em desenvolvimento vêm apresentando graves problemas relacionados à escassez de recursos financeiros, decorrentes da vertiginosa ampliação de tecnologias na área da saúde. Dessa forma, torna-se cada vez mais urgente o desenvolvimento de estratégias para enfrentamento das questões relativas à incorporação tecnológica desordenada.

(CONASS, 2012).

Sobre as estratégias de enfrentamento, analise as afirmativas a seguir:

- I. Estratégias de enfrentamento incluem avaliações de eficácia / efetividade e custo das tecnologias em saúde.
- II. A avaliação de tecnologias em saúde não influencia a decisão clínica, visto que esta é uma decisão individual.
- III. A avaliação de tecnologias opera somente no campo de saúde pública, uma vez que, no sistema privado, o custo não é um fator limitante para a obtenção de produtos em saúde.

Está(ão) **CORRETA(S)** a(s) afirmativa(s):

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) III, apenas.
- D) II e III, apenas.

QUESTÃO 25

Uma das principais diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) é a universalidade. Entretanto, observa-se elevado número de estabelecimentos de saúde privados no Brasil.

De acordo com a Constituição Federal, de que forma ocorre a participação do sistema de saúde privado?

- A) Complementar ao SUS.
- B) Opcional para o SUS.
- C) Compulsório para cidadãos com alto poder aquisitivo.
- D) Obrigatório para empresas.

QUESTÃO 26

De acordo com o Art. 3º da Resolução Normativa Nº 259 de 2011, a operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas em prazos pré-estabelecidos.

Sobre esses prazos, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Consulta básica (pediatria, clínica médica, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia): em até 7 (sete) dias úteis.
- B) Consulta nas especialidades médicas (nefrologista, pneumologista, ortopedista): em até 14 (quatorze) dias úteis.
- C) Serviços de diagnóstico por laboratório de análises clínicas em regime ambulatorial: em até 3 (três) dias úteis.
- D) Urgência e emergência: em até 3 (três) dias úteis.

QUESTÃO 27

De acordo com a Lei Nº 9.656 de 1998, o plano-referência de assistência à saúde deve contemplar os seguintes procedimentos, **EXCETO**:

- A) Cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar
- B) Centro de terapia intensiva
- C) Tratamento clínico ou cirúrgico experimental
- D) Tratamento antineoplásico

QUESTÃO 28

De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) "a cobrança feita aos beneficiários de plano de saúde pelos prestadores de serviços, como a conhecida taxa de disponibilidade, são consideradas indevidas".

Disponível em: < <http://www.ans.gov.br/a-ans/sala-de-noticias-ans/consumidor/2519-taxa-de-disponibilidade-para-acompanhamento-de-parto-e-ilegal-#sthash.JjpSqr9H.dpuf> >.
Acesso em: 14 ago. 2015.

A esse respeito, assinale a alternativa em que essa afirmativa se baseia.

- A) Artigo 198 da Constituição Federal de 1988 (Integralidade das ações em saúde)
- B) Artigo 10 da Lei Nº 9.656 de 1998 (Constituição do plano-referência de assistência à saúde)
- C) Artigo 3º da Resolução Normativa N.º 338 de 2013 (Dos princípios de atenção à saúde na saúde suplementar)
- D) Artigo 2º da Resolução Normativa Nº 124 de 2006 (Das infrações a que estão submetidos os planos privados de assistência à saúde)

QUESTÃO 29

De acordo com a Resolução Nº 338 de 2013, a atenção à saúde na Saúde Suplementar deverá observar os seguintes princípios, **EXCETO**:

- A) Centrar ações no cuidado médico para evitar falta de integração no cuidado ao paciente.
- B) Incorporar de ações de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças, bem como de estímulo ao parto normal.
- C) Usar a epidemiologia para monitoramento da qualidade das ações e gestão em saúde.
- D) Adotar medidas que evitem a estigmatização e a institucionalização dos portadores de transtornos mentais, visando o aumento de sua autonomia.

DERMATOLOGIA

QUESTÃO 30

Em relação à anatomia e fisiologia da pele, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O processo de maturação dos queratinócitos é influenciado por fatores genéticos, sistêmicos e ambientais.
- B) Os demossomos são estruturas de adesão localizadas entre queratinócitos e têm função de dar suporte ao epitélio.
- C) As células de Merckel encontram-se na camada basal da epiderme e apresentam função imunológica no processamento primário de antígenos.
- D) A zona de membrana basal desempenha várias funções, dentre elas encontra-se a aderência dermoepidérmica, o suporte mecânico e a barreira cutânea.

QUESTÃO 31

De acordo com o estudo da anatomia e fisiologia da pele, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O tamanho das glândulas sebáceas é diretamente proporcional às dimensões do pelo presente no folículo piloso correspondente.
- B) As glândulas sudoríparas écrinas existem em maior quantidade nas palmas, plantas e axilas.
- C) O produto da secreção das glândulas sebáceas, o *sebum*, apresenta diversas funções, dentre elas encontra-se a importante atividade antibacteriana e antifúngica.
- D) A musculatura da pele é predominantemente lisa, mas pode-se observar musculatura estriada na pele do pescoço e da face.

QUESTÃO 32

Em relação às alterações na fisiopatologia cutânea, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) Os granulomas de corpo estranho, nos quais predominam células epitelioides sobre os demais componentes do granuloma, podem ser produzidos pela queratina de cistos rotos, zinco, parafina, berílio, sílica e outras substâncias.
- B) Doenças da paratireoide são as causas mais comuns de depósitos de cálcio na pele.
- C) Os granulomas da sarcoidose apresentam frequentemente fenômenos necrobióticos do colágeno.
- D) A substância amiloide pode, mais raramente, se depositar na pele de forma secundária a processos crônicos cutâneos.

QUESTÃO 33

Em relação à imunopatologia cutânea, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A resposta imunitária envolve, fundamentalmente, os mecanismos humorais dependentes de linfócitos T e os mecanismos celulares condicionados por linfócitos B.
- B) Os receptores dos linfócitos T correspondem a moléculas de imunoglobulina secretadas pela célula e dispostas na sua superfície.
- C) A reação imunológica anafilactoide ocorre devido à formação de complexos imunes que se precipitam em zonas de excesso antigênico moderado.
- D) Na reação imunológica de hipersensibilidade tardia, as lesões resultam da interação do antígeno com linfócitos previamente sensibilizados.

QUESTÃO 34

Em relação à semiologia dermatológica, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O sinal de Auspitz se caracteriza pelo aparecimento de urtica após uma fricção da lesão examinada.
- B) O fenômeno de Koebner se caracteriza pelo surgimento de lesões similares às da dermatose apresentada pelo doente nas áreas submetidas a traumas cutâneos.
- C) O sinal de Sampaio se caracteriza pela identificação de uma bainha gelatinosa na raiz dos cabelos da área afetada e indica atividade da doença.
- D) O sinal de Zileri é identificado como positivo quando se obtém uma descamação furfurácea após o estiramento de uma mácula sugestiva de pitíriase versicolor.

QUESTÃO 35

Em relação aos métodos complementares da semiologia dermatológica, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A citodiagnose consiste em fazer esfregaço de material colhido na base de uma lesão e examinar após a coloração pelo Leishman ou Giemsa.
- B) O exame com a luz de Wood deve ser realizado em local escuro com uma lâmpada que emite radiações ultravioleta, a fim de se verificar a fluorescência na área afetada.
- C) A dermatoscopia, que permite boa penetração de luz até na derme média e profunda, possibilita o estudo de lesões benignas e malignas localizadas até em níveis mais profundos da pele.
- D) A diascopia possibilita distinguir o nevus anêmico da mancha hipocrômica e o eritema da púrpura.

QUESTÃO 36

Em relação às erupções eczematosas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O líquen simples crônico é raro em crianças e tem como sítios de predileção a nuca, região sacra, genital e membros, podendo, entretanto, ocorrer em outras áreas.
- B) O eczema atópico pré-puberal se caracteriza geralmente pelo surgimento de lesões recidivantes vésico-secretantes, exulcerações e crostas nas regiões de dobras cutâneas, face e dorso das mãos e pés.
- C) A via aferente da dermatite de contato alérgica é denominada fase de indução e se inicia quando a substância química causal de baixo peso molecular entra em contato com a pele.
- D) A fase de elicitação da dermatite de contato alérgica ocorre quando o indivíduo previamente sensibilizado entra novamente em contato com o antígeno causal.

QUESTÃO 37

Em relação à sífilis, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) O cancro duro surge, em média, três a cinco dias após a infecção.
- B) O tratamento da sífilis na gravidez deve ser feito preferencialmente com o estolato de eritromicina ou tetraciclina.
- C) Na sífilis recente, a negatificação sorológica ocorre, em geral, nos primeiros três meses após o tratamento.
- D) As reações sorológicas para sífilis tornam-se positivas, em geral, entre a segunda e quarta semana após o aparecimento do cancro duro.

QUESTÃO 38

Com relação às doenças sexualmente transmissíveis, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O linfogranuloma venéreo é mais comum em climas tropicais e subtropicais.
- B) A donovanose, principalmente no sexo feminino, pode determinar manifestações elefantíasicas após formas ulcerativas que promovem alterações linfáticas locais.
- C) A infecção gonocócica disseminada é mais frequente na mulher e inicia-se geralmente no período menstrual por sepse gonocócica.
- D) O cancro mole é mais comum na mulher e, por isso, é frequentemente transmitido após relações sexuais com prostitutas.

QUESTÃO 39

Em relação às doenças sexualmente transmissíveis, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A uretrite herpética é frequente e deve ser considerada após a devida exclusão de outros agentes causais mais facilmente isolados nas uretrites.
- B) No linfogranuloma venéreo, pode-se observar tardiamente: elefantíase dos genitais externos, retite estenosante, e, ocasionalmente, acometimento do testículo e epidídimo.
- C) A donovanose é geralmente transmitida pelo contato sexual com indivíduos doentes.
- D) O período de incubação da uretrite gonocócica é, em geral, de duas a quatro semanas após o coito infectante.

QUESTÃO 40

Em relação às micoses profundas, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A esporotricose, na maioria das vezes, localiza-se nos membros superiores ou face e menos frequentemente nos membros inferiores.
- B) O eumicetoma é causado por várias espécies de *Nocardia*.
- C) A paracoccidiodomicose acomete mais frequentemente pacientes do sexo feminino, por causa da proteção do hormônio masculino nos homens.
- D) A cromomicose apresenta riscos de acometimento sistêmico, via hematogênica, impondo-se investigação para se afastar lesões viscerais em todo caso cutâneo.

QUESTÃO 41

Em relação às doenças infecciosas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Na paracoccidiodomicose, a inoculação cutânea primitiva na pele é excepcional.
- B) A forma torácica de actinomicose endógena pode originar-se por aspiração da bactéria ou por embolização, a partir de foco cervical.
- C) No tratamento da actinomicose endógena, são utilizadas sulfas como primeira escolha por um período de seis a 24 meses.
- D) Na feohifomicose subcutânea, são encontradas numerosas espécies de fungos dematiáceos.

QUESTÃO 42

Em relação às micoses superficiais, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A tinha da barba, rara em nosso meio, apresenta três quadros distintos: o tipo com lesões inflamatórias, exsudativas e supurativas, o tipo com lesões anulares, eritemato-pápulo-vésico-escamosas e o tipo com pústulas foliculares e crostas.
- B) A tinha negra é provocada por fungo filamentosso preto denominado *Trichosporon beigeli*.
- C) Nas tinhas tonsurantes, podem ocorrer pápulas foliculares na pele, particularmente no tronco, por hipersensibilidade ao fungo.
- D) A candidose oral é comum nos lactentes, mas pode ocorrer também em idosos com dentes mal conservados ou prótese dentária e em imunodeprimidos.

QUESTÃO 43

Em relação às erupções por drogas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A erupção fixa por droga envolve reação alérgica com atuação da imunidade celular.
- B) A necrólise epidérmica tóxica apresenta clivagem subepidérmica ao exame histopatológico.
- C) O hábito de fumar heroína provoca lesões pigmentadas do tipo eritema pigmentar fixo na língua.
- D) As urticárias agudas têm como principal mecanismo fisiopatológico as reações alérgicas tipo IV, por atuação da imunidade celular.

QUESTÃO 44

Em relação à hanseníase, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A forma tuberculoide pode apresentar necrose caseosa em tronco nervoso periférico.
- B) Na forma indeterminada, pode-se observar eventualmente algum tronco nervoso afetado associado à lesão cutânea sugestiva.
- C) A forma virchoviana pode-se apresentar com numerosas lesões na face com conservação dos cabelos, quadro denominado "facies leonina".
- D) Na forma dimorfa, cujo teste de Mitsuda geralmente se encontra negativo, enquadra-se a maioria dos pacientes de hanseníase.

QUESTÃO 45

Em relação à leishmaniose tegumentar americana, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Após um período de incubação de uma a quatro semanas, surge a lesão inicial localizada no ponto de inoculação do agente causal.
- B) A reação de Montenegro logo se positiva e, por isso, é um bom exame para a diagnose nos primeiros dois meses de doença.
- C) As lesões mucosas podem aparecer precocemente, porém, geralmente, surgem um ou dois anos após o início da infecção.
- D) A evolução da doença e a infecção secundária podem atingir a estrutura cartilaginosa do nariz e comprometer os ossos da face.

QUESTÃO 46

Em relação às neoplasias cutâneas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O carcinoma basocelular esclerosante tem evolução lenta e nunca se ulcera.
- B) O lentigo maligno melanoma é o segundo tipo de melanoma em frequência, representando um total de 15% a 30% dos casos nas séries estudadas.
- C) O carcinoma espinocelular na mucosa pode iniciar-se em placa de leucoplasia.
- D) A doença de Paget, na grande maioria dos casos, acompanha-se de um adenocarcinoma ductal mamário.

QUESTÃO 47

Em relação à escabiose, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O sulco escavado é uma pequena saliência linear, não maior que 1 cm, com vésico-pápula perlácea em uma das extremidades, contendo a fêmea fecundada.
- B) A sarna nodular localiza-se geralmente nas regiões genital, inguinal e axilar.
- C) A sarna norueguesa caracteriza-se pela formação de crostas, que podem alcançar vários milímetros de espessura, e deve-se a uma maior virulência do agente causal.
- D) A sarna em crianças afeta, além das áreas classicamente descritas, as palmas, plantas e couro cabeludo.

QUESTÃO 48

Em relação às dermatoviroses, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Mulheres com história de herpes genital devem fazer cesariana para prevenir o grave quadro de herpes simples neonatal.
- B) O orf (ectima contagioso) ocorre por contato com ovinos e é provocado pela inoculação de um parapoxvírus.
- C) A doença das mãos, pés e boca caracteriza-se por febre moderada e pela presença de pápulas inflamatórias orais e nas margens laterais das mãos e pés, bem como nas regiões palmo-plantares.
- D) A papulose bowenoide é mais frequente no homem e caracteriza-se geralmente por lesões papulosas, planas, com cor variando do vermelho ao castanho-escuro, localizadas no órgão genital.

QUESTÃO 49

Em relação ao eritema nodoso, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) É mais frequente em mulheres adolescentes e de meia idade.
- B) Caracteriza-se por nódulos dolorosos, duros, eritematosos e com tendência a ulcerações.
- C) Eritema multiforme pode ser causado por inúmeros agentes bacterianos.
- D) Evolui geralmente por surtos com três a seis semanas de duração.

QUESTÃO 50

Com relação aos pênfigos, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Recém-natos de mães com pênfigo foliáceo apresentam imunoglobulinas tipo IgG fixadas na pele e no soro, detectáveis após o parto.
- B) O pênfigo vulgar inicia-se, na maioria das vezes, com lesões cutâneas vésico-bolhosas, que coalescem e se rompem; posteriormente, há também o envolvimento da mucosa oral.
- C) O pênfigo vegetante inicia-se geralmente na mucosa oral, evoluindo depois para o acometimento das grandes dobras flexurais e intertriginosas.
- D) Drogas como penicilamina, captopril e rifampicina já foram descritas como desencadeadoras do pênfigo induzido por drogas.

QUESTÃO 51

Com relação às doenças bolhosas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O penfigoide bolhoso acomete principalmente idosos e se caracteriza por bolhas tensas e grandes com predileção pelas áreas flexurais e parte inferior do abdome.
- B) A dermatite herpetiforme acomete mais adultos, geralmente não há acometimento mucoso e as lesões cutâneas são pápulo-vesiculosas, pruriginosas, que evoluem para bolhas tensas, com tendência a se agruparem.
- C) A epidermólise bolhosa adquirida é rara, mais comum em crianças, apresenta bolhas em áreas de trauma, que se curam lentamente com cicatrizes atróficas.
- D) A dermatose por IgA-linear não responde frequentemente às sulfas e nem às dietas com ausência de glúten, como observado na dermatite herpetiforme.

INSTRUÇÃO: Para resolver as questões **52** e **53**, analise o caso clínico seguinte.

Paciente, masculino, melanoderma, 34 anos de idade, jardineiro, natural e residente em Curvelo-MG, apresenta-se há quatro meses com lesão ulcero-vegetante no antebraço direito, com 6 cm de diâmetro e bordas eritematosas.

QUESTÃO 52

Diante do caso apresentado, assinale a alternativa que indica as principais hipóteses diagnósticas.

- A) Cromomicose, botriomicose, paracoccidioidomicose e micobacteriose atípica.
- B) Esporotricose, cromomicose, leishmaniose e carcinoma espinocelular.
- C) Paracoccidioidomicose, tuberculose verrucosa, actinomicose e carcinoma espinocelular.
- D) Esporotricose, cromomicose, zigomicose e tuberculose verrucosa.

QUESTÃO 53

Em relação a esse caso, assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta a ser adotada, após o resultado negativo do exame micológico de raspado.

- A) Coletar material para culturas, realizar biópsia para exame anátomo-patológico e pesquisa de agente etiológico, intradermorreação (PPD).
- B) Coletar material para culturas, realizar biópsia para exame anátomo-patológico e pesquisa de agente etiológico.
- C) Coletar material para culturas e pesquisa de agente etiológico.
- D) Coletar material para culturas, realizar biópsia para exame anátomo-patológico e pesquisa de agente etiológico, intradermorreação (Montenegro).

QUESTÃO 54

Com relação à psoríase, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A acrodermatite contínua de Hallopeau é condição rara, mais frequente em mulheres, caracterizada por numerosas pústulas sobre base eritematosa, que às vezes coalesce, formando verdadeiros lagos de pus nas extremidades digitais.
- B) A psoríase artropática ocorre em cerca de 30% dos doentes de psoríase, em geral naqueles com lesões cutâneas disseminadas.
- C) A psoríase ungueal pode preceder o aparecimento das lesões cutâneas e ser, durante anos, a única manifestação da doença.
- D) O Acitretin é particularmente indicado na psoríase pustulosa generalizada, geralmente com rápido início de resposta terapêutica.

QUESTÃO 55

Com relação às erupções purpúricas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A púrpura de Henoch-Schönlein é mais comum em crianças e pode ser observada após infecções das vias respiratórias.
- B) A púrpura pigmentosa crônica é mais frequente em homens adultos, e sua causa não é conhecida.
- C) A púrpura artefata caracteriza-se geralmente por lesões purpúricas de aspecto insólito, contornos geométricos, simétricas, situadas em locais facilmente alcançados pelas mãos.
- D) A púrpura tromboastênica (síndrome de Glanzmann-Naegeli) é quadro raro, autossômico e recessivo, que se caracteriza por uma diminuição quantitativa da produção plaquetária, desencadeando sangramentos e púrpura.

QUESTÃO 56

Com relação aos prurigos, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O prurigo nodular (Hyde) é uma afecção rara, constituída por lesões pápulo-nodulares, localizadas nas superfícies extensoras dos membros, acompanhadas geralmente de prurido discreto e crônico.
- B) O prurigo de Hebra é uma síndrome de hipersensibilidade, admitindo-se que picadas de insetos possam ser causa desencadeante.
- C) O estrófulo parece estar relacionado à anomalia do desenvolvimento imunológico, atingindo mais frequentemente crianças com constituição atópica.
- D) O prurigo melanótico atinge, predominantemente, a mulher adulta e deve ser diferenciado da amiloidose por exame histopatológico.

QUESTÃO 57

Com relação à etiopatogenia das dermatoses por imunodeficiências, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Na hipogamaglobulinemia transitória da infância, os níveis de IgG normalizam-se entre os 12 e os 36 meses de idade.
- B) Na deficiência seletiva de IGM, cerca de 50% dos pacientes mostram redução numérica dos linfócitos T.
- C) A deficiência seletiva de IgA é a mais comum das deficiências imunológicas e pode ocorrer sob forma esporádica ou hereditária.
- D) A agamaglobulinemia congênita pode ocorrer esporadicamente ou de forma hereditária e, na maioria dos casos, faltam linfócitos B maduros.

INSTRUÇÃO: Para resolver as questões **58** e **59**, analise o caso clínico seguinte.

Paciente, sexo feminino, 25 anos de idade, residente em Pirapora-MG, refere há seis meses queixa de bolhas flácidas, que se rompem rapidamente, deixando áreas erosadas. Há confluência das lesões, localizadas na face, no pescoço e na parte superior do tronco. Nega uso de qualquer medicação sistêmica. Ao exame dermatológico, apresenta lesões eritemato-escamo-crostosas, exulcerações nas regiões supracitadas; sem lesões em mucosas.

QUESTÃO 58

Diante do caso apresentado, assinale a alternativa que apresenta as hipóteses diagnósticas mais prováveis.

- A) Pênfigo foliáceo, lupus eritematoso, dermatite seborreica.
- B) Dermatite seborreica, pênfigo vulgar, lupus eritematoso.
- C) Pênfigo vulgar, pênfigo foliáceo, dermatose por IgA linear.
- D) Pênfigo induzido por drogas, dermatose por IgA linear, lupus eritematoso.

QUESTÃO 59

Optou-se por realizar uma biópsia para exame anátomo-patológico e imunofluorescência direta, a fim de se definir o diagnóstico mais provável. A histopatologia revela clivagem intramalpighiana alta, logo abaixo da camada granulosa, por acantólise. A imunofluorescência direta demonstra a presença de anticorpos antiepitéliais da classe IgG nos espaços intercelulares.

Diante desses resultados, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico do caso apresentado.

- A) Lupus eritematoso.
- B) Pênfigo foliáceo.
- C) Pênfigo vulgar.
- D) Dermatose por IgA linear.

QUESTÃO 60

Em relação ao dano solar cutâneo, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) O eritema solar tem como única causa a radiação ultravioleta B (UVB), não havendo, assim, qualquer participação de outros tipos de raios ultravioleta.
- B) A pigmentação solar imediata deve-se à ação da radiação UVA e luz visível, particularmente até 450 nm.
- C) As exposições solares agudas e intermitentes são as principais responsáveis pelo fotoenvelhecimento cutâneo que surge a partir da terceira década de vida.
- D) O quadro de poiquilodermia solar é uma alteração caracterizada por espessamento de consistência coriácea e superfície sulcada, como casca de laranja, nas faces laterais do pescoço.

QUESTÃO 61

Com relação às fotodermatoses, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A síndrome de Hartnup é uma genodermatose com alterações semelhantes à pelagra, por ação da luz solar.
- B) A erupção polimorfa à luz é causada principalmente pelo ultravioleta A (UVA), com menor importância pode haver participação causal do ultravioleta B (UVB) e espectro visível.
- C) O uso de pós ou pomadas contendo compostos sulfamídicos pode desencadear fotoalergia, caracterizada por eczema nas áreas expostas.
- D) A reação cutânea mais frequente aos psoralênicos é de fototoxicidade.

QUESTÃO 62

Com relação às dermatoses metabólicas, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A gota é um distúrbio do metabolismo das pirimidinas, que ocorre predominantemente em homens.
- B) A homocistinúria é doença metabólica hereditária de transmissão autossômica dominante e ocorre devido à deficiência da enzima cistationina sintetase.
- C) A fenilcetonúria é doença rara, que se caracteriza por deficiência da enzima fenilalanina hidroxilase, resultando aumento da fenilalanina no sangue e excreção urinária dos ácidos fenilpirúvico e fenilacético.
- D) A kwashiorkor ocorre por deficiência nutricional, com baixa ingestão de proteína, acometendo crianças maiores, geralmente acima dos 8 anos de idade.

QUESTÃO 63

Com relação às porfirias, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A porfiria eritropoiética (congenita) é rara, provavelmente por herança autossômica recessiva, e ocorre em jovens, que raramente atingem a vida adulta.
- B) A protoporfiria eritropoiética é rara, autossômica dominante, determinada por deficiência da enzima ferroquelatase nos eritrócitos e fibroblastos da pele.
- C) A porfiria cutânea tardia apresenta duas formas clínicas distintas e caracteriza-se por aumento da coproporfirina nas hemáceas, com excreção urinária e fecal de porfirinas normais.
- D) A porfiria hepática aguda (intermitente) ocorre no adulto, às vezes é familiar, autossômica dominante, e em outras vezes há história de abuso de álcool ou ingestão de medicamentos.

QUESTÃO 64

Com relação às piодermites, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Na foliculite decalvante, admite-se que a invasão bacteriana represente apenas um dos mecanismos de produção das lesões, desconhecendo-se os mecanismos de aparecimento de atrofia e intensa destruição folicular.
- B) A foliculite dissecante ocorre principalmente em jovens, caracteriza-se por nódulos e abscessos comunicantes drenando pus e serosidade.
- C) O impetigo é mais comum em crianças, e a falta de higiene costuma ser fator predisponente.
- D) O erisipeloide é provocado geralmente por estreptococo beta-hemolítico do grupo A e mais raramente por *S. aureus* e ocorre habitualmente nos membros.

QUESTÃO 65

Com relação às discromias, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A síndrome do bebê bronzeado caracteriza-se por cor cinzenta-bronze em neonatos com icterícia após início da fototerapia.
- B) Os antimaláricos depositam-se na pele e podem causar cor acinzentada.
- C) O nevus halo (nevus de Sutton) caracteriza-se por surgimento de halo despigmentado em redor de um nevus melanocítico e pode ser associado a desaparecimento total ou parcial do nevus melanocítico.
- D) A repigmentação espontânea no vitiligo não é rara e se inicia com ilhotas pontuadas ou gotadas nos óstios foliculares, no interior da mancha, ou de modo centrípeto, através das bordas.

QUESTÃO 66

Em relação à síndrome da pele escaldada estafilocócica, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O exame histopatológico da lesão demonstra clivagem intraepidérmica baixa suprabasal.
- B) O quadro clínico inicia-se com febre e irritabilidade, a pele se torna quente e eritematosa e após período de 24 a 48 horas começa a se soltar.
- C) É causada por uma toxina epidermolítica produzida pelo *Staphylococcus aureus* grupo II, fagos 71 e 55.
- D) O sinal de Nikolsky é positivo, pois há descolamento com a pressão na área afetada.

QUESTÃO 67

Em relação ao líquen plano, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) As pápulas podem se dispor em linhas, que muitas vezes surgem após escoriações ou outros traumatismos.
- B) Observam-se lesões mucosas em cerca de um terço dos casos e podem constituir manifestação isolada.
- C) O curso é crônico, variando de meses a anos, com frequente involução espontânea, mas pode haver recidiva.
- D) O líquen plano bolhoso é de difícil distinção clínica com o penfigoide bolhoso, mas pode ser diferenciado pela imunofluorescência direta, que geralmente é negativa no líquen plano bolhoso.

QUESTÃO 68

Em relação às urticárias, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Nas formas agudas, é frequentemente possível a elucidação etiológica, mas nas formas crônicas, em pelo menos 70% das vezes, a causa permanece obscura.
- B) Os testes cutâneos de escarificação, a exclusão de inalantes e as dietas de eliminação são hoje imprescindíveis na investigação causal.
- C) O doente deve ser orientado no sentido de evitar o uso de ácido acetilsalicílico e anti-inflamatórios, tranquilizantes, laxantes e alimentos com potencial urticariogênico, como mariscos, camarões, tomates, chocolate e morangos.
- D) A urticária colinérgica compreende cerca de 5% a 7% das urticárias crônicas e acomete principalmente jovens de 15 a 25 anos.

QUESTÃO 69

Em relação à acne, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A acne por cosméticos é a forma mais frequente de acne induzida e ocorre frequentemente em mulheres na segunda década de vida.
- B) A isotretinoína pode ser usada na acne vulgar porque atua eletivamente sobre a glândula sebácea, diminui a sebogênese e normaliza a queratinização folicular alterada.
- C) No tratamento tópico da acne vulgar comedônica (grau I), a indicação eletiva é o peróxido de benzoila em concentrações de 2,5% a 10%.
- D) A acne vulgar que se caracteriza por apresentar comedos abertos, pápulas, com ou sem eritema inflamatório, pústulas e seborreia fluente é classificada como acne grau III.

QUESTÃO 70

Em relação ao lúpus eritematoso, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O lúpus eritematoso crônico cutâneo constitui a variante clínica mais comum.
- B) O lúpus eritematoso cutâneo subagudo é forma disseminada cutânea, com importante componente de fotossensibilidade e lesões cutâneas que geralmente envolvem sem atrofia cicatricial e com hipopigmentação.
- C) O lúpus eritematoso cutâneo agudo ocorre exclusivamente no lúpus sistêmico (LES) em atividade.
- D) No lúpus sistêmico, incluem-se, entre os sinais e sintomas gerais, a febre, anorexia, adinamia, fraqueza muscular, cefaleia e, em cerca de 10% a 15% dos doentes, a afecção renal glomerular.

QUESTÃO 71

Em relação à doença mista do tecido conjuntivo ou síndrome de Sharp, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Apresenta como características típicas o fenômeno de Raynaud, a poliartralgia ou artrite, o edema de mãos com aspecto em "charuto" dos dedos, a hipomotilidade esofágica, a miopatia inflamatória proximal e o comprometimento pulmonar.
- B) O estudo radiológico das articulações mostra osteoporose e, eventualmente, lesões erosivas, e o raio X pulmonar evidencia fibrose em graus variáveis.
- C) A imunofluorescência direta da pele assintomática e comprometida demonstra deposição de IgG nos núcleos epidérmicos e deposição em faixa, na zona de membrana basal, com aspecto pontilhado.
- D) Os anticorpos anti-DNA e anti-nucleares estão geralmente presentes, em títulos baixos.

QUESTÃO 72

Em relação às dermatofitoses, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A terbinafina oral é a primeira alternativa terapêutica para o tratamento da tinea capitis em crianças.
- B) Na tinha da pele glabra, forma anular, a pesquisa de fungos deve ser realizada no centro das lesões em virtude da maior quantidade de parasitas observado nessa área.
- C) A tinha das mãos é mais frequente do que a tinha dos pés.
- D) Animais infectados por dermatófitos podem ser portadores sãos e responsáveis pela transmissão da doença ao ser humano.

QUESTÃO 73

Em relação aos linfomas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A micose fungoide apresenta geralmente evolução crônica, com tempo médio de sobrevida em torno de cinco anos.
- B) A doença de Woringer-Kolopp caracteriza-se geralmente pela presença de placas eritemato-descamativas, policíclicas, bem definidas, de crescimento muito lento, localizadas nas extremidades.
- C) A síndrome de Sézary é uma forma epidermotrópica de linfoma cutâneo de células T associado a eritrodermia, hiperqueratose palmo-plantar fissurada, linfadenopatias múltiplas e volumosas, entre outras alterações.
- D) A *cútis laxa granulomatosa (granulomatous slack skin)* é uma variante rara de linfoma de células B, predominante em homens.

QUESTÃO 74

Em relação às ictioses, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O acitretin pode beneficiar os doentes de formas graves de ictioses, nos quais as medidas locais não serão suficientes.
- B) A ictiose vulgar apresenta maior acometimento do couro cabeludo, fronte, palmas, plantas e nas dobras flexurais.
- C) A hiperqueratose epidermolítica é uma gernerodermatose autossômica dominante que apresenta, ao exame histopatológico, degeneração granular composta por vacuolização das células granulosas e malpighianas altas.
- D) A ictiose linear circunflexa é doença autossômica recessiva rara caracterizada por eritema difuso com áreas de descamação policíclicas.

QUESTÃO 75

Em relação à epidermólise bolhosa, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) A variante herpetiforme é autossômica dominante, as manifestações clínicas surgem nos primeiros dias de vida e se caracterizam pelo aparecimento de vesículas e bolhas no tronco e extremidades, com distribuição herpetiforme.
- B) A variante simples localizada é autossômica dominante e se caracteriza por bolhas recorrentes que ocorrem exclusivamente nas mãos e nos pés.
- C) A epidermólise bolhosa juncional, variante de Herlitz, autossômica dominante, apresenta prognóstico grave, com êxito letal dentro dos dois primeiros anos de vida, embora alguns indivíduos possam atingir a idade adulta.
- D) A forma distrófica recessiva apresenta bolhas hemorrágicas e erosões desde o nascimento, com surgimento de cicatrizes. As mãos e pés podem apresentar-se deformados, com fusão total dos dedos.

QUESTÃO 76

Em relação à policondrite recidivante, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) É doença comum de etiopatogênese desconhecida que acomete as cartilagens.
- B) A condrite atinge mais frequentemente as regiões auriculares, verificando-se esta ocorrência em cerca de 90% dos casos.
- C) Grande parte dos pacientes tem, associadamente, artrites e, eventualmente, podem haver lesões dos aparelhos auditivos, ocular e respiratório.
- D) Eventualmente, podem surgir lesões cardíacas e a moléstia pode ser fatal.

QUESTÃO 77

Em relação às afecções dos anexos cutâneos, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A) A dermatite perioral é caracterizada pela presença de eritema, pápulas e pústulas na face. Ocorre particularmente ao redor da boca e em homens.
- B) A hidradenite é mais comum em mulheres e ocorre geralmente após os 30 anos de idade.
- C) A rosácea ocular ocorre em cerca de 50% dos doentes, podendo ocorrer blefarite, conjuntivite, episclerite, irite e queratite.
- D) A moléstia de Fox-Fordyce (miliária apócrina) inicia-se entre os 14 e os 35 anos de idade e é mais frequente em homens.

QUESTÃO 78

Em relação às vasculites, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) As manifestações clínicas da púrpura de Henoch-Schonlein envolvem a pele, as articulações, o trato gastrointestinal e os rins.
- B) O eritema elevatum diutinum é forma rara de vasculite necrotizante, de evolução crônica, provavelmente relacionada a estímulos infecciosos.
- C) A poliarterite nodosa apresenta-se geralmente em adultos jovens e do sexo feminino.
- D) A granulomatose de Wegener é rara, caracteriza-se por uma vasculite necrotizante granulomatosa do trato respiratório superior e inferior, glomerulonefrite e vasculite disseminada.

QUESTÃO 79

Em relação aos cistos, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O esteatoma múltiplo (sebocistomatose) é, em geral, uma enfermidade de caráter genético autossômico dominante, embora existam casos esporádicos não hereditários.
- B) O cisto veloso eruptivo são cistos derivados de folículos pilosos tipo velus.
- C) Os cistos triquilemais são os mais comuns dentre os cistos cutâneos e apresentam conteúdo de queratina e a parede composta por epitélio cuja queratinização é semelhante à bainha externa do folículo piloso.
- D) O cisto dermoide se caracteriza por nódulos subcutâneos localizados nas áreas de fendas embrionárias, como regiões periorbitárias, pescoço, região supraesternal, sacral e perineal.

FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO)

01	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

28	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
36	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
37	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
38	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

55	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
56	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
57	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
58	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
59	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
61	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
62	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
63	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
64	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
65	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
66	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
67	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
68	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
69	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
70	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
71	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
72	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
73	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
74	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
75	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
76	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
77	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
78	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
79	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

**ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**